

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書


子部
第五三冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EP66/07

四庫全書存目叢書·子部五三

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 49.125 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第五三冊目次

子部·醫家類

傷寒分經十卷

〔漢〕張機撰 〔清〕喻昌增註 吳儀洛訂
中國科學院圖書館藏清乾隆三十一年吳氏利濟堂刻吳氏醫學述本

一

醫貫砭二卷

〔清〕徐大椿撰
北京大學圖書館藏清刻本

三〇六

臨證指南醫案十卷

〔清〕葉桂撰
浙江圖書館藏清乾隆三十三年刻本

三四四

傷寒分經十卷

〔漢〕張機撰 〔清〕喻昌增註 吳儀洛訂

中國科學院圖書館藏清乾隆三十一年吳

氏利濟堂刻吳氏醫學述本

附《四庫全書總目·傷寒分經

十卷》提要

序

儒不通經，不可以稱儒；醫不通經，不可以稱醫。靈素諸經，猶儒者之六經也。仲景諸書，猶儒者之四書也。今之醫，無論不能熟玩靈素，甚且并仲景之書而忽易之，噫！醫道之不明，尚可言哉！夫仲景生丁漢季，憫民天枉，昭揭病源，同於日月，所著傷寒論，實為衆法之宗。羣方之祖。昔朱子有言：「天不生孔子，萬古如長夜。」天生仲景，是亦醫門之孔子也。惜其書早已散失，僅得諸晉世，讀者口授，故篇目

傷寒分經

序

一

先後錯亂為多。惟時太醫令王叔和取三百九十七法，一百一十三方，編集成書，厥功甚偉。第其編述，潦草糊塗，加以妄入序例，繆戾滋多，大為後世病。至宋時林億成，無已不特校註多差，且將叔和緯翼仲景之詞，混編為仲景之書，於是已岐又岐，一誤再誤。學者研窮，無所從入。雖有英賢輩出，如龐安常、朱肱、許叔微、韓祗和、王實之流，究莫能舍叔和之疆畛，追溯仲景淵源。近代王肯堂、張景岳之書，皆膾炙人口，其所稱引，尚不免承訛襲陋。

其他乎嗟乎七篇不作楊墨之橫流不息也濂洛關閩之傳注不出堯舜周孔之道家殊而戶異也是故義利之辨圖象性命之問難其所以為不得已者易地則皆然也慨自叔和而後傷寒一書沉淪於羊腸鳥道中者幾千餘年天意未喪有明方中行出著傷寒條辨澄幾研理卓識超越前人即其註未盡達仲景立言之旨而叔和序例獨首創去可謂闢盡榛蕪矣至西昌喻嘉言踵而增之尤為完美所著前後尚論篇編次則綱舉目張闡發則獨開生面春溫一篇理解尤屬創闢究不於仲景論外旁溢一詞此真張氏之功臣而吾徒之先覺也已不揣取其書重訂之間有白璧微瑕稍為更易以期大暢作者宗旨而後已至于仲景原文詞約旨遠體認不精繆以千里竊為添註腳於其中俾有志斯道者藉為筌蹄焉蓋自有晉以迄今茲醫門著作林立其能發揮素問之蘊奧者首推王氏而能發揮仲景之蘊奧者則首推喻氏非一人之私言云爾也讀其書當有見其槩者

乾隆丙戌年上元前五日漱水吳儀洛遵程書於硤川之利濟堂



此吳氏書成于乾隆丁丑距丙戌六十一年也本堂舊藏三種本多字誤此書多本為氏述也
乙作宜女字辨如是 永福力鈞記

傷寒分經

序

三

吳氏醫學述第五種傷寒分經總目

卷一上

太陽經上篇

風傷衛證
法五十三條

卷一中

太陽經中篇

寒傷營證
法五十八條

卷一下

太陽經下篇

風寒兩傷營衛證
法二十四條

卷二上

陽明經上篇

太陽陽明經證
法三十九條

傷寒分經

總目

一

卷二中

陽明經中篇

正陽陽明府證
法三十一條

卷二下

陽明經下篇

少陽陽明經證
法三條
附太陽陰轉
陽明一證
附厥陰轉陽明一證

卷三上

少陽經全篇

法共二十一條
附併病五條
附合病九條
附壞病三條

附痰病
三條

卷三下

太陰經全篇

法九條

卷四上

少陰經前篇

從權溫經法
二十五條

卷四中

少陰經後篇

正治存陰法
一十九條

卷四下

厥陰經全篇

法四十七條
附差後勞復證七條
附陰陽
易一條

卷五上

春溫上篇

冬傷於寒春必病
溫之證一十七條

傷寒分經

總目

二

卷五中

春溫中篇

冬不藏精春必病
溫之證一十條

卷五下

春溫下篇

冬傷於寒又冬不藏精春月同時
病發之證法二條
附辨溫證合
偶感之客邪小兒春月
病溫治法亦分為三例

卷六

夏熱全篇

病五條
溫證一條
濕病七條
霍亂證九條

夏熱全篇

卷七上

脈法前篇

卷七下

脈法後篇

卷八

諸方全篇

卷九附

補卒病論大意

三條比類傷寒論陽虛陰盛治法并死證
共三十一條比類傷寒論陽虛陰盛治法并死證
六條比類內經金匱胸腹寒痛十七條

傷寒分經總目

三

附論胡養神論治法 暴卒中寒方六首
引證傷寒論方治十四首 引證金匱方
治十二首 評定通
用成方共二十四首

卷十附

秋燥全篇 秋燥論 推廣經義以論秋燥治
燥證之本及治法七條 律家治燥諸方 燥
門諸方法共二十七 附醫案四則

凡例

一冬月之傷寒、春月之病溫、夏月秋月之傷於暑
溼熱、乃四序中主病之大綱也。仲景立法、獨詳
於冬寒者、以春夏秋時令雖有不同、其受外感
則一、倘其中法有未備、自可取治傷寒之法而
錯綜用之爾。

一仲景原文、文義深奧、其中自有層次轉折、因竊
倣程子說詩法、為之句籀字比、添細註以聯貫
而疏明之、務使經義了然、不敢妄為穿鑿。

傷寒分經凡例

一仲景書、一語可當千百言、每令人闕發不盡、讀
者須沉潛反覆、必於言外透出神髓、斯為能讀
仲景之書耳。

一方中之傷寒條辨、澄幾研理、亦甚有關於醫
道、其間并有先得喻嘉言之所同然者、如削序
例、闢驚風之類是也。但方氏有晦滯處、而喻氏
則明顯矣。方氏有迂遠處、而喻氏則切要矣。此
則青出於藍、後來居上、亦從古作述之大凡、豈
得謂方氏之書、竟可廢而不覽乎。周禹載傷寒

王叔和編次大綱混於節目之中無可尋繹喻氏則先振舉其大綱次詳其節目將三百九十七法分隸於大綱之下極得分經之妙因名之曰分經

王叔和編次之亂，序例之誤，及林億成無已校註之多差，尙論篇中辨之甚詳，且明茲集俱不重錄。

傷寒分經

凡例

一拙著醫學第六種雜證條律第七種女科宜今等書俱闕刻問世
一拙刻數種同人所賜瑤序甚多其言皆未免過舉故一槩不敢付梓

吳氏醫學述第五種

南陽張機仲景著
西昌喻昌嘉言註

武原吳儀洛遵程訂
賁湖周學江襟三
海昌周廣業廛補參

傷寒分經

太陽經上篇凡風傷衛之說列於此篇法五
表也而表有營衛之不同病有風寒之各異
風則傷衛寒則傷營風寒兼受則營衛兩傷
三者之病各分疆界仲景立桂枝湯麻黃湯
大青龍湯湯足三大綱分治三證風傷衛則
用桂枝湯寒傷營則用麻黃湯風寒兩傷營
衛則用大青龍湯用之得當風寒立時解散

傷寒分經

卷一上

太易經上篇

—

不勞餘力矣。乃有病在衛而治營，病在營而治衛，病在營衛而治其一，遺其一。與夫病已去，營衛而復汗，病未去，營衛而候下，以致纏傳錯亂，展轉不已，源頭一差，末流百出。於是更出種種節目，輔三法而行，正如八卦之有六十四卦，八陣之有六十四陣，參伍錯綜，以盡病之變態，其統於桂枝麻黃青龍三法，無疑也。第從來編次者，潦草糊塗，不察來意，悠悠忽忽，沿習至今。今於太陽經中，仍分風傷衛、寒傷營、風寒兩傷營衛爲上、中、下三篇，而剖文斷義，要歸至當。其溫病、熱病等名，逐段清出，另立篇目，俾業醫者得其門而人。庶足以窺其富美也。

太陽經受病之初有定脈定證一法

太陽之爲病風不論中
傷寒脈則俱浮頭項強痛而惡

寒

太陽膀胱經乃六經之首主皮膚而統營衛所以為受病之始仲景列惡風惡寒證惟下第七條風寒並舉餘則云惡風即不云惡寒云惡寒即不云惡風正以惡寒未有不惡風惡風亦未有不惡寒也○以後凡首稱太陽病者皆該脈浮頭項強痛諸證而言

太陽受病有風寒不同宜辨陰陽而定愈日通計五法

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

二

天地之氣風為陽寒為陰人身病有發熱惡寒者此風傷發於陽也無熱惡寒者此寒傷發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七進陰數六退其病其也

無熱惡寒指寒邪初受未鬱為熱而言少頃鬱勃於營間則仍發熱矣中篇第一條云或未發熱正互明其義病之始終各從陰陽之類此道之所以本乎自然而人身與天地同撰也

三 太陽病頭痛至七日以上其病猶在自愈者以風

橫行於其經脈之中盡他傳故也若欲再作他經者必在足鍼足陽明竭其邪使經不傳則愈

七日而云以上者該六日而言也病若自愈則邪已去盡不別傳矣設不愈則傳陽明故鍼足陽明在他經則不然蓋陽明中土萬物所歸無所復傳之地邪易解散故耳然必鍼以竭其邪使得歸併陽明不犯他界也舊謂奪其傳路而遏之則經經皆可遏矣何獨取陽明也哉○此即內經七日太陽病衰頭痛少愈之旨可見太

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

三

陽一經有行之七日以上者矣其欲再作經者針足陽明使經不傳則愈以太陽既羈留多日則陽明少陽亦可羈留過經漫無解期矣所以早從陽明中土而奪之此捷法也

四 太陽病欲解時從巳至未上

凡病欲解之時必從其經氣之王太陽者盛陽也故從巳午未之三時而病解

五 欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之以其脈

浮故知邪還汗出而解也

天地鬱蒸而雨作人身煩悶而汗作氣機之動也氣機一動其脈必與證相應邪還於表脈必先浮乃汗出而解設脈不以浮應則不能作汗邪不外解其煩即為內入之候矣

以上四條先挈太陽經始病終愈風寒之總法太陽受病風寒不同先辨中風定脈定證一法

六 太陽病發熱汗出惡風脈緩者名為中風

既有第一條脈浮頭項強痛諸總證更加發熱

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

四

汗出惡風脈緩則其病乃是觸冒於風所致即名中風中與傷無別即謂傷風亦可風為陽邪衛為陽氣風傷衛從其類也後凡云中風者皆該發熱汗出惡風脈緩而言

中風病主用桂枝湯解肌大綱一法

七

太陽中風

衛氣邪氣陽浮於外而營無邪氣陰脈

弱於陽

浮者不待開熱自發陰弱者不能內汗自

出內氣

而惡寒外體熱而淅淅惡風氣蒸淫翕翕發

熱比傷寒之乾熱不同

息鳴乾嘔者宜解散其風

桂枝湯主之

陽浮陰弱與下文衛強營弱義同

服已須臾歔熱稀粥一升餘以助藥力被溫覆身

令一時許遍身榮榮但微似有汗者益佳不可令

汗如水淋漓病必不除每劑分作三次服若一服汗出病

差停後服不必盡劑若不汗重服依前法又不可汗

法又不汗進後服此前一服相去時一服依前法

總要半日許令三次服盡劑若病重藥力者一晝

一夜內三次服盡劑若病重藥力者一晝

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

五

劑盡病證猶在者更作一劑服若汗不出者乃服至二三劑禁食生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

桂枝湯有禁用三法

八

桂枝湯本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者

九

桂枝湯本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者

桂枝湯

本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者

桂枝湯

本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者

桂枝湯

本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者

熱愈淫溢於上，焦蒸為敗，濁故必吐膿血。此一
大禁也。其誤服未至於吐者，上焦清氣未傷，熱
雖漸消，亦蹈險矣。

干酒客病不可與桂枝。湯得湯則嘔，以酒客不喜甘故也。

酒為溼熱之最，故即於上條文意重引酒客以
示戒。嘔吐乃互詞，勿泥。○辛甘發散為陽，乃內
經之旨也。仲景遵之製方，重申辛甘之戒，可謂
慮周千變矣。如酒客平素溼熱搏結胸中，纔

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

六

挾外邪必增滿逆，所以辛甘之法遇此輩即不
可用。辛甘不可用，則宜用辛涼以撤其熱，辛苦
以消其滿矣。後人不察，偏詆桂枝為難用，即不
遇酒客無端變亂內經定法，可勝誅哉。○葛根
雖酒客所宜，然犯太陽經禁又不可用。

汗後水氣上逆有禁更汗增滿一法

汗發汗後水藥俱不得入口。者為中滿逆，治當導若

此條從來諸家錯會，扯入桂枝四禁，謂已用桂

枝致逆，若更用桂枝，則其變愈大，粗疎極矣。蓋
為逆是言水逆，未嘗說到其變愈大為凶逆也。
且原文不云更與桂枝，而云更發汗者，見水藥
俱不得入，則中滿已極，更發汗以動其滿，凡屬
表藥皆可令吐下不止，不獨桂枝當禁，所以仲
景於太陽水逆之證全不用表藥，惟用五苓以
導水，服後隨漑熱湯以取汗，正與此條互相發
明也。設但知禁桂枝而於麻黃葛根柴胡等一
槩誤用，以致吐下不止，恬不知怪，惜哉。

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

七

中風病主用桂枝湯解肌和營衛七法
三太陽病頭痛發熱汗出惡風者，桂枝湯主之。
頭痛見第一條發熱汗出惡風見第六條重互
其文以叮嚀辨證用法，首宜識此也。

三

太陽病外證未解，脈浮弱者，其證初不在當以
汗而解，但無緊脈，知非寒傷，宜用桂枝湯解肌和

浮弱即陽浮陰弱之謂，宜桂枝湯見不可行發
汗之法也。至于不可下更不待言矣。

古

人身之汗，內出於營，外出於衛。太陽病發熱汗出者，此為營無邪助弱。

衛其勢強營不能當故使汗出欲救之邪風者宜桂枝湯主之

須知營弱與血虛無涉邪風即風邪勿鑒看

病人藏無他病時發熱不熱自汗出而不愈者此為風邪衛氣不和也先其發時為發汗則愈宜桂枝湯主之

愈宜桂枝湯主之

藏無他病四字隱括人身宿病即動氣不可發

汗亦在內見裏無病而但表中風邪乃有汗出不愈者必是衛氣不和也設入於營則裏已近

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

八

災未可晏然稱無病矣

云

病常自汗出者何也凡汗出於營營行脈中衛氣本和但風邪作熱氣強盛蒸逼何以有汗今營

故津液之在營者不安復微發其汗使邪散

營衛和則病自愈宜桂枝湯行此段舊本多

此明中風病所以衛受風邪營反出汗之理見

營氣本和但衛強不與營和復發其汗俾風邪

從肌表外出斯衛不強而與營和正如中酒發

狂酒醒即帖然矣營受寒邪不與衛和宜麻黃

湯亦然

宅

太陽病初服桂枝湯反煩不解者乃服藥時不如先刺風池風府風熱卻與桂枝湯則愈

中風病凡未傳變者舍解肌並無別法然服桂

枝湯以解肌而反加熱悶者乃服藥時不如法

也其法維何即歔稀熱粥以助藥力不使其不

及但取週身熱熱微汗亦不使其太過之謂也

此云服湯反煩者必微汗亦未得肌竅未開徒

用藥力引動風邪漫無出路勢必入內而生煩

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

九

也刺風池風府以瀉風熱之暴甚後風不繼庶

前風可息更與桂枝湯引之外出則愈可見解

肌當如法也風池二穴在耳後陷者中按之引

一寸大筋內宛宛中督脈陽維二經之會刺可

入同身寸之四分風府在項上入髮際同身寸之

大

風家服桂枝湯已解而不了了者蓋陽氣擾攘

不宜妄行施治但十二日氣平復自然清爽而

以上七條曲盡用桂枝湯妙義一條辨用桂枝

之證二條辨用桂枝之脈三條辨衛強營弱宜
用桂枝兩和營衛四條辨衛氣不和宜在未發
熱前用桂枝和衛五條辨衛氣不共營氣和諧
宜仍用桂枝和衛六條辨陽邪熾盛服桂枝轉
煩者先刺風穴再行桂枝七條辨用桂枝表已
解宜俟勿藥何等深切著明也經中凡勿藥而
甚多今人凡有診視無不與
藥致自愈之譏反多不愈矣

不解肌指第一節或誤汗指第二節病邪入裏用五苓
散兩解表裏二法

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇 十

中風病發熱六七日不解因之熱而心煩有表
證而裏證又渴欲飲水入則吐者乃熱邪挾積
水格而名曰水逆以治當五苓散主之導水下行又多服
煖水得汗出則表裏愈

傷風證原有汗以其有汗延至日久不行解肌
之法汗出雖多徒傷津液表終不解而裏亦大
困膀胱為津液之府五苓通調水道則熱自化
而津液得全矣服五苓熱湯表裏俱解者正
緣表者陽也裏之屬府者亦陽也所以一舉兩

得然亦以未經誤治邪不內陷故易為力耳

太陽病服發汗藥大汗出內津液胃中乾煩燥不得

眠欲飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若飲水

後雖未即愈而熱邪得脈轉浮是邪漸還於小便

不利則微熱而口渴者則邪熱猶盛於

盛而表邪亦未盡解但當導邪與五苓散

不解肌而誤發大汗其變逆有救亡陽漏風

二法

太陽病服發汗藥汗大出而病不解其人仍發熱覺

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇 十

心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者此汗多亡陽
收攝真陽真武湯主之

此本為誤服大青龍因而致變者立法然陽虛

之人縱發其汗便出不止即用麻黃火劫等法

多有見此證者所以仲景於桂枝湯中垂戒云

不可令如水淋漓誠見解肌中且有逼汗亡陽

之事矣下篇大青龍證中垂戒云若脈微弱汗

出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤正與

此段互發振振欲擗地五字形容亡陽之狀如

繪蓋擇者關也避也汗出過多衛氣解散似乎

全無外邪故振振然四顧徬徨無可置身思欲

關地而避處其內也陰證似陽者欲坐井中避

熱就冷也汗多亡陽者欲入土中避虛就實也

試觀嬰孩出汗過多神虛畏怯嘗合面偃入母

懷者豈非振振欲擗地之一驗乎從來皆以為

驚風誤治實由未透傷寒證中之大關耳

太陽病發汗遂漏不止其人表疎風惡風津

下燥小便難入筋脈失養風四肢微急難以屈伸者

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇 三

當固表驅風 桂枝加附子湯主之

大發其汗致陽氣不能衛外為固而汗漏不止

風本有汗溼潤未乾也陽氣與陰津兩虛更加

外風復入與前條亡陽一證微細有別故止用

桂枝加附子也

不解肌而以火劫汗傷陰致變四法 一法辨

太陽病中風者宜解肌以取汗以火劫發其汗

徒令邪風被火熱之助擾亂血氣流溢失其常度

大兩陽之相 薰灼於內 其身發黃 若陽但盛

則小便難 陰陽俱處 而身絕 體則不

劑頸而還 不復能出 於其腹 為滿而之 喘口

乾咽爛或不大便 久之則譫語甚者至噦手足躁

擾捻衣摸牀 此火邪熾極 陰小便利而難者

至枯燥 其人盡亡 猶可施治也

仲景以小便之利否辨真陰之亡與未亡最細

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇 三

蓋水出高源 小便利則津液不枯 肺氣不逆可

知腎以膀胱為府 小便利則膀胱之氣化行腎

水不枯可知 注家謂小便利者陰未甚虛則

陽猶可回是認可治為回其陽大失經旨不知

此證陽邪挾火深入於裏明是失汗所致失汗

則陽必內入何反外亡耶治宜急驅其陽以存

陰氣之一綫尚恐不得況可回陽以更劫其陰

乎且頭汗乃陽邪上壅不下通於陰所以頸以

下不能得汗設見衄血則邪從衄解頭間且無

太陽病

二日

反躁

理哉又豈有遍身無汗而頭汗為亡陽之理哉

醫者不知反火

熨其背而使之

大出汗

火熱入胃胃中

水竭躁煩必發讖語

至十餘日

振慄自下利者

此火邪從大為欲解也

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

西

汗惟從腰以下不得

而巴與前之劑頸

欲小便不

得則反逆邪又欲從

惡風

則在下也

又欲失溲

陰出也

便當數而反不數

則大便

及多大便已

則小便

人足心必熱

則此病

卓然而痛

陽氣其

此條言胃氣有權能驅邪外出始本欲作汗而

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

解誤用火攻入內卒能自解與陽明上篇二十

三條胃強脈律得病易愈同意

太陽病

不得汗

不解必

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

也奔豚氣從少腹上衝心者宜灸其核上各一壯以攻散寒與桂枝加桂湯更加桂服之庶風氣內平而愈也

奔豚者腎邪也自少腹上衝心狀若豕突又北方亥位屬豬故云奔豚北方腎邪惟桂能伐之所以用桂三倍加入桂枝湯中外解風邪內泄陰氣也嘗即此例推之凡發表誤入寒藥服後反加壯熱肌膚起赤塊畏寒腹痛氣逆而喘者或汗時蓋覆未週被風寒復侵紅腫喘逆其證

傷寒分經

卷一上 太陽經上篇

去

同者用此法良驗一婦病外感服表藥後忽面若裝朱散髮叫喘雙手上揚

不解肌而用吐藥雖得汗內傷脾胃名爲小

逆二法

桂枝湯解肌全不動傷脾太陽病本當惡寒發熱今但自汗出不惡寒發熱惟關上熱則得虛脈而細數者以醫者不爲解吐之吐中亦不發散故惡脾胃以致虛過也一二日在太陽吐之者腹中饑口不能食三四日在陽明吐之者不喜糜粥欲食

冷食其甚者脾朝食暮吐以醫吐之所致若此者感難除脾胃內爲小逆

太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此爲醫吐之過使之內煩也

此以吐而傷胃陰較上條兩傷脾胃之陰陽者稍輕故內煩不欲近衣雖顯虛熱之證比關上脈細數已成虛熱之證者亦自不同然以吐而傷其津液雖幸病不致逆醫者能無過乎可見用吐法時亦當相人之津液矣

傷寒分經

卷一上 太陽經上篇

去

中風肌未解不可下宜用桂枝湯解外一法

太陽病外證未解者雖顯有不可下也下之則邪乘虛爲種種逆故必先欲解外邪者宜桂枝湯

中風肌未解誤汗下無他變者仍當用桂枝湯

証

太陽病先發汗其病不解而復下之故脈浮

如者外證猶不愈也凡浮爲病在外而反下之其治故令不愈然誤下者熱邪往往今幸脈浮故

必有以義興曰太陽紹表邪未解而懷下以致
陽盛而利心下痞轉設腹中利止則裏邪已從

陽位而胸則木結桂枝去芍藥湯主之若

微惡寒者則陽虛已著非復上盛
附子湯主之者此治以回陽為急
去芍藥方中加

誤下脈促與上條同以無下利不止之證但見
胸滿則陽邪仍盛於陽位幾與結胸同變然滿
而不痛且諸證未具胸未結也故取用桂枝之
芳甘以亟散太陽之邪其去芍藥之意非徒畏
其酸收實以誤下之後恐其復領陽邪下入腹
中也設微見惡寒則陽虛已著而非陽邪上盛
之比去芍藥方中即當加附子以回其陽此條

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

手

雖不言汗出然實蒙上條言之脈促胸滿喘
而汗出而又見微惡寒斯為陽虛畏寒之候故
仲景於此特發其義與汗不出而惡寒者同大
不侔矣傷寒證中多有下後魄汗不止而釀亡
陽之變者必於此等處參合以求神髓庶可進
於道耳

氣藥一法

太陽病

誤下之

微喘者表未解故也

治之當解

桂枝加厚朴杏仁湯主之
桂枝湯加厚朴杏仁以和其利其佳
凡下後利不止而加上氣喘急者乃是上爭下

奪之象危候也但驟病之人中氣足供上下之
用邪盡而喘與利自止若中氣素餒加以上下
交征立盡之數矣此證不云下利但云微喘表
未解則是表邪因誤下上逆與虛證不同故仍
用桂枝以解表加厚朴杏仁以利下其氣亦微
裏之意也○此訣風邪誤下作喘治法之大要

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

手

其寒邪誤下作喘當用麻黃石膏即此可推故
中篇不復贅也

不解肌反誤下有憑脈定變一法

聖

太陽病不解肌反誤下之其脈變緩促陽邪上盛宜為

不結胸者此陽邪不陷為欲解也若脈浮者邪氣

陽位必結胸也蓋浮為太陽本脈故其脈浮者邪

者必咽痛脈弦者必兩脇拘急脈浮而細數者頭

痛未止設脈沉者必兩脇拘急脈浮而細數者頭

作嘔脈沉而滑者陽邪已入協熱為利脈浮而滑

者陽邪正在名必下血種種換下之變唯

脈浮者必結胸。即指脈促而申之。浮字乃貫下四句。祇因論中省用一促字。三浮字。讀者遂謂緊為下焦。屬在少陰。惑之甚矣。觀本文下句。即指出沉緊者必欲嘔。一語正見前緊字。指浮緊言也。沉緊方是陽邪入陰。上逆作嘔。豈有浮緊咽痛。反為少陰寒邪上衝之理。明明太陽誤下之脈證。何緣插入少陰。燔亂後人耶。至於滑脈居浮沉之間。亦與緊脈同推。故沉滑下利。浮滑

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇

下血皆陽邪為害於陰分也。夫太陽誤下之脈主病皆在陽。在表。即有沉緊沉滑之殊。亦不得以裏陰名之。仲景辨析之精。詎可雜以贅龐哉。中風病不解熱結膀胱下血。有宜先表後裏一法。

太陽病不解熱結膀胱其人如狂。血自下者愈。若其外邪之使然不解者尚未可攻。當先解外氣湯。外邪解已但少腹急結者乃可攻之。宜桃仁承

死 太陽病六七日表證仍在脈微而沉似病入內為

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇

熱邪搏血結於膀胱。寒水之經水得邪熱必沸騰而上侮心火。故其人如狂。血自下者邪熱不固。故愈。若少腹急結則膀胱之血蓄而不行。先解外乃可攻。其攻法亦自不同。必用桃仁增入承氣以達血所。仍加桂枝分解外邪。正恐餘邪少有未解。其血得以留戀不下耳。

中風病不解熱瘀下焦蓄血明辨脈證用抵當湯二法。

反不結胸。其人發狂者以邪熱在下焦少腹當鞭滿也。鞭滿有瘀熱。小便自利者。則膀胱氣行。其乃蓄血下血乃愈。所以然者。以太陽隨經之熱在裏故也。此當湯主之。峻攻其血血去而邪自不爾矣。

此條之證較前條更重。且六七日表證仍在。曷為不先解其外邪。又曷為攻藥中不兼加桂枝耶。以脈微而沉。人不結胸。知邪不在上焦而在下焦。若少腹鞭滿小便自利。則其發狂為血蓄下焦無疑矣。故下其血自愈。然蓄血而至於發

旱
太
陽
病
身
黃
脈
沉
結
少
腹
鞭
之
證
然
或
小
便
不
利
而
兼
現
者
又
為
發
黃
之
無
血
也
之
不
可
妄
投
攻
血
此
三
證
者
為
血
證
之
諦
也
云
小
便
自
利
其
人
如
狂
而
現
此
者
為
血
證
之
諦
也
云
急
治
抵
當
湯
主
之

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇 言

此條乃法中之法見血證為重證抵當為重藥恐人辨認不清不當用而誤用與當用而不敢用故重申其義小便不利乃熱瘀膀胱無形之氣病為發黃之候也小便自利則膀胱之氣化行然復小腹滿者允為有形之蓄血矣

中風病以小便利否定裏證一法

四
太
陽
病
小
便
利
者
邪
不
在
裏
勝
脈
無
熱
以
飲
水
過
多
之
故
而
未
必
裏
證
必
心
下
悸
多
而
小
便
仍
少
者
必
苦
熱
邪
在
內
消
裏
證
為
急
也

小便少者即小便短赤裏證已具之意飲水多而小便少者邪熱足以消水故直指為裏證已急也以飲水多三字貫下其旨躍然

一法

四
天
下
之
後
復
發
汗
小
便
不
利
者
亡
其
津
液
故
也
勿

治之津液復必自愈凡病若發汗若

吐若下若亡血亡其津液以致不解

生之候必自愈投湯劑

傷寒分經 卷一上 太陽經上篇 言

泉之竭矣不云自中古今通弊人或已亡津液復強責其小便必令膀胱之氣化不行轉增滿鞭脹喘故宜以不治治之於此見汗下恰當津液不傷為措於不傾藏於不竭之良圖矣

一法

四
太
陽
病
下
之
而
不
愈
因
復
發
汗
以
此
表
裏
俱
虛
其
人
因
致
胃
家
汗
出
自
愈
所
以
然
者
汗
出
表
和
故
也
而
得
表
和
裏
未
和
然
後
下
之

冒者神識不清似有物蒙蔽其外也所以必須得汗俾外邪先從外微然後察其二便之和否再一分解其邪也然表裏俱虛之證其兩解之法宜輕而且活所以說汗出自愈未嘗指定服何藥也又說得裏未和然後下之但示其意並不出方後人孰察其虛者責之之義乎若論用藥表無過桂枝裏無過大柴胡五苓矣

中風病表裏已虛餘邪未解辨脈用治迥異初病一法

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

美

太陽病久不解之兩途幸而脈陰陽俱停無有可以解矣然必先振慄汗出而解有偏勝可以議病久而虛故必先振慄汗出而解有偏勝可以議陰陽之偏虛而知病但陽脈微者病必在陽先使汗出而解但陰脈微者病必在下之而解過桂枝若欲下之宜調胃承氣湯主之

病久不解辨脈用法要與初病不同蓋初病皆邪氣勝則實之脈久病皆正氣奪則虛之脈所以最虛之處便是容邪之處故陽脈微者邪乘其陽汗之而解陰脈微者邪乘其陰下之而解

必須透此一關始得用藥與邪相當邪去則正自復不補虛而自補耳至於虛者責之之意前條已露一斑此云若欲下之宜調胃承氣湯意更輕活其無取於大汗大下明矣

中風病嘔利痞滿表解可攻與攻胃實迥異一法

望

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之但其人漿漿汗出發作有時之微難有頭痛心下痞鞅滿引脇下痛乾嘔短氣而汗出不惡寒者此為表已

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

毛

解特邪裏而未和也與法當攻之但攻法結於裏而末和也與攻胃實迥異以十棗湯主之

此證與結胸頗同但結胸則邪結於胸其位高此在心下及脇其位卑然必表解乃可攻之亦與攻結胸之戒不殊也漿漿汗出發作有時而非晝夜俱篤便是表解之徵其頭痛心下痞鞅滿引脇下痛乾嘔短氣諸證乃邪結本證不得以表證名之若必待本證盡除而後攻之不坐誤時日乎故復申其義見汗出不惡寒便是表

解可攻之候蓋外邪挾飲兩相搏結設外邪不解汗必不可得出也攻藥取十棗正與結胸之陷胸相倣因傷寒門中種種下法多為胃實而設胃實邪熱燥乾津液腸胃俱結不得不用苦寒以蕩滌之今證在胸脇則胃中津液未經熱耗而蕩滌腸胃之藥無所取矣故取逐水於胸脇之間以為下法也

中風病本痰標熱誤下有結胸及協熱利之變一法

傷寒分經 卷一上 太陽經止篇

天

太陽病二三日風熱熾盛不能臥但欲起者知其陽邪過盛也心下必欲結之象脈微弱者此本有寒於心也此時外邪方盛反下之利若利遂止則邪乘虛而入必作結胸其未止者至四日妨復下之此利已作協熱利導使有止期也心下必結但顯欲結之象尚未結也寒痰在膈適與外邪相召外邪方熾而下之邪既乘虛矣而利遂止則無從出欲結者愈益上結利未止而復下之俾陽邪不復上結亦將錯就錯因勢

利導之法然熱邪從裏解非若表解之易協熱下利熱不盡其利漫無止期亦危道也合上條外邪搏飲之證反覆提誨深切著明從來疑是闕文可為太息

中風病候下熱邪內陷而成結胸六法一法

病發於陽而反下之熱勢乘入因作結胸

傷寒分經 卷一上 太陽經止篇 天

成結胸者皆以下之太早故也

太陽病初起脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛虛故邪久頭痛發熱又微盜汗出

而反惡寒者表未解也醫者不知其邪持太

反下之於內者動數欲傳經變而為遲緩而力綿勢

傳經後令膈內之氣與外拒而痛胃中因下後

空虛不能開客氣之動膈於是正氣往來於短

氣而不足以躁煩不安心中近災時生懊懷蓋陽

邪氣乘內陷心下因之鞭則是熱結為結胸也證

陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗頸項

動數變遲三十六字形容結胸之狀殆盡非化

工之筆安能點綴病情若此哉

不可近者大陷胸湯主之

不大便燥渴日晡潮熱少腹鞭滿證與陽明頗

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

三

腹手不可近則陽明又不似此大痛因是辨其

為太陽結胸兼陽明內實也緣誤汗復誤下重

傷津液不大便而燥渴潮熱雖太陽陽明亦屬

下證但太陽痰飲內結必用大陷胸由胸脇以

及胃腸蕩滌始無餘若但下腸胃結熱反遺胸

上痰飲則非法矣

結胸者項亦強如柔瘕狀但身手

和宜

大陷胸丸

煮服

下之則

實項勢嘗昂有似柔瘕之狀然瘕病手足俱張

此但項強原非瘕也借此以驗胸邪十分緊逼

耳胸邪緊逼以大陷胸湯下之恐過而不留即

以大陷胸丸下之又恐滯而不行故煮而連滓

服之然後與邪相當而可施戰勝攻取之畧觀

方中用大黃芒硝甘遂可謂峻矣乃更加葶藶

杏仁以射肺邪而上行其急者時又倍加白蜜

以留戀而潤導之而下行其緩必識此意始得

用法之妙

有能無敗乎此陷胸諸法見幾於早兢兢以滌

傷寒分經

卷一上

太陽經上篇

三

結胸證其脈浮大者不可下

之則結而必死

結胸證已具更煩躁者此津液內竭胃氣垂

邪結於胸藉藥力以開之而所以救藥力上行

者胃氣也胃氣充溢於津液之內汗之津液一

傷下之津液再傷至熱邪搏飲結於當膈而津

液又急奔以應上征有不盡不已之勢故煩躁

者胃絕而死譬如堅敵在前營中士卒化為烏

有能無敗乎此陷胸諸法見幾於早兢兢以滌

飲為先務則津液自安如寇退而百姓復為良民也噫微矣

不解肌誤汗下成痞復誤燒鍼合色脈以定死生一法

太陽病醫發其汗而終發熱惡寒如因復下之

以心下成痞夫痞者陰氣閉塞也病發於陽而亦

致津液表裏俱虛身陰陽之氣並竭矣人身陰

大傷津液表裏俱虛身陰陽之氣並竭矣人身陰

以流通無滯而心下之無陽以治則惟陰獨盛充

間正清陽所治之位陽以功而熱氣內心煩

見陰之為病復加燒鍼以功而熱氣內心煩

傷寒分經卷一上太陽經上篇

矣誠危而色青黃膚潤者是正衰難治今色微黃

手足溫者氣漸復為易愈也

凡表裏差誤證變危篤有陰已亡而陽邪尙不

盡者有陽邪盡而陽氣亦隨亡者有外邪將盡

未盡而陰陽未致全虧者此可愈不可愈所由

分也夫心下痞與胸間結雖有上下之分究

竟皆是陽氣所治之位觀無陽則陰獨一語正

是所以成痞之故雖曰陰陽氣並竭由心下無陽故陰獨痞塞也無陽陰獨早已括傷寒誤下

成痞大義安得草草讀過無陽亦與亡陽有別無陽不過陽氣不治復加燒鍼以逼劫其陰陽乃成危候其用藥逼劫即可同推○中風誤下而結胸傷寒誤下而成痞者證之常也然中風誤下間有成痞傷寒誤下間有結胸故次此條於結胸證後中篇亦次結胸於痞證後以求合作者之同神也

傷寒分經卷一上太陽經上篇

太陽上篇論列方正用方十四
借用方二

桂枝湯

五苓散

真武湯借用太陽
下篇方

桂枝加附子湯

桂枝加桂湯

桂枝人參湯

葛根黃連黃芩湯

桂枝去芍藥湯

傷寒分經卷一上
太陽經上篇方目

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

桃仁承氣湯

抵當湯

調胃承氣湯借用陽明
上篇方

十棗湯

大陷胸湯

大陷胸丸

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西昌喻 昌嘉言註

武原吳儀洛遵程訂
賁湖周學江襟三
海昌周廣業廬補參

傷寒分經

太陽經中篇凡寒傷營之證列於此篇法五
十八條。上篇風傷衛之證用

桂枝湯解肌者乃不欲發汗以擾動其營也
不擾其營但治其衛常有不及之弊不及則
邪不盡去勢必傳入於裏故兩解表裏之法
居多此篇寒傷營之證用麻黃湯發汗者乃
驅其邪盡從表出使邪停滯而虛候易生
過之弊太過則未免因邪傷正而虛候易生

傷寒分經卷一中
太陽經中篇

設有餘邪不盡者多未敢再汗但可和其營
衛或俟其津回自然得汗故兩解表裏之法
差少其誤下之說亦不比上篇之陽邪多變
但發汗之後津液已虛更加誤下則津液重
虛所以或邪少虛多而傷其陽或邪盛熱熾
而傷其陰源同流異各造其偏以故治法亦
錯出一不一必先會其大意然後一展卷而
了然於心目也

辨寒傷營有定脈定證總稱傷寒一法

一 太陽病或已發熱或初未發熱必惡寒體重嘔逆
脈陰陽和緊者名曰傷寒

或未經熱寒邪初入尚未鬱而為熱頃之即熱
矣多服表藥後反增發熱者病必易解蓋熱

鬱未久，即領邪外出，無裏證，故也。仲景恐人見惡寒、嘔重、逆，又未發熱，認為直中陰經之證，故蚤於辨證之先，揭此一語，慮何周耶？○寒為陰邪，宜為陰血寒，傷營從其類也。後凡稱傷寒者，皆該發熱、惡寒、體重、嘔逆、脈陰陽俱繁而言。

辨傷寒證用麻黃湯大綱一法

二、大陽病頭痛發熱，身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風、無汗而喘者，宜發其汗而愈。麻黃湯主之。

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 二

上條已言傷寒之脈證矣，此復以頭痛發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風、無汗而喘，互發其義。蓋頭身、腰節疼痛，即體重之應；無汗而喘，亦即嘔逆、脈陰陽俱繁之應也。汗乃血之液，血為營，營有邪，助則強，營強則腠理閉密，雖熱汗不出也。

辨傷寒傳經不傳經一法

三、傷寒一日，太陽受之，脈若靜者，為不傳。他經也。經頗欲吐，若煩躁，脈數急者，此為外邪內搏，必傳經也。傷寒二三日，陽明少陽證不見者，雖快治亦止。

為不傳也。

辨傷寒欲傳不傳，心悸而煩，宜用建中一法。

四、傷寒二三日，欲傳未傳之，心中悸而煩者，必先

為建中，其氣易以建中。小建中湯主之。嘔家不可用建中，以甜故也。

辨寒傷營證，當汗不汗，反行鍼灸，致變二法。

五、太陽傷寒者，湯發汗反加溫鍼，引熱邪以內，必驚也。溫鍼以火攻寒，營血得之，反增其熱，營氣通於

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 三

心，引邪內逼，擾亂神明，其驚必矣。

六、傷寒脈浮，病在表，宜以麻黃湯發汗而解。乃用火灸之，邪通

火無從出，反因火而盛，其勢上炎，必從腰以下必

重而痺，名火逆也。

辨脈浮及浮數，宜用麻黃湯發汗一法。

七、傷寒脈陰陽俱緊，浮而不者，似不可汗，病在表正

之，可發汗。其以托出，宜麻黃湯。脈不緊，浮而數者，是

熱有傳經，可發汗。乘勢以驅，宜麻黃湯。蓋麻黃湯

之勢，亦桂枝湯治中風表證，乃一定之法，不可廢也。

乃一定之法，不可廢也。

服麻黃湯得汗後察脈辨證有次第不同三

法一法汗解後復感復發者宜更

兩解表裏一法其兩解證

八傷寒服麻黃湯發汗解半日許復煩脈浮數者明係表

可更發汗之法以宜桂枝湯且營虛不能復任

麻黃湯也

九發汗已脈浮數而煩且渴者其熱邪內入裏證五

苓散主之

用五苓清內而解外比上更用桂枝之法又大

傷寒分經

卷一中

太陽經中篇

四

不同者以無復感故也然兩解表裏之邪熱則

五苓散中木用蒼桂用枝可知矣○五苓散

兩解表裏之法風傷衛寒傷營俱用之

十傷寒汗出後不而渴者仍宜兩五苓散主之若汗

井不渴者裏證本以茯苓甘草湯主之益用桂枝湯

散中之一示三

傷寒以無汗故煩汗出則不煩可知矣但渴與

不渴治法不同似此消息病情而分解微邪如

璋判圭合允為寶符

辨脈浮緊浮數尺脈反遲反微不可發汗二

法一法脈浮緊身疼痛宜以麻黃湯發汗解之假令尺

中遲者則宜先服建中湯使尺不可發汗何以

主脈浮緊者法當身疼痛宜以麻黃湯發汗解之假令尺

中遲者則宜先服建中湯使尺不可發汗何以

知之以凡尺遲營氣不足血素少故也

主脈浮數者法當身發熱汗出而愈發汗不可

誤下之後身重心悸者則不可發汗但宜

自汗出乃解所以然者其尺中脈微此裏虛與

傷寒分經

卷一中

太陽經中篇

五

愈以竭其津液也表裏俱實至津液自和之後便自汗出而

此亦先建中而後發汗之變法要知既云尺微

不可發汗又云尺微不可下無非相人津液之

奧旨所以誤下之脈雖浮數不改亟宜發汗者

亦必審諦其尺脈不當率意經情也

凡用發汗藥宜審病人有無宿疾不可徑汗

六法

主咽喉乾燥者平日津液不可發汗以重奪其

叔和重集不可發汗篇有咽中閉塞者不可發

汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得跪臥不

能自溫一條與此似同而實大異此戒發汗以

奪陽明之津液彼戒發汗以奪少陰之血也又

咽中閉塞不可下一條亦指少陰立說成氏俱

以咽門為胃之系混釋之謬矣

五淋家熱閉不可發汗發汗則必主小便出血

五瘡家肌表素虛雖寒而身疼痛不可發汗汗出則

血愈虛外風襲之必至瘡也

傷寒分經 卷一中 大陽經中篇 六

去衄家清陽之不可發汗汗出則上焦必額上陷且

脈緊急目直視不能眴不得眠

傷寒發煩日暝者必衄宜用麻黃湯發汗此言

素憤衄血之人戒發汗以虛其虛宜兩諦之也

亡血家陰氣耗而不可發汗發汗則孤陽從汗寒

慄而振陰陽兩竭而莫救也

亡血陰虛之人而發其汗本當生熱乃反寒慄

而振則孤陽從汗盡越之故也

大心主血汗乃心汗家重發其汗必使心戰血傷恍

惚心亂心與小腸相表裏小便已陰必疼

常與禹餘糧以生心血滋水道也

服麻黃湯汗後病不解有惡寒惡熱不同治

一法

充發汗病不解反惡寒者營衛虛故也法當收陰固

衛芍藥甘草附子湯主之其汗不惡寒但惡熱者

津乾實也法當泄實調和胃氣與調胃承氣湯

與字大有酌量不當徑行攻下以重虛津液從

可識矣

傷寒分經 卷一中 大陽經中篇 七

服麻黃湯汗後身痛脈遲者宜行補散一法

桂枝加芍藥生薑各一兩以去外邪人參三兩輔

正氣新加湯主之

門人問相傳仲景全方止得一百二十二道因有

新加湯故為一百三十三方其說然與否曰此後

人之誤也仲景意中明桂枝湯不欲與人

參同用也桂枝能解肌表之邪人參反固肌表

微餘邪不解然在誤汗誤下後表裏參錯正氣虛

表裏不解桂枝湯者即此意也人參湯向主半表

仲景精微之遺也然桂枝人參湯中桂枝藥者以誤下而邪入於陰芍藥主陰不能散陽邪也桂枝新加湯中倍芍藥以和之俾不至散亂也故用法必識立法之意斯用之各當矣

服麻黃湯後不可誤用桂枝湯及飲水灌水過多一法

麻黃主傷寒桂枝主中風各有至當之理發汗後雖病未解不可認作傷風更行桂枝湯蓋桂枝解肌誤用汗出後寒不得而喘治喘者或有大熱恐兼裏證也若無大熱者兼裏證不須重劑可與麻黃杏

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 八

仁甘草石膏湯主之然傷寒作喘不但桂枝能為如大熱則能消之若發汗後內無大熱飲水過多者水之必逆而喘即以此水灌之於此冷氣侵膚亦能喘治之之法要不出

服桂枝氣逆變喘意合下條觀之止是說汗下後不可更行桂枝湯即使汗出而喘無大熱者但宜麻杏甘石而已不得認作傷風有汗而用桂枝也○汗出跟發汗二字來至其致喘之故則不越飲水灌水二者故下文復言之蓋喘兼

汗出跡似中風但既的係傷寒則仍從麻黃加減而不從桂枝也

本麻黃湯證誤下表邪未盡氣逆變喘一法

以麻杏甘石治傷寒之變喘下之後亦有汗出不善矣然不特此也凡傷寒誤下而喘者亦不可認作傷風更行桂枝湯彼喘兼裏證未可法施治與麻黃杏仁甘草石膏湯總統於麻

中風與傷寒一從桂枝一從麻黃分途異治由中風之誤下而喘者用厚朴杏仁加入桂枝湯

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 九

中觀之則傷寒之誤下而喘者用石膏加入麻黃湯中乃天造地設兩不移易之定法仲景所以諄諄告戒者恐人以傷寒已得汗之證認為傷風有汗而誤用桂枝故拈出誤汗誤下兩條示以同歸麻黃一治之要益見營衛分途而成法不可混施矣問發汗後不可更行桂枝湯汗仁甘草石膏湯發汗後桂枝既不可行麻黃可汗則無大熱石膏可汗則桂枝不可行麻黃可傷寒先分營衛受邪桂枝湯與麻黃湯一彼一此則然中分果真為麻黃證斷無混用桂枝之理故發汗以後得汗而熱少除但喘尚未除者更與麻杏甘石湯治之則愈此中頗有奧義蓋

發汗過多陽氣虛衰陽本受氣於胸中陽氣不足故又手冒心不說到陰血上方用桂枝甘草固表緩中亦未說到陰血上方氏謂汗多則血傷血傷則心虛反置陽虛不理所謂迂濶而遠於事情也

苗未持脈時病人又手自冒心師因教試令欬而不欬者此非必兩耳聾言若無聞也所以然者以重發汗氣虛故如此

此示人推測陽虛之一端也陽虛耳聾宜亟固傷寒分經 卷一中 太陽經中篇

其陽與少陽傳經邪盛之耳聾迥別矣

服麻黃湯後有陽氣暴虛陰邪上逆臍下悸腹脹滿二法一法欲作奔豚預伐其邪

發汗後其人臍下悸者氣虛而腎氣發動欲作奔豚之兆也治宜茯苓桂枝甘草大棗湯主之

發汗後外邪已解腹脹滿者益因脾胃氣虛津液與痰降氣厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

服麻黃湯汗後不由誤下津乾飲結胃困變痞一法

傷寒汗出邪解之後無恙以胃主津液故也胃中不和則伏飲結聚心下痞鞭矣於是食人乾噎食臭旁湯飲脇下而有水氣腹中水穀不消雷鳴清濁而下利者皆胃之生薑瀉心湯主之

上篇論結胸及痞之源云胃中空虛此云胃中不和互意以其未經誤下而致空虛故但言不和然不和已足成痞設誤下空虛其痞更當何如甚哉胃氣所關之大也

誤下成痞用瀉心湯諸方次第不同四法一傷寒分經 卷一中 太陽經中篇

誤下後再誤下客熱虛痞用甘草瀉心湯一法誤下後復發汗惡寒先解表後用大黃黃連瀉心湯一法陰氣挾熱邪作痞用大黃黃連瀉心湯一法心下滿而

行完穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安此皆誤下胃氣虛見心下痞謂病結熱不盡復下之其痞益甚知此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

客邪乘虛結於心下本當用參以屢誤而痞滿

已極人參仁柔無剛決之力故不用生薑辛溫最宜用者然以氣薄主散恐其領津液上升客邪從之犯上故倍用乾薑代之以開痞而用甘草為君坐鎮中州心下與腹中漸致泰寧耳人但知以生薑代乾薑之僻孰知以乾薑代生薑之散哉但知甘草能增滿孰知甘草能去滿哉

傷寒分經
卷一中
太陽經中篇
西

傷寒大下後復發汗之治法類例徒使已陷心下作痞乃其外惡寒者表邪未因發而解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

脈浮而緊寒邪在表而復下之使脈緊者不從反入裏而不陷而作痞雖痞按之自濡則證不挾但陰氣上逆而痞爾治者當審按之濡其脈獨上仍獨浮者但瀉以苦大黃黃連瀉心湯主之

心下痞而復惡寒汗出者此陽虛也附子瀉心湯主之

否者乾往居外坤往居內所以宜切陰盛陽微之慮今惡寒汗出其事著矣故三黃湯內另煎

附子汁和服以合各行其事而共成傾痞之功即一瀉心方中其法度森森若此

傷寒五六日嘔而發熱者病果專柴胡湯證已具而誤以他藥下之其柴胡證仍在者當復與柴胡湯此雖已誤下之不為逆也胡湯後必蒸蒸而振卻發熱汗出而解也若誤下之後心下滿而硬痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞滿柴胡湯誤下所致此湯不中與之宜半夏瀉心湯因有半夏瀉心湯之法不便

傷寒分經
卷一中
太陽經中篇
五

上篇論結胸有陽明之兼證此復論結胸及痞有少陽之兼證見五六日嘔而發熱為少陽本證然太陽未罷亦間有之所以陽明致戒云嘔多雖有陽明證不可攻以嘔屬太陽也且發熱而非往來寒熱尤難辨識果係少陽證則太陽證將罷不似陽明之不可攻若係太陽未罷誤下即成痞結其為逆更大矣半夏瀉心湯即生薑瀉心去生薑而君半夏也去生薑者惡其辛

散引津液上奔也。君半夏瀉心諸方原用以
滌飲此因證起於嘔故推之為君主耳。

服瀉心湯痞不解煩渴小便不利用五苓散
兩解表裏一法

世本以下之故心下痞與瀉心湯開結瀉熱痞不解
其人更加渴而口燥煩小便不利者再當導飲以除煩
五苓散主之

傷寒服瀉心湯後復誤下利不止宜治下焦一法

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 六

服瀉心湯為合已而復以他藥下之以瀉下焦
全不相濟於是利不止醫乃以理中湯與之
而開盡何也理中者理中焦此為利在下焦
利益甚蓋何也理中者理中焦此為利在下焦
滑脫故理中無效則當固赤石脂禹餘糧湯主之
下焦之脫而修其關固以赤石脂禹餘糧湯主之
復利不止者則當舒發奔迫但利其小便而利自
矣止

痞證汗出嘔吐下利用大柴胡湯兩解表裏
一法

傷寒發熱汗出不解轉入心下痞嘔吐而下利

者此表證未衰而裏證已迫大柴胡湯主之裏而
解也

汗吐下後餘邪挾飲作痞用旋覆代赭石湯
一法

世傷寒發汗若吐若下解後而心下痞噯氣不除
者此胃氣虧損伏飲為逆當養正旋覆代赭石湯
主之

病人素有痞連臍脇更加痛引陰筋名為臍
結一證

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 七

病人脇下素有痞連在臍旁今病痛引少腹入陰
筋者此陰邪聚名曰臍結死凡臍結者無在
之陽證又往來寒熱無半表半其人反靜而無
舌上胎有滑脈者此外感寒邪結於下焦陰
舌也彼陽下痞介乎胸中陽分是熱在陰寒在陽
陰陽悖亂相結不解攻之是速其痛引陰筋而死
不可攻也

病人素有動氣在當臍上下左右則不可汗下
素有痞氣在脇下連臍旁則不可汗下醫工不
細詢病家不明告因而貽誤者多矣凡下見

之。若臟結乃陽虛而陰和內凝之證。攻之必死。

設問借結胸以明臟結之脈證一法

問曰：病有結胸有臟結，其狀何如？答曰：按之痛寸

脈浮，關脈沉，名曰結胸也。何謂臟結？曰：如結胸狀

按之腹中亦自拒痛，寸脈浮，關脈小細沉緊，名曰

臟結。舌上白胎滑者難治。此段舊本有飲食如

飴而明外邪熾盛者為難治，結胸者陽邪結於

陽也。臟結者陰邪結於陰也。然胸位高，臟位卑

傷寒分經

其脈之寸浮關沉兩俱無異，乃臟結之關脈更

加細小緊者，以關脈居上下二焦之界，外邪由

此下結積氣由此上干，實往來之要衝，所以病

在上下而脈反困於中也。此證全以外受之邪

定輕重，若舌上有胎滑則所感深重，其互結之

勢方熾，單表單裏及兩解表裏之法俱不可用，

故難治。惟溫中散邪，俾陰氣漸下而內消，客邪

漸上而外散，兩相開解，此則良工之為其所難

也。推此中義，則可以托散其邪，中其機，理下

以分解其邪，可以漸而收，神功於萬一。

傷寒分經

傷寒下早亦成結胸之證四法

傷寒一法，謂小結胸用小陷胸湯，大陷胸湯

熱結在裏，與結胸異治。一法，謂邪熱在表

心下支結，但治其表，太陽結胸證，熱邪在表

有少陽兼證，附本篇第三十一條後。

傷寒六七日，或誤下之，有結胸者，其狀熱實而

散脈沉緊，浮而不沉，心下痛，按之石硬者，大陷胸湯主

之。

傷寒誤下多成痞，亦時有結胸之候。痞者十之

七八，結胸者十之二三。故次傷寒結胸於痞之

後。上條言寸脈浮，關脈沉，此言脈沉緊更明

傷寒分經

蓋緊脈有浮沉之別，浮緊主傷寒，無汗沉緊主

傷寒結胸，與中風之陽邪結胸迥殊，此所以不

言浮也，精矣精矣。

小結胸病，其結略卑，正在心下，按之則痛，而不必

脈浮滑，沉而不緊者，但換飲散邪，內結耳。小陷胸湯主

之。

結胸者，外邪挾飲結於胸次，未全入於裏也。若傷寒十餘日，但係無熱結

在裏，胸而不定，在復往來寒熱者，此仍兼半與大

柴胡湯。取以分解表裏之邪，無但結胸表裏無大熱

者此為水飲結在胸脇堅實之至也其結頗高而

故但頭微汗出者則以大陷胸湯主之於熱結耶

傷寒至六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心

下不通支結而不正外等證未去者此其邪尚

少當合用柴胡桂枝湯主之以治其表邪去

此條又緯上三條而明其意

辨下後胸滿煩驚身重困篤一法

望有一等伏傷寒至八九日下之因其津液素結未

入積飲挾之填塞胸而心煩驚致小便不利

傷寒分經卷一中

識語一身盡重不可轉側者治當急救心危并導

痰散柴胡加龍骨牡蠣湯主之

病久脈結代心動悸宜補胃生津兼散邪一

法

望傷寒脈結代心動悸者真陰已亡邪聚而炙甘草

湯主之為之補胃生津潤一名復脈湯脈者其象

如何按之來緩而時一止復來者名曰結又脈來動

而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈

來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得

此脈者必難治

脈結代心動悸真陰已亡邪聚不散故立炙甘

草湯以復其脈少加桂枝以和營衛少加清酒

以助藥力內充胃氣外達肌表不驅邪而邪自

無可容矣○後段本為結代二脈下註腳後人

不解疑為闕文但以虛多實少混說殊不知脈

者血氣之先仲景於津液內亡之脈名之為結

陰代陰又名無陽原有至理何得惜然不識聊

為四言俚句以明其義胃藏津液水穀之海內

傷寒分經卷一中

充臟腑外灌形骸津多脈盛津少脈衰津結病

至津竭禍來脈見微弱宜先建中汗則津越下

則津空津耗脈和不可妄攻小便漸減大便自

通陽明內實急下救焚少緩須臾津液無存陽

明似實少用調承驅熱存津此法若神腎中真

陽陰精所裁胃中真陽津液所胎津枯精盛烈

泉可既陰精衰薄瓶罄竭何謂結陰無陽脈

闕何謂代陰無陽脈奪經揭無陽津液所括較

彼亡陽天地懸淵

誤下利不止身疼痛宜先救裏後救表一法

傷寒醫下之續得下利清寒而出之穀不止身疼

痛者此陽微陰盛內急當救裏之既救後身疼痛

如清利之證自調治者明是表邪未盡營衛不

致和所急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

下利清穀者脾中之陽氣微而飲食不能腐化

也身疼痛者在裏之陰邪盛而筋脈為其阻滯

也救裏與攻裏天淵若攻裏必須先表後裏必

傷寒分經卷一中太陽經中篇

無倒行逆施之法唯在裏之陰寒極盛恐陽氣

暴脫不得不急救其裏俟裏證少定仍救其表

初不敢以一時之權宜更一定之正法也厥陰

篇下利腹脹身體疼痛者先溫其裏乃攻其表

曰先溫曰乃攻形容不得已之次第足以互明

此意辨誤下引邪入內用梔子湯取吐三法

煩滿不安用梔子厚朴湯一法誤用九藥

大下身熱微煩用梔子乾薑湯一法大下

後身熱心中結痛用梔子鼓湯

望傷寒誤下後表邪入裏心煩腹滿

之臥起不安者此表邪入裏之證無可奈何之象

兩解梔子厚朴湯主之

與傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者

溫中散邪以梔子乾薑湯主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者

勢方盛未欲解已而邪熱也此時汗下俱不可施

梔子鼓湯主之然此湯主發汗若下之而煩熱胸

中窒塞者以梔子鼓湯主之即發汗吐下後虛煩

傷寒分經卷一中太陽經中篇

不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹者亦梔子

鼓湯主之若虛少氣者宜兼補其梔子甘草鼓湯

主之若嘔者宜兼治以梔子生薑鼓湯主之凡用梔

子湯皆以病在上因其病入舊微瀉此湯不能上

下泄不可與服之

香豉主寒熱惡毒煩躁滿悶下後身熱不去心

中結痛則表邪昭著與前條之微煩不同故以

梔子合香豉解散餘邪又主表而不主裏之法

也凡汗下後煩譫原有虛實之不同胸中窒塞

調之後乃治其他病故特於此示戒

辨下後復發汗之脈證及晝夜靜躁二法

誤

下之後不得已而復發汗必振寒脈微細

治傷寒先汗後下原不得已之法良工於汗下

之際已不可無集木臨谷之懼况以誤治致虛

更可再誤而犯虛虛之戒乎註以振寒屬誤汗

脈微細屬誤下且牽入亡陽亡陰變語殊失仲

景叮嚀之意

即名實煩窒比心中結痛則較輕也身熱既除

心中不窒止是虛熱內壅即名虛煩虛煩不得

眠亦即臥起不安之互詞反覆顛倒心中懊懣

熱邪逼處無法可除故用梔豉湯以湧其餘熱

乃因汗吐下後胸中陽氣不足最虛之處便是

容邪之處正宜因其高而越之爾若慮津液內

竭正氣暴虛餘邪不盡則原有炙甘草湯一法

寧敢妄湧以犯虛虛之戒耶舊微瘡不可與服

者緣內經有先泄而後生他病者治其本必先

誤

下之後復發汗以致振寒脈微細晝日煩躁不

得眠夜而安靜則誠虛陽擾亂將為不嘔不渴無

表證脈沉微而身無大熱者是陽虛而不熱外

也乾薑附子湯主之

晝煩躁而夜安靜虛陽擾亂為亡陽之候即此

而推日中安靜夜多煩躁則陽不病而陰病可

知矣然陰病乃傷寒後之本證自有陽邪入陰

及陰氣內虧津液未復之條故不復互言之也

辨吐下後復汗身為振搖動惕久成痿廢二

法一法胸高頭眩脈沉緊加誤汗動經宜

久咳

辛

人身筋脈接處津液傷寒若吐若下後津液傷

或心下逆滿氣上衝胸此寒邪搏津為飲所以起則頭

眩脈沉緊明係飲中留結外邪治之當能便邪

發汗其外則外邪盡解而津液自行乃為善治若但

振振動搖者當散邪茯苓桂枝朮甘草湯主之

下篇用小青龍湯以證兼風寒兩受不得不重

在表此證外邪已散止存飲中之邪故以桂枝

傷

寒吐下後以發汗愈重所以證虛煩不安脈沉

變而爲甚微八九日之內焉心下逆滿痞硬并脇下

亦痛此氣者今且上衝咽喉而眩冒有一身之外焉經

脈動惕無已時者上元氣湧泄久飲結不能復榮經

而先成痿

此卽上條之證而明其增重者必致廢也○汗

吐下三法差誤陰陽並竭變證遙起如心忤頭

玄身開力。面色青黃。口支。惟以吊串等。發本篇。

言之下。一皆是父人討登急治。不可因循以治。

言之一皆長矣。人謂急流不可因循以興。

補慧女此詔心下指碑方陽之牙打食
 劫三痛少易之耶夾次上道也防而不三止

因疾止溫頤頤而上衝頤上對而玄鬲有加則

不曰才爲辰蚤其顛頂間且易虛而陰奏之矣

不但兵爲拔擢其要職且降且用之云云

陰氣齊於房不從道乃三不一而足其理與一而益辰者矣夫人身之經脈全賴元氣與津液

爲充饗元氣以動而漸消津液以結而不布上

心下逆滿氣上冲胸之日早已用力乎

辨傷寒熱厥小便反利爲蓄血用抵當丸

法下而、真、以、苦、熱、終、焦、一、三、上、三、

寒焦有熱而少腹滿勝於應小便不利今反

者知其腹滿爲有血也當下之若血更爲凝

不可飲藥宜
抵當丸藥雖對病

送王師一矢當易爲山其苦勾踐雖以宋玉

變上篇之振奮湯爲大興系朋項強似弄瘡用

大旨同意。蓋易者易也。易即人會一事。

之卽散丸者緩也陰邪入陰心傷條之不盡故

緩而文之。所以求功於必勝也。其曰不可徐驅。

卽本易不變爲凡不可得矣

辨傷寒風溫相傳身體煩冬脈證二去

寒八九日或風至之氣相搏結流人關身體

不能自轉則但上無不嘔不渴內非熱

虛者以加
風溼搏於
經絡水道
以風溼無
疑治宜疾
與

桂枝附子湯主之。若其人大便硬小便自利者。

可脾勝濕不
外散其津去桂枝加木湯主之

溼土地氣也地氣之中人也下先受之其與風相搏結止流入關節身疼極重而無頭疼嘔渴等證故雖浸淫於週身軀殼自難犯高巔臟腑之界耳

晉或風溼相搏比前加骨節煩疼至掣痛而不得屈伸或以近之則痛劇難忍汗出短氣小便不利於

也惡風不欲去衣或身微腫者其風內去其溼以甘草附子湯主之

傷寒分經 卷一中 大陽經中篇 天

此條復互上條之意而辨其證之較重者故於前方加木以理脾而內去其溼減薑棗之和中外泄其風要皆藉附子之大力負之而走耳

辨傷寒發黃有寒溼相搏四法

望傷寒發汗已邪熱解身目為黃所以然者以寒溼相搏在軀殼裏不能解散故外蒸也以其與臟腑不可下也治之於寒溼中求之

在裏謂在軀殼之裏宜淺看蓋身目正屬軀殼與臟腑無關於寒溼中求之即下文三法也

身必發黃解之法麻黃連軀赤小豆湯主之此法也

觀此益知裏字真軀殼之裏非臟腑之裏否則豈有邪在裏而反治其表之理哉

毛或傷寒七八日身黃明如梔子色此三陽溼不利而腹微滿者勝宜茵陳蒿湯主之此又一

黃色鮮明其為三陽之熱邪無疑小便不利腹微滿乃溼家之本證不得因此指為傷寒之裏證也方中大黃者取佐茵陳梔子建驅溼除

傷寒分經 卷一中 大陽經中篇 天

熱之功以利小便非用下也

或傷寒身黃已發熱者勢清解其黃俾不留於肌以梔子蘘皮湯主之此又一

前條熱熱故用麻黃此條發熱反不用麻黃者蓋寒溼之證難於得熱熱則其勢外出而不內入矣所謂於寒溼中求之不盡泥傷寒定法此其明徵也

用三法以驅傷寒發黃於寒溼中求之能事畢矣設不知此妄行攻下其邪乘虛陷入陽明中

土與水穀相蒸身目之黃有加無已漸致沉錮不返者多矣此仲景所為叮嚀不可下之意與○同一溼也與風相搏則為痺痛與寒相結則發黃以俱係太陽表邪故戒不可下叔和不察將寒溼編入陽明之末未免與不可下之旨相悖今悉歸太陽求不違先聖矩矱云

辨太陽病有兼帶少陽及已罷未罷細察脈證用藥一法

大陽病十日已去脈浮細而嗜臥者太陽外邪

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 三

已解也設向胸滿脇痛之柴胡證者當與小柴胡湯以出少脈但浮而細者必有麻黃證與與麻黃湯陽證使太陽之邪從營分而散也

少陰證有嗜臥脈則沉而不浮陽明中風證有嗜臥脈則大而不細今脈浮細而神恬嗜臥可知太陽之外邪解散而不傳裏矣設向見胸滿脇痛之少陽證則其嗜臥乃膽熱神昏也又當用小柴胡湯矣若脈但浮而不細又不胸滿脇痛必有寒傷營之證與浮脈相合雖在十日之

外仍當用麻黃湯矣○陽明篇云病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯少陽篇云傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結必有表復有裏也可與小柴胡湯太陰篇云太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯三條雖表裏陰陽不同而諦審其脈證乘機以提出太陽少陽皆足以互明此條之義

傷寒分經 卷一中 太陽經中篇 三

太陽中篇論列方

三十五

麻黃湯

小建中湯

桂枝湯常用太陽上篇方

五苓散

茯苓甘草湯

禹餘糧丸缺

芍藥甘草附子湯

調胃承氣湯常用陽明上篇方

傷寒分經

卷一中

太陽經中篇方目

三

桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大嘔湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

大陷胸湯常用太陽上篇方

半夏瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

大柴胡湯

旋覆代赭石湯

小陷胸湯

柴胡桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

炙甘草湯

傷寒分經

卷一中

太陽經中篇方目

三

四逆湯常用陰經方

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

乾薑附子湯

茯苓桂枝朮甘草湯

抵當丸

桂枝附子湯

去桂枝加朮湯

甘草附子湯

麻黃連軀赤小豆湯

茵陳蒿湯借用陽明上篇方

梔子梔皮湯

小柴胡湯借用少陽全篇方

傷寒分經

卷一中

太陽經中篇方日

論

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西昌喻 昌嘉言註

傷寒分經

太陽經下篇凡風寒兩傷營衛之證列於此篇法二十四條上篇中風乃

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

衛病而營不病之證中篇傷寒乃營病而衛不病之證然天氣之風寒每相因人身之營衛非兩截病則俱病者恆多俱病則邪勢孔濇其人必增煩躁非發汗不解故仲景取用青龍之法乃內經陽之汗以天地之雨名之義也但青龍為神物最難駕馭必審其無少陰脈證乃可用之以少陰亦主煩躁故也於是更立真武湯以救青龍之誤投白虎湯以匡青龍之不逮神方罕用所為神乎其神者矣有志精義入神之學者請自茲篇證人

用大青龍湯詳辨脈證大綱二法

太陽中風脈常浮緩浮而緊是兼中寒又因寒身疼痛氣鬱而不汗不能出而煩躁

於外而周身疼痛氣鬱而不汗不能出而煩躁者邪勢亦孔熾矣治非大青龍湯主之若脈微

弱汗出惡風煩躁者恐是少陰亡陽不可服之則

陰竭陽厥逆筋惕肉瞤以謂此為用藥逆也此

孤必陽厥逆筋惕肉瞤以謂此為用藥逆也此

者速宜收攝其陰以真武湯救之

太陽中風四字括上篇而言。○解肌兼發汗而取義於青龍者。龍升而雲興而雨降。鬱熱頓除。煩躁乃解。匪龍之為靈。何以得此。觀仲景製方之意。本是桂枝麻黃二湯合用。但因芍藥酸收。為興雲致雨。所不宜。故易以石膏之辛甘大寒。以勝寒鬱之邪。且能助青龍之勢。所以為至當至神之法也。然而去芍藥之酸收。則麻桂之辛散。外攻其力。猛而無制。在寒多風少。及風寒兩停之證。則用當而通神。其有風無寒之證。及微弱之脈。若不知辨而驟用之。有厥逆陽暈而亡陽耳。此疎庸之輩。所以望而畏之也。孰知仲景於風多寒少之證。而見微弱之脈。有用桂枝二越婢一之法。桂枝全方。不去芍藥。取其二全。是不欲發汗之意。復改麻黃一湯為越婢一者。略用麻黃石膏。示微發於不發之中耳。夫越者。過也。婢。女子之卑者也。女子固以順為止。況於婢。則惟所指使。更無專擅矣。以大青龍之升騰變化。不可駕馭之物。約略用之。乃至性

過女婢之卑柔。此仲景通天手眼也。只一方中。忽焉去芍藥。為大青龍。而升天興雲雨。忽焉存芍藥。為小青龍。而蟠泥潤江海。忽焉用桂枝二越婢一。而細雨溼泥沙。精義入神之道。比仙經較著矣。後人不窺作者之藩。安望其能用之也哉。

傷寒二字。括中篇而言。○二條反覆互明。大青龍湯。充為風寒兩兼的對之藥也。細玩文意。傷風脈本浮緩。反見浮緊。傷寒脈本浮緊。反見浮緩。是為傷風見寒。傷寒見風。兩無疑矣。既無可疑。又當辨無少陰證。相雜則用青龍。萬舉萬當矣。故脈見微弱。即不可用大青龍。以少陰病脈必微細也。方註泥弱字。牽入中風之脈。陽浮陰弱。為解大失。仲景叮嚀垂戒之意。不思中風之脈。以及誤汗等證。上篇已悉此處。但歸重分別

傷寒二字。括中篇而言。○二條反覆互明。大青龍湯。充為風寒兩兼的對之藥也。細玩文意。傷風脈本浮緩。反見浮緊。傷寒脈本浮緊。反見浮緩。是為傷風見寒。傷寒見風。兩無疑矣。既無可疑。又當辨無少陰證。相雜則用青龍。萬舉萬當矣。故脈見微弱。即不可用大青龍。以少陰病脈必微細也。方註泥弱字。牽入中風之脈。陽浮陰弱。為解大失。仲景叮嚀垂戒之意。不思中風之脈。以及誤汗等證。上篇已悉此處。但歸重分別

少陰以太陽膀胱經與少陰腎經合為表裏膀胱邪勝腎切震鄰其在陰精素虛之人表邪不俟傳經蚤從膀胱之府襲入腎臟者有之況兩感夾陰等證臨病尤當細察設少陰不虧表邪安能飛渡而見身重欲寐等證耶故有少陰證者不得已而行表散自有溫經散邪兩相綜照之法豈可輕用青龍之猛立剷孤陽之根乎仲景豈此一義用法之妙已竭盡無餘後人顛倒無傳妄行註釋致令察脈辨證之際惛然不識

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

四

要妙祇覺仲景之堂無階可升其治虛勞發熱骨蒸等證每遵東垣升陽散火輕用升柴乃至百不救一可慨也夫

青龍項中脈見浮緊口久致衄用麻黃湯次

第三法

石太陽頭痛惡寒而脈但浮緊無汗發熱身疼痛是風多寒少八九日不解表證仍在此當發其汗如解服藥已病微除其人仍發煩熱目瞑此藥不劇者熱邪必迫血妄動血散乃解所以然

春風之陽者兼以寒氣氣加重故也不當再逐其麻病於陽挾持而其氣加重故也不當再逐其麻黃湯主之

風多寒少之證雖得衄解仍主麻黃湯以發其未盡之沉滯此大變乎中風之例也問太陽病汗發熱身疼痛云云劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之則家不可發汗而己解不用麻黃可也何復用之耶答曰衄家不可發汗者乃病傷寒平素慣衄及病傷寒不可發汗所謂衄血者無汗強發其汗徒動其血如下厥上竭之類也傷寒之人寒氣深重其熱亦重熱迫血行因而致衄衄乃解者不過少湯解其煩熱未盡之沉滯一以盡微其邪一以免其再衄此定法也仲景復申二法其一云太陽

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

五

病身浮緊身無汗自衄者愈此則不用麻黃湯也身無汗必係已用麻黃湯而未得汗然亦足以推發其勢而致自衄也以其既無發熱煩目眩之證則一云傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之此因全不發其汗因而致衄是一衄不能盡微其邪仍當用麻黃湯以發之邪始微也秦二條以會用法之意了無疑義矣至於審邪勢之微甚以分用劑之大小更不待言矣

四

太陽風多寒少之病脈浮緊發熱身無汗則寒證較輕又不發煩目瞑自衄者愈麻黃湯也此即前條之證證較輕故愈較易

五

病傷寒風多於中脈浮緊不發其汗熱邪迫血妄

致衄者此時風已隨衄而解麻黃湯主之

寒多風少之證衄則風邪得解惟用麻黃湯以

發其未散之寒但從傷寒之例也

青龍項中狀如瘡表裏虛禁汗吐下用各半

湯一法

六太陽病得之八九日忽往來如瘡狀雖發熱惡寒

而熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度

發脈微緩者此熱邪漸衰為欲愈也雖為欲脈微

而惡寒者此陰陽俱虛不可更大發汗更吐更下

傷寒分經卷一下太陽經下篇六

也乃面色反有之熱色者以風持於寒未欲解

也以其不能得小汗出身必癢宜用桂枝麻黃各

半湯總風寒而兩解之

此亦風多寒少之證

青龍項中脈微弱為無陽用桂枝二越婢一

湯一法

七太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此津液衰

無陽也不可更大發汗止宜用桂枝二越婢一湯

治之使熱化津生不特風散而寒邪亦解矣

問既曰脈微弱者此無陽也不可發汗方中桂

枝麻黃石膏生薑能此無陽也答曰太陽病風

傷寒則用桂枝湯解肌寒傷營則用麻黃湯發

汗風寒兩傷營衛則用大青龍湯發其汗此

定法也然於中復有最難用法一語如太陽病發

熱惡寒不可用桂枝湯而桂枝湯又不可用麻黃

湯為不可見微不可用桂枝湯而桂枝湯又不可

以麻黃湯不可欲微不可用桂枝湯而桂枝湯又

萬不可欲微不可用桂枝湯而桂枝湯又不可

麻黃一之欲微不可用桂枝湯而桂枝湯又不可

耳於是更欲微不可用桂枝湯而桂枝湯又不可

之於中越婢更欲微不可用桂枝湯而桂枝湯又

過之正勝者微解之任其發散之任其發散之

解陽明之熱然解之津液復生而然者以石膏能

無陽此天然妙合之法仲景之精義也

青龍項中汗出不解用桂枝二麻黃一湯一

傷寒分經卷一下太陽經下篇七

法

八木風多寒服桂枝湯治風而遺其寒病必大出汗

脈洪大者則其未解之故但與桂枝湯如前法可

汗若形如瘡日再發者則其未解也特為微寒所

汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

青龍項中辨表裏用桂枝湯單解風邪一法

九傷寒不大便六七日雖頭痛便不清裏有邪熱者

可與承氣湯下其不大見頭痛者則內非知不在

裏仍在表也不可常須發汗以解若頭痛熱者勢

必熱邪上此此無身痛目眩之謂蓋宜桂枝湯解
其風邪而血六七言寒邪已盡但

青龍項中風寒挾飲微結桂枝合五苓加減

一法

十風寒兩服桂枝湯治風而或以其不下之寒邪乘
表證未除而水仍頭項強痛翁翁發熱而無汗其
飲內逆其外心下滿微痛小便不利變如此者桂枝湯中去
桂枝一加茯苓木湯以主之邪自退也

青龍項中火迫亡陽用桂枝湯加減救逆一

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

八

法

土傷寒脈浮以無汗火迫劫之火氣內逼元陽亡
陽必驚狂起臥不安者元神散越而邪滯桂枝湯
去芍藥降之加蜀漆以發散上焦之邪龍骨牡蠣為之用
宅謂之救逆湯主之

篇首誤服大青龍湯厥逆筋惕肉瞤而亡陽者
乃汗多所致故以真武湯救之此以火迫劫而
亡陽者乃方寸元陽之神被火迫劫而飛騰散
亂其邪滯仍留連上焦而不能出以致驚狂起

臥不安如此故用此湯救之蓋陽神飛越當求

之於陽桂枝湯陽藥也然必去芍藥之陰降始
得疾趨以達於陽位既達陽位矣其神之驚狂
者漫難安定所以加蜀漆以發散上焦之邪滯
而重加龍骨牡蠣有形之骨屬為之舟楫以載
神而反其宅亦下重以鎮怯濇以固脫之外行
其妙用如是而後天君復辟聿追晉重耳越勾
踐返國之良圖矣仲景製方豈易識哉

青龍項中火逆煩躁用桂枝甘草龍骨牡蠣

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

九

湯一法

既病者火逆矣治者下之手是真陰因燒鍼傷人煩
躁不安者外邪未盡而桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之
此證誤而又誤雖無驚狂等變然煩躁仍外邪
未盡之候亦真陽欲亡之機故但用桂枝以解
外龍骨牡蠣以安內甘草以溫補元氣而散表
寒也

青龍項中誤用桂枝治風遺寒治表遺裏救

變一法

傷寒脈浮自汗出本寒而兼風小便數心煩微惡

寒腳攣急則寒邪已在于裏而表氣未去反與主枝

湯但欲攻其表令陽氣愈虛而陰經以散寒致

此之誤也病者得之便厥咽中乾煩躁吐逆

如者急作甘草乾薑湯與之以復其陽若而

厥愈足溫者是寒邪已散但恐辛熱之更作芍藥

甘草湯與之和陰其腳即伸若胃氣不和致譫語

者則胃中津液亦少與調胃承氣湯以和胃而止

證之誤治若可汗而重發其汗復加燒鍼者陽

傷寒分經卷一下 太陽經下篇十

之虛者必造於亡陰之無制四逆湯主之以制陰於

桂枝且謂麻黃可知大青龍更可知陰寒內凝

總無攻表之理也調胃承氣和胃止譫但可少

與多與則為下而非和矣

蓋問曰證象桂陽旦宜加寒按法治之而增劇手足厥

逆咽中乾兩脰拘急而譫語師言夜半手足當

溫脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮

而大浮則為風大則為氣虛風則生微熱而實無

氣虛則陰氣而兩脰攣其病證實象桂枝陰旦用寒

治因桂枝湯加附子參其間又增桂令汗出用陽旦

子者溫經以其亡陽故也此厥逆未已咽中乾

煩躁陽明內結譫語煩亂諸熱逆是所不更飲甘草

乾薑湯以夜半陽氣還兩足當熱而脰尚微拘

急此辛熱之重與芍藥甘草湯陰和乃脰伸少以

調承氣湯使之微泄則止其譫語誤作陰旦治故

知病可愈

仲景之圓機妙法在陽旦陰旦二湯陽旦者天

傷寒分經卷一下 太陽經下篇土

日晴暖以及春夏溫熱之稱也陰旦者風雨晦

冥以及秋冬寒涼之稱也以一桂枝湯遇時令

溫熱則加黃芩名陽旦遇時令寒涼則加桂

名陰旦湯後世失傳紛紛謂桂枝不宜於春夏

者皆由不識此義耳即如此證既象陽旦又云

按法治之即是按用桂枝加黃芩之法也所以

病人得之便厥明誤在黃芩助其陰寒若單

服桂枝湯何至是耶故仲景即行陰旦之法以

不足更加附子溫經即咽中乾陽明內結譫語煩亂渾不為意且重飲甘草乾薑湯以俟夜半陽回足熱後果如其言豈非早有所見乎唯黃芩入口而便厥未幾即以桂附乾薑尾其後固知其厥必不久所以可斷云夜半手足當溫况咽乾譫語熱證相錯其非重陰沍寒可知故纔得足溫即便以和陰為務何其審哉

青龍項中汗下後煩躁將欲亡陽宜補虛回陽一法

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

主

發汗若下之病仍不解煩躁者此真陽欲亡之不暇治急當煩躁本大青龍證然厥弱汗出惡風者誤服之則厥逆筋惕肉瞤首條已諄諄致戒矣此條復申其辨用參苓薑附溫補兼行以安和其欲越之陽俾虛熱自退煩躁自止乃為合法若因煩躁更加散邪則立斃矣夫不汗出之煩躁與發汗後之煩躁毫釐千里不汗出之煩躁不辨脈而誤投大青龍尚有亡陽之變是則發汗後之

煩躁即不誤在藥已誤在汗矣此仲景所以見微知著倣真武之例更加人參之補以默杜其危也下後煩躁較未下之煩躁亦殊

一法

青龍項中風寒兼見寒熱兩證宜分解陰陽

五傷寒

有風中胸中有熱寒中胸中有邪氣則腹中陰盛陽邪欲下痛而巳胸中陽盛陰邪欲嘔吐此者陰陽不相入失其黃連湯主之陽而兩解也

嘗因此法而推及中篇臟結之證書上有胎者

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

主

又為寒反在上熱反在下陰陽悖逆既成危候仲景但成以不可攻未言治法然非先之以和解將立視其死乎學者請於黃連湯着眼詳見中篇

五傷寒

有腹滿兼此肝過盛之氣乘脾土也木剋土

浮而

名曰縱刺期門土自安而病愈期門

二穴在不容兩旁各去同身寸之一寸五分肝之募也

傷寒 兼中風之發熱 發熱惡寒 內則大渴欲飲水

水勢其腹必滿但自汗出小便便利則熱邪亦其病欲解也此者肝木之氣乘其所不肺也金乃

發熱惡寒者太陽之本證也大渴飲水者

木盛則熱燥而求水以潤之也木得水助其勢益橫反侮所不勝而上乘乎肺水勢汎溢其腹必滿然肺金素無他病者必能時為運布或自汗而水得外滲或小便便利而水得下行其病欲

傷寒分經 卷一下 太陽經下篇 丙

解也亦由但腹滿而不識證故其病易解耳○

木本尅土而乘乎土其事直故口縱木受制于金而反乘金其事不直故口橫直則難愈不直則易安理之常也然縱橫之證不同而同刺期門者以賊土侮金皆由木盛腹滿識證涉危疑故亟以瀉木為主治也

用小青龍湯外散風寒內滌水飲一法

傷寒 風表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者此水寒相

治諸散邪而兼滌飲以 小青龍湯主之

風寒不解心下有水氣水寒相搏必傷其肺多列證者人身所積之飲或上或下或中或冷或熱各不相同而肺則為總司但有一二證見即水逆之應也於散風寒滌水飲藥中加五味子之酸以收肺氣之逆也葶之辛以瀉肺氣之滿名曰小青龍者取其翻波逐浪以歸江海不欲其興雲升天而為淫雨之意也後人謂小青龍為發汗之輕劑毋乃昧其旨乎

傷寒分經 卷一下 太陽經下篇 五

先傷寒心下有水氣上逆故咳而微喘上逆

雖發熱而不渴乃陽湯已反渴者此津液下行寒去欲解也其欲解之勢助 小青龍湯主之

寒去欲解仍用小青龍湯與上篇脈見單浮用

桂枝湯中篇脈見單浮用麻黃湯同意問曰此

去欲解不用藥可矣必用小青龍湯何也條既寒傷寒心下有水氣故發熱而微喘此水寒相搏而傷其肺金也傷寒故發熱水停心下故不渴而傷與外寒相得益彰矣今服湯已而渴明是表藥之甘溫克勝其外寒為內水所以知其證為欲解也然尚未解者外寒為內水所持開解最難故

必仍用小青龍以逐之令寒從外出水從下出
期一舉而兩解無餘耳不然縱外寒漸散其水
氣之射肺中者無由得出
吳口寧不為喘咳之人乎

按桂枝麻黃湯無大小而青龍湯有大小者以
桂枝麻黃之變法多大青龍之變法不過于麻
桂二湯內施其化裁或增或去或饒或減其中
神化莫可端倪又立小青龍一法散邪之功兼
乎滌飲取義山澤小龍養成頭角乘雷雨而翻
江攪海直奔龍門之意用以代大青龍而擅江
河行水之力立法誠大備也今編次於分篇之

傷寒分經

卷一下 太陽經下篇

六

際特以小青龍為綱於中麻桂諸法悉統於青
龍項下擬為龍背龍腰龍腹然後以小青龍尾
之或飛或潛可彈可伏用大用小曲暢無遺矣
乃於青龍尾後復綴白虎一方為之對待俾觀
者知神用無方爽然有會焉爾或問青龍白虎
耶出另其後然則脈證之經橫何與青龍事
耶答曰此等與義惟作者知之傷寒多有忽然
自汗突亡陽之候雖不用青龍之藥亦已犯
青龍之逆者矣况腹滿則陰虛可知語則陽
虛可慮仲景特挈經橫以名之者豈無說耶蓋
屈變者龍之所以伏也縱橫者龍之所以飛也
縱橫之脈證不同刺穴同用斯門所以制龍
所主東方青龍之位也刺其穴者正所以制龍

本而前之陽之變耳故一青龍方中張大其
施其天行而為霖雨使小其制則鼓浪而奔江
海其性則為龍女婢之卑柔刺其經穴則
清其氣而不與武湯爭其雨果口出龍氣不
上於天者且不得其雨其雨果口出龍氣不
開於天者且不得其雨其雨果口出龍氣不
馴可撫顧無法以制伏之耶此余所為有於
經橫之義也倘不其然匪但無與青龍亦并無
氣上之義也倘不其然匪但無與青龍亦并無
偶勝之疾即內動設小有人風苦痰飲為恙夏月無
之陽經位有則仲景之小龍無以易也蓋無形
太感於外威則仲景之小龍無以易也蓋無形
飲而收陰如乾薑細辛以散結而分邪合而用
之令藥力適在痰邪結之處攻擊片時則無
形之威從肌膚出有形之痰從穀道出頃刻分
解無餘而肺則空矣若疑麻桂甘溫減去不
用則不成其為龍公一特何物以為翻波鼓浪
之具

傷寒分經

卷一下 太陽經下篇

七

經青龍湯經制改用白虎湯權宜五法

服桂枝湯大汗出津液外亡而大煩渴不解脈洪
大者內變也常以白虎加入參湯主之所以兩
而止渴也

傷寒之脈陰陽俱緊此云浮滑則兼風可知滑

常傳入而作熱亦白虎湯主之
傷寒之脈陰陽俱緊此云浮滑則兼風可知滑

為裏熱浮滑則表亦熱所以白虎湯證又云熱結在裏表裏俱熱可以互證裏有寒者傷寒傳入於裏更增裏熱但因證起於寒故推本而曰裏有寒實則表裏俱為熱極也

上白虎湯者以表裏俱熱也傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯必其渴欲飲水已無頭痛惡寒之表證者熱解渴以白虎加人參湯主之

白虎湯治熱不傷寒外無大熱熱盛於口燥渴心傷寒分經卷一下 太陽經下篇 七

煩脈浮滑其背微惡寒是者雖帶表證其勢將熾仍白虎加人參湯主之不可牽泥也

表裏熱極燥渴心煩全無惡寒頭疼身痛諸表證者固常行白虎矣若脈浮滑背微惡寒此為表熱少裏熱多之證仍可與之蓋以脈滑明係裏熱而背為至陰之地雖表退尚有餘寒不當牽泥也設脈但浮而不滑證見頭疼身痛則雖表裏俱熱而在表之邪渾未退白虎湯即不可用以白虎辛涼不能解表故也○此條辨證最

細脈滑而帶浮渾身無大熱又不惡寒但背間微覺惡寒是表邪已將罷其入口燥渴心煩是裏熱已大熾更不可姑待而當急為清解恐遲

則熱深津竭無救於事耳門人問用白虎則表熱轉增試投白虎湯中倍石膏少減麻桂或見目惟於大青龍湯中倍石膏少減麻桂或見少時麻黃湯中倍石膏少減麻桂或見

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏是表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者裏熱已極不可不為之清也白虎加人參湯主之

傷寒分經 卷一下 太陽經下篇 九

此條表證比前較重何以亦用白虎耶本文熱結在裏表裏俱熱二句已自酌量惟熱結在裏所以表熱不除况加大渴飲水安得不以清裏為急耶

白虎五證得隸青龍後者以風寒俱有故也○寒與風皆傷宜從辛甘發散而表與裏又俱熱則溫熱為不可用欲并風寒表裏之熱而俱解之不其難乎故立白虎一法以輔青龍之不逮其藥乃石膏知母辛涼之二物也辛者西方金

也涼者秋令也酷熱之時欲求金風薦爽萬不可得計惟虎嘯則山谷間習習風生風生則熱解耳所以取辛涼二物偶而成方以象白虎之陰也夫青龍變化莫測方無定體故各用制伏之法若白虎則地獸之靈得風從而其威愈震亦不易制伏之物况裏熱已極津液垂亡元氣所存無幾而領西方之肅殺以入胃中能無慮乎於是甘以甘草之甘緩和其猛性而入米同煎以助胃中水穀之氣虛者更加人參以助胃中

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇

辛

天真之氣乃可用之而無患制之之法早具於一方之內矣道家降龍伏虎之能仲景有焉○按石膏一物之微入甘溫隊中則為青龍從清涼同氣則為白虎惟文武聖神之哲乃能用之恰當此龍虎慶風雲之會也設在表之風寒未除常用青龍而反用白虎在裏之熱渴已逼當用白虎而反用青龍則用者之誤究與倒行逆施者同類寧不敗乃公事乎傷心哉千古興亡之際同一轍矣

太陽下篇論列方

正川方十五
錯川方四

大青龍湯

真武湯

麻黃湯

借用太陽中篇方

桂枝麻黃各半湯

桂枝二越婢一湯

桂枝湯

借用太陽上篇方

桂枝二麻黃一湯

桂枝去桂加茯苓術湯

傷寒分經

卷一下

太陽經下篇方目

主

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

借用陽明上篇方

四逆湯

借用陰經方

茯苓四逆湯

黃連湯

小青龍湯

白虎加人參湯
白虎湯

傷寒分經

卷二下

太陽經下篇方目

三

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西昌喻 昌嘉言註

武原吳儀洛遵程訂
賁湖周學江襟三
海昌周廣業廬補參

傷寒分經

陽明經上篇凡外邪初入陽明者謂之太陽陽明列於

此篇法三十九條。陽明者謂之太陽陽明列於

實為正胃實則皆下證也。然陽明之邪其來

路則由太陽陽明證見八。九而太陽證有

一二未從即從太陽而不從陽明可汗而不

可下也。其去路則趨少陽陽明證見八。九

九而少陽證略見一二。陽明證上篇

陽明經上篇凡外邪初入陽明者謂之太陽陽明列於

此篇法三十九條。陽明者謂之太陽陽明列於

實為正胃實則皆下證也。然陽明之邪其來

路則由太陽陽明證見八。九而太陽證有

一二未從即從太陽而不從陽明可汗而不

可下也。其去路則趨少陽陽明證見八。九

初傳陽明病脈遲汗出多微惡寒者在表之風
未解也可解肌發汗使風邪仍從宜桂枝湯

傷寒分經

卷二上

二

傷寒陽明病脈尚浮無汗而喘者在表之寒邪發其汗使寒邪仍從營分而出則愈宜麻黃湯

三

陽明病能食者陽盛能消穀也為中風不能食者陰盛不能消穀也為中寒

傷寒分經

卷二上

陽明經上篇

二

風則傷衛寒則傷營一定之理是則足三陽經

太陽行身之背陽明行身之前少陽行身之側皆可言營衛受邪何仲景於陽明經但以能食不能食分風寒而不以營衛分風寒耶蓋營衛交會於中焦論其分出之名則營為水穀之精氣衛為水穀之悍氣論其同出之源渾然一氣何由分其孰為營孰為衛哉惟風為陽陽能消穀故能食寒為陰陰不能消穀故不能食以此辨風寒之邪不確然有據乎

四

發陽明胃經之汗先當顧脈陽部微緩而汗出少

者為陽自和也即將也若汗出多者為太過不能無變凡傷

陽脈實因用麻黃湯發其汗而山多者亦為太過所引為太過者為後陽氣將絕於裏亡之

津液大便因鞭也

陽微者中風之陽脈微緩也陽實者傷寒之陽脈緊實也陽絕即亡津液之互辭仲景每於亡津液者悉名無陽本文陽絕於裏亡津液大便因鞭其明証家認作汗多而陽亡於外大謬○傷寒發太陽膀胱經之汗即當顧慮陽氣以勝

傷寒分經

卷二上

陽明經上篇

三

肺主氣化故也發陽明胃經之汗即當顧慮陰津以胃中藏津液故也所以陽明多有熱越之證謂胃中津液隨熱而盡越於外汗出不止耳然則陽明證不論中風傷寒脈微脈實汗出少而邪將自解汗出多則陰津易致竭絕業醫者可不謹持其柄而妄用重劑發汗以劫人之津液耶觀太陽發汗之重劑以青龍名之可見亢旱得之則為甘霖若淫雨用之則沉竈產蛙傷禾害稼有載胥及溺已耳此陽明所以有桂枝

麻黃湯證而無大青龙湯證也。噫微矣哉。

五問曰：陽明中風外證未解者，云何答曰：身熱而汗自出，盜汗不惡寒反惡熱也。此所謂太陽未罷，汗自出，盜汗不惡寒反惡熱也。此所謂太陽未罷，汗自出，盜汗不惡寒反惡熱也。

桂枝湯者也。以此辨陽明中風之外證，正兼太陽也。

六問曰：在經之病，何緣又得陽明病？答曰：太陽病，若發汗若下，若利小便，此病不治而愈。亡津液，胃中乾燥，因轉屬陽明。人久不更衣，內實大便難者，此風邪正名陽明，下之候也。此本傷寒分經。

傷寒分經卷二上陽明經上篇四

陽明病可下之說，當置之。中篇以全文不便分剖，故錄於此。讀者識之可也。下第八條同此。

以此辨陽明中風之裏證。

七問曰：病在陽明，宜有得之一日，不發熱而惡寒者，何也？答曰：此初時寒邪在表者未盡，雖得之一日，證尚在。至第二日，惡寒將自罷，即自汗出而惡熱也。以此辨陽明傷寒之外證，正兼太陽也。

八問曰：陽明病，惡寒何故自罷？答曰：陽明之居中，土也。萬物所歸，無所復傳。故其始未罷，雖向惡寒，至二日，傳於胃腑，自止。此為陽明之病，乃可。

候也。以此辨陽明傷寒之裏證。

候也。

以此辨陽明傷寒之裏證。

以上八條，見仲景於太陽傳入陽明之證，其辨認之法，即少變太陽之定例矣。蓋太陽有營衛之兩途，風則傷衛，寒則傷營。而陽明則營衛難以辨別，辨之全在於脈與證。風邪之脈，傳至陽明，則緩去而遲在；寒邪之脈，傳至陽明，則緊去而浮在。風邪之脈，輕高而上前者，風邪本微，殊無內向之意。雖汗出少而不為過也。寒邪之脈，已至於實，則將去太陽而成可下之證，故發其汗太多，反為過也。如此辨別，讀者猶不心花開朗耶？至其辨證，則以能食不能食為諦。蓋陽邪能化穀，陰邪不能化穀之義也。又設四問以辨風寒之在表在裏，而定汗下之權衡，何其明且盡耶？由是推之，病已傳經，而太陽邪有未盡其用，桂枝麻黃二湯，即當挾小其制，不可使太過明矣。太陽邪已盡其用，承氣諸湯，即當竭蹶從事，不可使不及又明矣。

傷寒分經卷二上陽明經上篇五

事不可使不及又明矣。

九

本太陽病初得時或中風則用桂枝湯發其汗汗

先出而不盡微邪因轉屬陽明也

陽明病自汗出其熱常在口喘而多汗者微發

熱惡寒者則太邪未解也其熱不潮此時止未

可與承氣湯若腹大滿不通者則裏證已急可

與小承氣湯以去其微和胃氣勿令大泄下

千

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭

傷寒分經

者此皆是邪傳入與小承氣湯和之而愈不得大

下之意不同矣

用承氣湯少變不可下之例然曰和則與用

至

凡傷寒病在胸膈則吐之胃肺吐後但腹脹滿而

下

吐後而腹脹滿則邪不在胸其為裏實可知然

承氣可耳此亦和法非下法也觀中篇腹滿不

法

但腹滿而不痛自不宜用急下之法少與調胃

三

減減不足言如是之急者止言當下自可類推

三

陽明病心下鞭滿者正兼太陽結胸痞滿不可攻

三

之或行攻之而利遂不止者真氣先脫主死而利

西

傷寒嘔多去除也即有陽明證不可攻

傷寒分經

此條復辨嘔有太陽亦有陽明寒熱不同不可

誤治也

主陽明中風之病傷寒口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒

脈浮而緊皆太陽未若治陽明之法下之則邪

乘虛內腹益滿且津液耗亡而小便難也

諸證俱太陽未除之候但以腹滿一端知為熱

入陽明然終非太實大滿豈可誤下召變耶

夫陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱是太

也而汗出不惡寒反惡熱身重明之證熱已深

也

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱是太

矣此若發其汗則內熱益甚津燥而心中憤憤反
發譫語若再加燒針則火氣內攻津液乾必更休
惕煩躁不得眠若下之則胃中不和氣鬱滯其
空虛客邪氣乘虛動於膈中心中為懊憹向兼太
陽故汗下燒針俱不舌上胎者宜上湧梔子豉湯
可也其腸熱甚而身重以上渴欲飲水口乾
主之無碍陽明也若等證加以渴欲飲水口乾
舌燥者宜解熱白虎加人參湯主之若其證同是
渴欲飲水以小便不利者宜利水豬苓湯主之
若不多者宜之若陽明病汗出多而渴者不可
傷寒分經卷二上陽明經上篇八

大太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不
嘔其內亦無他苦但心下痞結者此以醫下
之陷也如其不誤下痞者太陽必漸病人不
惡寒而渴者此傳轉屬陽明也其小便數者則津
去大便必鞭然其鞭但因津少之故不更衣於十
日之無所苦也多所交今刪之
寸緩風傷衛也關寸猶在經未入府也尺弱

其人陰精素虧也○此條津液雖重虧而傳邪
不重且小便數則熱邪已漸從膀胱出矣當俟
其津回自愈不可妄行施治以劫奪其津液也
左陽明病脈浮而緊者太陽寒傷營之證未罷也必
日潮熱發作有時在於陽明但浮者太陽風傷衛
傷風原有汗必兼盜汗山陽熱在肌肉也以此認太
陽明中風而兼寒之病太陽未罷則陽明之證較然矣
有陽明中風而兼寒之病太陽未罷則陽明之證較然矣
之浮陽明大而證之所見上短氣陽明之腹都滿
少陽之脇下連及於心作痛處雖久按摩之而氣
傷寒分經卷二上陽明經上篇九

不通利且風寒在鼻乾不得汗嗜卧一身及面目
悉黃之證而又不小便則難既有潮熱時時噦之
而且少陽耳前後皆腫困連三經乃陽明極重之
脈過處耳前治者其氣證也然其中亦有可治者
有不治者耳前治者其氣證也然其中亦有可治者
內固病趨於外也治者其氣證也然其中亦有可治者
邪不即解病過十日診脈若續其前更浮者則
太陽而陽明少陽漸減之候與小柴胡湯引陽明
為可治也宜先用和解法之候與小柴胡湯引陽明
少陽而後視其脈或浮象無陽明證者則邪風
退太陽尤與服麻黃湯收功若固不拔於陽明半
為易治便加噦者則真氣垂盡何所憑藉以不治
尿腹滿且加噦者則真氣垂盡何所憑藉以不治

此陽明中風之證居八九而中寒之證亦居一二觀本文不得汗及用麻黃湯其義自見其證為陽明第一重證太陽證既未罷而少陽證亦兼見是陽明所主之位前後皆邪而本經之邪更瀰漫流連矣蓋陽明脈本大兼以少陽之弦太陽之浮則陽明之天正未易衰陽明諸證正未易除也所以病過十日外證未解必審其脈證或可引陽明之邪從少陽出則用小柴胡湯或可引陽明之邪從太陽出則用麻黃湯方為

合法若不尿腹滿加噦則真氣垂盡無力可送

世

風寒在陽明而脈遲似乎表證將除而食

難用飽飽則微煩仍食外邪助其熱也頭眩

道不順必小便難此水穀氣蒸無欲作穀瘕而身

發黃中風雖下之腹滿如故所以然者其脈遲

則胃氣不實故也此者當復其脈使勝氣

陽明病若中虛寒不能食小便不利手足澀然汗

出此欲作久固之瘕必大便初鞭後溏所以然

者以胃中冷水穀不別故也

註謂固為堅固瘕為積聚大謬蓋大便初鞭後

溏因成瘕泄瘕泄即溏泄久而不止曰固瘕也

陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節

疼翕然如有熱狀本經熱交勝乃奄然發狂澀然汗

出而解者此格陽明之病也既乃奄然發狂澀然汗

與汗共併必其脈緊則盛而易愈不能透而

解矣

上二條一以小便少而成穀瘕是溼熱由胃上

攻胸膈則頭眩而身發黃一以小便不利而成

固瘕是溼熱由胃下滲大腸則手足汗出而成

瘕此條小便反不利本當成穀瘕及瘕泄之

證況骨節疼溼勝也翕然如有熱狀熱勝也溼

熱交勝非胃氣有權焉能驅之與汗併出奄然

發狂者溼熱憑陵陽明邪正交鬪之故也醉酒

發狂者亦是此理脈緊則愈言不遲也脈緊疾

則胃氣強盛所以肌肉開而澀然大汗若脈遲

則胃中虛冷偏滲之水不能透而為汗即手足

多汗而周身之溼與熱又未能其併而出此胃
強能食脈健之人所以得病易愈也

有陽明熱病不能食也此表熱裏寒不可攻其熱
必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻
其熱必噦

蓋脈浮而遲雖有表熱而裏則寒下利清穀而不出
者不可攻熱四逆湯主之若胃中虛冷下利清穀
能食者飲水則噦攻熱已也

表熱裏寒法當先救其裏太陽經中下利不止
傷寒分經 卷二上 陽明經上篇 三

身疼痛者已用四逆湯不為過其在陽明之表
熱不當牽制更可知矣此證比前條虛寒更甚
故不但以其熱必噦即飲以水而亦噦矣
前云能食者為中風不能食者為中寒矣此上
五條云食難用飽一云欲食似乎指中風為
言一云中寒不能食及後二條之不能食又明
指中寒為言所以後人拘執其說而誤為註釋
也不知此五條重舉風寒證中之能食不能食
辨胃氣之強弱非辨外邪也故五證中惟水不

勝穀氣脈緊則愈一證為胃氣勝其四條俱是
脈遲胃冷反為水熱所勝之證夫傷寒雖為熱
證而胃中虛冷者未可一例而推蓋胃既虛冷
則水穀混然無別熱邪傳入必不能遽變為實
也胃不實則不可下而熱邪既入轉蒸水穀之
氣蘊崇為病即下之而水熱不去徒令胃氣垂
絕而作噦耳仲景一擊出而於後條下利清
穀一證主之以四逆湯則前條之較輕者宜主
之以溫胃更不待言惟合五條而總會其立言

傷寒分經 卷二上 陽明經上篇 三

之意始不至於傳訛耳
反作而何手足不宜於汗耶答曰前代之業
醫者皆極大聰明學問之人故仲景書為中人
以上舉一隅能以三隅反者也胃氣虛寒之
人外邪入之必轉增其熱胃熱故勝於寒氣
化不利小便因之不利小便不利而熱注于大
腸則為洞泄即末條之下利清穀者是也小
腸則為瀉利而滲于脾則四肢先見色黃乃至
遍身發黃而成穀瘵者是也今手足微然得汗
則脾中之溼熱行而色黃穀瘵之患可免但汗
從手足而出水熱之氣未得過泄于身不過
少分大腸奔迫之勢故不為洞泄而為瘵耳
無病之人小便不行尚清為他病况傷寒證極
赤極熱之小便俾行尚清不為他病况傷寒證極
極之變耶一週其源而輕重自分矣
共陽明風病但頭眩不惡寒故能食而咳其人必咽

痛以胃熱故風若不欬者咽不痛

芒陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者

此而鬱于肌膚以其久虛正氣故不能透達也

言久虛者但明不能透出於肌表之故非謂當

補也

其陽明病水不頭痛然反無汗而小便利二三日嘔

而欬手足厥者則邪熱不在內而在必苦頭痛若

不欬不嘔手足不厥便利者熱邪順水道而頭不

痛

傷寒分經 卷二上 陽明經上篇 古

其陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊

憊饑不能食但頭汗出者此陽中鬱熱上攻所梘

子鼓湯主之

下之而外有熱心中懊憊饑不能食幾成結胸

矣然手足溫則陽氣未至傷陷不結胸則外邪

原屬輕微又因頭汗之出知是胸中鬱熱上蒸

乃因其而揚之用梘子鼓湯以徹其熱則陽

得下通於陰而過身澱然汗解并可知矣

上數條皆溼熱上攻之證

世陽明病口燥但欲漱水不欲嚥知其邪入陽明血

之脈起於鼻陽明此必上循鼻衄

世脈浮發熱口乾鼻燥熱熾矣能食者則為風邪風

衄

世陽明有發病若發熱汗自出者此為因溼氣熱越於

外不能復發黃也但於頭上汗出身則無汗刺頸

而還小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏

有出路身必發黃茵陳蒿湯主之

世陽明病面合赤色必虛於內不可攻之熱邪愈

傷寒分經 卷二上 陽明經上篇 古

不可得必發熱色黃愈津液小便不利黃無也

世熱而發陽明病若汗出者溼熱外越小便不利者

無汗又小便不利則溼熱心中懊憊者身必發黃

世陽明病被火攻其熱上微汗出下則絕小

便不利者發黃

合四條觀之陽明病溼停熱鬱而煩渴有加則

必發黃與前穀瘕本同一證但彼因脈遲胃冷

而得則與因痼及噦同源而與此異派

世陽明病下血譫語者此為熱入血室熱邪挾白已

語如見鬼狀也。心口故。但頭汗出而無汗者。所謂者。無汗。正與下血病相應。而汗出於頭。則又熱刺。氣上攻。實可知也。血散于肝。熱有血則則實。常刺之。期門穴。隨其熱而瀉之。使澱然汗出則愈。

婦人病傷寒。經水適來。適斷。則邪熱乘之而入於血室。譫語。如見鬼狀。常刺期門。男子陽明經病下血而譫語者。亦為熱入血室。亦刺期門。詳後

心賴血以養。陽明證其人喜忘者。以有積久瘀血。在陽明之分。不故令喜忘也。胃屎雖結。輒大便秘反。

傷寒分經 卷二上 陽明經上篇 六

藉於血。易出。然帶瘀。其色必黑。陽明為多血之經。復可動。宜抵當湯下之。

太陽經熱結膀胱之證。輕者如狂。重者發狂。如狂者。血自下。但用桃仁桂枝加入承氣湯。因勢利導。血去則愈。發狂者。血不下。須用抵當湯下之。乃愈。詳太陽上篇。此條陽明喜忘之證。本差減於如狂。乃用藥反循發狂之例者何耶。蓋太陽少血。陽明多血。陽明之血一結。則較太陽更為難動。所以宜用抵當湯峻攻之法耳。但太陽

云主之。則確乎不易。此云宜用。則證有輕重。不等。在於臨時酌量耳。

支病。人無表裏證。但發熱至七八日之久。則胃中支。雖脈浮數。尚帶者。亦可下之。以救熱。津液難。脈數不解。故如是。胃熱。則為消穀善饑。便食多者。乃至六七日不大便者。為有瘀血。結住。故也。宜抵當湯下之。若脈數不解而下利不止者。此非有瘀之候。但血分熱極。必協熱而便膿血也。

雖云無表裏證。然發熱脈浮數。表證尚在也。其傷寒分經 卷二上 陽明經上篇 七

所以可下者。以七八日為時既久。而發熱脈數。則胃中熱熾。津液盡亡。勢不得不用下法。如大柴胡湯之類是也。若脈數不解而下利不止。註謂用抵當湯下之。數仍不解。大謬。此乃對假令已下五句之文。見已下脈數不解。反六七日不大便。則宜抵當湯以下其血。若已下脈數不解。而下利不止。則不宜抵當湯之峻。但當消息以清其血分之熱。邪若血分之邪不除。必協熱而便膿血矣。

合三條總是熱入血室故隨下血與不下血而異治也然要知陽明尚兼太陽則不但胃中熱熾而膀胱隨經之熱亦未盡解此所以宜於抵當湯乎

死

病人煩熱汗出則解人陽經之邪將盡矣又如瘧狀每日晡

所發潮熱者屬陽明也然惡寒未盡太陽之邪脈實者大者正陽

也陽明宜下之脈浮虛者陽明宜發汗以解其

下之之藥宜用與大承氣湯發汗之藥但和其營衛以盡陽明兼

帶之宜桂枝湯不可誤用

傷寒分經 卷二上 陽明經上篇 六

陽明上篇論列方正用方四

桂枝湯借用上篇方

麻黃湯借用上篇方

小承氣湯

調胃承氣湯

吳茱萸湯借用上篇方

梔子豉湯借用上篇方

白虎加人參湯借用上篇方

豬苓湯

傷寒分經 卷二上 陽明經上篇方 九

小柴胡湯借用上篇方

四逆湯借用上篇方

茵陳蒿湯

抵當湯借用上篇方

大承氣湯借用上篇方

大氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著
西昌喻 昌嘉言註

武原吳儀洛遵程訂
賁湖周學江襟三
海昌周廣業厘補參

傷寒分經

陽明經中篇

凡外邪已離太陽未接少陽謂
陽明經中篇之正陽明列於此篇法三十
條。外邪全入陽明所轄地界已離太陽未
接少陽此際當用下法確無疑矣然其邪復
有在經在府之不同在經者與太陽少陽
消息連綿之邪用下尚恐胃有未實篇中無
胃已大實惟在府者則入於胃而不傳經

傷寒分經

卷二中

陽明之為病風寒山胃家實是也

以胃家實正陽陽明之總見邪到本經遂入
胃而成胃實之證也不然陽明病其胃不實者
多矣於義安取乎

陽明經血約至三日病邪當入胃陽明其脈
大氣俱盛故傷寒第一

傷寒一日太陽二日陽明三日少陽乃傳經之
次第其實不以日拘也此云三日陽明脈大正
見二日之陽明傳自太陽必兼乎浮緊浮緩未

定是正陽陽明也若正陽陽明氣血俱多其脈

必大而與太陽別矣言外見三日證兼少陽則

脈必大而弦又不得為正陽陽明也噫微矣哉

三傷寒發熱始無汗嘔不能食及熱除而反汗出

澀然肌肉潤者是陽邪已去太轉屬陽明也

四澀然微汗出也傷寒轉繫陽明者肉故其人肌肉

澀澀者肌肉潤而微汗不乾之貌發熱無汗嘔

不能食皆傷寒之證也傷寒無汗何以反澀澀

傷寒分經 卷二中 陽明經中篇 二

汗出耶可見證已轉屬正陽陽明矣既澀澀然

汗出則熱除嘔止可知矣

五太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者乃自內而

熱蒸蒸者熱勢自內騰達於外如蒸炊然胃實之

證也其熱蒸蒸勢必其汗澀澀矣妙哉形容乎

惟熱在胃故用承氣以調其胃胃調則病渙然

除矣

六陽明病本自汗出醫更重發汗亡其津病已差尙

微煩不了了者此大便必硬所以以亡津液胃中乾燥故也當問其便小便日幾行若本三四行今日再行其津液當還入胃中不久必大便也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖大便不可攻之以其津液當須自欲大便乃

蜜煎導而通之若土瓜根及大豬胆汁皆可為導

有陽明病向者浮脈變而遲雖有汗出與中風有

不惡寒者則熱在胃府其身必重又短氣腹滿而喘且

有潮熱者此陽明也欲解而巳入陽正可攻裏內陽

傷寒分經 卷二中 陽明經中篇 三

也手足濇然而汗出者此又大便秘已胃實而可攻之

外證也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者太陽

外證未解也又其熱不潮則非陽明之表熱未可與大

承氣湯若腹大滿不通者又不得可與小承氣湯

微和胃氣勿令大泄下後半節入陽明上篇

脈遲汗出不惡寒身重短氣腹滿喘潮熱八者

乃陽明之外邪欲解可以攻裏而不為大悞之

候也然曰欲解曰可攻不過用小承氣及調胃

承氣之法耳必手足濇然汗出方可驗胃實便

鞭外邪盡解而當從大承氣急下之法也申酉戌間獨熱餘時不熱者為潮熱若汗多微發熱惡寒是陽明證尙兼太陽縱腹大滿胃終不實只可微和胃氣以從權而已

九病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此

有燥屎故使不大便也

十天下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥

屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

十一病人小便利大便乍難乍易時有微熱喘冒不

傷寒分經 卷二中 陽明經中篇 四

能臥者有燥屎也宜大承氣湯

十二陽明病潮熱大便鞭者可與大承氣湯不鞭者不

可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法

少與小承氣湯湯入腹中轉動失氣者此有燥屎

乃可攻之若不轉動失氣此但初頭鞭後必溏不

可攻之攻之正氣必致脹滿而不能食也時有欲

飲水者與水則噦此寒也或為其後復發熱者邪熱

胃燥得熱必大便鞭而少也復發熱者以小承氣湯和之

腹中之氣得攻藥不為轉動則屬虛寒所以候
 攻而證變脹滿不能食及噦也攻後重復發熱
 又是胃熱至此方熾大便因可得硬但為時未
 久必少耳仍以小承氣和之若腹中氣仍不轉
 則不但用大承氣大差即用小承氣亦小差矣
 主陽明病既試下之矣心中懊憹而煩必因病
 向有燥屎未出者可再攻之其煩自解若腹微
 滿但知其大初頭硬後必漇非有不可攻之若有燥
 屎清息如前轉失氣繞臍腹滿者方宜大承
 傷寒分經 卷二 陽明經中篇 五

得病二三日正陽明時下脈弱雖無太陽表證及
 柴胡證又證煩躁心下硬至四五日雖能食胃氣
 之故未可下然以脈弱以小承氣湯少少與微和之
 令小安至六日再與小承氣湯一升以探腹若不
 大便六七日方是胃實小便少者則胃弱而勝雖
 不能食屎不下燥但亦初頭硬後必漇未定成硬攻
 之必漇須其小便利屎定硬乃可攻之宜大承氣
 湯

無太陽少陽之證則煩躁心下硬屬正陽陽明
 之可下無疑矣乃止用小承氣一再嘗之總因
 脈弱故爾遲徊也○雖能食雖不能食全與辨
 風寒無涉見雖能食者不可以胃強而輕下也
 雖不能食者不可以胃中有燥屎而輕下也後
 九條云譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥
 屎五六枚與此互發
 主陽明病會經吐下傷其津不吐不下而心煩者知
 胃中熱燥津液往來心煩若可與調胃承氣湯和之以
 液不安之故可與調胃承氣湯安胃氣
 傷寒分經 卷二 陽明經中篇 六

問陽明病心下硬滿者不可攻之陽明病不吐
 心煩者與調胃承氣湯不可下也答曰心下正胸膈
 心煩者與調胃承氣湯不可下也答曰心下正胸膈
 之證而利遂不止者死至太陽陽明之候不可
 攻之內耗大率當調其胃然尚有重傷津液之慮
 若下止下利者當調其胃然尚有重傷津液之慮
 為邪熱灼胃密矣當調其胃然尚有重傷津液之慮
 同與亦是少少和胃切
 安津液之法非下法也
 合九條總是以外證之解與不解氣之轉與不
 轉臍腹之痛與不痛脈之弱與不弱汗出之多
 與不多小便之利與不利邪熱之熾與不熾津
 液之乾與不乾而辨腹中之燥屎多與不多漇

與不瀉以消息微下之法故惟手足澀然汗出大便已硬者主之以大承氣其他諸證則曰津還自便曰不可攻之曰宜小承氣曰少與小承氣曰明日更與一升曰宜大承氣全是商量治法聽人臨時斟酌以期無悞所以不用主之二字此等處關係安危最大蓋熱邪入胃不以寒藥治之則胃傷然寒藥本以救胃也不及則藥不勝邪太過則藥反傷正況乎不勝其邪勢必盡傷其正徒傷其正又未必盡去其邪此仲景傷寒分經

卷二中

陽明經中篇

七

所為諄復於二者之間耶

夫陽明病識語發潮熱脈滑而疾者此熱藏於裏滅知裏氣之虛實小承氣湯主之因與小承氣湯一何如先當以升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之若服明日不大便脈反微澀者知裏氣虛也為難治不可更與承氣湯以速之也識語而發潮熱陽明之下證審矣更兼其脈滑疾復與脈弱者不倫故主之以小承氣一定之法也然尙未知其裏證若何必轉失氣方可再

服若服後不轉失氣并不大便秘反微而且澀又是裏氣虛寒之證蓋陽明居於中土其表虛表實來自太陽至此已明其裏虛裏實茫然未上故用法不可令虛者益虛有如此之鄭重也

老夫

語不足故也

實則識語虛則鄭聲鄭聲重其

六

識語本非死證然有三等主死不直視而識語則氣垂絕心火愈無喘滿者死下利者亦死蓋一則所制土死識語而喘滿者死下利者亦死氣從上脫一則氣從下脫皆正

傷寒分經

卷二中

陽明經中篇

八

九

太陽經發汗已多及傳若重發汗者即使病邪亡其陽氣於是神魂無主識語飛越不返故脈短者則陽不死脈自和者陰陽未不死

門人問亡陽而識語四逆湯可用乎答曰仲景固必急回其陽然邪傳陽明胃熱之熾否津液之竭否裏證之實否俱未可知設不辨悉從回其陽先竭其陰竟何益哉此仲景不言藥乃其所以聖也然得于此問而仲景之妙義愈彰矣

十

陽明病其人自多汗以其津液外出故胃中燥而大便必鞭鞭則裏實識語小承氣湯主之以和若

一服識語止燥已更莫復傷津之後多服寒

此舉讖語之因汗多津越者為言

傷寒四五日脈沉而喘滿沉為病在裏本宜而反

發其汗使津液越出大便為難其表出而虛裏便

而實久之則必讖語

此舉讖語因誤汗而致者其曰裏實亦即上文

胃中燥大便必鞭之互辭其不出方者亦即上

文小承氣湯之互意也

傷寒若吐若下後邪不解不大便五六日或上至

十餘日每日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼

傷寒分經 卷二中 陽明經中篇 九

狀已為陽明若更劇者發則不識人循衣摸牀

惕而不安微喘直視此等病勢脈弦者陽證仍得

生可謂澀者則陽證見死其微而未者但發熱讖

語而非循衣摸者已過熱盛心大亢極而大承氣

湯主之若一服得利止後服過也

此條舉讖語之勢重者為言而勢重之中復分

二等劇者生死仍憑乎脈微者則主以大承氣

比上條之小承氣則更進矣前云讖語脈短者

死此云脈弦者生前云讖語脈滑疾者用小承

氣湯此云脈澀者死更互一字而大意躍然

傷寒明汗出讖語者以有燥屎在胃中而此

為風邪在胃尚未脫也燥屎須下之然必過太

陽經乃可下之下之若早下之則邪氣擾亂神

必亂以此表虛裏實故也當因勢利下之則邪

盡而愈所謂通因宜大承氣湯此宜置上篇因

昔陽明病讖語有潮熱此胃熱本反不能食者胃中

必有燥屎五六枚而後能食也若不能食者胃中

但便鞭爾二者總是宜大承氣湯下之而藥制大

傷寒分經 卷二中 陽明經中篇 十

前條云其後發熱者必大便鞭而少也此云但

鞭爾不更言其少乃於胃中有燥屎者言其五

六枚之多亦互舉以辨微細之意不可忽也俱

宜大承氣湯者已結者開其結未結者滌其熱

不令更結同一讖語潮熱故同一治法也

合九條觀之既云實則讖語矣乃其用治遲徊

審諦始以和法為攻法俟服藥後重辨脈證不

敢徑情急攻即攻之又一服利止後服何其鄭

重耶可見所謂實者乃邪氣實也邪氣實正氣

未有不虛況津液為邪所耗而至於譏語方寸
幾於無主其虛為何如哉邪實不可不下正虛
不可不下斟酌於邪正之間以權宜而善其治
良工苦心要當三復於聖言矣

蓋陽明病發熱汗多者惡津液盡急下之以存津液宜大承氣湯

胃中止一津液汗多則津液外滲加以發熱則
津液盡隨熱勢騰達於外惟有急下一法引熱
勢從大腸而出庶津液不致盡越於外爾前條

傷寒分經 卷二 中 陽明經中篇 主

云發汗不解蒸熱者屬胃也調胃承氣湯
主之可見調胃之義乃和緩其胃中之熱以存
津液也此證發熱而至於汗多明是始先未行
調胃所致故宜急下無取緩調

其發汗不解腹滿痛者是邪不在表急下之應滿痛

宜大承氣湯或腹滿不減或減去盡或不足

言減裏滿孔急如此當下之宜大承氣湯

芒傷寒六七日陽明邪熱益於目中不了了睛不和

難者無表裏急證過大便難身微熱者此亦為實熱

當下也急下之宜大承氣湯

此條辨證最微細大便難則非久祕裏證不急
也身微熱則非大熱表證不急也故曰無表裏
證只可因是而驗其熱邪在中爾熱邪在中亦
不為急但目中不了了睛不和則急矣蓋陽明
之脈絡於目因其熱邪熾盛 露於絡脈之
端亦惟有急下之而已

其陽明病欲解時從申至戌上

死脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱是

傷寒分經 卷二 中 陽明經中篇 主

津液其陽則絕若早下之則不至此

其陽則絕即無陽之互辭

世跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相
搏大便則難其脾為約麻仁丸主之

脾約之證在太陽陽明已當用麻仁丸潤下失
此不用延至正陽陽明胃中津液耗乾杯盤下
無及矣然則浮濇之脈轉為浮芤不可頻推乎

門人問脾約一證胃強脾弱脾下為胃行其津
液如渴夫甘受悍妻之約東寧不為家之素乎
答曰何以見之曰仲景云跌陽脈浮而濇浮則
胃氣強濇則小便數字既相搏大便則難其脾

為約麻仁丸主之。以是知胃強脾弱也。答曰：脾
 弱即當補矣。何為麻仁丸中反用大黃？曰：實厚
 朴、枳實、芍藥、日啗師說：而腹從前相仍之咽甚
 井所望也。仲景說胃強而腹從前相仍之咽甚
 胃強者，正是因脾之強而強。若約者，約也。脾
 氣過強，將三五日胃中燥，受令腸胃中之津液
 彈丸而出，全是以大便為難。設脾氣弱，即當便
 日所乾枯，所以大便為難。理乎相傳謂脾約不
 胃中之水，何以反能約束胃中之穀耶？在陽明
 胃中，凡宜攻下者，惟恐邪未入胃，大便弗變，又
 恐初後後薄，不可妄攻。若欲攻之，先與小承氣
 試其轉失氣，方可攻。皆是慮夫脾氣之弱，故爾
 躊躇也。若夫脾約之證，在太陽已即當下矣。更
 何待陽明耶？子華傳會前人以脾約為脾弱，將
 指吳起之殺妻者為儒，夫平有悖聖言矣。門
 人又問曰：今乃知脾約之解矣。觸類而推，太陽
 陽明之脾約，與少陽陽明之胃中燥，頗實大便
 傷寒分經 卷二中 陽明經中篇 三

難者，同是一證，此其所以俱可攻下耶？答曰：是
 未可言。陽為日既久，燥其津液，大便固難矣。其
 而在太陽方病之始，邪未入胃，何得津液？即便消
 耗，而大腸燥結耶？且太陽表邪未盡，又何不俟
 傳經，即亟亟潤下，而自犯太陽之禁耶？門人不
 能對，因誨之曰：脾約一證，乃是大便者及至感受
 其人素懶，脾約三五日一次大便者，及至感受
 風寒，即邪未入胃，而胃已先實，所以邪至陽明
 不患胃之不實，但患無津液以奉其邪，邪至陽
 槁，則仲景大變太陽禁下之例，而另立麻仁丸
 一法，以潤下之，不其一時暫結者，可用湯藥湯
 滌之，此義從前憤憤，凡遇素成脾約
 之人，亦必俟經盡方下，百無一生矣。

陽明中篇論列方 正用方四

訓胃承氣湯 借用陽明上篇方

蜜導

豬膽導

大承氣湯

小承氣湯 借用陽明上篇方

麻仁丸

傷寒分經

卷二中

陽明經中篇

丙

吳氏醫學述第五種

南陽張
西昌喻

機仲景著

武原吳儀洛遵程訂

昌黎書社

日新書局

海昌周廣業廩補

小兒參

傷寒分經

陽明經

一篇凡外邪已微少陽未離陽明謂之少陽陽明於此篇法八條

愈其有胃不實而下證不具者病仍在經。在經之邪不解必隨經而傳少陽。口苦咽乾目眩耳聾胸脇滿痛之證必兼見一二。故謂之少陽陽明其實乃是陽明少陽也。○少陽主半表半裏陽明證中纔見少陽卽表裏皆不分經。

分經

卷下

陽明經下篇

1

病

發潮熱而大便溏小便自可則胃全不實加以

不非其證已傳少陽汗下皆去所宜當從少陽治法者小柴胡湯

德和之也。

柴胡和解乃少陽經之正法故少陽陽明

取用之

明病

傷風感冒則已傳少陽矣不大便證

可與小柴胡湯之

魚得通津液得下皆爲身軀然而江

期驗不一
諸證俱解也

不但大便溏爲胃木實即使不大便而見脇下

鞭滿喘與舌胎之證則少陽爲多亦當用小柴

胡分解陰陽斯上通和潏然汗出而外證俱

解矣此利而表裏俱徹也○上焦得通津液

得十八字關係最切風寒之邪協津液而

上聚於膈中爲喘爲嘔爲水逆爲結胸常十指

六七是厥寒不解則津液必不得下倘快行發

散不收津液不下日轉增上逆之勢愈無退息

傷寒分經

卷下

陽明經下篇

之契矣此所以利之於中而上焦反通也至於

雜症耳中如痰火哮喘咳嗽癰癤等證又皆火

熱蒸然日久積痰膠結經隧所以火不內熄其

津液必不能下溜。氣枯而津華盡化爲敗濁耳。

夫人之利以長亨者惟將後天水穀之氣生此

津液涸則病涸液竭則死故治病而不知

救人濟世者立居二也

論大陽陽明少陽陽明厥在四山之說

有太陽陽明有少陽

陽明何謂也答曰太陽陽明者平素津液脾約者是也正陽陽明者病在胃家實是也少陽陽明者解法發汗利小便已方胃中燥煩實大便難是也

註謂脾約乃太陽之邪徑趨入胃而成胃實貽悞千古

附少陽轉陽明二證此與陽明兼帶少陽

四有病證少陽轉陽明者少陽治法發汗利小便

傷寒分經卷二下陽明經下篇三已於胃中燥煩實大便難是少陽治法發汗利小便

五服柴胡湯已後渴者少陽重復轉屬陽明也

此條亦互上條之意解見少陽

附太陰轉陽明一證

六傷寒脈浮而緩本為表證然無發

邪已去其為繫在太陰在太陰者蒸熱身當發

黃若小便不利者下利不能發黃胃氣乾燥

至七八日大便硬者陰轉為陽明可下之病

候也

附少陰轉陽明一證

七少陰病自利其六七日腹脹不大便者明係熱邪

急下之宜大承氣湯

少陰之證自利者最多虛寒則下利清穀滑脫

則下利不止故多用溫法此以六七日不大便

而腹脹可見熱邪轉歸陽明而為胃實之證所

以宜於急下也

附厥陰轉陽明一證

八厥陰下利則胃不實譏語者必其邪返有燥屎也

傷寒分經卷二下陽明經下篇四

此半利半結不可大攻下但宜小承氣湯微動其

附答客難大意客難曰所分陽明三篇將仲景

大開後人眼目可謂智矣祇是過於其智而掩

昔賢之長爾且王叔和當日編次陽明一經首

列問有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明有

何也仲景答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽

明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已

後中燥大便秘結是也聖言瀉燥下利其例何

以中燥大便秘結是也聖言瀉燥下利其例何

二陽之不可下乃陽明之條混引其端實有
所不取也又况少陽明所謂發汗利小便
已胃中燥大便難者乃是病邪已去陽明全入
少陽及發汗利小便後少陽證亦盡罷其邪不
入三陰重復轉到陽明所以一名為少陽陽明與
客始為之心折

附答門人奇問

精一之理貫徹始終者雖多必有

傷寒分經

卷二下

陽明經下篇

五

其後惟恐不傳經之說大奇且大創未之前聞
也答曰仲景言之再四但十單雙時未明見同
未見爾何奇制之有耶詳云陽明居中土也萬
物所歸無所復傳蓋陽明之脈行身之前邪入
其經則有前經後經相傳之次第而陽明之脈
乃中州之胃為水穀之海臟腑經脈之總司邪
入其中則無復傳次之可言所以仲景於陽明經
法奪其上不傳之邪自不啻兩此仲景於陽明經
特掣不傳之妙理也又云陽明中風脈弦浮大
而短氣促喘滿身重下利及心煩久按之氣不
乾不得汗喘而身重下利及心煩久按之氣不
熱時時汗出而身重下利及心煩久按之氣不
日脈浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與
麻黃湯若不出腹滿加噦者不治此一投至理
千古無人有出短腹滿者何事詎知脈
弦浮大乃氣反短連腹滿者邪不傳也鼻鼾
不得汗喘臥表裏俱困乃至一身及面月悉然

傷寒分經

卷二下

陽明經下篇

六

為黃者邪不傳也小便難有潮熱時時噦者胃
熱熾盛上下道窮邪不傳也耳前後腫刺之小
差者內邪不解過經十日其血亦不聚但物
所歸無所復傳者原為美實執知邪歸之而
不傳反成少陽所以脈續浮者與小柴胡湯
其邪使速往少陽去路也脈浮者與小柴胡湯
麻黃湯則胃邪內壅使速還太陽來路也若不尿
渴則胃邪逆矣再有何法可以驅其邪而使之
解已也設胸滿痛者與小柴胡湯而使之解
與麻黃湯方見脈浮細而嗜臥邪已盡湯脈但浮者
湯散者方見脈浮細而嗜臥邪已盡湯脈但浮者
與麻黃湯之速往少陽而設脈但浮者與小柴胡
之不解也伏危機也必識此意然後識仲景用
藥之妙不然豈有十條日後而無故張皇反用
麻黃湯之理哉凡此皆因太少二陽與陽明速
貫故用表法所謂從外入者驅而出之於外也
復有表裏陰陽之間正已虛而邪不盡無可速
傳之候仲景用陰陽法悉從外入者驅而出之
太陽病未解脈陰陽俱停必振慄汗出而解如
設不振慄則邪不能傳之於表而振慄汗出而
知也然既云陰陽兩停其傳表裏未可預定
所以惟陰陽微者方是邪不能傳裏當從汗之
而解惟陰陽微者方是邪不能傳裏當從汗之
而解此其故甚可思也若非邪不能傳裏當從
陽微者當補其陽微者當補其陰微者當補其
有反汗之病過其陽微者當補其陽微者當補
如太陽病過其陽微者當補其陽微者當補
柴胡湯發熱汗出而解矣乃反加啞不心下
而振即微熱汗出而解矣乃反加啞不心下
柴胡湯可以盡提之傳出於表必再與大柴胡

陽明下篇論列方

小柴胡湯 借用少陽全篇方

大承氣湯 陽明方

小承氣湯 陽明方

傷寒分經

卷二下

陽明經下篇方目

九

莫氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西昌喻 昌嘉言註

傷寒分經

武原吳儀洛遵程訂
賈湖周學江襟三
海昌周廣業廣補參

傷寒分經

卷三上

少陽經全篇

一

少陽經全篇 仲景少陽經原

少陽經用 小柴胡湯和解加減一法

人身軀殼之表為陽軀殼之內為陰傷寒至五六

日之時無不傳少陽中風與否其辨則熱於陰則

往來寒熱而無常時少陽之氣其胸脇則必苦實

滿病勢震動於結聚少陽之氣其胸脇則必苦實

不煩則喜嘔逆此其常也但人之氣體或則心煩

中煩而不嘔或於前證又或腹中痛或脇下痞

觀或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者

證便是不必證

悉具惟然後可用此湯之法又

若胸中煩而不嘔去半夏人參加枳實

若渴者去半夏加人參栝蒌根若腹中痛去黃芩

加芍藥若脇下痞鞭去大棗加牡蠣若心下悸小

便利者去黃芩加茯苓若不渴外有微熱者去

人參加桂枝溫覆取微似汗愈若欬者去人參大

藥生薑加五味子乾薑
此七法者乃用少柴胡湯之準繩也

傷寒分經

卷三上 少陽經全篇

二

少陽病有辨證一法

心陽爲病口苦咽乾目眩也

目眩者熱聚於膽也目眩者木盛生風而

旋運也

少陽病有汗吐下三禁三法

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽

其故不獨此也。必時習之。則神明終

少陽血
胃津同
胃和具
愈胃才
利具不
安定

燈而小

四少陽中風。風熱上壅，使兩耳無所聞。目赤。風熱與痰，飲搏結，今胸

中滿而煩者。但於和解中。行不可吐下。吐下則氣

大傷和氣得以
亂神明必
惴而驚

少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下二義互舉

其首益嚴益傷寒之頭痛發熱宜於發汗者固

不可汗則中風之不可汗更不待言矣中風之

胸滿而煩，痰飲上逆，似可吐下者，尙不可吐下。

則傷寒之不可吐下更不待言矣

辨少陽經病有欲解不解四法

大易卷三上

觀傷寒三日約三陽爲已盡三陰常受邪其入

反前全不嘔此爲三陰不受邪而自愈也

角金不吐與胃和具愈之義耳

修養三少陽朋小者氣既微
谷曰兆也

少陽在角甲從寅至辰上
受時之經王氣虛建再曆乃令時令之王比翼

愛瘠之終且無虛妄在義方則全之至此

三過五所日外可
易寒。三身無大熱。而其人反自燥不者。比爲

傷其六也。已集大業。其人。火。此。寧。示。此。久。

陽病去深之陰古七轉致危困者多

子 53—72

矣向使邪在陽經早
從外奪何至此哉

少陽證具將欲入裏而大陽陽明小有未罷

但用小柴胡湯一法

九傷寒

至四五日身熱惡風頭項強為太陽陽明

以少陽病位脇下滿宜行表法乃其手足溫而渴者

是病邪輻輳於少陽向裏之機已著若小柴胡湯

主之傷寒一舉而兩得者也

此用小柴胡湯當從加減法不嘔而渴者去半

夏加栝蒌根為是

傷寒分經

卷三上少陽經全篇 四

少陽證脈弦澀加腹痛先用建中後用小柴

胡一法

十傷寒陽脈澀陰脈弦是裏在裏法當腹中急痛治

者先用小建中湯之緩藥乃和其急不差者則少

陽木脈澀乃由不徹腹痛乃與小柴胡湯主之

少陽證具已經汗下而太陽未罷胸有微結

者宜用柴胡桂枝乾薑湯一法

十一傷寒

五六日雖傳少陽或已發汗而此復下之

不胸脇滿且熱搏微結小便不利渴而不嘔結熱

但頭汗出無汗往來寒熱心煩者此為少陽證其
未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

少陽證服小柴胡湯加渴者宜救津液一法

三陽傳

少陽服柴胡湯已而復渴者屬陽明也當以治

之法證治之

風寒之邪從陽明而傳少陽起先不渴裏證未

具及服小柴胡湯已重加口渴則邪還陽明而

當調胃以存津液矣然不曰攻下而曰以法治

之意味無窮蓋少陽之寒熱往來間有渴證倘

傷寒分經

卷三上少陽經全篇 五

少陽未罷而恣言攻下不自犯少陽之禁乎故

見少陽重轉陽明之證但曰以法治之其法維

何即發汗利小便已胃中燥煩實大便難之說

也若未利其小便則有豬苓導熱之法若津乾

熱熾又有人參白虎之法仲景圓機活潑未易

言矣

少陽證具誤下而證尚未變者仍用小柴胡

湯二法

三凡服柴胡湯和解病證而誤下之若柴胡證不罷

幸無者可復與柴胡湯但因誤下後必蒸蒸而振
他變者正氣虛此時卻發熱汗出而解也

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以此藥

下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已誤下之

不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若誤下而

下滿而輕痛者此為結胸在太陽也太陽胸湯

主之但滿而不痛者此又為痞瘕雖已柴胡湯

不中與之宜治之與半夏瀉心湯

二條互發前略後詳誤下雖證未變然正氣先

傷寒分經 卷三上 少陽經全篇 六

虛故服柴胡湯必蒸蒸而振始得發熱汗出而

邪從表解此雖誤下而不成壞病也若誤下而

成結胸與痞則邪尚在太陽而柴胡湯非所宜

矣結胸及痞太陽篇各有專條

少陽病有疑似少陰者當細辨脈證用藥一

法

傷寒五六日按期當在頭汗出微惡寒手足冷

心下滿口不欲食大便鞭脈沉細者此為陽微

結散而未有表復有裏陽證為少也雖脈沉亦病

在裏也有汗出為陽微結而假令純陰結而

少陰不得復有外證而悉入在裏以此為半在

裏半在外也脈雖沉緊不得為少陰病所以然者

為陰結不得有汗今頭汗出故知非少陰而陽也

可與小柴胡湯設不了了者餘邪未盡得屎則清

而解矣

陽微結者陽邪微結未盡散也註作陽氣衰微

故邪氣結聚大差果爾則頭汗出為亡陽之證

非半表半裏之證矣果爾則陰結又是陰氣衰

傷寒分經 卷三上 少陽經全篇 七

微矣玩本文假令純陰結等語謂陽邪若不微

結純是陰邪內結則不得復有外證其義甚明

得屎而解即取大柴胡為和法之意也

用汗吐下後有辨脈證而識其必愈一法

去凡病若發汗若吐若下若亡其津液以致不解陰

陽自和者乃津液復必自愈不可妄

辨婦人傷寒傳少陽有熱入血室之證四法

七婦人中風發熱惡寒經水適來至得病之七八日

熱除而脈遲身涼此乎病胸脇下滿如結胸狀識

大

語者此為熱入血室也肝在血則隨其實處而瀉之當刺之期門

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室其血必結故使熱如瘧狀發作有時亦用和解法以小柴胡湯主之解而血

元

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室其血必結故使熱如瘧狀發作有時亦用和解法以小柴胡湯主之解而血

必自愈

傷寒分經 卷三上 少陽經全篇 八

中

婦人經血弱氣盡腠理開邪之氣因乘之入與正氣相搏結於脇下位少陽部正邪分爭往來寒熱則勝休則作有時默默不欲飲食在肝痛下故使嘔飲食不飲也小柴胡湯主之

四條皆互文見意也一云經水適來一云經水適斷一云七八日熱除而脈遲身涼一云七八日續得寒熱發作有時一云胸脇下滿一云邪

氣因入與正氣相搏結於脇下一云如結胸狀

一云邪高痛下一云譫語一云晝日明了暮則

譫語如見鬼狀一云如瘧狀一云往來寒熱休

作有時一云刺期門一云用小柴胡湯一云母

犯胃氣及上二焦皆互文以明大義而自為註

腳也學者試因此而紬繹全書思過半矣○如

結胸狀四字仲景向恐形容不盡重以臟腑相

連邪高痛下之語暢發病情蓋血室者衝脈也

下居腹內厥陰肝之所主也而少陽之膽與肝

傷寒分經 卷三上 少陽經全篇 九

相連腑邪在上臟邪在下胃口逼處二邪之

所以默默不欲飲食而但喜嘔爾期門者肝

募也隨其實而瀉之瀉肝之實也又刺期門

註腳也小柴胡湯治少陽之正法也母犯胃

及上二焦則令刺期門服小柴胡湯更無他

矣必自愈見腑邪可用小柴胡湯而臟邪必

經水再行其邪熱乃隨血去又非藥之所能

爾問血弱氣盡一節有藏府相連其痛必下

高不指表上故使嘔也高指表邪下指脇下

成此證。蓋少陽熱邪深入血室。遍其經血妄行。不
連與太陽陽明兩陽各為一區。不與少陰太陰
相連者。少陽所以太陰陽明之府。不與少陰太陰
於藏而少陽之府。與藏相連。漫無界限。其熱
邪之在少陽者。血妄行。必痛連腹中。見經血熱
止。而腹中痛。猶不止。其痛在腹中。又指腹中。邪在
兩陽。已搏飲。上逆。痛在腹中。又指腹中。邪在
其證。嘔逆特甚。但不可因其痛在腹中。遂指為
厥陰。見誤。特甚。但不可因其痛在腹中。遂指為
不誤。此是吃緊。小柴胡湯。治其府。不治其枝。大黃等
邪人。裁。而。成。兩感。水漿不入。見藏府。不治其枝。大黃等
矣。仲景。不能盡。所欲言。但以。小柴胡湯。主之。一
語。砥柱。狂瀾。幾千年來。但以。小柴胡湯。主之。一
竟。其。奧。旨。者。果。誰。人。哉。少陽篇止此

傷寒分經

卷三上 少陽經全篇

十

附合病併病壞病痰病○過經不解附三陰經

後。上。證。叔。和。俱。編。入。太。陽。經。中。不。知。何。意。或
謂。傷。寒。只。分。六。經。合。太。陽。一。經。別。無。可。入。諸
項。也。然。則。霍。亂。證。及。陰。陽。易。等。證。易。為。不。盡。入
太。陽。邪。茲。一。一。清。出。俾。業。傷。寒。者。一。展。卷。而。了
然。於。心。

合病法。八條。合病者。兩陽經三陽經之證

太陽病。只。須。凡。九。便。兼。陽。明。即。為。合。病。當。從
合。病。治。法。如。葛。根。湯。等。見。證。多。又。何。疑。焉。

二 太陽病項背強。凡九。不舒。此當。反汗出惡風者。

三 太陽病項背強。凡九。無汗。今。反汗出惡風者。

也。葛根湯主之。
二條以有汗無汗定傷風傷寒之別。頸項陽明
既於太陽風傷衛證中。纔見陽明一證。即於桂
枝湯中加葛根。則於太陽寒傷營證中。纔見陽
明一證。即於麻黃湯中加葛根。似天然不易之
法也。然第一條不用麻黃。全方加葛根。反用桂
枝。全方加麻黃。葛根者。則并其巧而傳之矣。見
寒邪既入陽明。則胸間之喘必自止。自可不用
杏仁。況頸項。俱是陽位。易於得汗之處。設以
傷寒分經 卷三上 合病 上

麻黃本湯加葛根。大發其汗。將母項背強。凡九
者。變為經脈振搖動惕乎。此仲景所以為精義
入神也。○桂枝湯。麻黃湯。分主太陽之表。葛根
湯。總主陽明之表。小柴胡湯。總主少陽之表。三
陽經合併受病。即隨表邪見證。多寡定方。絲絲
入扣。

三 太陽中與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根

加半夏湯主之。

四 太陽與陽明合病者。必自下利。寒性下。葛根湯

主之

五

太陽傷與陽明合病本宜合用兩經之藥然或喘而胸滿者則不可用陽下之藥但麻黃湯主之

兩經合勢攻肺則喘於上也邪解於外矣

兩經合病當合用兩經之藥何得偏用麻黃湯耶此見仲景析義之精蓋太陽邪在胸陽明邪在胃兩邪相合必上攻其肺所以喘而胸滿麻黃杏仁治肺氣喘逆之額藥用之恰當正所謂內舉不避親也何偏之有

傷寒分經

卷三上 合病

主

六

太陽與少陽合病自下利者半表半裏之證與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯

太陽陽明合病下利表證為多陽明少陽合病下利裏證為多太陽少陽合病下利半表半裏之證為多故用黃芩甘草芍藥大棗為和法也

七

陽明少陽合病必下利其脈大而不相負者順也負者失也互相尅賊名為負也若少陽陽脈

下之宜大承氣湯

為負脈滑而且數不逆者知有宿食在胃也當急

土木之邪交動則水穀不停而急奔故下利可

必也陽明脈大少陽脈弦兩無相負乃為順候

然兩經合病陽明氣衰則弦脈獨見少陽勝而

陽明負矣下之固是通因通用之法而上受尅

賊之邪勢必藉大力之藥急從下奪乃為解圍

之善若然亦必其脈滑而且數有宿食者始為

當下無疑也設脈不滑數而遲澀方慮土敗垂

亡尚敢下之乎○按太陽與陽明合病陽明與

少陽合病俱半兼陽明所以胃中之水穀不安

傷寒分經

卷三上 合病

主

而必自下利其有不下利者亦必水飲上越而

嘔與少陽一經之證乾嘔者大不同也或利或

嘔胃中之真氣與津液俱傷所以急須散邪以

安其胃更慮少陽勝而陽明負即當急下以救

陽明其取用大承氣湯正迅掃外邪而承領元

氣之義也設稍牽泥則脈之滑數必轉為遲澀

下之無及矣微哉危哉

三陽合病其脈浮大上關上熱勢瀰漫之但欲眠

睡目合則汗中州擾亂之腹滿身重難以轉側口

不仁而面垢。識語遺尿。此病勢狼狽如發其汗則偏陽津液。識語益甚。將成下之則偏於陰。孤額主坐。汗而手足逆冷。陽之患若得自汗者。表證已盡。只宜內解其熱。白虎湯主之。

按三陽經之受外邪。太陽頭疼腰痛。陽明目痛鼻乾不眠。少陽往來寒熱口苦嘔渴。各有專司。合病者。即兼司二陽三陽之證也。仲景但以合之一字括其義。而歸重在下利與嘔喘胸滿之內證。蓋以邪既相合。其腹內必有相合之驗。

傷寒分經

卷三上

合病

西

故也。○再按太陽中篇第四十一條云。傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者。柴胡桂枝湯主之。數語其證全是太陽與少陽合併之病。但內無下利其嘔復微。即不謂之合病。心下支結又與時如結胸。心下痞鞭者不同。即不謂之併病。乃知合併之病。重在內有合併之微驗矣。○後人謂三陽合病宜從中治。此等議論似得仲景表邪未散。用小柴胡湯裏熱已極。用白虎湯之旨。然未可向痴人說。

夢也。設泥此則仲景所用麻黃湯大承氣湯之妙法。萬不可從矣。噫。吾安得盡闢提徑為周行也哉。

併病。法五條。○併病者。兩經之證連串為一。病也。趙嗣真曰。合病者。二經或三陽經同受病。不傳者也。併病者。一經先受病。又過一經。不踰日而本證悉罷。盡見所傳是經之證。若併病則一經先現。復顯一經。迨至後來盡歸併於一經。其治法則與傳經不甚相遠也。

傷寒分經

卷三上

併病

五

先出而不盡。微。因轉屬陽明。續自微汗出不惡寒。此陽明熱微。若太陽病證不能者。不可下之。則成結為逆。如此者可先小發其汗。然後設面色緣緣正赤者。乃陽氣怫鬱在表。因感寒邪深當以麻黃湯發之。而不可發汗其人於內躁煩不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得者。當解之。蒸之。而非小發汗。若發其汗而不徹者。陽邪已不足言。陽氣怫鬱不得越。其汗中人胸短氣。因汗氣鬱而非未。但坐以汗出不徹故也。宜更用發汗。

之湯藥以微其未微之邪則愈然何以知其汗出不微以其脈

更字讀平聲與太陽中篇傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗互發然則彼更桂枝湯此更桂枝加葛根湯并可推矣

二有始二陽併病其太陽證以漸罷併陽明一俱歸但見

發潮熱手足絳絳汗出大便難而識語證者此胃

太也下之則愈宜太承氣湯

治太陽與陽明併病固太陽與少陽併病治法通

傷寒分經卷三上併病

其證上項強而痛或眩冒

時如結胸而心下痞鞭處可謂重矣然不治之名

但當刺大椎第一間肺俞之穴使膀胱氣行則汗

俞之穴以瀉肺府之熱慎不可併病治法誤發其

汗也發其汗則液耗亡陽明津液語之變脈則獨弦

象其五六日識語不止蓋陽明負而少陽勝木邪

當刺期門木氣之實而瀉

少陽之脈絡脇間併入太陽之邪則與結胸

證似是而實非也肝與膽合刺肝俞所以瀉膽

也膀胱必得氣化而能出肺主氣刺肺俞以通其氣斯膀胱之氣化行而邪自不能留矣發汗則譫語與木盛尅土之意同註謂木盛則生心火節外生枝反失正意脈弦亦即合病內少陽勝而跌陽實之互詞所以刺期門隨木邪之實而瀉之也

四不但發汗不可也凡太陽少陽併病心下鞭頭項強而眩者

治法當刺大椎肺俞肝俞二慎勿下之

若太陽少陽併病用刺法而反下之陷人土則成

傷寒分經卷三上併病

結胸而心下鞭則下利不止於是陽明告困水漿

不人其人乃心煩而

以上三條之義互發第三條言不可發汗第四

條言不可下此條又互四條之意而言誤下之

害併病即不誤用汗下已如結胸心下痞鞭矣

況加誤下乎此比太陽經誤下之結胸殆有甚

焉其人心煩似不了之語然太陽經謂結胸證

具煩躁者亦死意者此謂其人心煩者乃死乎

壞病法二條。凡病已汗已吐已下已溫絳

之爲壞病。其病有在三陽有在三陰。真過經不解相同。其證有結胸下利眩冒振惕驚悸譫妄嘔噦躁煩之不同。其脈有弦促細數緊滑沉微澀弱結代之不同。故必辨其脈證。知犯何逆。然後以活法而治其逆也。

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者
此爲壞病桂枝不中與也當觀其脈證而於太陽
汗吐下溫針諸知犯何逆以前治隨證治之
變逆中求之

相傳傷寒日久三十日不痊者謂之壞病此

過經壞病也此條止說病三日乃未過經之壞

病也目止說太陽病連少陽亦未說到故謂桂

卷三上 壞病

大

枝偏表之法不可用觀下條太陽轉入少陽之

有柴胡證罷四字。可見此爲桂枝證罷。故

不用也。然桂枝證仍在。卽不得謂之壞病與

少陽篇內柴胡證仍在者此雖已下之不爲逆

復血葉胡湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解之

文又互相綰照也豈有桂枝柴胡之證尙未畢

而得指爲壞病之理哉

本太陽病不解轉入少陽者本確經有脇下硬滿乾嘔

不能食往來寒熱諸證尚未吐下有諸悞而脈沉

之象者此非和解與小柴胡湯若已用吐下發汗
不衰者不愈當識語少陽柴胡之證悉罷此為壞病當
溫針之後而證見於少陽本經候用吐知犯何逆
其脈證而於少陽諸變逆中求之
下發汗溫鍼諸變逆中求之
逆治之

上條太陽經之壞病此條少陽經之壞病兩條

文意互發其旨甚明叔和分彙致滋疑惑茲合

而觀之乃知云桂枝湯不中與則其所犯要不

離太陽經之悞用汗吐下燒針之諸逆也云柴

胡證罷則其所犯要不離少陽經之悞用汗吐

卷三上

九

上燒劍之諸逆也而陽明乃三陰無不有悞治

之陳類俱可由此而類推矣

癰疽疔瘡
癰疽疔瘡
癰疽疔瘡

此等名目一出凡醫家皆簡拙已自
不識要訣况復加冬溫溫病寒疫熱病溫

上安頭愈求愈失。痰欲直趨淵源。不得不盡。

陽氣盛於春，則冬令之傷寒，皆傷寒之所有也。

世在冬之居外而不加密至臨諒樓其角

者論中分同異凡夾外感而動者有不

陽篇中已致詳矣此但舉不山外感之

痰病附屬

病如太陽中風有汗桂枝證而頭不痛項不强則

外人之脈微浮而不胸中痞鞭氣上冲咽喉不

得息者此為胸有痰寒枝證也當吐之宜瓜

蒂散其痰諸亡血虛家不可與

病人胸中有痰復發汗其陽氣則胃中益冷必

吐蚘

此即上條之互文上條辨非桂枝證此條辨不

可發汗蓋痰從內動無外感與俱誤發其汗必

傷寒分經

卷三上痰病

子

至迷寒經絡雷連不返故示戒也設兼外感如

三陽證中諸條則無形之感挾有形之痰結於

一處非汗則外邪必不解即強吐之其痰飲亦

必不出所以小青龍一法卓擅奇功爾此言有

痰無感候發其汗重亡津液即大損陽氣其胃

冷而吐蚘有必至也

三病人手足厥冷如厥陰熱深脈則雖非常乍緊者

病邪結在胸中也加以心中滿而煩中饑口不能

食者依腦之痰病在胸中也無疑當須吐之宜瓜蒂散

合三條總見痰證可吐不可汗合食積虛煩脚

氣四證論之勿指為類傷寒但指為不可發汗

則其理甚精蓋食積胸中陽氣不布更發汗則

陽氣外越一團陰氣用事愈成危候虛煩則胸

中津液已竭更發汗則津液盡亡脚氣即地氣

之淫邪從足先受者正淫家不可發汗之義爾

奈何舍正路而趨曲徑耶

傷寒分經

卷三上痰病

三

少陽篇論列方正用方二
借用方三

小柴胡湯

小建中湯借用太陽
中篇方

柴胡桂枝乾薑湯

大陷胸湯借用太陽
上篇方

半夏瀉心湯借用太陽
中篇方

附合病論列方正用方五
借用方三

桂枝加葛根湯

葛根湯

傷寒分經
卷三上少陽經全篇方目

葛根加半夏湯

麻黃湯借用太陽
中篇方

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

大承氣湯借用陽明
中篇方

白虎湯借用太陽
下篇方

附併病方

大承氣湯借用陽明
中篇方

附瘵病方

瓜蒂散

傷寒分經
卷三上少陽經全篇方目

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西昌喻 昌嘉言註

武原吳儀洛遵程訂

秦溪許 栽培之參

新安胡承曾天宗較

傷寒分經

太陰經全篇 仲景傷寒論六經中唯太陰經

之至矣然而汗下溫三法無不備具於一篇

之中但太陰始三陽二陰之間為陰中之陰

唯脾胃素虛或內傷飲食者外邪始得犯之

故其表法但取解肌不取發汗其傳經之邪

或緣先傷飲食或緣攻下所致無大熱證非

少陰厥陰之比其桂枝大黃湯一證乃緣誤

傷寒分經 卷三下 太陰經全篇

太陰有邪內陷而腹滿用之以分陰內陷之邪非

則陰為最多非一方可盡故曰宜服四逆輩

太陰之為病腹滿而利腹滿而利者此其利也

下利者此其利也下利而脈沉者此其利也

下利而脈沉者此其利也下利而脈沉者此其利也

更加逆矣

二太陰中風者四肢多煩疼以脾主四肢風淫陽部

微陰部濕則風邪已去而長短者元氣未滿之

病其為欲愈也

脈見不足正恐元氣已漓暗伏危機故必微瀉

中兼見長脈始為其病欲自愈也註家不察來

意謂瀉為血凝氣滯豈有血凝氣滯反為欲愈

之理耶

三太陰病脈尺寸俱沉浮者是邪還可以解肌發其汗

宜用桂枝湯使邪仍從衛分而出

傷寒分經 卷三下 太陰經全篇

四自利不渴者屬太陰以屬陰土其藏自

故自利而也當溫之宜服四逆輩

自利不渴者屬太陰太陰主水穀故病自利內

有真寒故不渴用四逆輩者蓋以水土同出一

源冬月水煖則土亦煖夏月水寒則土亦寒所

以土寒即陰內陽外也故用四逆輩以溫土○

註謂自利不渴溼勝也故用四逆輩以燥土燥

溼此老生腐譚非切要也仲景大意以自利不

渴者屬太陰以自利而渴者屬少陰分經辨證

所關甚鉅蓋大陰屬溼土熱邪入而蒸動其溼則顯有餘故不渴而多發黃少陰屬腎水熱邪入而消耗其水則顯不足故口渴而多煩躁若不全篇體會徒傳註釋之名其精微之蘊不能闡發者多矣

太陰中風脈浮發熱而傷寒脈浮而緩而手足自溫者合其病繫在大陰也太陰病脈浮緩

當發身黃若小便自利者之而泄不能發黃者此至七八日雖暴煩下利日十餘行有少陰下利不止

傷寒分經卷三下太陰經全篇三

而此必自止以其手足溫則穀氣充於四肢脾家之

實能運穢腐即當去盡故知其自止而也

不能發黃以上與陽明下篇第六條語句皆同

但彼以胃實而便鞭其證復轉陽明此以脾實

而下穢腐其證正屬大陰爾至七八日暴煩下

利日十餘行其證又與少陰無別而利盡穢腐

常自止則不似少陰之煩躁有加下利漫無止

期也況少陰之煩而下利手足反溫脈緊反去者仍為欲愈之候若不辨晰而誤以四逆之法

治之幾何不反增危困耶雖陽明與大陰臟腑相連其便鞭與下利自有陽分陰分之分別註家歸重於脾謂脾為胃行其津液則如此不為胃行其津液則如彼似是而非全失仲景三陰互發之旨

本太陽病醫者不為解反下之因而腹滿時痛不

桂枝加大黃湯主之

傷寒分經卷三下太陰經全篇四

桂枝加大黃湯主之

太陰病為瀉治之者常宜照服弱而其人續自便利

明矣故當行大黃芍藥之品者宜減之以其人

胃氣素弱易傷動故之也

此段叮嚀與陽明篇中互發陽明曰不轉失氣

曰先鞭後瀉曰未定成鞭皆是恐傷太陰脾氣

此太陰證而脈弱便利減用大黃芍藥又是恐

傷陽明胃氣也

太陰病欲解時從亥至丑上

太陰篇論列方正用方三

桂枝湯借用太陽上篇方

四逆湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

傷寒分經

卷三下

大陰經全篇方目

五

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西呂喻 昌嘉言註

武原吳儀洛遵程訂

賁湖周學江襟三

海昌周廣業廣補參

傷寒分經

少陰經前篇

凡本經宜溫之證悉列此篇法

傷寒分經

卷四上

少陰經前篇

一

中之陰甚者邪未除而陰已竭溫藥類非所
宜獨是傳入少陰仲景舉急下之證僅居十
之三急溫之證反居十之七而不解必于營犯
有次第不同毫釐千里粗工不解必于營犯
房勞者始敢用溫及遇一切當溫之證反不
能用詎知未病先發其腎水者不可因是遂
認爲當溫也必其人腎中之真陽素虧復因
汗吐下利之外出而後不能內返勢必藉溫藥
以回其陽方可得生所以傷寒門中亡陽之
證最多即在此太陽已有一種種危候至傳少陰
其辨證之法清熱仲景多疑徊顧慮不得但從
正治溫經之法疏爲前篇
從權溫經之法疏爲後篇
正治存陰之法疏爲前篇

少陰病始得之

反發熱而脈自沉

者

麻黃附子細辛湯

主之

脈沉爲在裏證見少陰不當復有外熱若發熱者乃是少陰之表邪即當行表散之法者也但

三陰之表法與三陽迥異三陰必以溫經之藥為表而少陰尤為緊關故麻黃與附子合用俾外邪出而真陽不出纔是少陰表法之正也

二少陰病得之一二日口中和而裏熱之證其背又惡寒者則陽微陰盛之常火灸之以助陽清附子湯主之而散寒也

得之一二日即上條始得之之互文

三少陰病得之二三日力以之麻黃附子甘草湯微發其汗以二三日無煩躁者裏證在表

傷寒分經卷四上少陰經前篇一

故溫散之微發其汗也

四少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救此傳邪之病形悉具其未可便用寒若小便色白者雖之法矣然腎虛者小便必赤

少陰病形悉具其未可便用寒若小便色白者雖少陰經病形悉具其未可便用寒若小便色白者雖

虛有寒不能制水使故令色白也而寒下之證法

五病人脈陰陽俱緊此傷於寒宜反汗出者亡陽以護其外所以邪也此屬少陰真陽虛也虛則邪在不出而汗先出也此屬少陰真陽虛也虛則邪在法當咽痛而復吐利之證也

六人身陽氣少陰病脈微者不可發汗以其亡陽故

復傷其陽不可下之惟溫法可

七少陰病則下利若利自止惡寒而踰臥之證

而手足溫者陰寒亦易散可用溫治之而愈

八少陰病陽虛惡寒而踰臥不寤時自煩欲去衣

被者陽猶在舍未可以溫治之而愈

九少陰病手足反溫脈緊至七八日自下利脈暴微本陽

盛然手足反溫已則陽氣脈緊反去則寒邪已者為

傷寒分經卷四上少陰經前篇三

欲解也雖心煩不安其下利必自愈

三條互見此則邪解陽回勿藥自愈之證即緊

去入安之互辭也

十少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者皆寒邪入

以散其寒附子湯主之

十一少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者此腎中陰氣

候法當下其逆氣兼厚吳茱萸湯主之溫經而後

少陰病下利絕其陽治宜通陽消陰早用白

通湯主之

少陰病下利脈微者與白通湯

止反厥逆無脈乾嘔煩者此非藥不勝病也利不

導以白通加豬膽汁湯主之若服湯後脈暴出者

乃無根之陽遇藥而與故其來死脈微續者陽為真

藥而回生必當早用白通國功於未著也

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利此

寒內持淫勝而水四肢沉重疼痛此至微也自

下利者此為有水氣也水氣沉流其人或然或亦

小便利或下利或上逆嘔者非鎮攝北方之水真

傷寒分經 卷四上 少陰經前篇 四

武湯主之

太陽篇中厥逆筋惕肉瞤而亡陽者用真武之

法已表明之矣茲少陰之水溼上逆仍用真武

一法以鎮攝之可見太陽膀胱與少陰腎一臟

一腑同居北方寒水之位腑邪為陽邪藉用附子

桂為青龍以滌痰導水臟邪為陰邪藉用附子

為真武以消陰攝陽其神功妙濟真有不可思議者矣

少陰病觀下利清寒而出穀裏寒極免外反熱

手足厥逆脈微欲絕陰寒極身反不惡寒其人

面赤危急或腹痛或乾嘔或咽痛或

利止而脈不出者明係陰格陽出在軀殼通

脈四逆湯主之所以入陰迎陽其脈即出者真

陽不隨熱勢愈主死

前條云脈暴出者死此條云脈即出者愈其辨

最細蓋暴出則脈已離根即出則陽已返舍由

其外發熱不惡寒而赤色真陽尚在軀殼故也

少陰病兩相搏擊脈沉而不鼓者是陽氣衰微可

傷寒分經 卷四上 少陰經前篇 五

急溫之宜四逆湯以助

少陰病有挾飲者亦當從溫以化飲食入口即吐

之時非飲食不可純作飲治也如飲食入口即吐

之時亦食心下溫欲吐復不能吐格拒物始得

之其手足雖寒而脈不弦遲而細者此為胸

中痰飲實而陽氣不得宣越不在溫不可下也當

用吐法以之得通氣若痰邪欲吐之故非係膈上有

寒飲而乾嘔者飲於胸中吐之轉增其逆不可吐也急溫之宜四逆湯以助

陽虛汗出陽虛必數更衣陰弱者反少者固當以救陽然但溫其下必當溫其上但於百灸之陽遇迫下利使陰立亡故當溫其上會穴中灸之陽安靜而下利自止也

前條用吳茱萸湯兼溫其中此條用灸法獨溫其上其義天開令人舞蹈

先少陰病吐而下利必手足不厥逆而反發熱者至是陽氣未下利厥逆今手足不厥逆而反發熱灸少陰七壯利則服至而止矣

第二條背惡寒之證灸後用附子湯者陰寒內傷寒分經卷四上少陰經前篇六

凝非一灸所能勝此條手足反溫止是陰內陽外故但灸本經以招之內入不必更用溫藥也

廿少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者陽氣不能復回不治

廿少陰病吐下利而煩躁不寧陰陽擾亂已四肢逆冷者是脾土先敗上下交亡使早用溫中之少陰病下利自止而反頭眩時時自冒者陰亡附而擾動欲脫故頭眩主死

下利既止似可得生乃頭眩時時自冒者復為

死候可見陽回利止則生陰盡利止即死矣

廿少陰病四肢逆冷惡寒而身踈脈不至其陽已不煩然或陰氣未亡而加復躁者則陰亦垂絕

廿少陰病六七日息高者此真氣上逆於胸中不能復歸於氣海本實先撥也

廿少陰病脈微沉細但欲臥此本證也若又汗出不煩則陽陰而當煩其自欲吐明係陰邪上逆當急至五六

日自利加復煩躁不得臥寐者此少陰經中之真傷寒分經卷四上少陰經前篇七

或問細玩傷寒論中並無直中陰經之條豈直中陰經之證非傷寒所有事歟仲景醫中之聖

其書不當有如許大疎漏也答曰仲景著傷寒論十卷治傳經陽病者卒病論六卷治暴卒陰

病合十六卷生民不幸其卒病論當時即懼兵

火之厄早已失傳醫門法律中寒門粗陳病案及急治大法觀之亦可以識卒病論之旨矣

麻黃附子細辛湯

附子湯

麻黃附子甘草湯

吳茱萸湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

通脈四逆湯

傷寒分經

卷四上

少陰經前篇方目

八

吳氏醫學述第五種

南陽張

機仲景著

西昌翁

皇朝詩註

武原吳儀洛遵程訂
賁湖周學江襟三
海昌周廣業庶補參

傷寒分經

少陰經後篇

列凡此少陰傳一經熱邪正治之。陰法悉

傷寒分經

卷四中

七
如
後
一
七
不
中

火效所以其雖陰反煩躁多汗而似陽仲
 景每用乾薑附子白通之法以收攝其陽初
 不慮入外感蓋陽出則腠理大開外感先出
 所以一固陽而了無餘義也若用寒涼以助
 水則真陽不返而命根斯斷矣其有腎水衰
 薄邪入不能橫溢轉而內挾真陽蘊崇為患
 外顯心煩舌燥咽痛不眠等證即不敢擅用
 汗下諸法以重傷其陰但用黃連阿膠湯苦
 酒湯豬苓湯豬膚湯四逆散之類以分解其
 熱而潤澤其枯於中雖有急下三證並無當
 下之一病所以其方俱用重劑潤下一日三服
 始勝其任設熱邪不能盡解傳入厥陰則熱
 深者其厥亦深而咽痛者轉為喉痺嘔欬者
 轉吐衄膿下利者轉便膿血甚者發熱厥逆
 躁不得臥仍是腎氣先絕而死也必識此意
 然後知仲景溫經散邪之法與清熱潤燥之
 法微細曲折折與九轉還丹不異後人窺見
 敗者遇陰寒便急溫遇陽熱便急下其鹵莽

咸裂尚不可勝言况於轉讀之輩

凡外邪少陰之為病脈微細與三陽之滑大迥

傳人但欲寐此少陰之微細與三陽之滑大迥

少陰病脈沉細加數病為邪在裏之不可發汗恐

亡陽之變也

少陰支脈別出上攻肺經而為欬下走空竅而為利

內亂神明而病欬而下利又譫語者以正被火氣劫

迫故也三其既小便必難不心胞而勝眈眈而小腸

枯涸大陽其迫而強責少陰之汗致也

水穀不分凡此皆以強責少陰之汗致也

傷寒分經卷四中少陰經後篇二

傳少陰之中風病陽微者外邪已陰反浮者內

已盡得為欲愈也少陰傷寒之愈脈從此可推

外山少陰病欲解時從子至寅上

各經皆解於所主之時而少陰獨解於陽生之

時陽進則陰退陽長則陰消正所謂陰得陽則

解也即是推之而少陰所重在真陽不可識乎

問陽病從寅而解於戌陰病從亥而解於寅是

陰病得陽解於日中者何也答曰陽得陽解於夜半

解者此從其經氣之王也如少陽得陽解於卯陰

太陽此從其經氣之王也如少陽得陽解於卯陰

也各經皆從其主時少陰獨從其生者少陰

內藏真陽子時三陽生陽生於陰陰生於陽

消也且天一生水三陽之水生於地地生於天

欲解也從天一生水三陽之水生於地地生於天

之解也從天一生水三陽之水生於地地生於天

門戶解也從天一生水三陽之水生於地地生於天

其不相解也從天一生水三陽之水生於地地生於天

於此見仲景之義及陰時五運也但三陽之

陰陽之義及陰時五運也但三陽之

與否陰陽之義及陰時五運也但三陽之

解之機然從後知兩相和協於日中者內經之

安也先聖後聖之機然從後知兩相和協於日中者內經之

少陰病以發熱為聖一陰日陰無此候而反一身手

傷寒分經卷四中少陰經後篇三

足盡熱者以發熱為聖一陰日陰無此候而反一身手

血既為少陰之熱所移熱在膀胱之內故使軀殼之

遍當趨二陰之熱以出必便血以陰主也

七少陰病但厥無汗也宜邪深入於裏而外假寒而強

發之熱必動其血行而卒未知從何道出或從

口鼻或從兩目竅以出少陰諸藥皆陽藥是

名下厥上竭又少陰血逆行從陽竅出較前證血從

少陰本少血且從上逆故為難治然則上條不言難治者豈非以膀胱多血且從便出為順乎

少陰病得之二三日以上心中煩而不得臥此陰為熱邪煎熬與真陽發動而為嘔利等證者迥別急以黃連阿膠湯主之解以真

凡真陽發動必先陰氣四布為嘔為下利為四逆乃致煩而且躁魄汗不止耳今但心煩不臥而無嘔利四逆等證是其煩為陽煩乃真陰為邪熱煎熬如日中纖雲頃刻消散安能覆蔽青

傷寒分經

卷四中

少陰經後篇

四

天也哉故急須解熱以生陰少緩則無及矣

九少陰病

二三日至四五日腹痛小便不利熱邪也

下利不止便膿血者則滑脫矣滑脫者忌寒藥宜治中虛使

桃花湯主之

十少陰病

下利不止便膿血者桃花湯主之若少陰病

利但便膿血者

可刺其經穴以散其邪熱

十一少陰病

下利咽痛胸滿又心煩者是其熱邪充斥

不利其陰有立竭之弊

豬膚湯主之亦從其散而邪

豬膚以潤少陰之燥

與用黑驢皮之意同若以

為燐豬皮外毛根薄膚則發劣無力且與熬香

之說不符但用外皮去其內層之肥白為是此

藥大不可忽陽微用附子溫經陰竭用豬膚潤

燥其中同具發散之義比而觀之思過半矣

少陰病二三日下利嘔逆諸證未具故可用之若五六日則

繞舌本熱邪上攻可與甘草湯以和緩

與桔梗湯以開提熱邪則諸

此在二三日他證未具故可用之若五六日則

少陰之下利嘔逆諸證蠶起此法不可用矣

傷寒分經

卷四中

少陰經後篇

五

少陰病咽中痛宜者熱邪挾痰攻咽也半夏散及湯

主之若少陰病咽中痛而傷于生瘡不能語言聲

不出者是熱邪已刺前藥中桂枝之熱既不可用

咽消而瘡已苦酒湯主之

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或

腹中痛或泄利下重者雖係熱證然逆而未飲其

宜但四逆散主之

少陰病下利六七日本熱去寒起之咳而嘔渴

心煩不得眠等者是熱邪搏結水飲以致嘔渴

利自利而猪苓湯主之

少陰病得之方二三

也延至五六日必急下之宜承氣湯

問曰此條觀急字以不宜緩其證不過口燥咽

乾而此病屬少陰少陰又不可用承氣耶答曰

日之大滿大實有此神見而用承氣耶答曰

少陰病得之方二三即口燥咽乾其人脈沉而

可無及矣此誠動陽性命所關如救頭燃何商

量等天淵懸絕所當辨之干矣

條天淵懸絕所當辨之干矣

少陰病自無上焦心下必痛與陰邪之口必乾燥

傷寒分經卷四中少陰經後篇六

不燥者異若此者急下之宜大承氣湯

少陰病六七日腹脹不大便者有立盡之勢當急

下之宜大承氣湯

胃土過實腎水立盡非少陰負趺陽反為順候

之比此時下之已遲安得不急

按陽明經有急下三法以救津液一汗多津越

於外一腹滿津結於內一目睛不慧津枯於中

少陰經有急下三法以救腎水一本經水竭一

木邪涌水一土邪凌水合兩經下法以觀病情

生理恍覺身在冰壺腹飲上池矣

少陰脈負於趺陽者

為順也

少陰水也趺陽土也諸病患土尅水而傷寒少

陰見證惟恐土不能制水其水反得以汎溢則

嘔吐下利無所不至究令中州土敗而真陽外

越神丹莫救矣故于其權於土則平成可幾于

其權於水則昏墊立至此脈法中消息病情之

奧旨也

傷寒分經

卷四中

少陰經後篇

七

少陰後篇論列方

黃連阿膠湯

桃花湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯

四逆散

傷寒分經

豬苓湯

大承氣湯

卷四中

少陰經後篇方

八

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西昌喻 昌嘉言註

傷寒分經

厥陰經全篇法四十七條。厥陰雖兩經交

逆行而上。以傳於肝。故曰厥陰也。邪傳厥陰。

其熱深矣。熱深多發。發後皆屬陽。因陽與陰

不相承接。因致厥也。厥後發熱。陽邪出表。則

易愈。厥多熱少。則病進。熱多厥少。則病退。所

以仲景難用三陽經治法。即識語之當下者。

但用小承氣微和胃氣。他證皆不用下。正欲

傷寒分經

其熱多而邪從外。出耳。然厥證多兼下利。則

陽熱變為陰寒者。十居其七。蓋木盛則土

受。則腎水穀。奔迫。胃陽發。虛能食。則為除。中

感。則腎水。暗。厥。取。無。休。腎陽發。虛。而。不。返

為。戴。陽。由。是。陽。微。則。厥。愈。甚。陽。絕。則。厥。不。返

矣。所以溫之。灸之。以回陽。仍不。出。少。陰。之。成

法。也。但。厥。而。下。利。陰。陽。之。辨。甚。微。不。便。分。為

二篇。故。發。其。端。於。篇。首。俾。讀。者。先。會。其。意。云。

厥陰之為病

雖多飲水而渴不止也。心氣上冲。心中疼熱也。

者。肝之子。母虛則子實。故心氣上冲。心中疼熱也。

胃土受制。腹中脹。飢而不欲食。食則吐。虵不食

饑。一聞食氣。則苦。寒攻下之。其所不勝。遂至下利不

止。而此則厥陰病也。

足經之邪終與手經有別雖仰關而攻究不能入心之邪郭也至胃則受俯凌之勢無可逃避食則吐而下則利不止矣亦由邪自陽明傳入胃氣早空故易動耳

厥陰之脈微厥陰中風脈微浮則邪還為欲愈不浮則邪不為未愈

三厥陰病欲解時從丑至卯上是三時厥陰厥陰病欲飲水者少與之愈

四諸四逆極厥者不可下之虛家亦然凡厥逆者傷寒分經

陰陽氣不相順接便為厥絕故不可下也厥者手足逆冷者是也

厥陰之脈微厥陰中風脈微浮則邪還為欲愈不浮則邪不為未愈

從陽解也此但舉最不可下之二端以嚴其戒耳○手之三陰與手之三陽相接于手足之三

陰與足之三陽相接於足陰主寒陽主熱故陽氣內陷不與陰氣相順接則手足厥冷然四肢

屬脾脾為陰與胃之陽不相順接亦主逆冷所以厥證雖傳經熱邪復有不盡然者最難消息

以厥證雖傳經熱邪復有不盡然者最難消息

六傷寒脈遲用寒涼明矣乃如是六七日而反與黃芩湯除其熱兩寒腹中應冷當不能食今反能食此將漸去而不能久存名除中必死

除者去也與除夕之義同又授也與授繫帶之義同

七傷寒始發熱止六日厥反九日而下利凡厥利者

胃氣當不能食今反能食者恐為除中也而利者食以索餅性熱之不發熱者知其能食胃氣尚在必愈

傷寒分經卷四下厥陰經全篇

愈然恐厥至九日則前者暴熱來出而復去也

也一日脈之其發熱證續在者期之

旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日

復發熱三日并前六日亦為九日與厥之數相應

陽非不故期之旦日夜半愈也但熱亦不

脈之前其脈或數其發熱過三日不罷者此為熱

氣有餘病勢雖必發癰膿久持不散而壅敗也

少陰經中內藏真陽最患四逆故云吐利手足不逆冷反發熱者不死厥陰經中內無真陽不

患其厥但患不能發熱與夫熱少厥多耳論中
 恐暴熱來出而復去後三日脈之其熱尚在形
 容厥證重熱之意匠心滿志讀者不可草草

凡厥利者傷寒先厥後發熱利者不可草草
 止再見厥復利未盡也傷寒先厥後發熱下利必
 自止而愈矣而反汗出咽中痛者熱邪有餘將
 喉必為痺凡發熱無汗而利必自止若不
 止則其無汗明係邪必便膿血便膿血者其熱
 喉不痺亦在下不復在上也

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

四

傷寒一日至四五日先厥者後必發熱前熱者
 後必發熱厥者內也如日數多而厥深者必熱亦
 深少而厥微者必熱亦微凡先發厥者與四逆應
 以若寒清下之而醫反甘誤發其汗者必上攻使
 口傷爛赤不可不

前云諸四逆厥者不可下矣此云厥應下之者
 其辨甚微蓋先四逆而後厥與先發熱而後厥
 者其來迥異故彼云不可下此云應下之也以
 其熱深厥深常用苦寒之藥清解其在裏之熱

即名為下如下利譫語但用小承氣湯止耳從
 未聞有峻下之法也口傷爛赤與喉痺互意

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

五

熱厥者入轉深人事昏者為萬不同諸書類
 證之病所或往投以四逆等湯促其暴亡而
 過此常較重如救也蓋犯房勞而感寒者其勢不
 則病極所重然者以陰虛陽往乘之非陰盛無
 陽之非暴證安得始能勿陰虛陽往乘之非陰盛無
 尤非暴證安得始能勿陰虛陽往乘之非陰盛無
 病且暴證安得始能勿陰虛陽往乘之非陰盛無
 厥不厥者又云厥反以陰虛陽往乘之非陰盛無
 也又云厥多熱少則病以熱之五日設六日當復
 愈而熱過久者必便膿血發熱多厥少下之而反
 汗之必口傷爛赤先便膿血後發熱利必自止而反
 利之必口傷爛赤先便膿血後發熱利必自止而反
 為除中厥止思食邪退欲愈無非熱深發厥之
 旨原未論及于陰厥也至于本陽分之病而妄

得安臥者亦死

又傷寒發熱下利至甚厥逆不止即不者亦死此

陰陽兩絕陽氣外散而發熱故不可投藥也

老利與熱勢發熱而厥至七日下利之者是熱自

不兩存今或發熱而厥至七日下利之者是熱自

則愈厥治其厥則愈熱不至陰陽兩絕不止其熱為

難治

大傷寒六七日不利忽便發熱而利之象是外陽內陰

之機若不用溫用其人汗出不止陽而亡者死熱雖

在厥陰而少陰無陽故也

傷寒分經

卷四下厥陰經全篇

病者手足厥冷難言我不結胸然小腹實滿且按

之痛者此非陽邪上結於下之氣結在膀胱關元

也

陽邪必結於陽陰邪必結於陰關元在臍下三

寸為極陰之位也

厥陰無大下之例傷寒五六日邪入厥陰其熱不

上而虛者死之例傷寒五六日邪入厥陰其熱不

凡血虛者不但忌手足厥寒脈細欲絕者此人氣衰微

下而并忌溫有如此手足厥寒脈細欲絕者此人氣衰微

熱之藥以助其陰值太常歸四逆湯之藥主之若

其人內有久寒者必宜當歸四逆加吳茱萸生薑

湯主之

前條之脈虛此條之脈細互見其義總為無血

故用下用溫皆非治法

其大下出熱不去恐是陽氣越出內拘急四肢疼又

加下利厥逆而惡寒者也亟宜回陽使陰自散

四逆湯主之

傷寒分經

卷四下厥陰經全篇

三 大下出熱若大下利而厥冷者陰寒之甚也雖大下

不宜牽制四逆湯主之

傷寒脈促可知更知手足厥逆者其陽必為陰所

不接之證可灸之以通

法傷寒脈滑而厥逆者裏有之熱故得也當依三

白虎湯主之

其病人雖手足厥冷有微熱脈乍緊者則是陽邪

陽邪結在胸中陽分當須以吐治之宜瓜蒂散

此與太陽之結胸迥殊其脈乍緊其邪亦必乍結故用瓜蒂散湧截其邪而由斯陽邪仍從陽解耳

大陽病飲水多者心傷寒方厥逆而心下悸者明

係飲水宜及其水未先為治水利以清下當用茯苓

甘草湯既治其邪卻治其厥不爾水漬入胃必作利

也厥與利相因病較深治較難矣

傷寒六七日因大下後陰氣陷入寸脈沉而遲手足厥逆且下部脈不至陰氣亦衰極矣又因大咽

傷寒分經卷四下厥陰經全篇十

喉不利唾膿血陽氣下泄利不止此者雖非死證

裏錯為難治治之者宜於陰中提出其麻黃升麻湯主之

金匱曰肺痿得之被快藥大下重亡津液者是也泄利不止未是下焦虛脫但陽氣下陷所致

故必升舉藥中兼調肝肺乃克有濟此麻黃升

麻所以名湯而謂汗出愈也○按寸脈沉而遲

明是陽去入陰之故非陽氣衰微可擬故雖手

足厥逆下部脈不至泄利不止不得謂純陰無

陽可知况咽喉不利唾膿血又陽邪搏陰上逆之微驗所以仲景特於陰中提出其陽得汗出而錯雜之邪盡解也

傷寒四五日腹中痛虛寒若更加轉氣下趨少腹

者此必因腹欲自下利也知者於此急當

傷寒之平素本自胃寒而下利者醫復藥吐下之藥

氣格拒于中更逆吐下利甚吐之食入口即

吐治宜溫胃下氣并乾薑黃連黃芩人參湯主之

平素胃寒而下利較上條之轉氣下趨少腹者

傷寒分經卷四下厥陰經全篇十

更為已然之事矣所以縱病傷寒即不可妄行

吐下與病人倍微泄不可服梔子湯互意倍微

泄而用梔子則易湧易泄本自寒下而施吐下

則吐下更逆方用乾薑人參以溫補其胃用芩

連之蓋以下逆氣而解入裏之邪熱也

下利脈沉而遲裏寒也其人面少赤身有

微熱內下利清寒而出穀者必熱甚于鬱胃于汗

出而解其病人又必微厥所以然者其面赤為

戴陽戴陽之證必下元虛寒故陽無所附而發也

下利清寒而出穀其裏寒矣外發熱汗出而厥者
陰陽不相順接之至也治宜通脈四逆湯主之

上條辨證此條用藥兩相互發然不但此也少
陰病下利清穀面色赤者已用其法矣要知通
之正所以收之也不然豈有汗出而反加葱之
理哉

附戴陽證案黃起潛年老而患時氣頭面甚紅
浮于上與在表之邪相合望八老翁下元虛僂陽
已戴于頭而不知者更行表散則孤陽飛越而
危殆立至矣此證唯以人參附子等藥收拾陽
氣歸于下元而加葱白透表以散外邪如法用

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

主

之即愈萬不宜遲藥家誤為偏僻之說更醫投
以表藥頃刻陽氣升騰肌膚栗起又頃刻寒戰
咬牙而逝

附戴陽證石曉開病感冒咳嗽求嘗發熱
診之見其頭面紅赤躁擾不眠呼吸不能相續
謂此其證頗奇全似傷寒戴陽證何以感胃小

回陽氣不然而宜用人參附子等藥溫補下元收
不以爲然及日落陽不用身大汗脫陽而死者

忙服藥少寧片刻又爲淋瀝同寢不能一人通
出其汗如雨再用一劑身安咳嗽俱不

詢其知感胃小連服麻黃四劑遂爾躁急欲死
然後其人平素下虛是以真陽易於上越耳

附辨徐國禎傷寒疑難急證治驗六七日身熱
身熱

日赤索水到前復置不快異常大躁將門牖洞
破身臥地上展轉不快更求入井一醫洵急
以此承氣與服余診其脈洪大無論重按無力
曰此用人參附子乾薑之證奈何認爲下證耶
醫曰身熱目赤有餘之邪躁急若此再下證耶
附子乾薑服之有餘之邪躁急若此再下證耶
顯假熱內有真寒之藥重投之何勝回陽
之任況敢以純陰之藥重投之何勝回陽
芒確乎天氣已大露豈水向不飲其陽乎
結胸不可救矣且既認大熱爲陽證頃刻一身大
汗散邪退可慮也惟用薑附大熱爲陽證頃刻一身大
以散邪退可慮也惟用薑附大熱爲陽證頃刻一身大
疑吾在此久坐如有一差誤至穩至當之法有何可
服後寒戰五錢人參三錢甘草二錢煎成冷服不
肯與診陽微之狀始著再與
前藥一劑微汗熱退而安

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

主

附答門人問蔣中尊受病致死之因門人問曰
尊病傷寒臨危求肉汁海飯半碗食畢大吐一

多而近此易故也答曰今人外感三分內傷七分
緩劑小劑及薑棗和中七分外感三分內傷七分

血等果若七分內傷三分外感七分內傷三分
傷爲主但加人參透表傷者一味而熱服以助藥

則外感自散益以內傷者一味而熱服以助藥
發病不似壯盛者必所感深重有些微乃外感即

中時者向曾見其滿面油光足知其病乃外感
非本壽之人也人惟欲然不足方知其餘精神外

有幾耶近聞其官情與神聲色交濃有征海而胃
應世可以當病若夫神聲色交濃有征海而胃

傷而外感不遇受霧原不傳經故非發表攻裏
所人但入氣分清道原不傳經故非發表攻裏

所能驅惟培元氣厚穀氣則邪不驅而自出

以其頭運發熱。認為太陽之證。誤表其汗。則內傷必轉。而危殆在所必至矣。且即使其汗。則內寒。原不禁食。又候以傷寒。當禁食。而絕其食。以虛益虛。致腹中餓。求救於食。食而大吐。一氣從中斷。而後也。此理甚明。如饑民什地。即死。臨危。每多大呼。而絕。以無外感之邪。亂其神明。是以未死。而先已昏。不測矣。安得精明。若是哉。人未死。而先已昏。不測矣。安得精明。若是哉。日。每見人之神。采外揚者。病發恆多。汗而躁急。不識何藥。可以治之。答曰。上藥在。以神治神。蓋神既外揚。必須內守。方可逆挽。老子所謂。知其雄。守其雌。知其白。守其黑。其對證之藥也。若夫草木之性。則取其氣。下達而味。沉厚者。用之。恆使勿缺。做灌園之例。頻預沃之。以水而防其枯竭。可也。

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

西

下利手足厥冷。無脈者。灸之不溫。若脈久不還。已死。證矣。猶幸其根。未絕。隨火氣。微喘者。則孤陽絕也。而或升用之氣。反逆上。作微喘者。上脫。與少陰息高。死矣。必者。正同其死矣。此即互上條。用灸之意。所以不重贅灸法。少陰下利。厥逆無脈。服白通湯。脈暴出者。死。微續者。生。厥陰下利。厥逆脈絕。用灸法。晬時脈還者。生。不還者。死。可見求陽氣者。非汎然求之。無何有。

之鄉也。根溪寧極之中。必有幾微。可續然後藉溫灸為鸞膠耳。

聖

下利腹脹滿。寒盛于裏。身體疼痛者。雖或因寒邪裏寒。而然。然厥陰病。見陽易愈。見陰難痊。今腹中陰寒之氣。萬盛。當先溫其裏。氣稍強。乃攻其表。則不致亡陽。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。

此與太陽中篇下利身疼。用先裏後表之法。相同。彼因誤下而致下利。此因下利而致腹脹。總以溫裏為急者。見睨曰消之義也。身疼痛有裏。

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

圭

有表。必清便自調。其痛仍不減。方屬于表。太陽條中已悉。故此不贅。

聖

下利清。寒而出之穀。腹中陰寒之極也。當不可攻。表以發其汗。出氣陽已則陰必脹滿。致驚而不。

此條重舉下利清穀。不可攻表。以示戒。正互明上條。所以先溫後攻之義也。

聖

傷寒下利。日十餘行。脈反實者。邪盛則正脫。而必死。

下利有微熱而渴者。證已轉陽矣。然正脈微見之厥陰。

弱之者則陽邪已退可令其自愈或下利有脈數

而渴者猶微熱而令自愈設脈數而不差者必其所

利不與藥但徐令自愈設脈數而不利者必其所

脈數有微熱而汗出者散其邪必令自愈設脈數復

弦則邪方熾盛為未解也又下利脈弦且發

熱身汗者其邪熱已轉出無疑也下利脈弦

利陰病也寸下利而寸脈反浮數者邪走下圍膿血也

數而尺中自濇者乃未盡熱邪必走下圍膿血也

下利脈沉弦急者必邪迫下重也其脈沉弦大者

傷寒分經卷四下厥陰經全篇

邪熱尚盛為未止脈沉弦微弱數者邪熱已微為

欲自止雖發熱未愈不過為餘不死也

下重邪急於裏暴注下迫也舊註謂傷寒轉痢

非是○仲景凡言下利即泄瀉圍膿血即痢也

凡治厥熱利下重不能愈者當與除白頭翁湯主之

若下利未顯下重之欲飲水者以有熱津液耗故

也與藏寒利而不渴者迥異必白頭翁湯主之

下利識語以有燥屎也厥陰陽明大承氣證同然

但大下宜小承氣湯微攻其胃以

已下利後而更煩邪在內則胸滿若按之心下濡

而不者為利虛煩也與陽明候下胃虛膈熱宜梔

子豉湯

厥陰之邪嘔而兼發熱者乃肝陰膽陽二藏相連

上逆作嘔而發熱者乃為病也治宜分解其

患小柴胡湯主之

嘔而脈弱者小便利復利也裏寒身有微熱則裏證

表矣見厥者陰陽錯難治此其大勢以陽微陰盛

而復先回四逆湯主之發微熱將自除也

傷寒分經卷四下厥陰經全篇

若嘔家有癰膿者不可湯治嘔以益其熱膿盡

則熱去自愈

厥陰之邪上逆而乾嘔吐涎沫可用吳茱萸湯

以下其逆氣若陰邪之上逆已結而為癰潰出

膿血即不可復治其嘔正恐誤以吳茱萸湯治

之耳識此意者用辛涼以開提其膿可耳

按厥陰篇中次第不一有純陽無陰之證有純

陰無陽之證有陰陽差多差少之證有陽進欲

愈陰進未愈之證復有陰居八九陽居一二之

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

大

再按厥陰經原無下法首條卽先示戒云下之利不止矣蓋厥陰多至下利下利中伏有死證

傷寒分經

卷四下

厥陰經全篇

丸

客在亡血藏虛之人下之百無一生矣所以三陰經非胃實本禁下而厥陰經爲最也厥陰篇止此

過經不解法四條。過經不解者病邪止而
寒以七日爲一經過。一候二候猶不痊愈也。傷
氣雖留於經而人之營衛流行六日周遍
六經至七日復行。受邪之經正氣內復。邪氣
得以外解。若七日不罷則邪熱勢盛。必至三
日之外解而解所以過經證有十三日不解
之矣。若問傷寒傳經日傳一經六日六經傳
盡七日復傳太陽必無是理。豈有厥陰兩陰
交盡於裏復從皮毛外再入太陽之理耶。茲
所列過經證四條俱在陽經然邪在陰經亦
有過經一候二候者如厥陰篇本發熱六日

厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日
豈非過經不解之證乎總當辨其邪在何經
而治之

辨太陽過經誤下邪陷少陽用大小柴胡湯

兩解一法

太陽病過經十餘日未罷本反三三下之幸無他

邪陷少陽後四五日而柴胡證仍在者本當以大柴

胡證因誤下深入即非大柴胡證仍在此者本當以

柴胡下法所透能服故必先與小柴胡湯出中表邪

而嘔不止心下急鬱鬱微煩者為邪未解也後與

大柴胡湯下之則愈

傷寒分經卷四下過經不解

辨過經不解心下欲吐微煩微滿用藥宜審

一法

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大

便而反薄腹微滿鬱鬱微煩治之者極

時會自極吐下傷其胃氣者則以和胃與調胃

承氣湯若不爾者此不可與吐下也但欲嘔胸

中痛微滿者其病非吐所傷其胃也此不惟胸

乃治之利非其治也若虛自下利者服當微以

厥今反和者此為內實也調胃承氣湯主

而反下利脈調和者知醫下利之而氣以圓藥下之

脾人大腸而不利今小便利者大便當乾

脾不運化者小便多今小便利者大便當乾

熱也當以承湯下之或以其有微利疑脾虛不能

實者傷寒十三日不解過經之證識語者以胃有

芒硝湯主之治此內虛也

用誠可攻也然表邪內陷方利不止攻之恐胸

小柴胡湯分以解外邪後中實熱而以柴胡加

傷寒分經卷四下過經不解

反利不止者知醫下利之而大柴胡以開藥下之

此引熱邪內陷久利不止之而大柴胡以開藥下之

致成虛候表裏俱不能解非其治也夫潮熱者實

傷寒分經卷四下過經不解

二法

過經證屬可下誤用圓藥增利辨內虛內實

而有傷胃純主也

之此內實
治法也

二條俱見微利之證難辨其內實內虛上條腹
脇滿而嘔邪湊少陽之表故欲下之必用柴胡
湯為合法若以他藥下之表邪內入即是內虛
此條原無表證雖圓藥誤下其脈仍和即為內
實也

按仲景下法屢以圓藥為戒惟治太陽之脾約
乃用麻仁圓因其人平素津枯腸結必俟邪入
陽明下之恐無救於津液故雖邪在太陽即用

傷寒分經

卷四下 過經不解

三

圓藥之緩下潤其腸俾外邪不因攻而內陷乃
批卻導窾游刃空虛之妙也

差後勞復
法七

一 大病差後動勞苦復生餘者宜用苦藥發枳實梔

子鼓湯主之若有宿食者加大黃如博碁子大五

六枚使其熱邪

勞復乃起居作勞復生餘熱之病方註作女勞
復大謬女勞復者是犯傷寒後之大戒多死少
生豈有反用上湧下泄之理耶太陽中篇下後

身熱或汗吐下後虛煩無奈用本湯之苦以吐
微其邪若此條非取吐法也乃用苦以發其微
汗正內經火淫所勝以苦發之之義觀方中用
清漿水七升空煮至四升然後入藥同煮全是
欲其水之熱而趨下不致上湧爾所以又云覆
令微似汗精絕

二

傷寒差後更發熱者乃餘熱在內以熱召熱也治

半表半裏者小柴胡湯主之若在何經密其治

則用和解汗解之在裏脈沉實者仍加以下

傷寒分經

卷四下 差後勞復

三

不可汎然施治
以虛其虛也

三 大病差後從腰以下腫有水氣者此脾土因不

也令驅逐不早從此汎逆襲人陽界能制水而上清

主之

水漬為腫當利小便此定法矣乃大病後脾土
告困不能攝水以致水氣汎溢用牡蠣澤瀉散
峻攻何反不顧其虛耶正因水勢未犯身半以
上急驅其水所全甚大設用輕劑則陰水必襲
入陽界驅之無及城不沒者三服亦云幸矣可

見活人之事。迂疎輩必不能動中機。宜庸工遇大病後。悉行溫補。自以為善。孰知其為鹵莽滅裂哉。

四

大病差後喜唾。其唾稠膩。久猶不了。然清者乃胃上有寒。凝結津液而成。此時身必微。當以圓藥溫而緩之。宜理中圓。

理中圓乃區分陰陽溫補脾胃之善藥。然唯差後病外邪已盡。纔用其方。在太陽邪熾之日。不得已合桂枝用之。即更其名曰桂枝人參湯。又傷寒分經卷四下差後勞復。

云醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。非其治也。於此見用法之權衡矣。

五

傷寒解後。因津液為熱。邪虛。瀕少氣。以致餘邪氣逆欲吐者。宜益虛清熱。竹葉石膏湯主之。

六

病人脈已解。陰陽和適。而每日將暮時。不微煩。以病新差。人強與之穀食。脾胃氣尚弱。不能消穀。故令微煩。若能損穀食。休養。則自愈。

日暮微煩者。日中衛氣行陽。其不煩可知也。註家牽扯日暮為陽明之王時。故以損穀為當。小

七

下不知此論差後之證。非論六經傳陽明之證也。日暮即內經日西而陽氣已衰之意。所以不能消穀。但當減損穀食。以休養脾胃。豈可引前條宿食例。輕用大黃重傷脾胃耶。

吐利發汗。脈平小煩者。以新虛不勝穀氣故也。此段前在霍亂條。今移附於此。○霍亂雖是吐利。無發汗之條。且脈平小煩。新虛不勝穀氣。明係傷寒遺事。與上條同意。

合七條觀之。差後病凡用汗下和溫之法。但師傷寒分經卷四下差後勞復。

其意不泥其方。恐元氣精津久耗。不能勝藥。爾豈但不能勝藥。抑且不能勝穀。故損穀則病愈。而用藥當思減損。并可識矣。其腰已下有水氣。峻攻其水。亦以病後體虛。膀胱氣化不行。若不一朝迅掃。則久困之脾。上必不能提。防水逆不至。滔天不止。所以少陰後篇云。少陰負跌陽者。為順。故取奪少陰之水。以解跌陽之圍。夫豈尋常所能測識耶。

陰陽易病

有與傷寒新差之男陰陽因而病易受之為病者

其人病狀身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣

熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者

病者精簡中餘毒貽害他人過身為患也治之者

男病燒女人假毒女病燒男人假毒為未名曰

燒視散主之氣相求引熱毒仍從下竅而出也

陰陽易之病註家不言後人亦指為女勞復

謂是病新差者接女子而復病夫然則女病新

差接男子而再病為男勞復乎竟不知何以云

易也蓋凡男婦傷寒熱毒藏於氣血中者漸從

傷寒分經卷四下陰陽易病

表裏解散惟藏於精髓中者無由發泄差後一

與男女交媾陰陽則遂傳送餘毒於不病之人

而使之驟病故名陰陽易者遷易之謂亦交

易之義也暴受陰毒又非葛桂附子辛熱所能

驅故以同氣相求之法治之服藥後小便得利

陰頭微腫則毒出而愈矣若謂是接女自復之

病證治必不如此此條叔和策於差後勞復之

前因滋後人之惑今移置於後而解正之益見

熱病之惡而可畏也大

厥陰篇論列方正用方九借用方七

烏梅圓

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

四逆湯

白虎湯借用太陽下篇方

瓜蒂散借用痰病方

茯苓甘草湯借用太陽中篇方

麻黃升麻湯

傷寒分經卷四下厥陰經全篇方目

乾薑黃連黃芩人參湯

通脈四逆湯借用太陽上篇方

桂枝湯借用太陽上篇方

白頭翁湯

小承氣湯借用陽明上篇方

梔子豉湯借用太陽中篇方

小柴胡湯借用少陽全篇方

吳茱萸湯

附過經不解論列方

小柴胡湯 借用少陽全篇方

大柴胡湯 借用太陽中篇方

柴胡加芒硝湯

調胃承氣湯 借用陽明上篇方

附差後勞復論列方 正用方三借用方二

枳實梔子豉湯

小柴胡湯 借用少陽全篇方

牡蠣澤瀉散

理中圓 借用夏熱全篇亂條方

傷寒分經

卷四下

附陰陽易病方

竹葉石膏湯

燒裨散

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

西昌喻 昌嘉言註

傷寒分經

春溫上篇

治傷寒略此篇法一十六條。仲景溫證列於中也。後人深解義例者鮮。故春溫一證漫無成法。可謂滋特會內經之旨。以暢發仲景不宣之奧。焉內經云。冬傷於寒。春必病溫。此一也。大例也。又云。冬不藏精。春必病溫。此一大例也。既冬傷於寒。又冬不藏精。至春月同病。

傷寒分經

卷五上

春溫上篇

一

發此一大例也。春此三例以論溫證而詳其治。然亦與仲景三陰三陽之例先後同符。蓋冬傷於寒。邪藏肌膚。即邪中三陽之謂也。冬不藏精。邪入陰藏。即邪中三陰之謂也。溫之邪。淺而易療。陰分之邪。深而難愈。所以病溫之人。有發表三五次。而外證不除者。源遠流長。少減復劇。以為在表也。而內證不除。又在裏也。為在裏也。而表證不除。則陰虛。皆得有用寒涼。則陽隨絕。凡在表用溫。種危候。溫證皆得有用寒涼。則陽隨絕。凡傷寒。不能勝其任。生於熱。證尤為十中入虛。邪盛。不能勝其任。生於熱。證尤為十中入虛。九緣。真陰為熱邪久耗。無以制亢陽。而燔原。不熄也。以故病溫之人。多骨瘦皮乾。津枯肉燥。縱者。方可得生。然多骨瘦皮乾。津枯肉燥。縱年善調。始復未病之體。實緣醫者於此一證。茫然不知。病之所在。用藥不當。邪無從解。茲因持出手眼。以印證。先聖法。則焉。冬傷於寒。藏於肌膚。至春月氣溫之時。而始發。肌膚

者陽明胃經之所主也陽明久鬱之熱一且發出而外達於太陽陽明之熱經是邪所發黃之熱故陽明發熱而表不遠熱之法適足以增溫病之困厄耳此則春溫之治法與冬月自不相同矣

太傷病惡寒今發熱而渴且不惡寒者月所發而為發之溫病也此條乃冬傷於寒春必病溫為第一例之綱也春溫之證由肌肉而外達於皮膚故經雖從太陽而病邪實出自陽明胃經所以更傷寒之名而曰溫病謂冬寒久鬱至春溫時發熱而渴不

傷寒分經

卷五上 春溫上篇

二

惡寒以其自內出外與冬月驟病發熱惡寒且不渴者證則不同也○溫病亦有春時新感微寒引動伏邪而發者證兼惡寒然必微而不甚解病不可發若冬不藏精之人熱邪久蓄少陰素傷若再為發汗已而灼熱倍者名曰風溫風溫乃少陰脈本當沉靜因陰陽俱浮緊其自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出陰一皆少若被下者則勝脫之小便不利上榮而直視氣亦外失洩若被火者則陰微發黃色劇無制愈如

痛狀時瘧瘧若火熏之則再候矣此一逆尚可引以再逆則促命期

此條乃冬不藏精春必病溫為第二例之綱也合上條冬傷於寒春必病溫二者同時病發即為第三例之綱也○按冬不藏精之例乃內經之例也然此條仲景之論溫證已發其端矣夫既名溫病即是時行外感何又汗之火之下之俱為逆耶蓋熱邪久蓄少陰腎中精水已為素傷重加汗下火劫陰之法乃為逆耳其自汗出

傷寒分經

卷五上 春溫上篇

三

身重多眠睡鼻息鼾語言難者一皆少陰之本證也膀胱為腎之府故少陰證具若被下則膀胱之陰亦傷而直視失溲被火劫則陰愈虧而邪愈無制甚則如驚癇狀而時瘧瘧也一逆再逆言汗下火之候一之為甚其可再乎非汗而又下而又汗之為再候也由此觀之冬不藏精之溫證顯然昭著茲為比例以分其治而仲景之道愈明矣○仲景之論候下有結胸及痞協熱驚瘧藏寒不禁等證從未說到小便不

利直視失洩於此言之者謂腎以膀胱為府素
不藏精之人得下則膀胱益虛以故小便不利
直視失洩其變亦倍重於膀胱也況風邪內熾
津液乾燥而大便難通之未必通徒令膀胱受
累而小便自遺耳試觀好色之人多成癰淋可
以類推今之醫者亦講於快下而絕膀胱之化
源立取危困耶○發汗已身灼熱名曰風溫仲
景此語將冬不藏精之溫證形容殆盡蓋凡外
感之邪發汗已則身熱自退乃風溫之證發汗

傷寒分經

卷五上

春溫上篇

四

已身始灼熱者明明始先熱在骨髓發汗已然
後流山肌表也至於風溫二字取義更微與內
經勞風之義頗同勞風者勞其腎而生風也然
則冬不藏精之人詎非勞其腎而風先內熾歟
故纔一發汗即帶出自汗身重多眠睡鼻息鼾
語言難諸多腎經之證設不發諸證尚隱伏不
盡透出也夫腎中之風邪內熾而以外感汗下
及火攻之法治之寧不促其亡耶

客難曰內經論冬傷於寒毒藏於肌膚感春
月之溫氣而始發故名曰溫病未嘗言寒毒藏

於骨髓也今謂冬不藏精者寒邪藏於骨髓或
未盡然耶答曰此正內經之言也黃帝問溫瘧
含於何藏岐伯曰對曰溫者得之於中於風寒氣
藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自
出因遇大暑腦髓燦爛此病發於骨髓或有所
用力邪氣與汗皆出此病發於骨其氣先從內
出於外也如是者陰虛而陽盛則熱矣衰則氣
復返入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒
名曰溫瘧由是觀之則溫病之病在骨也
然而況於溫病乎客難曰惟
傷寒脈常弦緊今病形如傷寒其脈不弦緊而弱
者必渴被火者必譫語弱者發熱渴脈浮者解之
當汗出愈

傷寒分經

卷五上

春溫上篇

五

風性緩弱故脈亦弱弱者發熱即內經諸弱發

熱之義也脈既浮當以法解之使汗出而愈取
解肌不取發汗之意

四脈浮熱

此為邪氣實也反灸之則實以虛治矣
因火而動必至妄咽燥吐血

咽燥者火勢上逆枯涸之應若是少陰見譫言

不止此一端故不入冬不藏精一例

五病如桂枝證

而頭不痛項不强則太陽無外入之

且寸脈不甚微浮則邪自內出而胸中痞鞭氣上

衝咽喉而不得息者明胸有痰寒也當吐之宜

瓜蒂散 病人有 寒復 發汗胃中冷必吐

不曰病似中風證而曰病如桂枝證者恐人誤

以治溫一例混入太陽中風之例而滋擾故更

換其名也吐法多用梔豉湯此用瓜蒂散者取

其吐頑痰而快膈湧風涎而逐水也○有痰而

誤發汗徒亡津液胃中空虛虵失所養故悖逆

而上出也

六病人手足厥冷其證似涉脈有乍緊者其邪亦必

結在胸中非厥陰也心下滿而煩饑不能食者病在

傷寒分經 卷五上 春溫上篇 六

胸中無當須吐之宜瓜蒂散

上二條乃痰與邪自內而出即四證類傷寒之

痰證也

七病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓

此表實裏虛之證也身大寒反不欲衣者寒在皮膚熱在

骨髓此表虛裏實之證也

此以互合之表裏言設由厥府而統言之則皆

謂之表矣

病在陽未去未除應以汗解之反以冷水噴之若灌

之其熱被遏冷水卻不得去彌更入益煩熱其肉

上栗起意欲飲水反不渴者熱邪為水服文蛤

散以利水若不瘥者與五苓散寒實結胸無熱

證者兩利水與三物小陷胸湯若寒結白散亦可

病在陽則不兼陰可知正合第一例也

九病人藏無他病和也時發熱時不發汗出而不愈

者此衛氣不和也先其熱未發時發汗則愈宜桂

枝湯主之病人自汗出者此為營氣和營氣和

者外不諧以衛氣不其營氣和諧故耳以營行脈

傷寒分經 卷五上 春溫上篇 七

中衛行脈外但復發其汗營衛和則愈宜桂枝

湯營氣和者及營行脈中等而復發其汗

藏無他病但衛氣不和亦陽病陰不病之例也

春溫之證由肌肉而外達於皮膚則太陽膀胱

經之邪由自陽明胃經與冬月外受之風寒始

先便中太陽而傷其營衛者迥乎不同故此但

言衛不與營和其無太過可知也既衛不與營

和當用桂枝湯使邪散熱止可見溫證中發汗

大汗而重傷津液變反起矣此先聖用藥之大

關也

春月用桂枝湯治溫證宜佐以辛涼清潤之品

十病人脈數為熱常消穀引食而反吐者此以

發其

汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不

能消穀以胃中虛冷故吐也

發汗而令陽微悞之甚也陽微則胃中虛冷而脈反數者不過客熱之微溫其胃而客熱不匿則脈不數矣○此但言胃中陽微與不藏精之真陽微弱者不同

傷寒分經

卷五上

春溫上篇

八

主

病人煩熱

陽也汗出則解

又有

如瘧狀日晡所發

熱者屬陽明也

總須察其脈實者

確在陽府

宜下之脈虛

浮者

陽經

宜發汗下之宜大承氣湯汗之宜桂

枝湯

三

微而數之脈

陰虛多熱

慎不可灸

此而

因火為邪

則心為之煩逆

以陰虛而益

逐熱實之

益熱則血不

能

支散脈中

益一

火氣雖微內攻有力之焦骨傷筋

難欲補血

血難復也

此條不專為溫證而設所以不言證而但言脈

也脈見微數則是陰虛而陽熾重以火力追逐其血有焦骨傷筋已耳今世之灼艾者不識亦辨脈之微數否耶

主

病人耳聾

無聞者以重發汗

陽虛故也

此與傷寒耳聾為少陽邪盛者迥異益見溫證禁過汗也

主

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此

有燥屎故使大便硬也病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承

傷寒分經

卷五上

春溫上篇

九

氣湯

溫熱病亦有先見表證而後傳裏者蓋怫熱自內達外熱鬱腠理不得外泄遂復還裏而成可攻之證非如傷寒從表而起也傷寒從表而起故誤攻而生變者多溫證未必從表始故攻之亦不為大變然鬱熱必須外泄為易誤攻則引邪深入終非法也○溫熱病表證兼見而裏證為多故少有不渴者法當以治裏為主而解肌兼之亦有治裏而表自解者其間有誤攻裏而

致大害者。乃春夏暴寒所中之疫證邪純在表。未入乎裏故也。不可與溫熱病同治。

至天下後五六日不大便煩不解腹滿痛者有燥屎也。宜大承氣湯。

凡仲景治溫證用表法皆行桂枝湯以示微發於不發之意。用下法皆行大承氣湯以示急下無所疑之意也。所以然者祇慮熱邪久據陽明胃中津液先傷故當汗而惟恐其過于汗反重傷其津液當下而惟恐不急於下以亟存其津液也。

傷寒分經

卷五上

春溫上篇

十

去本

常發汗而復下之此為逆也。若先發汗未解而

治之

不為逆本當先下之而反汗之此為逆也。若

先下之

以發汗治之不為逆蓋表裏多少之

觀此則溫證比傷寒太陽經之變證為差減而

汗下之次第亦為不同矣。

老天下

之後復發汗小便不利者亡其津液故也。勿

治之

津液得小便利則愈。凡病若發汗若吐

若下若亡

其津液以致不解。陰陽和者此津液復

必自愈皆不可妄投湯劑

觀此則素無內傷及不藏精之類者為易愈也。

解肌諸方

桂枝湯桂枝湯葛根黃芩黃連湯

葛根柴胡湯

葛根葱白湯

附人參敗毒散

升麻葛根湯

海藏大羌活湯

參蘇飲

解肌後病不去反惡寒者虛也。芍藥甘草附子湯

脈細身曉

解肌後身疼痛脈沉者桂枝加芍藥人參新加湯

傷寒分經

卷五上

春溫上篇

土

解肌後汗出過多心下悸欲得按者桂枝甘草湯

臍下悸欲作奔豚者茯苓桂枝甘草大棗湯

解肌後煩渴脈洪大者白虎加人參湯乾煩不眠飲水者

少少與之

解肌後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯

解肌後不惡寒但惡熱者調胃承氣湯

解肌後惡熱無下證知母石膏湯

解肌後脈浮一作微數小便不利微熱煩渴五苓散

吐法 瓜蒂散

梔子豉湯傷寒內著有專論

清熱 白虎湯 白虎加人參湯 白虎加桂枝湯 竹葉湯

竹葉石膏湯 元參升麻湯 升麻梔子湯

和解 小柴胡湯 小柴胡加桂枝湯 小柴胡去半

參胡加五味子湯 小柴胡加黃芩湯 小柴胡去半

疎風 荊芥散 獨活湯 續命湯 滅麻黃 附子

風引湯

分利 五苓散 脈浮大是表其人發渴 小便赤澀當下用此

豬苓湯 陽明脈浮發熱渴欲飲水小便不利者與之 汗多者不可與

天水散 辰砂天水散 治腰以下 有冷氣

傷寒分經 卷五上 春溫上篇 主

開結 三物小陷胸湯 三物白散

下法 大承氣湯 調胃承氣湯 大柴胡湯 脈浮

大柴胡湯下痞滿當下若煩渴燥熱小 便赤色咽不利心下微煩者與兩解

下後脈促胸滿桂枝去芍藥湯 若微惡寒者去

芍藥加附子湯 誤以丸藥下之身熱不去微

煩者梔子乾薑湯 以上三法俱取 其溫以散表

下後利不止脈促表未解喘而汗出者葛根黃連

黃芩湯 取其長

下後身熱不去心中結痛未欲解者梔子豉湯

下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯 取其可 以散邪

下後心中懊憹而煩有燥屎者大承氣湯 取其仍 從下解

下後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不

利唾膿血泄利不止為難治麻黃升麻湯 取其 解其

邪之

下後傷血脈痛身熱苦酒湯 取其 壯陰

大汗使陽氣微又下使陰氣弱其人亡血病惡

寒後乃發熱無休止時陰陽既虛血氣俱弱故

其熱不可止息葶藶子湯 取其助陰

傷寒分經 卷五上 春溫上篇 主

解毒 黃連解毒湯 黃連湯 黃連阿膠湯

黃連瀉心湯 黃連龍骨湯 黃連犀角湯

黃連橘皮湯 黑膏

養血生津 酸棗仁湯 阿膠散 麥門冬湯

芍藥甘草湯 五味子湯 炙甘草湯

大青湯

補中 理中湯 治中湯 溫中湯 小建中湯

黃耆建中湯

涼血滋陰 犀角地黃湯

外邪則重者輕而輕者即愈矣奈其裏而
不彰因是冥悟一斑即仲景少陰傷寒之例
推演為治溫之例未嘗以
已意混一字也引例如左
少陰病始得之病既在裏外不反發熱而脈自沉
者是其經表裏皆病也法當表其麻黃附子細辛
湯主之

脈沉病在裏也而表反發熱則邪雖在表而其
根源實在裏在裏之邪欲其盡透於表則非專
經之藥不可故取用附子細辛以匡麻黃為溫
經散邪千古不易之正法奈何後人全不知用
傷寒分經 卷五中 春溫中篇

明明見脈沉嗜臥倦語之證即知風溫又知為
冬不藏精尚且漫用三陽經之表藥屢表不應
十不能活一矣

三少陰病得之二三日乃治之麻黃附子甘草湯微發
汗何也以二三日來無煩躁嘔裏證故以溫散微發
其汗也

麻黃主散邪附子主溫經二者皆大力之藥也
前條發熱脈沉則表裏俱急惟恐二物不勝其
任更加細辛之辛溫取其為少陰引經之藥而

又有辛散之能以協贊二物其建奇功也此條
云無裏證非是并脈沉嗜臥等證俱無也但無
吐利煩躁嘔渴之證耳似此則表裏俱不見其
急而麻黃附子二物尚恐其力之太過故不用
細辛以助之而反用甘草以和之也謹並製方
之意剖心相告凡治冬不藏精之溫證始發二
三日間請決擇於斯二方焉
病發熱頭疼表證也而脈反沉則病又在裏若治表
體反加疼痛當救其裏宜四逆湯不瘥身

傷寒分經 卷五中 春溫中篇

此段文義可得仲景治冬不藏精之奧旨病發
熱頭疼證見於表而脈反沉則病又疑其在裏
也既發熱頭疼勢必先治其表若不瘥則治表
無益矣凡治表皆治其陽也陰病治陽非惟無
益將見陰中之真陽因之外越而身體反加疼
痛一團陰寒用事矣此所以當用四逆湯以急
回其陽也○若不瘥三字甚活蓋發熱頭疼表
之原不為快但一切三陽經之表藥俱不對證
惟麻黃附子細辛湯與麻黃附子甘草湯二方

始為少陰經對證之表藥而又不取必人之能用所以不說誤表而說若不瘥正見表藥中原有瘥法也

四

少陰病脈沉細中數病為邪在裏不可發汗氣而有奇血亡陽之變也

沉細數裏熱也發汗則虛其表且亡其津液內熱愈熾

五

人身陽氣每與汗俱傷寒分經少陰病脈微者不可發汗以其亡陽

傷寒分經

卷五中

春溫中篇

四

瀋者為陰血損復不可下之為溫經散邪可耳

前云脈沉細數為熱此云脈微為虛熱而發汗

則陰易亡虛而發汗則陽易亡故兩戒之然則

脈不微數者一槩禁汗不為懲噫廢食耶況不

藏精之證初發未必即見微數之脈惟可用麻

黃附子二方而不知用馴至脈微且數則汗下

溫三法皆不可行而陰絕陽離有立而待斃耳

六

少陰支脈別出於肺經者或用大強劫其汗則熱邪挾火上攻肺經而為痰下走空竅而為利內亂

譏語者以正被火氣

故也其其小便必難蓋肺傷而膀胱氣化水穀不分凡此皆以強責少陰之汗故也

少陰少血強責其汗是劫奪其血也小便難者

源先竭也○少陰病強汗則小便必難誤下則

小便不利直視失溲可見腎以膀胱為府藏病

則府未有不病藏傷則府先已告絕也傷寒證

中云直視譫語循衣撮空小便不利者其人可治

是少陰藏氣之絕不絕全於小便之利不利別

之耳

傷寒分經

卷五中

春溫中篇

五

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微似陰盛之

則手足必厥而手足反溫脈緊反去者則陽氣已

退脈不夫今為欲解也雖其人煩不安其下利必自愈

邪在陰者多自利自利則邪氣痛正氣而脫者

多矣其候必脈緊數而四肢逆冷今脈緊去而

但微則陰邪已散手足溫則真陽未傷雖有心

煩下利之危急而可直決為必愈矣○此與邪

在陽脈數而熱得汗而脈和身涼數去為欲愈

之意同然陽病輕而從汗解則易陰病重而從

利解則難所以仲景於陽邪內陷下利不止之證惟用逆流挽舟之法挈裏邪還之於表則利不治而自止矣

八少陰病以發熱為八九日陰邪內解之時一身手足盡熱者以藏邪傳移熱在膀胱之內故使邪散之

通當二陰竅以出必便血也

膀胱為腎之府腎邪傳於膀胱則裏熱達表故一身手足盡熱也太陽多血為熱所亂則血出於二便然比之少陰少血悞動其血而從口鼻

傷寒分經 卷五中 春溫中篇 六

九耳目出者則天淵矣○熱邪雖從便血而解經年調理陰氣難復况既開脫血一竇漫無止期何如一身手足方熱之頃預識其所必至而急圖之於早耶奪膀胱熱用桂枝大黃入五苓散少陰病上逆欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者虛故引水自救口燥舌乾證具小便色反白者下焦虛有寒也勿認為熱以致悞

冬不藏精之證此一段最有仲景早已欲人辨

識之矣

于病人脈陰陽俱繁此傷於寒宜反汗出者無陽以

護其外所以邪也此屬少陰其經不經之證一

冬不藏精之證此一段更有少陰為水藏吐利者陰盛而水無制也

溫經散邪一法 麻黃附子細辛湯 麻黃附子

甘草湯 詳前解

溫經一法 附子湯 治得病一二日口中和背惡

傷寒分經 卷五中 春溫中篇 七

急溫一法 四逆湯 治有寒邪深入於裏者

通陽一法 白通湯 治陰寒下利之證

白通加豬膽汁湯 治下利脈微者

通脈四逆湯 治下利清穀裏寒外熱手足厥逆

通脈四逆湯 治下利清穀裏寒外熱手足厥逆

<p>清解一法 四逆散 治四逆或腹中痛或泄利</p>	<p>急下二法 大承氣湯 治三二日口燥咽乾者</p>	<p>和陰一法 黃連阿膠湯 治心煩不寐者</p>	<p>溫經鎮水一法 真武湯 治腹痛小便不利或咳或喘</p>	<p>傷寒分經 卷五中 春溫中篇</p>	<p>灼艾助陽一法 附子湯 治手足不逆冷者</p>	<p>桃花湯 治二三日利不止</p>	<p>溫胃一法 吳茱萸湯 治吐利手足厥</p>
---	---	---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	--

<p>清咽一法 苦酒湯 治咽中生瘡</p>	<p>分利一法 豬苓湯 治下利不止</p>	<p>傷寒分經 卷五中 春溫中篇</p>	<p>清咽一法 甘草湯 治咽中不利</p>	<p>分利一法 豬苓湯 治下利不止</p>	<p>清咽一法 半夏湯 治上風</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

傷寒分經

卷五下

春溫下篇

三

甚乖離尚可調其偏以協於和之意設惡寒而
踧又加下利手足逆冷則無陽而偏於陰矣更
加脈不至不煩而躁則陽去而陰亦不存矣所
以用藥全要臨時校量果其陰盛陽微即以溫
為主果其陽盛陰微即以下為主果其陰陽錯
雜溫下兩有所礙則參伍以調其偏勝為主也
當從表解之義前已申明然亦必邪勢雖熾陰
陽尚未全虧方可溫經散邪若夫滋蔓難圖任
行背水之陣必無僥倖矣此等處皆是危疑關

頭雖仲景之聖不敢輕出一方以膠治法之圓
機所貴明理之彥師其意而自為深造耳

附治金鑑傷寒死證奇驗

此證不見經語無倫皮腐汗出而喘者皆死治
無一功未敢於余余曰此證與兩感傷寒無異
幸為春溫病不傳經致難邪氣兩感傷寒亦必
多延幾日待元氣竭絕乃死觀其陰證陽證兩
下混在一高治陽則陰不治陰則陽不治然日發
之病情有自仲景原則死證不治法在人神而明之未
嘗攻裏本自不同又曰法在人神而明之未
嘗教人執定勿藥也吾有一法在人神而明之未
生變化行鬼神之意必可効也於是自製黃附

傷寒分經

卷五下

春溫下篇

四

汗而熱全清再以附子瀉心湯兩解其在裏陰
陽之邪果然胸膈柔活人事明了諸證俱退次
少陰中風若陽反微者外邪已入陰反浮者內邪已
出為欲愈之候否則陽浮陰沉
觀此條而認脈辨證之機亦甚彰著矣陽微陰
浮為欲愈則病發之時陽盛陰緊可知也陽盛
則先治府陰盛則先治藏既盛且緊則參之外
證以分緩急倘陽已微而陰不浮者更當治其
陰倘陰已浮而陽不微者更當治其陽也

今擬冬傷於寒兼冬不藏精之證名曰兩感

溫證

傷寒少陰證是從三陽經中傳入者此證乃腎與
膀胱經一藏一府自受之邪故與三陽傳入之例
多不合惟兩感之例一日太陽受之即與少陰俱
病其例昭然仲景又不立治法但曰有先後
發表攻裏本自不同是則一藥之中決無兼治兩
經籠統不清之法矣而治有先後於義何居蓋嘗
思之傳經之邪先表後裏直中之邪但先其裏溫

證之邪裏重於表兩感之邪表裏不可預擬惟先論其偏重之處假如其人腎水將竭真陽發露外現種種躁擾之證再加以治太陽之邪則頃刻亡陽而死矣是必先溫其在經之陽兼益其陰以培陽之基然後治太陽之邪猶爲庶幾也此則與少陰宜溫之例合也又如其人平素消瘦兼以內鬱之邪灼其腎水外現鼻燥舌黑種種枯槁之象加以再治太陽之邪則頃刻亡陰而死是必急下以救將絕之水水液既回然後治太陽之邪猶爲庶

傷寒分經

卷五下

春溫下篇

五

幾也此則與少陰宜下之例合也又如其人邪發於太陽經者極其勢迫大熱惡寒頭疼如劈腰脊頭項痛莫移胸高氣喘種種危急溫之則發斑發狂下之則結胸識語計惟有先從太陽經桂枝之法解之解已然後或下或溫以去其在陰之邪也此則當用太陽經之表例而與少陰可汗之例略同也詎非先後攻發之可預擬者耶但兩感傷寒之攻裏取攻上原不兼溫兩感溫證之攻裏亡陽之候頗多不得不兼溫下而擬之也此又變

例而從病情者也

按亡陽一證在傷寒則候發太陽經汗與陽發少陰經汗多見之可見兩感之溫證爲太陽少陰受之邪設舍溫經散邪之法而單用汗藥者其亡陽直在頃刻間耳蓋陽根於陰深居北方腎水之底素不藏精之人真陰既耗則真陽之根淺而易露若不以溫經之法默護其根而但用甘溫發散之藥是以陽召陽隨感即起不待蓋覆而即淋漓不止矣真所謂斷根湯也

傷寒分經

卷五下

春溫下篇

六

按亡陰一證在傷寒則邪傳陽明當下而不下致津液暗枯邪傳少陰當下而不下致腎水暗枯其亡也以漸尙有急下一法可救若在不藏精之溫證則腎水已竭於先而邪發之日陰邪必從下走勢自下利奔迫是下多允足亡陰而又絕無補法可以生陰金匱云六府氣絕於外者其人惡寒五藏氣絕於內者則下利不禁藏者陰也陰氣欲絕豈非亡陰之別名乎故淫雨而求杲日尙易大旱之得甘霖爲難神哉仲景之書既詳不藏精之證

又出不藏精之治特未顯然擊示後人不維其義耳即如桂枝一湯本為太陽之中風設也而汗下和溫早已具于一方之中至於溫法尤為獨詳如加附子人參白朮乾薑甘草桂心茯苓龍骨牡蠣等類豈太陽表證中所宜有乎惟病有不得不先溫經又不得不兼散邪者故以諸多溫經之法隸於桂枝項下一方而兩擅其用與麻黃附子細辛湯同意凡遇冬不藏精之證表裏之邪交熾陰陽之氣素虧者按法用之裕如也仲景立方於四達傷寒分經

卷五下

春溫下篇

七

之衢會心於衆妙之府雖賢哲輩出究竟表章不盡後之業仲景者各盡其心各抽其緒毋以見聞而自窒靈悟也斯可矣

論用桂枝湯宜加益陰藥以匡芍藥之不逮仲景用桂枝湯以和營衛而解肌此定例也不但為太陽經受邪之本藥即少陰之宜汗者亦取用之其最妙處在用芍藥以益陰而和陽太陽經之營衛得芍藥之酸收則不為甘溫之發散所逼而安其位也至若少陰則更為陰藏而少血所以強

逼少陰汗者重則血從口鼻耳目出而竭蹶可虞輕亦小便不利而枯涸可待用藥自當比芍藥之例而倍加益陰以和陽余每用桂枝湯必加生地黃以匡芍藥之不逮數十年來功效歷歷可紀蓋得比例之法也○用桂枝湯治溫病勢必佐以辛涼而不藏精之證屬在少陰不得不用桂枝之溫以解之以少陰本陰標寒邪入其界非溫不散也豈惟桂枝甚則麻黃附子亦用所貴倍加益陰以輔之如芍藥地黃豬膽汁之類是也今人未達此傷寒分經

卷五下

春溫下篇

八

理但知惡藥性之溫藥以羌獨柴葛為表則是治三陽而遺少陰屢表而病不除究竟莫可奈何而病者無幸矣

桂枝領邪一法 桂枝加生地黃湯

清表溫中一法 桂枝加入參湯

清陽瀉火一法 桂枝加大黃湯

脈浮先表一法 桂枝湯

先溫後表一法 下利清穀不止身疼痛者先用四逆湯急救其裏救後清便自調

但身痛者隨用桂枝湯急救其表此見下多則陰邪亦從陰解故溫後但解其陽邪不必兼

陰為

溫經止汗一法 桂枝加附子湯

汗後惡寒一法 芍藥甘草附子湯 收陰固陽以治其表虛

下後惡寒一法 桂枝湯去芍藥加附子 以治其陽虛

汗後惡熱一法 調胃承氣湯 治胃中乾實

汗後裏虛一法 桂枝新加湯 治汗後身疼痛脈沉遲

汗多發悸一法 桂枝甘草湯 治心下悸欲得人按

茯苓桂枝甘草大棗湯 治悸

汗後腹脹一法 厚朴生薑甘草半夏人參湯

傷寒分經 卷五下 春溫下篇 九

晝夜靜躁一法 汗下後表虛惡寒裏虛脈微細日晝黃陽為主宜乾薑附子湯

悞汗變逆一法 本脈浮而汗出心煩微寒胸中煩乾煩躁逆者乃陽虛而陰獨盛也先與甘草乾薑湯以復其陽後以桂枝湯加黃芪即愈

甘草乾薑湯以復其陽後以桂枝湯加黃芪即愈

而汗後惡寒大者但用四逆湯以溫其陽而不可兼陰

為治也

溫經散邪諸法入第一例者此不重錄前例俱可

參酌互用 附辨溫證合偶感之客邪以明理而闡謬

春溫夏熱秋涼冬寒各主一氣者其常也然天氣

不可以常拘所以夏氣亦有淒清之時冬氣亦有

燠熱之時凡此皆謂之客氣也本溫證而重感於

寒其病即兼冬氣而為溫瘧本溫證而重感於熱

其病即兼夏氣而為溫毒本溫證而重感於時行

不正之氣其病即兼不正之氣而為溫疫原無所

謂變也乃謂某病忽變某病不令人炫且駭乎又

且長夏之溼氣春分後早已先動最能與溫氣相

合而成溼溫之證何以四證內反不並舉又且溫

瘧一證內經明說是冬月邪入骨髓至春夏始發

何得妄說春月重感於寒又且更遇於風變為風

溫一證乎蓋春月厥陰風木主事與時令之溫不

得分之為風凡病溫者皆為風溫之病也試觀仲

景於冬月之病悉以傷寒之名統之其感發之風

寒栗冽之氣寒總為一寒則春月之風寒風熱風

溼總為一風并可知也夫風無定體在八方則從

八方在四時則從四時春之風溫夏之風熱秋之

風涼冬之風寒此自然之事也仲景於溫證篇中

即特揭風溫之名以綱眾目其斯義之精為何如耶顯明道理一經後人之手便將風與溫分之爲二況於精微之奧乎茲特辨之以見治溫之法切近平易而非有奇特耳

溫瘧主治之法溫瘧病尺寸俱盛先熱後寒宜小桂湯但寒不熱宜柴胡桂枝湯寒後熱宜小柴胡加

桂湯但寒不熱宜柴胡桂枝湯寒後熱宜小柴胡加素宜白虎如津液未傷有汗多煩渴小便赤澀嘔吐甚者宜五苓散

溫毒主治之法溫毒爲病最重溫毒必發斑宜人參白虎湯若欲清熱涼血者宜黑膏

傷寒分經 卷五下 溫病合參 土

溫疫主治之法溫疫病陽脈濡弱正虛也陰脈弦緊邪實也正虛邪實則一團外邪

內熾莫能解散病固纏身爲累而不藏精之人觸其氣者染之尤易所以發表藥中宜用人參以領出其邪寓意草中論之已悉

溫證治入夏三月此不贅

小兒春月病溫亦分爲三例

小兒冬月深居房幃觸犯寒邪者恆少而知識未開天癸未動又無不藏精之事然亦有溫證三例可互推者經云水穀之氣感則害人六府或因啖乳而傳母熱或由飲食而中外邪皆從陽明胃經

先受由陽明而外達太陽即與溫證之第一例頗同而平素脾氣受傷者邪氣入胃復乘其脾虛而客之即與溫證之第二例頗同既陽明胃與太陰脾相連之一藏一府交合爲病正傷寒兩感證中

二日陽明與太陰受之則腹滿身熱不欲食識語之證與溫證之第三例分經雖不同而兩感則頗同也後人造爲小兒八歲以前無傷寒之說以悖

理叛道凡一切外感俱妄立驚風之名擅用金石重墜反領外邪深入百無一活寓意草中已略辨

傷寒分經 卷五下 小兒春溫病 土

其端但未詳其治也試觀中風卒倒之人邪中脾中之大絡則昏迷不醒然則邪熾太陰脾經勢必

傳於大絡其識妄而不知人者夫豈驚風之謂耶祇有慢脾風一說似乎近理然不以外感之名統

之則用藥茫無措手茲特比入春溫之例庶推之以及四時而治悉無忒矣

小兒春溫證第一例

由陽明而太陽自內達外皆是表證但表法原取解肌而不取發汗況於小兒肌膚嫩薄腠理空虛

所無發汗之理仲景於太陽之項背強凡反汗
出惡風者用桂枝加葛根湯極得分經之妙桂枝
湯主太陽葛根湯主陽明以類推之太陽證多陽
明證少則用桂枝湯加葛根陽明證多太陽證少
則用葛根湯加桂枝圓機在乎臨證然頸項肩背
正二陽所轄之地不明經絡者見其凡几然牽強
不舒加以目睛上竄手足反張諸多太陽見證而
驚風之名自此始矣詎知仲景云身熱足寒頭項
強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭搖卒口噤背反
傷寒分經 卷五下 小兒春溫病 三

張者瘧病也發熱無汗反惡寒者名剛瘧發熱汗
出不惡寒者名柔瘧又曰太陽病發汗過多因致
瘧可見不解肌而誤發汗者必有此變又可見汗
沾衣被旋復內滲者必有此變當解肌而不當發
汗之義顯然矣然則小兒之解肌不更當從乎輕
劑耶小兒服桂枝湯不必啜熱稀粥并不可急灌
逼其大汗也凡小兒發熱喉吐者倘未佈痘即須
族之子忌服不審每服香砂平胃散極効一久
發作嘔服前藥滿頭紅筋錯出斑點密攢筋路
齒寒返齒虛發作嘔乃父授以霍香正氣散一久

舌上生三黑疔如突一形舌下生四疔如牛乳
形而沒蓋痘邪正出而截其路凶變若此姑述親
見二則於治胃經感邪之末以垂戒焉

解肌清熱一法 桂枝湯 桂枝加葛根湯 葛根湯

攻裏救胃一法 調胃承氣湯 不著席脚掣急必

誤攻邪陷一法 桂枝加芍藥湯 治下後腹

小兒春溫證第二例 由陽明而太陰自表入裏仲景云太陰之為病腹

滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸

中結鞭可見脾氣虛衰不能為胃行其津液者必

致吐利兼見此俗子藉口慢驚風之源也豈知外

感之邪入乘其虛上吐下利者即霍亂之意正氣

既虛兒因畏怯則有之豈是心虛發驚肝木生風

之候耶此等處認證一差用藥不當萬無生理蓋

脾經之證自有脾經之專藥況於屬在外感仍以

散邪為先所以誤下則心下結硬正謂邪雖已入

太陰而陽明未盡除者恐有表證相碍也

解肌之法 桂枝湯 桂枝湯 桂枝湯 桂枝湯

仍用解肌之法送
出其邪為常也

溫裏之法

四逆湯

自利不渴者用
以換上燥濕

理中湯

濁氣上干胃服
腹滿者用之

攻下之法

桂枝加大黃湯

大實痛者用之然芍
藥大黃亦當倍減以

小兒胃薄
易動也

小兒兩感溫證第三例

胃與脾一府一藏表裏雙受則在表者為陽邪然

既已入於胃便當愛惜津液即不得已而解肌清

熱不可輕動其汗所最難者要在急溫急下審諦

傷寒分經

卷五下

小兒春溫病

主

不差蓋胃實兼以脾實則二火交熾水穀之陰立

盡其口燥咽乾鼻燥之證皆枯槁之應耳胃虛兼

以脾虛則胃中之津液不自行而脾不復為胃行

其津液其吐而且利者積滿而上下溢出耳所以

急溫則兩經之陽俱存急下則兩經之陰俱存也

兩經原具四證曰腹滿曰身熱曰不欲食曰譫語

在傷寒則陽邪為多在小兒則陰邪為多故遇當

溫之證即七八日傳臥不醒必俟溫後陰證轉陽

則自生矣

分理陰陽之法

理中湯

或加附子或加黃連或
加枳實相陰陽虛實之

較偏者而
加用之也

養胃健脾之法

四君子湯

五味異功散

六君子湯

醒脾驅風之法

烏蠅四君子湯

急下存陰之法

調胃承氣湯

解毒生陰之法

黃連阿膠湯

通用諸法

於大人溫證第一例參酌

傷寒分經

卷五下

小兒春溫病

去

附會講溫證語錄其六則

上堂師嘉言老人第一會語錄

會講刺熱

篇溫論述上古經文一段

上古醫者其時首春其證首溫先師祖僦貸季所傳先師岐伯述之者也首引太陽之脈色榮顴骨榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病內連腎少陽之脈色榮頰前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死凡十五句七十字岐黃之庭宗旨曉傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

七

然至後世則內經且闕況上古乎所以釋者極悖理不成說吾徒會講宜首析其義凡人有病其色必徵於面而熱病尤彰內經本篇謂肝熱病者左頰先赤心熱病者顏先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤是五藏熱病色且先微突然五藏隱深其色不宜外見纔見微色隨刺俞穴蚤瀉其熱名曰治未病待病治之遲矣靈樞謂赤黑色忽見天庭大如拇指者不病而卒死劇則非刺所能挽矣惟陽經脈色顯而易見初

起熱徵於面此時漫無凶咎太陽脈色榮飭於顴乃久邪內伏其春發溫必始太陽經脈紅赤熱色先見兩顴如以采飭熱之先徵也榮飭之色止顴骨一處不交他處病之淺者也古經榮未交曰今且得汗待時而已少雷聽其自解此真訣也大凡溫病熱自內出經氣先虛雖汗之多未汗解故云今且得汗待時而已太陽經氣虛者必待午未正陽某日當空羣陰見現太陽經邪不畱而盡出也少陽經氣虛者必待寅卯初旭出震繼離煥然一

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

大

新少陽經邪不畱而盡出也註謂肝病待甲乙解心病待丙丁解此五藏經文與三陽經全不相涉何混之耶至於與厥陰脈爭見者死咸謂外見太陽赤色內應厥陰弦脈此則如隔千山矣秦漢以後始分二十四脈弦謂少陽可也厥陰亦可也大浮滑數入陽弦可也沉濡微弱入陰弦可也弦脈陰陽兩屬安得指為死脈且三日之促耶古義斷不其然上古理脈色而通神明謂上帝之所貴也先師之所傳也色以應口脈以應月先師已傳其

要矣後人曷不傳其要耶諸君倘有未徹吾徒請一述之色以應日者舉頭見日隨處長安晶光萬道人身之色無幽不燭同也脈以應月者千江有水千江月地脈潛通人身之脈環會貫通同也脈榮顙骨即色榮顙骨縱一見之表裏兩符豈非日月合璧耶如太陽顙骨色脈同時解散則不成溫熱病矣病則色脈同時俱見矣太陽榮顙骨少陽榮顙前厥陰榮顙後少陰榮兩頤乃至十二經脈色大絡小絡隨病彰灼一瘡一座色脈不相離也

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

九

道在下合五行休王上副四時往來何吾人自小之耶所以太陽厥陰兩陽同時並交榮飭此纔名為爭見若只而呈一部豈爭見乎爭見赤紫滯晦傳經勢重已為主死爭見青黑尅賊十死不救矣蓋太陽水而生厥陰木則發榮滋長光華畢達固有善無惡也厥陰木而孕太陽水則子藏母腹勾萌盡缺亦默庇其根也今外邪入而真藏遍見於面夫是以死耳其熱病內連腎身內百司庶職惟腎獨為政府安則宅神根本危則顛覆濁亂生死

出入莫不由之太陰厥陰祇稟其成難干之矣然不曰少陰而曰腎者少陰傳走經脈腎則專主內藏經謂過在少陰甚則入腎同一義也太陽厥陰爭見主死牽連腎氣在內以少陰為厥陰母木勢垂危求救腎水腎水足供尚可母子兩全腎水源流並竭不母子俱斃乎可見神去則藏敗藏敗則爭見黧黑豈脈色不由根心也哉釋謂木之生數三故死期不過三日以生數定死期謬甚果爾水數一土數五其死主一日五日耶內經明謂死陰

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

十

之屬不過三日而死何以生數妄解乎下文無期不滿三日反誤古脫增入五字駭觀總因死陰之屬不審其義故擅複之耳少陽之脈色也六字亦擅增入少陽之脈色榮顙前熱病也榮未交日今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死謂右頤前見赤色未交他處待汗自己若兩頤黑色與少陽赤色爭見則死也少陰經敗甚必入腎腎藏發露泉之竭矣無陰以守之矣少陽相火少陰真火上下交焚頃刻俱為灰燼誠劫災也傷寒傳經勢重

間有回大之手至於溫證腎中枯槁無救頰頤紫黑已死惡痕縷縷不散此獨無陰如大火聚安得紫府丹臺授以太陰神水予吾徒同志濟列彼之泉自同援古經之法傳心無負此番提命可矣

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

三

上堂師嘉言老人第二會語錄 會講評熱
論病溫經文一段

岐伯論溫勝義微茲今始深解之也黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何岐伯對曰病者陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪卻而精勝也精勝則常能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

三

能食者精無存也病而謂者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也此段論溫獨創穀氣之旨穀氣化精精氣充乃為汗身中之至寶至寶者也穀氣為疾病之總途生死之分界羣萬理為一言誰能外之內經謂精者身之本也故藏於精者春不病溫是則藏精之人外邪不入身如藥樹有病不生矣即不然冬藏已敵春溫

積貯爲命。主張蚤計。在是胡乃泥沙擲之耶。泥沙
擲之。其後則腎虛甚而溫死矣。尺熱甚而溫死矣。
穀氣既餒。轉輸不給。關門閉而水穀難通。大事去
矣。况腎虛尺熱。一呼脈三動。一吸脈三動。而躁準
平人十二時脈。更增四時三日促爲一朝。再促則
脫而不續矣。所以狂言失志。脫精則死。以此故也。
上古中古。兩大聖神如出一手。倒說豎說。變化生
心。萬理淵源。爛然生色。千載以後。乃至傳爲土苴。
不論不議。奈之何哉。吾徒七十有五。始知理障稍
傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

重

盡矩則昭然。茲時不言。更待何年耶。岐伯言陰陽
交。交者死。黃帝願聞其說。岐伯但發穀氣之妙。至
陰陽交一言而終。不更再舉。向者胸爲疑府。今乃
知穀氣之肯。既明。則陰陽交與不交。了然定矣。上
古榮未交。證之輕者。榮交陰重。且死者。中古冬傷
於寒。春必病溫。證半輕者。冬不藏精。腎虛尺熱。重
且死者。聖神心印。妙義大開。變化錯綜。愈出愈奇。
上古太陽與厥陰爲偶。少陽與少陰爲偶。而陽明
太陰雖不言之。而其相偶。更定位也。中古太陽與

少陰一府一藏。獨主其重。蓋太陽主外。少陰主內。
太陽司陽經之溫。少陰司陰經之溫。太陽交少陰
少陰交太陽。陰陽交而死矣。然掌上意珠。不敘其
交。若隱若顯。俟之後人。何乃竟成絕學耶。岐伯妙
翻千古。變證若相忤。而實相成。賢智不識其肯。况
庸人乎。謂一陽搏其病溫。死不治。不過十日死。乃
陽經榮未交之輕證。而舉爲死不治。必有其說。言
二陽搏雖未入陰。病溫至極。必死不治。稍延不過
十日死。較三日死陰之屬。少饒其期耳。二陽者。手

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

重

大腸足胃。手經足經。並主陽明。金土燥剛。亢熯陰
絕。胃穀腸津。水穀將絕。乃至腸胃如焚。縱延多日。
究竟不得不死。至上古足陽明胃。足太陰脾。一陽
一陰。雖不相錯。而相偶然。吾徒榮未交。待時汗已。
經氣虛者。辰巳經王。汗乃盡解。必然之理也。門人
有蓄疑義。謂脾胃以膜相連。耳脾胃榮交相連。直
是易易。所以上古不言之也。予曰不然。傷寒傳經
如膽藏肝葉。豈不表裏相合。然必少陽膽乃傳太
陰。再傳少陰。乃傳厥陰。繞經而走。不能直截合膽。

也。今陽明胃乃傳少陽膽，少陽始傳太陰，遽經傳次亦然。固知陽明太陰交與不交，各分疆界矣。而顙頰後榮交相爭，部位不遠；頰前與頤榮交相爭，部位不遠；頰中鼻準榮交相爭，部位不遠。必至榮交不分，乃為死也。至於太陽少陰陰陽正交，吾徒更深言之。內經兩感證：一日太陽少陰，二日陽明太陰，三日少陽厥陰，三日死。由是論之，與溫證微不相同。溫證一日太陽而交少陰，有十分交者，有五分交者，有一二分交者，所以溫證太陽少陰本傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

重

而傾也。又曰：今見三死不見一生，雖愈必死也。然則陰陽交者死，予向以為一言而終隨病隨死之候，幾悞一生。牆面惶汗常慄然之矣。立志奇男子，冬至閉關儲蓄，內實立非第一義乎。

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

美

上堂師嘉言老人第三會語錄

會講傷寒

論中論溫證一段

上古中古首重溫證民生最賴之矣周秦以降如扁鵲越人起家數輩各樹偉義經緯裁成後代宗匠至於溫證絕不言之由是論溫證傳失乃至人去書存幾千百年黯然無色漢末張仲景前聖後聖同符一揆其著傷寒論雖述實爲作也三百九十七法一百一十三方其功遠紹軒岐於中溫證一法劃然天開步步着實繹傷寒家成朱十餘傷寒分經

卷五下 會講溫證語錄

七

輩義例多獲獨溫證從不知爲何事由晉至今竄入者叛竊指爲聖神傳心庸陋者并蛙誣爲同儕小視予步趨仲景至老不輟諸公會講大舉溫證欲建當世赤幟老人曷能任此然既壹志和衷細求名理貞識協贊一番設施傳茲西昌勝事俾仲景寒灰火傳老人將沒世望之矣太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病卽內經冬傷於寒春必病溫之說謂冬寒久鬱太陽經受肌表營衛上之與冬月驟病發熱惡寒且不渴者證則不同故春月寒

繼既久發熱而渴不惡寒自內出外與上古榮未交待汗自解同義其證不過下之一二耳若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫證少陰冬不藏精與太陽病隨時忽至勢則病之八九矣風溫與風傷衛又不同中風脈浮弱獨主太陽風溫脈尺寸俱浮兼主太陽少陰腎水本當沉也風溫載之從太陽上入根本撥而枝葉繁矣春月木長勢強吸汲腎水已爲耗虛加以風溫之病俄頃少陽相火厥陰風木風火熾然能無殆乎故若發汗已四字包

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

天

括錯悞見醫未病之先及得病之頃須診足太陽足少陰一府一藏此千古獨傳妙訣也診之辨其有無伏氣有伏氣者冬寒太少二經久伏身中時當二月其病先見露矣發則表熱太陽與裏熱少陰將同用事恣汗無忌灼熱反倍是爲風溫風溫表裏俱見浮脈其證自汗身重腎本病也多眠睡鼻息鼾語言難腎本病也腎中之候同時薦至危且殆矣古律垂戒云風溫治在少陰不可發汗發汗死者醫殺之也詎意發熱之初不及脈理輕易

發汗蚤已犯此大戒生命可輕試乎手既腎中風邪外出以陽從陽熱無休止矣被下者小便不利傷其膀胱氣化直視失溲太陽藏府同時絕矣被火微發黃色劇如驚痛時瘕瘕火熱亂其神明擾其筋脈也傷寒燔鍼灼艾仲景屢戒至溫證尤當戒之被火微發黃色一段亂其神明擾其筋脈重證莫重於此稍輕者悞火少陰脈系咽喉乾痛乃至唾血亦多死者如何妄人喜火如晉崔文行劫灰億兆能不寒心耶一逆發汗已是引日待斃再

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

三

促聖神莫挽矣故治溫病喫緊在未發汗前辨其脈證補救備至防危可也發汗以後凶咎卒至亦何措其手足哉上古論溫榮交以後其病內連腎中古論溫專論穀氣腎中精勝乃汗則生腎中虛甚更熱則死其言至矣盡矣即叔季復有聖出論溫別無剩義仲景出不盡之藏論腎更御膀胱以緯之小便傷膀胱氣化甚則直視失溲謂太陽入絡膀胱命門穴中者藏精光照兩日直視則光絕矣瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕太陽氣

絕者其足不可屈伸是則太陽之脈其終也有五大證戴眼反折瘕瘕色白絕汗太陽關格豈不最操其重哉所以中風暴證多絕膀胱人不識者故風溫扼要膀胱若腎藏將絕寧不膀胱死絕乎因是吾徒敢論太陽春溫受證雖不類夫風溫然陽熱勢極腎吸真陰上逆地道不通亦成太陽死證蓋由誤發其汗致少陰隨之上入大類內經風厥同也內經巨陽主氣故先受邪少陰與其為表裏也得熱則從之從之則厥也瀉陽補陰是則能治

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

三

風厥多不死者然而中風風溫風厥太陽纔涉三風見證總當同護陰之根底勿使陰不內守勿使陽之上厥百凡封蟄不露乃可需其正汗風始熄也必能若此乃為瀉陽補陰之妙若陽邪狂逞少水不能勝火虛風洞然果何為哉

上堂師嘉言老人第四會語錄 會講溫證

自晉至今千年絕學一段

仲景叔季天生聖人其道如日月之明無斂之矣叔和何如人也以爲得統而學聖人之徒則由官牘而升堂入室言聖人之言行聖人之事仲景世世賴功臣矣異哉叔和乃以序例插入論中如呂不韋之奇貨豈非竊耶叛耶今且譚從前英賢過信叔和之弊以明醫學繼續升天之難也叔和爲晉太醫令一時醫流旣以淺陋更甚荒唐如西晉傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

三

崔文行謬傳解散溫法用桔梗細辛白朮烏頭四味後世奉爲靈寶更增附子名老君神明散更增螢火名務成子螢火九托老君務成子售欺妖妄極矣後代朱肱活人書具載其方確信以爲有見時疫爲寒疫故謂陰毒傷寒所以久崇之耳及以毒攻毒受劫必死朱肱復改聖散子仍用附子而表裏香燥同之東坡學士在黃州見其隨施輒效載之集中後世又以過信坡公殺人多悞詎知坡公集中朱肱已三改其方始用敗毒散不用熱藥

厥功少減前罪然雖改易其方不識聖神心法竟無益矣朱肱論傷寒註釋頗合聖矩但其論溫傳派不清違悖聖言未可枚舉如仲景謂太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病朱肱謂夏至以前發熱惡寒頭疼身體痛其脈浮緊者溫病也仲景所言者冬月感寒至春始發之溫病朱肱所言者春月病溫重感於寒之變病苟朱肱立百法以治正病外立一法以治變病於理甚融乃千百年絕人絕世從未論溫正病卽指爲正病又皆爲邪說妖言傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

三

所以其法其方咸入室操戈也叔和云更遇溫熱變爲溫毒朱肱卽云初春發斑咳嗽爲溫毒吳綬謂傷寒壞證更遇溫熱變爲溫毒乃以溫毒爲壞證亦宗叔和序例依舊壞證而治之也朱肱吳綬頃篋迭奏於叔和之庭正乎邪乎潔古傷寒名家或叔和變法則亦不爲正矣其子雲岐竟指叔和信爲經言謂經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經之所在而取之凡傷寒汗下不愈過經其證尙在而不除者亦溫病也太陽證汗下後

過經不愈。診得尺寸俱浮者。太陽溫病也。身熱目疼。汗下後。過經不愈。診得尺寸俱長者。陽明溫病也。六經過經不愈。各現本證。本脈俱為溫病。是故隨其經而取之。將傷寒過經不解。扯入溫病。夢魘迷心。直易耳。趙嗣真謂仲景所云。重感異氣。變為他病者。即索矩所謂二氣三氣雜合為病也。朱肱謂仲景云。冬溫之毒。與傷寒大異。汪機謂仲景云。遇溫氣為溫病。遇溫熱為溫毒。不知仲景幾曾有是言哉。叛逆相承。諸多推戴。仲景黃袍加身。倒傷寒分經。

卷五下

會講溫證語錄

重

絕倒絕矣。巢氏病源宗序例四變。用崔文行解散法。龐安常亦然。治法初用摩膏火灸。二日法鍼解。散取汗。不解。三日復汗之。又不解。四日用藜蘆丸。微吐。愈。不愈。改用瓜蒂散。吐之。解。向未了者。復一法。鍼之。七日熱已入胃。乃以鷄子湯下之。巢龐比匪極矣。後安常自撰微言。有和解因時法。於春分夏至前後。一以和解為主。增一味減一味。即名一方。豈始崔文行蜂螫螯手耶。然只定不移。移則蹶矣。李思訓亦用和解。海藏謂二公當宋全盛其

法明哲莫踰。然欲汗不敢欲下不敢。遷延眇法。無可奈何矣。大率委置聖言。傳會多口。幾千年來。祖孫父子。一派相承。盈庭聚訟。各逞其端。而未已也。丹溪究心雜證。不事仲景。遇外感。宗東垣補中益氣。兼行解散。終非正法。况感異氣之說。決擇不精。然既外感。不習獨主雜證。何由登峯造極。耶。東垣不解傷寒。正治蓋一生精神在內傷也。乃由內經深入至理。發出冬溫春溫二義。真千百年之一人也。云冬溫者。冬行春令也。常寒而溫。火盛而水虧。傷寒分經。

卷五下

會講溫證語錄

重

矣。水既已虧。則所勝妄行。土有餘也。所生受病。金不足也。所不勝者侮之。火太過也。火土合德。溼熱相助。故為溫病。又云。春月木當發生。陽以外泄。孰為鼓舞。腎水內竭。孰為滋養。生化之源既竭。木何賴以生乎。身之所存者熱也。時強木長。故為溫病。此二則溫證從內經立說。入理深譚。不闕叔和叔和自妄蓋時。強木長腎水不足。供其吸取。故為溫病。較叔和三月四月不為寒折。病熱猶輕。五月六月為寒所折。病熱則重。盛夏寒折。倒見不成事理。

東垣一則冬溫妙義一則春溫妙義幾千年來獨步
悟入偉哉偉哉賢關肯肯此老矣上堂展敬執香
一拜每舉二則令諸公朗誦虛懷勵志極深研幾
吾爲日考月課引之於前督之於後西昌一派
天外傑出是所望矣

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

重

上堂師嘉言老人第五會語錄 會講溫證
正名辨脈之要一段

仲景祖素問熱論作傷寒論以傷寒皆爲熱病也
然於冬月正病禁詳而春溫夏熱則但通大意比
類一二惟風溫溼溫二證春司風溫夏司溼溫獨
主其重千古不易也前第三會已論風溫之戒矣
今舉溼溫言之傷寒溼溫其人嘗傷於溼因而中
暈溼熱相搏則發溼溫苦兩脛逆冷腹滿又胸頭
日痛苦妄言治在足少陰不可發汗汗出必不能
傷寒分經 卷五下 會講溫證語錄 美

言耳聾不知痛所在身 面色變名曰重暈如此
者醫殺之也然風溫二 指爲醫殺叔和當時既
凜若斧鉞不敢妄干何忽又插入重感異氣變出
四證以誑惑後人曰脈陰陽俱盛重感於寒者變
爲溫瘧陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變爲風溫
陽脈洪數陰脈實大更遇溫熱變爲溫毒陽脈濡
弱陰脈弦緊更遇溫氣變爲溫疫真乃指鹿爲馬
天下後世以爲仲景若此叔和不得不若此渾如
廟祝尸之矣予既自任仲景之徒不得不重折其

妄蓋溫瘧風溫溫毒溫疫四變總由不識仲景風
溫溫溫二大證耳明二大證無不明也風溫爲少
陰證微分太陽厥陰即溫瘧亦該少陰統屬素問
謂冬傷於寒藏之骨髓遇大暑內灼髓空而發溫
瘧此正理也若重感於寒而變瘧無是事也即有
之先治其寒瘧再治其溫乎抑一案同結之乎無
端插入不了之局真醜婦效顰巧言簧鼓耳至溼
溫一大證從不言及則是夏月竟無著落矣詎知
溼溫即疫證亦該在內溼熱至盛長幼相似則疫
傷寒分經 卷五下 會講溫語錄 三
矣疫亦暑溼之正法也其外感發瘧證之輕者也
今脈反加重而證變輕何以得此耶至溫毒則證
之重者陰更重砌出脈狀洪數實大有之其人
元氣實盛可堪入汗大下外邪立解何至發爲溫
毒乎且陽毒若此其陰毒又何脈耶謂陽脈濡弱
陰脈弦緊變爲溫疫濡弱本名溼溫而弦緊乃傷
寒定脈一溼一寒何從主之叔和至夏暑爲病最
重內經原無其說楊上善云輕者夏至前溫病甚
者夏至後暑病不知何見予謂初春寒芽或謂柔

折可也至盛夏時強木反謂疫寒斷不其然第
四會東垣老人片言而折矣蓋春月風溫多死在
三日夏月溼溫多有可愈者安得反重之耶至於
脈法微妙理之所在顯然易徵傷寒浮大而緊中
風浮緩而弱春溫浮而濡風溫弗舉風溫尺寸
俱浮風火洞然中陽弦細乳遲暑傷其氣溼溫沉
弱濡緩溼流其經至於瘧瘧仍是脈合火土主之
脈之應病步步著實自然之理也叔和左更過右
更遇左變爲右變爲從無黃岐仲景之徒悟其真
傷寒分經 卷五下 會講溫語錄 吳
知真見者韓氏微言本欲懲艾而見齟齬和解因
時聽病自愈正如用小柴胡湯誠亦一法第守此
將三百九十七法盡爲贅麗其可乎哉然幾千年
來白晝在是天限之矣風溫溼溫天大二證風溫
朱肱五方歲時湯知母乾葛湯防已湯栝樓根湯
葛根龍膽湯其風火相熾頃刻危亡全不知矣至
於溼溫君火心太陰脾從不識正法若何但施邪
術而已韓朱溼溫無方可言茲後隔靴千層如斯
而已其治溫證總訣治熱以寒溫而行之治溫以

清冷而行之治寒以熱涼而行之治清以溫熱而行之吾不知取義何事又謂春感清邪肝夏感熱邪心秋感涼邪肺冬感寒邪腎感四時者皆為溫病然二說幾希擇術則免落莫無奈耳真見則安在哉吾徒品臨溫證列眉如鼎諸公日擊勝義千里同風是所望矣

傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

竟

上堂師嘉言老人第六會語錄 會講論溫古今粹美同堂悅樂一段

人無古今性有完缺吾生所賦一隙微明而已然靜裏索照覺無極太極以來雖未生人先具人理人理者天地之心也向著陰病論少摹開闢一班而劫初上帝以為之君其臣以為之教創著上經中經下經三卷中古遼邈全書未覩而岐伯時與黃帝相授一堂內經以後十不徵一况古經論溫哉然上古榮未交前及榮交後生死燎然但溫肯傷寒分經

卷五下

會講溫證語錄

畢

莫能幾及絕世知識明明見莫問問莫究豈不世界空擲人理乎吾徒神酣上古志觀玉京繪為空中樓閣之想步虛涉降游焉息焉自覺目光心朗溫證開先即使拱璧以先駟馬不若晤言一室志求千古矣此吾徒一大暢也岐伯論運氣曰尺寸交者死陰陽交者死各有其義惟論溫曰陰陽交者死也一言而終更不再舉吾徒何從得之然遡上古前聖徐覺溫與風溫兩端而生死定之也仲景後聖徐覺溫與風溫兩端而生死定之也今

始陰陽交者死論溫比類列着岐伯從前大呼疾聲向不悟則不聞耳悟則豈論岐伯即吾徒交與未交自爛兩目胃為腎關同一機軸溫證纔一見之而意中已先覺矣此吾徒一大暢也仲景宮牆吾徒步趨垂老彌任忽發未刊之旨意謂冬寒春溫夏熱分之三時覺三大綱建鼎足焉冬月太陽寒水繼以厥陰風木則統傷寒中風兩證為一大綱以傷寒該中風天然不易也春月厥陰風木繼以少陽相火則出溫證風溫兩證為一大綱以溫病該風溫天然不易也夏月少陰君火繼以太陰溼土則出喝溼兩證為一大綱以喝病該溼溫天然不易也精微之蘊聲臭盡泯叔和以後岐路羊腸秦披鳥道多少淪沉天意未喪乃至吾世視履昭然此吾徒一大暢也仲景以前無方以後其方充棟大率禁方失傳浸成邪僻所以有晉溫證疑鬼疑神和洽未已亦以後人莫得仲景之方耳吾徒傷寒論方取裁溫證諸方逐一發明其義無方乃有定方此吾徒一大暢也晉唐宋元以來賢

傷寒分經

卷五下

會講溫證諸方

聖

者和解因時銖銖兩兩無可奈何猶可言也不肖者蕩檢踰閑妄行汗下生命試手不可言也幾千年來獨東垣老人二則談言微中域外偉觀異時同調此吾徒一大暢也嗣後諸君精參各出一則二則堅義警切蘊理新穎應接不暇吾徒且大暢大暢矣

傷寒分經

卷五下

會講溫證諸方

聖

吳氏醫學述第五種

南陽張
機仲景著

西昌喻
昌嘉言註

武原吳儀洛遵程訂
賁湖周學江襟二
海昌周廣業廬補

傷寒分經

夏熱全篇天之六氣春秋冬各主一氣獨夏月兼主三氣所以夏月之病最繁

目重伸景立瘧溼暍三種瘧者熱病之至極
多死少生之候溼者地之溼濁陰之毒也暍
者日之暍陽光之毒也夫熱而益之以溼則
其中於人也無形與有形相得而不散矣溼
而益之以暍則其中於人也地氣挾天氣蒸
動而不解矣天之熱氣下地之溼氣上人在

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

氣安之中其身體豐偉者更受其困加以醇酒厚味房勞無忌精神昏倦諸病由此而成所以善養生者夏月淡泊獨宿隄防金木二臟勿爲淫熱所乘爲最要也。王叔和編次傷寒論提出痙溼暍以爲宜應別論另立篇目後人紛說有謂叔和採擇金匱之文以補其缺者至於成無己之註釋不過附會叔和序例異氣而不顧仲景立言精蘊不知所謂宜應別論者卽於原論三百九十七法之中摘出題然可見也痙溼暍三證雖同屬太陽經然皆夏月熱病非傷寒之所有事後人先以傷寒無全書一語橫於胸中况所宗玉皆有晉以後之僞派其孰從而辨之蓋痙溼暍亦如鼎之三足夏月之病三者爲多見夏月極溼之時極熱之時有極溼熱交蒸之時故太陽經所受之外邪比之冬月傷寒另有此三種時分時令如溼得熱則發黃熱得溼則身重至熱交熾則致癰而瘡病也又以溼多

者。太陽有經夏月
即此名曰瘧寒

亦病但洪大今必發熱而脈反沉而細

仲景以瘧溼暍爲太陽外感之候合而名篇蓋
傷寒分經

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

瘧爲熱病之最惡而皆爲溼熱之所釀。正從三氣交動中會其微旨也。唯是病屬太陽卽是營衛所主。下文剛瘧柔瘧卽分營衛之例。剛瘧如傷寒柔瘧如中風也。然證雖若同藥則不同。此夏月溼熱所傷之營衛非冬月風寒所傷之營衛比耳。○瘧強也有作瘧者傳寫之誤也。成無已謂瘧惡也非強直之謂。病名且失何以辨證。王冰註內經謂柔瘧者謂氣骨皆熱故筋柔而無力骨強而不舉。明訓瘧爲強矣。凡外淫內漬

之熱皆足以致瘧熱深入體不充於外者
強止從表熱得之則為經筋之強也金匱曰瘧
脈按之緊直上下行脈經曰瘧家其脈伏緊直
上下而此條則特論夏月瘧病之脈與冬月感
寒之緊及雜證之伏與堅勁直上直下之象不
同而但見沉細耳蓋瘧病脈必沉濡弱病脈必
弦細孔遲勁直上下非其質也金匱有為難治
三字者以夏月脈本洪大今反得沉細之脈則
溼熱之中入正深未易攘除也

傷寒分經

卷六

三

二太陽病服辛發汗之過多者必愈增其熱筋脈得
衣破不更其溼乘因是致瘧

成無已謂汗多則亡陽亡陽則筋無所養因而
成瘧此十中容有一二其實瘧病不盡然也

三太陽病有全似發熱汗出然風為陽暑亦陽也陽

不惡寒者名曰柔瘧與風傷衛

四太陰病有全似發熱無汗不惡寒者反惡寒者

五有全似太陽病先受之濕則交勝則身熱而足

寒頸項強急其惡寒而時頭熱面赤目脈赤者
瘧病也

王海藏謂三陽太陰皆病瘧若背反張則屬太
陽低頭視下手足牽引肘膝相構則屬陽明一
目或左右斜視并一手一足搐搦則屬少陽發
熱脈沉細腹痛則屬太陰各就本位主病引伸
以開豁後人不愧名賢矣惜其於少陰厥陰何

傷寒分經

卷六

四

獨遺之靈樞云足少陰之經筋循脊挾脊上至
項與足太陽經合其病在此為主痼瘕及瘧在
外陽病者不能俛在內陰病者不能仰此非少
陰之瘧病乎厥陰肝藏主筋又豈不有風熱過
盛而自傷其筋濡短之強十中常見三四耶○
冬寒春溫以及雜證原各有瘧證而夏月溼暑
所主之瘧尤為多而難治夏月之病雖仍以傷
寒統之然以溼熱為主暍亦熱也仲景原文以
瘧瘧二字名篇何成無已謂重感寒溼變為

剛煙重感風溼變爲柔煙耶以夏月之病作冬
月之解悖理甚矣

附瘕病論素問謂諸瘕項強皆屬於淫是病機顯主於淫矣千金推廣其義謂太易

中風重感寒溼則變癰見太陽中風身必多汗或衣被不更寒溼內襲或重感天時之寒地氣之溼因而變癰是合風寒溼三者以論癰矣金匱以癰溼賜名篇又合熱暑溼三者言之然所謂柔癰剛癰本當不兼及風寒且亦云發汗過多因致癰見夏月人本多汗尤不可過發其汗也古今言癰之書止此後世王海藏論癰知宗仲景雖識存未充要亦識大之賢矣傷寒論此篇載癰病五條金匱又增十條其旨已悉然終古大惑不立論以破其疑心有未嫌誠以仲景論癰病所舉者太陽太陰經耳後之治此癰者謂太陽行身之故頸項強背反張屬在太陽而

傷寒分經

卷六

夏熟全篇

五、

用金匱桂枝葛根二方。茫不應手。每歸咎於仲景之未備。不思如感六淫之邪。由太陽而傳六經。乃自然之行度。邪未盡。傳即不已。故三陽三陰。皆足致瘕。仲景之書。通身手眼。雖未明言。其引而不發之旨。未嘗不躍然心。且如太陽之傳陽明。項背几几。少陽之頸項強。是知三陽皆有瘕矣。而三陰豈日無之。海藏謂三陽太陽皆病瘕。獨不及少陰厥陰。云背反張。屬太陽。低頭視下。手足牽引。肘膝相攣。屬陽明。一日或左或右。斜視。一手一足。指攣。屬少陽。發熱脈沉細腹痛。屬太陰。以防風當歸湯治太陽。陽明發汗過多。而致瘕者。以柴胡加防風湯治少陽。汗後不解。寒熱往來。而成瘕者。雖不及少陰厥陰。然其製附子散。桂心白木湯。附子防風散。意原有在。觀其白朮湯。下云。上解三陽下安太陰。一種苦心。無非謂傳入少陰厥陰。必成死證耳。詎知傳經之邪。如風雨之來。而晝地以限。其不至豈可得乎。况是少陰厥陰之瘕。不死者亦多。靈樞謂足

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

六、社

藥下中下死而不悟也。又如新產婦人血舍空。虛外尿襲人而成癰病。仲景之所明言。不肖者不顧性命。輒用產後驚風。妄投湯藥。亦下中下死而不悟也。噫。可慨也已。

附癰脈論 癰證異於常證。癰脈必異於常脈。是不可得。况強脈恆難於求。其亦強求其柔軟和緩必邪深脈絕。難於求。仲景謂脈陰陽俱緊亡陽也。此為少陰見非太陽之緊比也。又謂少陰病脈緊至七八日。脈暴微。手足反溫。脈緊反去者。為欲解。可見癰證之欲解。必緊實之脈轉為微弱。而現劇病之本象。乃可漸返平脈。不達解也。古今言癰證之及脈者。莫如金匱。然皆片言居要。非深明傷寒比類互推之法。茫不知其立言之意。故因論癰病而并及癰脈焉。其曰太陽病發熱。脈沉而細。名曰癰。為難治。以發熱為太陽證。沉細為少陰脈。陽病而得陰脈。故難治也。謹治初非不治。仲景治發熱脈沉。原有成黃附

傷寒分經

卷六

七

又之垂欲之之奔乃治發耶其陽於督中背脊春
 因所項亡先變入外而少瘕瘕病沉脈故任真
 發畢似則已證淫受陰證登可脈也其脈太
 汗通不援發見仲中為陰之汗陰高比之見
 令待腰汗惡景為陰邪必之汗陰高比之見
 真言似以寒日邪非發其似勇指按大直前
 陽失折後頭其非身其陽力即始人上如督
 脫第筋肉指脈中汗血其且是得癰直天脈
 入因筋口蛇而中者為下又半直所小脈子
 澤發動惕背不滅血必厥如昔直病癰經午
 中汗四舌張言頂之動厥如昔直病癰經午
 是而末卷脚其之比其上此何下病癰經午
 則動遷囊幾然凶但澤期然至則病癰經午
 多下冷縮幾然凶但澤期然至則病癰經午
 汗焦皆背幾然凶但澤期然至則病癰經午
 亡之瘕曲陽之汗陽難陰而難陰而難陰而

氣謂行其矣瘕寸有反之絕利厥亡見陰枝
 堅沉互脈兩口不沉耳煩陰陽微所為
 實也發伏證取者同遲此脈而細藏根
 也堅其堅之益其遲乃為微少則者
 直非義直夾陰生遲太瘕瘕瘕瘕瘕
 上漫明上陰津遲陽雖瘕瘕瘕瘕瘕
 下無伏下脈以營亦瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 行著非而辨和營血之瘕瘕瘕瘕瘕
 者落伏以筋血之瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 督即緊之按此脈不能受瘕瘕瘕瘕
 脈與如伏之其引不榮瘕瘕瘕瘕瘕
 與足按之其引不榮瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 足太不之如脈不與瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 陽為可茲經少筋瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 合指得直云陰脈之瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 行提印上瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 於邪所下瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕

傷寒分經

卷六

八

煙外茶氣二熱附溫故故屬滿陰在厥致筋
 煤滋勝日呻袁則知其於者之內陰所脈
 師之滴垂吟仲不厥腹熱仲用者亡以自
 氣重入至諸卿但陰之而景溫陰陽病
 已但診昏小郎無亦服暴亦仍病必反
 絕脈中其昏小郎無亦服暴亦仍病必
 縱微脈迷兒醫解從大腹先從不能沉
 有神脈不醫期少不腹溫少仰拘此少
 丹根存不偶衰仲有之徐大其陰之陽
 不可意蛛高驚什有溫而乃喪溫之陽
 可謂絲三清中郎法也陰是病之陽
 救過寸熱家入矣也陰是病之陽
 矣指頭合人水捉彭
 活一全成救水捉彭
 余醫從成救水捉彭
 口云來以散少蟬
 此鼻湯側與大戲

金例沉欲見再厥邪與瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 匱求發愈微傳陰必不瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 但可必不浮何太在傳脾其瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 取定自病為以而民瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 太陽其病未知但病瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 方解期筋愈之於太瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 方陽矣而而傷陰瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 論急也厥欲以常為瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 方治成若瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 為六瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 例經亦仍陰脈則見瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 而皆如過象微其瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
 厥陰有成法瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕

九

比七尺

一、交

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

士

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

士

子 53-145

傷寒分經 卷六 夏熱全篇

傷寒之起也。初起之時。身熱惡寒。無汗。脈浮。此太陽經也。太陽經者。人之表也。外感風寒。邪氣入於表。故見此症。治之當以辛溫發汗。使邪氣隨汗而出。則病自愈。若汗出不盡。邪氣入於裏。則病變。或為陽明。或為少陽。或為太陰。或為少陰。或為厥陰。此六經之傳變也。其症各異。治法亦異。不可不察。此卷六之要旨也。

大澤家之為病

大澤家之為病。太陰濕土之氣。自外一身盡瘳。淫鬱。

傷寒分經 卷六 夏熱全篇

傷寒之起也。初起之時。身熱惡寒。無汗。脈浮。此太陽經也。太陽經者。人之表也。外感風寒。邪氣入於表。故見此症。治之當以辛溫發汗。使邪氣隨汗而出。則病自愈。若汗出不盡。邪氣入於裏。則病變。或為陽明。或為少陽。或為太陰。或為少陰。或為厥陰。此六經之傳變也。其症各異。治法亦異。不可不察。此卷六之要旨也。

故發熱但此與中風不同身色如薰黃則身不熱而身黃矣

脾惡溼夏月溼熱相蒸多有發黃之候然與傷寒陽明發熱發黃微有不同彼屬熱多其色明

亮此屬溼多其色黯晦

七

溼家扶風病上風性身以上疼痛發熱面黃而喘頭

痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在

頭中寒溼故鼻寒納散之藥鼻中指去鼻則愈

諸證俱係風溼而云中寒溼者謂溼性本地氣

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

三

之陰寒非謂風溼更兼寒溼也

八

溼家扶風其人陰邪既客於陰則陽但頭汗出

而風溼背強因得寒溼欲得被覆且向火是其病若

下之早則結必噦或胸滿且小便不利

舌上如胎者以丹田有下熱胸中有未解

渴欲得水而不能飲則口燥而煩其病正在也

太陽病溼邪由關節疼痛而煩脈沉而細無表證

九

者此名溼痺溼痺之候其人小便不利大便反快

但當利其小便與太陽用五苓散

為下法之意同也

身盡疼發熱本太陽中溼日晡則劇者此

名風溼此病傷於汗出當風或久傷取冷

所致也

十

問曰風溼相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天

陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答

曰此因發其汗致汗大出者但使風氣因汗去而

其汗但微微似欲汗出者則風溼俱去也

此言治太陽中風溼之法不可大發其汗蓋在

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

四

內之溼但當利其小便而與風相搏在外之溼

不得不微微表散之也

三溼家下之額上汗出微喘小便利者死若下利

不止者亦死

傷寒證中誤汗而額上汗出微喘者為亡陽誤

下而下利不止者為亡陰皆主死乃溼家誤下

何亦致亡陽又何以小便利者即死且傷寒

證中謂微喘直視循衣撮空小便利者其人可

治矣而溼家下之又何以小便利反主死耶若

下利不止者亦死若字亦字不得草草讀蓋
溼土居中脾中運動之陽與胃中停蓄之陰
相戀抱而不脫今以悞下而致額上汗出微
喘則脾中之陽欲上脫矣而小便不利則胃中
停蓄之陰尚足以維繫之也設小便利則陽上
陰下兩不相顧故主死也即小便利若下利
不止仍是陽上陰下兩不相顧亦主死也與傷
寒證誤汗而腎中之真陽上越似同而異微矣

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

五

附風溼論 風也溼也二氣之無定體而隨時變
氣每隨四時之氣也溼上寄於四季之末其
者百病之長其變無常者是也其中人出風則
上先受之溼則下先受之俱從太陽膀胱經而
入風傷其衛溼流關節風邪居外溼邪居內
從陰而親下風邪無形而居外溼邪有形而居
內上下內外之間邪相搏擊故汗出惡風身
氣發熱頭痛骨節煩疼身重微腫等證此固宜
從汗解第汗法不與常法相同用麻黃湯必加
白朮或加蒼朮以去其溼用桂枝湯必去芍
藥加白朮甚者加附子以溫其經其取汗又貴
徐不可貴驟驟則風去溼在徐則風溼俱去也其
有不可發汗者緣風溼相搏多挾陽虛陽虛即
不可汗但可汗者緣風溼相搏多挾陽虛陽虛即
已故風溼證凡見微喘雖為邪阻其正當虛弱
中陽虛凡見汗出微喘雖為邪阻其正當虛弱
陽欲脫明眼辨之必早也前論中風溼相搏以

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

六

冬寒而三時其病者一身盡痛發熱日晡更甚
者名風溼此病傷於汗出當風或久傷風氣
後豈非風溼之病乎然風氣收斂過久而汗氣
所鬱其病在陽明然與虛病之發熱汗多口渴
陽明可下之證不同此但可汗而不可下也何
以言之內經謂太陽陽明為表裏不可下也何
陽受風氣陰受溼氣所以風溼客於太陽陽明
即為半表半裏而一身之肌肉盡痛即為半表
之邪未除故可汗而不可下也況人身之氣盡
日行陽二十五度平旦屬少陽日中屬太陽日
西屬陽明日入屬少陰故可汗而不可下也
氣猶未盡退故亦可汗而不可下也觀金匱一
則曰可與麻黃加木湯發其汗為宜慎不可以
火攻之再則曰可與麻黃杏仁湯發其汗為宜
未言及不可下而可與麻黃杏仁湯發其汗為
見矣若下之則虛其胃氣而邪氣下陷濕邪上
湧其變不可勝言矣其證與濕熱之病脈見浮

三

太陽中暈者

即熱是也其人汗自出

不若中風之

惡寒身熱津液而渴也

惡寒身熱

津液而渴也

夏月汗出惡寒者

衛氣虛也身熱而渴者肺金

受火尅而燥渴也

內經曰心移熱於肺傳為膈

消消亦渴也心火適王肺金受制證屬太陽然

消消亦渴也心火適王肺金受制證屬太陽然

消消亦渴也心火適王肺金受制證屬太陽然

與冬月感寒之治不同金匱用白虎加人參湯以救肺金是為第一義也

太陽中喝者

既有汗出而渴中熱之證矣後有身熱疼重

外不見汗內不渴

而脈反微弱此亦夏月

其所傷但傷在冷水飲水

或因

過多或以水灌之

行於

皮中

所致與中熱之證不同也

金匱治此證用一物瓜蒂湯主之變散為湯而去赤小豆酸漿水獨用瓜蒂一味煎服搗去胸中之水則皮中之水得以俱出也搗中有宜泄之義汗如其故不復水漬皮間矣此即內經以

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

水灌汗乃至不復汗之證仲景會其意言中喝者兼乎中溼有所祖也然水行皮中何以脈見微弱耶蓋中喝脈本虛弱而溼居皮膚內合於肺阻礙營衛之運行其脈更見微弱也喝脈虛弱按之無力溼脈微弱舉之不利溼熱喝合之脈則舉按皆不利也搗去其水而營衛通肺氣行舉之流利即溼去之微按之有力即喝解之微一物之微其功效之神且捷者有如此矣○

水行皮中乃夏月偶傷之水或過飲冷水或以

冷水灌汗因致水漬皮中過鬱其外出之陽以故身熱疼重用瓜蒂一味驅逐其水則陽氣行而過鬱之病解矣凡形寒飲冷則傷肺乃積漸使然此偶傷之水不過傷肺所合之皮毛故一搗即通并無藉赤小豆酸漿水之羣力也即是推之久傷取冷如風寒雨露從天氣而得之者皆足過鬱其上焦之陽又與地氣之溼從足先受宜利其小便者異治矣可無辨歟

金匱治喝病止出二方一者白虎加人參湯專

治其熱以夏月之熱淫必僭而犯上傷其肺金耗其津液用之以救肺金存津液也孫思邈之生脈散李東垣之清暑益氣湯亦既祖之矣一者瓜蒂湯專治其溼以夏月之溼淫上甚為熱亦先傷其肺金故外漬之水得以聚於皮間皮者肺之合也用以搗其胸中之水或吐或瀉而出則肺氣得以不壅而皮間之水得以下趨也何後人但宗仲景五苓散為例如河間之通苓散子和之桂苓甘露飲非不得導溼消暑之意

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

傷寒分經

卷六

夏熱全篇

求其引伸瓜蒂湯之制以治上焦溼熱而清夫肺金則絕無一方矣故特舉三方合論其義見無形之熱傷其肺金則用白虎加人參湯救之有形之溼傷其肺金則用瓜蒂湯救之各有所主也二方傷寒溼暍篇中不載金匱溼暍篇中復出之金針暗度宜識之矣

聖

太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其證皆暑熱水溼之因

其脈弦細孔遲即熱傷氣滯礙氣之應也所以動小便已洒洒然寒

毫毛聳且手足逆冷其虛寒也小有勞身即熱

傷寒分經 卷六 夏熱全篇

以熱名口開前板齒燥外水雖持而若發汗則惡寒甚重亡其加溫鍼則發熱甚邪也數下之則

淋甚重亡其陰也

傷暑之脈內經曰脈盛身寒得之傷寒脈虛身

熱得之傷暑甲乙經曰熱傷氣而不傷形所以

脈虛者是也若難經曰其脈浮大而散殊有未

然夫浮大而散乃心之本脈非病脈也仲景但

補其偏曰弦細孔遲即虛豁也弦細遲即熱

傷氣之應也其水行皮中之脈則曰微弱見脈

為水熱所持陽氣不行也統而言之曰虛分而

言之曰弦細孔遲微弱其不以浮大之脈混入

虛脈之中稱為病暑之脈慮何周耶○夏月人

身之陽以汗而外泄人身之陰以熱而內耗陰

陽兩俱不足仲景於中暍病禁用汗下溫鍼汗

則傷其陽下則傷其陰溫鍼則引火熱內攻故

禁之也而其用藥但取甘寒生津保肺固陽益

陰為治此等關係最鉅今特拏出靈樞有云陰

陽俱不足補陽則陰竭瀉陰則陽亡蓋謂陽以

傷寒分經 卷六 夏熱全篇

陰為宅補陽須不傷其陰陰以陽為根瀉陰須

不動其陽夫既陰陽俱不足則補瀉未可輕言

纔有補瀉必造其偏如重陰重陽之屬其初不

過差之毫釐耳所以過用甘溫恐犯補陽之戒

過用苦寒恐犯瀉陰之戒但用一廿一寒陰陽

兩無偏勝之藥清解暑熱而平治之則善矣

夫傷寒有溼溫病其人素常傷於溼因而復中暑

暍溼熱兩相搏深入則發溼溫病苦兩脛逆冷腹

滿又胸此溼得暑而頭目痛苦妄言此暑得溼而

治在足太陰之邪而息其熱不可發汗

汗出則必不能言耳而聾心不知痛所在也

身青而色變顯露於肌名曰重囑囑病而虛實

實之如此死者為醫殺之也

老問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利

曰霍亂

靈樞曰清氣在陰濁氣在陽清濁相干亂於腸

胃則為霍亂也

大問曰病人發熱頭痛身疼惡寒俱為外感之證其

傷寒分經卷六夏熱全篇

外感而吐利者此屬何病答曰此名霍亂

吐下利今又吐利止更復發熱乃內解而也

外邪固當從外解而治霍亂之外邪又與傷寒

外解之法不同傷寒可發汗而霍亂不可發汗

也

凡傷寒者其脈本盛微瀉者因本是霍亂今轉是

傷寒卻於四五日傳至陰經上自陽轉入陰必

下利若本自下利至此又不可治也若欲似大

便而反失氣仍不利者屬陽明也便必難

亦不可十三日自愈所以然者十三日經已盡

故邪解而也蓋病源起於霍亂胃中六腑之

陽明病宜後勿下利後便常鞭鞭則惟能食者

已復愈今始先六反不能食到後經十二中頗能

食是過前一經方能食也過後之一日十三日當

愈不愈者不屬陽明泥經盡自愈之說而生困

也

霍亂見頭疼發熱身疼痛熱多欲飲水者在表之

行為不多矣然不可從五苓散主之以散邪之一法

傷寒分經卷六夏熱全篇

耳寒多不欲用水者雖有頭痛發熱身疼痛之證

直在微煩中丸主之以分理陰陽

問耳惟宜理中丸主之以分理陰陽

深居廣廈襲風涼食生冷遏抑其陽而病暑者

一切治暑清涼之方即不得徑情直施如無汗

仍須透表以宣其陽如吐利急須和解以安其

中甚者用溫熱藥以從治之故冒暑之霍亂吐

瀉以治暑為主避暑之霍亂吐瀉以和中溫中

為主不可不辨也

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥逆者陰寒

既吐且利小水復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之

此證陰陽兩易竭絕然裏寒已甚而亡陽更易雖有外熱在所不計亦用四逆湯主之

四逆湯中附子配乾薑補中有發可以散邪退熱故此條與上條正以發熱相錯而用之也

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯主之

傷寒分經 卷六 夏熱全篇

吐已下斷非美事也必其人胃中之水穀已盡無物復可吐下耳汗出而厥陽微欲絕而四肢拘急全然不解又兼無血以柔其筋脈微欲絕固為陽之欲亡亦兼陰氣虧竭故用通脈四逆以回陽而加豬膽汁以益陰庶幾將絕之陰不致為陽藥所劫奪也註認吐已下斷為美事謂此條為餘證不解者更出其治且謂陽極虛陰極盛故用反佐之法以通其格拒豈有陰盛格陽而謂之餘證乎豈有陰欲亡而謂之陰盛乎

惡寒脈微而復利亡陽之利也今利止亦亡其血也逆加入參湯主之

觀此而上條之文意灼然矣惡寒脈微而利止非陽回利止乃陰盡利止故加入參以益陰而

瘧病諸方 枯薑桂枝湯 葛根湯 大承氣湯

以上三方金匱載之本篇不載

附論瘧病方 防風當歸湯 柴胡加防風湯 桂心白

木湯 附子防風散

瘧病諸方 瓜蒂散 木附湯 麻黃加朮湯

傷寒分經 卷六 夏熱全篇

麻黃杏仁薏苡甘草湯 防己黃耆湯 桂枝

附子湯 去桂加朮湯 甘草附子湯 以上八方本篇

不載金匱載之

附方 桂枝去芍藥加朮湯 麻黃加薏苡仁湯 桂

枝去芍藥加附子湯

喝病諸方 白虎加人參湯 一物瓜蒂湯 上二方金匱

附方 篇不載

生脈散 清暑益氣湯 通苓散 桂苓甘露

飲

溫方 蒼木白虎湯

霍亂諸方

五苓散

理中圓

四逆湯

通脈

四逆加豬膽汁湯

四逆加人參湯

易經入夏

夏熱全篇

宜

吳氏醫學述第五種

南陽張 機仲景著

武原吳儀洛遵程輯註
海昌周廣業廣補
秦溪許 栽培之 參訂

傷寒分經

脈法前篇

傷寒有六經所區而別之者全在
使標本主客邪正虛實各了然指
六經不可無法而察脈尤為假總不
辨證雖千法將於何用故四時六經
治雖千法將於何用故四時六經
篇皆歸宗於此以爲法之祖云云
脈法篇情已亡失茲所輯前後二篇
傷寒分經 卷七上 脈法前篇

傷寒分經

卷七上

脈法前篇

門法律及傷寒問答羅止得數條徐則於
方程諸家註內竊取其精粹之義以補之

問曰脈有陰陽何謂也答曰凡脈大浮數動滑此

名陽也此其所生病口實目熱曰表曰陽從

沉濇弱弦微此名陰也此其所生病口虛目寒曰裏

凡陰病受邪邪氣入裏則陽脈者則裏邪退而

正欲生陽病受邪邪氣入裏則陽脈者則裏邪退而

死學若須於脈理之精微窮其變而防其勝盛何

也先死法難設此陽圖義於早何法消弭此陰補救於

天地之道不外乎陰陽人身亦然故萬有不齊

傷寒分經

卷七上

脈法前篇

二

之脈萬有不齊之病皆於陰陽統之此仲景於首章特設為問答以明之也凡陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死此二語乃傷寒脈法喫緊大綱如漢法三章允為律令之祖至其比例詳情自非一端可盡如厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈是陰病貴得陽脈也如譌語妄言脈沉細者死脈短者死脈瀉者死是陽病惡見陰脈也又如太陽畜血病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者下血乃愈此亦

傷寒分經

卷七上

三

陽邪陷入陰中其浮數之脈為血所持而不露也然陽邪既陷入陰寸脈不加浮數則陽邪亦屬有限今寸脈反浮數其在裏之熱熾盛難除更可類推故知其必固膿血而成半死半生之證也合兩條論之上條可愈之故全在陰脈見脈既轉陰陽邪原有限也下條難愈之故全在陽脈見陽邪既從血下出陽邪不盡血必不止倘血盡而陽邪未盡能免脫陰而死乎可見陰病陽病二語特舉其大綱至其微處聽人自會耳大綱云者謂證屬於陰其脈反陽必能鼓勇以卻敵證屬於陽其脈反陰必難嬰城以固守故得沉清弱微之脈者其人血氣精津未病先虧小病且難勝况能勝傳經之熱病哉陰脈有別兼見沉瀉弱微為陰病如黃芩湯是也兼見大浮數動滑為陽病如麻黃湯是也兼見大偏陰偏陽其病極必至陰結陽結故又問曰脈有陽結陰結者何以別之答曰其脈浮而數陽脈能食不大便也此為實而陽邪名曰陽結也一日太陽期至十七日又當少陰三候主氣之期水不降火當劇其

脈沉而遲也。不能食，身體重。陰病也。陰病當下利。今大便反鞅，結不通。名曰陰結也。期至十四日，又當陽主氣之期，當劇此所謂亢土不勝水，當劇則害也。

脈始於足少陰腎，生於足陽明胃，是少陰陽明為脈之生始，而陰陽之總司，故必於少陰陽明主氣之期而決其常劇內經曰：一候後則病二候後則病甚，三候後則病危也。

獨陽無陰，獨陰無陽，則為陰結陽結。究竟陰陽相勝，彼此相乘者為多，故又設問曰：病有灑淅惡寒，水冷氣，肌肉不勝之狀，而復發熱者何傷寒分經

卷七上 脈法前篇 四

答曰：此陰部脈不足，而陽往從之，陽之脈不足，而陰往乘之也。曰：何謂陽不足？答曰：於寸口見之，假令寸口脈微，名曰陽不足，陰氣乘之。上入陽中，則灑淅惡寒，而與陰俱化也。曰：何謂陰不足？答曰：陰脈不可於尺中見之，假令尺中脈微，名曰陰不足，陽氣餘乘之，以下陷入陰中，則發熱，陰不足，以勝陽也。
陰在內，陽之守也。陽脈浮於外，不內陰脈弱者，則陽在外，陰之使也。陽脈浮，則其陰而陰脈弱者，則其陽而血虛血虛則無以筋急而拘也。

之陰陽以浮沉言。此之陰陽以尺寸言也。

其脈沉而發熱惡者，營氣虛微不能汗也。其脈浮而汗出如流珠者，衛氣衰微表也。此衛氣衰所營氣微者，陰血虛而有加燒針劫汗以易明耳。其微者，熱營者不知加燒針傷其陰，則血之流凝泣而不行，且反助其發熱而躁煩也。

上二條以尺寸合外證辨陰陽之不足，此條以浮沉合外證辨營衛之衰微也。燒針者，針其穴而復以火燒其針尾，是針而復加之灸也。唐不

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 五

嚴云：流或作雷，非。方其始也，雖微而不得不流者，燒針以迫之也。及其既也已衰而不能復流者，燒針以竭之也。

脈藹藹如車蓋，大而浮者，為陽氣鬱結於外，名曰陽結也。脈累累如循長竿，緊而沉者，為陰氣鬱結於內，名曰陰結也。脈微也，脈紫紫如蜘蛛絲，柔弱者，陽氣衰也。脈綿綿如瀉漆之絕，漸漸減少者，亡其血也。前陽結之脈浮數，此復以藹藹如車蓋者形容

其一等浮數中有擁上之象前陰結之脈沉遲
此復以纍纍如循長竿者形容其一等沉遲中
有牢勁之象前衛氣衰之脈浮此復以管管如
羹上肥者狀其一等浮而旦衰之象浮雖同而
羹肥之浮與車蓋之浮異矣前營氣微之脈沉
此復以紫紫如蜘蛛絲者狀其一等沉而且微
之象沉雖同而蜘蛛絲之沉與纍纍如循長竿
之沉又異矣且營氣微之脈沉經燒針而欲絕
可知茲復以綿綿如瀉漆之絕者補出而形容
傷寒分經 卷七上 脈法前篇 六

之欲絕不絕正背夫血流不行之狀得諸脈之
形容而陰陽有偏有損有微有甚自不得據六
經之見證而妄施汗下矣
脈雙弦而遲者乃陰寒必心下鞕也
脈大而緊者陽邪中有陰邪也

上二節王叔和分類入可下之條彙作一節末
有可下之宜大承氣湯句今刪正之分作兩節
問脈雙弦而遲者必心下鞕也脈大而緊者陽
中有陰也可下之宜大承氣湯設遇此證果可
下否答曰脈雙弦而遲調左右皆然乃陰寒內
結心下必鞕其脈其證必因誤下邪未盡退而

反致其虛寒也仲景金匱方論云脈沉者下之
也皆大下後虛脈所以於結胸條論脈沉者
病脈浮而動數醫反下之動數變遲以誤下
而脈變雙弦一以誤下而脈變遲遲以誤下
胸條以共人邪結在胸下而脈變遲遲以誤下
結者胸間之邪則與胃大承氣湯攻之則
并陷胸湯亦不可用垂戒甚明也雙弦脈即欲
用下當微用溫藥下之例今尺謂宜大承氣
謂傷風有寒屬大青龍湯證其不可下更明矣
兩段之文迥不相蒙誠斯道之大厄也導
之脈胎誤千載誠斯道之大厄也導
問不敢行其所疑其過人之識矣
脈來緩時一止還而復來者名曰結脈來數時一
止還而復來者名曰促陽盛則促阻則脈也陰
傷寒分經 卷七上 脈法前篇 七

盛則結阻則停也此皆病脈然漸退則吉漸進
也則凶
緩者遲於平而駛於遲促促促也與短促不同
結促代皆動而中止但能自還為結促不能自
還為代止無常數為結促止有常數為代結促
為病脈代為死脈問此之結促與桂枝去芍藥
結何處分別曰促結則同而脈勢之盛衰自異
彼之促者疲於奔而自總彼之結者不能前而
代替總非關於前途之阻也此處之結促曰陽
盛陰虛彼處之結促自是陽虛陰盛此處曰病
脈彼處曰脈病一脈雖有盛衰之別然漸退則
吉漸進則凶一也此因其人有停積痰飲邪

氣自內達外不能宣故所以脈有一此陽盛者正外邪積而愈盛也常見不或外邪而亦得此脈又純是內積滯而為之阻也

陰陽不和相搏數而指下名曰動若見於陽動則

陰陽不和相搏數而指下名曰動若見於陽動則

冷惡寒者此三焦不能溫肌傷也夫動脈必有若

數脈止見於關上而不及上下無頭尾圓如豆

大縮脈厥厥動搖者名曰動也

脈之動者皆因陰陽不和不能貫通三部雖多

見於關上然尺寸亦常見之本文言若數脈見

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 八

於關上若字甚活是舉一隅為例耳今世以尺寸之動強飭為滑殊不知動脈是陰陽相搏虛者受邪則動故單見一部滑脈是邪實有餘多兼見二三部或兩手俱滑以此辨之則動滑之虛實判然矣○王宇泰云陽升陰降二者交通上下往來於尺寸之內方且冲和安靜焉親所謂動者哉惟夫陽欲升而陰逆之陰欲降而陽逆之兩者相搏不得上下鼓擊之勢隴然高起而動脈之形著矣

陽寸脈浮大而濡陰尺脈浮大而濡陰脈與陽脈

上同等無有者名曰緩是陰陽之氣和緩也

緩為血氣和平與前節之緩不同緩有三義陰

陽同等而濡為胃氣之正脈陽浮陰弱為衛不

和之脈陰陽同等而欠濡為胃氣實之脈脈勢

雖不同卻總無緊急之象故皆得名之曰緩

脈浮而帶緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之

而不移動也脈緊者動如轉索之無常也分在移

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 九

許叔微云少陽之氣通於春春脈弦者以應春陽時令也如浮大而弦洪長而弦浮滑而弦浮數而弦皆為陽也若沉微而弦沉濡而弦沉細而弦皆為陰也仲景以弦脈分陰陽二用之理其義微矣

弦脈有陰陽弦而大者為純陽不大為純陰二義若脈弦而大則為花氣少則減則為寒虛則為虛大則為虛虛相搏陽氣減損而不足陰虛故其則為虛寒虛相搏陽氣減損而不足陰虛故其則為虛寒虛相搏陽氣減損而不足陰虛故其則為虛寒

如按此名為革婦人脈得此則為半產漏下男子得此則為

脈則為亡血失精皆因氣血虛損

問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脈浮而

緊邪雖還表而為按之反托此為根本虛故當

戰而汗出也以其人根本虛與正爭是以發戰

然以脈浮邪已故正卒勝邪當汗出而病解也

問曰病有不戰而汗出解者何也答曰若脈浮而

數陽邪已外按之不托此人根本不虛若欲自解

但汗出耳與正爭不發戰也

數本為在裏之脈而浮數則多在表

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 十

問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自

微邪正此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無

津液已無作汗至此陰陽自和復生必自愈故不戰

不汗出而解也

陰陽自和即下十四條寸關尺同等之脈為津

液復生之候也

問曰傷寒三日未經歷盡汗脈浮數而微非正氣

病人身涼和者何也答曰此為欲解也然其

解必以夜半助微脈之纖陽而協浮數也設脈浮

而解者必澹然身和汗出也脈數多而解者必

而強能食也脈微多而解者必虛而大汗出也

此條脈浮數邪已還表而兼微者內氣雖虛不

似上條之微曾經汗吐下已無邪留者比也

問曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關

上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱證不

解者此脈陰陽為和平雖劇必愈

三部同等雖有邪不能害然此以大槩言不獨

謂外邪也

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 十一

師曰立夏後夏至得洪大脈是其本位為夏令其

身體苦疼重者則洪大亦為須發其汗若明日身

不疼不重者不須發汗若汗濺濺自出者明日便

解矣何以言之立夏後夏至得洪大脈是其時脈有

則從邪無四時倣此病雖異而易解則同也

脈和平而證自解固已然有病脈而混乎本脈

者亦有本脈而類乎病脈者因舉一時令脈以

明之言脈得應時而王則病有當解之自然舉

夏以例其餘也凡有解胃者名曰傷寒餘皆則

傷寒分經

卷七上

脈法前篇

士

問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病者明日日中愈日中得病者夜半愈何以言之日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病明日日中愈者以陰得陽則解也

陰陽相際氣血平復所以自然當解○此條一
凡字所以總結上文之意乃反不言脈而言病
者蓋無論大小浮沉遲數等脈只以調其陰陽
二氣爲主陽得陰則解陰得陽則解特舉日中
夜半以示例而正邪虛實脈治之大端無不可

就此一語推及之也

寸口脈浮爲在表沉爲在裏數爲在府遲爲在藏假令脈遲此爲在藏也

凡單言寸口統六部而言乃手脈也下趺陽乃足脈每每對舉互文也鍼經以寸口人迎分別藏府此以浮沉遲數定表裡藏府而全重於遲爲在藏句故重中以明之設脈見浮遲雖有表證只宜小建中和之終非麻黃青龍所宜以藏氣本虛故也○此條以表裏藏府換出從前陰傷寒分經

傷寒分經

卷七上

脈法前編

五

陽又爲以下諸條作綱下文俱從此條細分之
 跌陽脈本遲而緩乃胃氣之常脈也今浮而濇而少陰脈則如經
 常也此非少陰之氣不與陽明相合而爲病其病在脾不爲胃行其津液耳法
 當下利何以知之若脈浮大者陽明氣實少陰血
 虛也今跌陽脈不大浮而濇故知脾氣轉輸不足
 以致胃氣之虛非關少陰也夫所謂如經者以少陰脈弦而浮纔
 見此陰柔之氣上與陽明相合爲調和之脈故稱如經也若反滑
 而數者得少陰君火之氣熱甚於經故知當屎膿血也
 跌陽脈浮濇爲脾胃不足故當下利此易明也

傷寒分經

卷七上

脈法前篇

齒

傷寒分經

卷七上

脈法前篇

圭

至少陰脈弦而浮。稱為調和如經之脈。此必有說焉。蓋傷寒熱傳少陰。仍得弦浮陽脈。為若見沉遲。則為少陰病。脈矣。夫所謂弦者。少陽生發之氣也。浮者。太陽表證之脈也。雖證見少陰。而少陰病脈不見。不失經常之度。故為調脈。若見滑數。則為邪熱內盛。必挾熱便膿血也。○凡言跌陽皆當推之。右關少陰。皆當驗於尺部。若必候諸於足。在婦人殊為未便。握手不及足之議。所不辭也。跌陽在足。距上骨間動脈處。去陷骨三寸。一名會元。主脾胃也。

寸口脈浮而緊。浮為陽。脈風。故浮則為風。寒為陰。邪。緊則為寒。衛為陽。營為陰。邪。各從其類。故。風則傷衛。寒則傷營。衛氣鬱而不行。故。營骨節煩疼。當發其汗。使風寒去而。也。

此舉太陽下篇首條用大青龍湯。中其脈而詳明其義。

跌陽脈以候遲而緩。乃胃氣如經常之也。今跌陽脈不緩。浮而反數。浮則為虛。傷胃數則為熱。動脾。此非胃本然病。醫特妄下之所為也。夫胃氣環。

行於脈中。脈之營衛。之氣不能。內陷其脈。數者。先為微而脈。變為沉。今反但浮。而無他脈。故既未人必見大便鞭氣噫而除。病之脾胃何以知之。本以數脈動脾。其數先微。故知脾氣不治。失於轉便。鞭氣噫而除。今脈反浮。其數改微。邪氣獨留。以心中雖則知饑。而口不邪熱。不殺穀也。如潮熱發渴。若有愈期。數脈當遲緩。如經脈。因前後度數如法。不病者則饑。而能消數脈。於通緩不時見。則陷人之邪。已著。生惡瘡也。則陷在經絡間。必生惡瘡也。

跌陽脈以遲緩為經常。不當浮數。若見浮數。知醫誤下。而傷胃動脾也。營衛環轉之氣。以候下而內陷。其數脈必先改為微。而脾氣不治。大便鞭氣噫而除。此皆邪客於脾所致。即鍼經脾病者。善噫。得後出餘氣。則快然如衰之謂也。邪熱獨陷心下。雖饑復不殺穀。抑且潮熱發渴。未有愈期。必俟數脈之先微者。仍遲緩如經常。始饑而消穀也。若數脈於遲緩後。仍有時見數。則邪已鬱於營衛。主生惡瘡而已。

師口傷病後人脈見微而濇者此為醫所病也

大發其汗又數大下之兩傷其其人亡血故病當

愈仍先惡寒後乃發熱無休止時至夏月盛熱時

欲着複衣極矣冬月盛寒時欲裸其身極矣所以

然者陽微則惡寒陰弱則發熱此因醫發其汗令

陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表

胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十

一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能

勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知亡血也

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 去

人身之脈陰陽相抱營衛如環傷寒病已之後

脈見陽微陰濇知為醫之所累大汗大下兩傷

其營衛以故傷寒病雖愈惡寒發熱無休止時

乃至夏月反眊於陰冬月反眊於陽各造其偏

經年不復其為累也大矣即陽脈之微以久持

而稍復而但陰脈遲濇亦為亡血以陰血更易

虧而難復耳設其人平素脈微且濇醫誤大汗

大下死不終日矣此論病時汗下兩傷所以經

年不復之脈也王肯堂曰大發其汗傷陽也宜其脈微而濇又數大下之傷

陰也宜其脈濇而發熱陰陽兩傷則金匱而首末獨言亡血者何也曰下之亡血不言汗亦血類故也內虛之人夏月陽氣在裏陰虛內無陽也故不勝其寒冬月陽氣在表陰虛內能常陽光之灼燄故不勝其熱然諸脈皆細而濇按之無力者往往惡寒苦振慄不止或時發寒水則便如故其振寒復至非必遇夏乃寒遇冬乃熱也此但言其例論其理耳

脈浮而大浮為太陽大為陽明法當從心下反鞭

有煩躁發熱屬心藏結者宜攻之不可因浮大

發汗也屬府實者攻之不可利小令溲數溲數則

大便鞭若此證常未傳裏之時若汗出多則服

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 去

熱愈矣惟汗出少則熱邪不脫而傳便難故急

下以存脈遲者則證尚未可攻也

此舉結胸痞氣胃實等之當下者槩致叮嚀戒

慎之意乃從證不從脈之法也屬藏主結胸痞

氣也故曰攻之不令發汗屬府指胃實等也故

曰不令溲數謂不可利小便也汗多則熱愈汗

少則便難乃推原所以當下之故謂服藥得汗

腠理既開兩三日內仍覺繫繫微汗則邪服而

熱除不傳裏矣若千幾尋可上道可

不服而傳熱既傳裏則津液必耗而便難故
宜攻下以存津液觀下文復云脈遲尙未可攻
又戒其勿候攻以重傷津液又當從脈不從證
也要知此三語總頂屬府者不令洩數而爲陽
胡病下註脚耳。○屬府者病已傳裏不當汗也
成註謂當先解表誤矣

脈不浮而起湧見身汗如油真津外洩也喘而不休
氣不歸元也水漿不下胃氣形體瘵不仁也靜乍
傷寒分經此爲命絕也

傷寒分經 卷七上 脈法前篇

大

此節乃下六條之總下五節乃五目末節乃總
結上文之詞皆合色脈以決五藏
命絕者五藏絕也故設問曰又未知何藏先受其災而絕
出髮潤喘而不休者此爲肺先絕也

汗出髮潤即身汗如油變文之互詞喘而不休
同然上節曰命絕此節曰肺絕何也曰人以氣
在則生氣絕則死肺主氣氣主命故以總一身
而槩言之則曰命絕及以通下文析五藏而詳
言之則又曰肺先絕也

陽氣先絕乃死道之常然亦有陽氣反獨運而陰先絕者形體如煙
薰人欲燼而昏暗先形直視搖頭者此爲心先絕也

人之有生氣血焉耳氣在則存氣去則死然血
氣之交亦有偏勝而不可以常論者心主血血
陰也故次言之直視者少陰之脈其支者從心
系上挾咽系目也頭搖者頭爲諸陽之會陰去
則陽無所依附故不寧也

唇吻反青四肢繫習者此爲肝先絕也

唇吻者脾之候肝色青肝絕則真色見於所勝

傷寒分經 卷七上 脈法前篇

大

之部也四肢者脾所主肝主筋肝絕則筋脈引
急發於所勝之分也繫習者爲振動若搐搦手
足時時伸縮也

環口黧黑柔汗發黃者此爲脾先絕也

口爲脾之竅黧黑熏黃黑暗土敗之色也柔汗
者柔膩而冷俗謂冷汗是也蓋汗者血之液血
雖陰行之者陽脾敗不能統血則陰不守陽不
固也發黃者脾屬土而主肌肉土欲敗而色外
奪也

漫便遺失狂言目反直視者此為腎絕也

腎司二便主闢闢廢故二便不能禁約也

腎藏志經曰狂言者是失志失志者死腎主骨

骨之精為瞳子目反直視者骨之精不上榮於

瞳子瞳子微而不能轉也

按五藏絕證有目眦

死者有本藏之氣衰竭而死者有藏府俱絕而

又未知何藏陰陽前絕日若陽氣前絕陰氣後

竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭者其

傷寒分經 卷七上 辛

人死身色必赤腋下溫心下熱也

五藏絕之先後不可以上文之次第為拘故復

言藏氣之陰陽前後絕竭有以驗之於既死之

後則藏有勝負絕有遲速大率可見矣腋左右

肘脅之間也成氏曰陽主熱而色赤陰主寒而

色青其人死身色青則陰未離乎體或知陰氣

後竭也身色赤腋下溫心下熱則陽未離乎體

故知陽氣後竭也

寸口脈浮大病全在表醫反下之則在表之陽邪下陷

遂成結此為大逆浮則為主氣無血大則為外寒邪

是下陷者寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知其

就錯內和其氣而反飲冷水又水令大汗出

中之一損其胃中之邪飲水再損其胃水得寒氣冷

必相搏且夾帶濁氣其人即餒

浮則無血即浮為在表未入於陰之互詞寒氣

相搏則為腸鳴此必未嘗痞結至極蓋痞結即

不復轉氣也餒同噎氣窒而不能通利傷寒之

危候也然其死與不死尚未可定蓋脈之浮大

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 辛

本非微弱之比而邪之內陷當大逆者止成腸

鳴小逆倘病餒已後陽氣漸回水寒漸散仍可

得生後條謂寒聚心下當奈何也此則聚而不

散無可奈何仁人之望絕矣

邪入陽明跌陽脈浮浮則為氣虛發不可發汗

必診跌陽跌陽脈浮浮則為氣虛發不可發汗

浮相搏故令氣餒言胃氣虛竭也其脈浮中

少差但為噦此為醫者不察其脈而責胃氣

虛劫汗取其胃中必致守空而迫其血從外迫出

若脈浮而外邪鼻中燥者必衄也

傷寒分經

卷七上

脈法前篇

三

傷寒分經

卷七上

脈法前篇

三

寸口脈浮宜發其汗以邪在太陽營衛間未深入也若至陽明即使是在經之邪亦以汗為大禁矣設其入胃氣充實亦何必禁之故邪入陽明必診跌陽跌陽脈浮即是胃氣虛冷不可發汗所以有建中之法建立中氣然後汗之以汗為胃之津液也津液不充強發其汗則邪與虛搏其人必餒若其脈浮中帶滑則胃之虛餒少差但為噦而已且陰在內為陽之守胃中津液為陽其不外泄者賴陰血以守之故強逼其津

液為汗斯動其所守之血而必離也其不離者亦瘀蓄而生他患此與誤發少陰汗者同科而減等少陰少血動其血則下厥上竭而難治陽明雖多血但釀患未已耳

寸口脈濡而弱陽濡即惡寒弱即發熱濡

弱相搏為藏氣衰微今患胸中苦煩此煩為虛非

結熱也而反令其結熱薄居以水漬布冷銚貼之

重傷其胸陽氣遂微夫胸中之陽為諸府無

所依陰氣與脈即凝而聚結在心下而不肯移

胃中虛冷水穀不化水寒下流小便縱通而陽不復

不能多此病微則可用同陽溫之若病聚寒

不散當奈何也亦因平素脈之虛弱知其

諸脈浮數為表熱固當發熱而瀉瀉惡寒似寒傷若

有痛處身盡痛飲食如常邪又不在者非表非裏

之邪逆於畜積有膿也

脈浮且數因血氣凝泣發為癰膿以癰疽之發

亦必惡寒發熱而非外邪入裏之候也

脈浮而數傷寒中多有浮雖不為風而數脈無力

傷寒分經卷七上脈法前篇

為虛風乃陽邪故為熱而虛因陽得為寒風虛

相搏則復發熱而瀉瀉惡寒也

脈浮數而無力為虛風發熱之候證雖發熱而

本屬虛寒是以仍瀉瀉惡寒言數為虛虛為寒

明所以當用溫經散邪不可竟行表散也

脈浮為邪在表而遲則為正氣虛面熱赤為陽氣拂鬱於表而戰惕

者虛也六七日之期當汗出而解乃不汗反發熱

者所差在於是遲遲為無陽以化故不能作汗

逆於皮膚其身必癢也

寸口脈陰陽俱緊者法當清中邪而入中於下焦
於上焦以人之鼻氣濁陰之邪而入中於下焦
通於地也清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰
渾也表氣微虛陰中於邪必心惕然內慄也此由
三陽主陽中於邪必有發熱頭痛項強頸攣腰
痛脛痠也諸所謂清邪者若陽中在霧露之氣邪也
陰中在地水土之氣即濁故曰清邪中上濁邪中
下也若陰中於陰氣盛則陽為內慄起於大小指
傷寒分經卷七上脈法前篇
故之足膝逆冷主三陰之氣便溺妄出此表氣微虛
則陽邪裏氣微急凡其於肌腠主行營衛陰陽者
也表裏之氣相熏而口爛食斷也中焦不治則於中
藏熱之氣相熏而口爛食斷也中焦不治則於中
胃氣不歸於上衝脾氣不能轉輸胃中不化而為
濁矣夫營出中焦衛出上焦不通營行於外營衛
不通血凝而不流行氣不治之衛氣前通而後陰
者則小便赤黃與熱氣相搏因熱作使遊行
於經絡之出入於藏府之熱氣所過之則為癰腫

亦病邪之若止陰氣前通者陽氣不相順厥而微
出於外也若止陰氣前通者陽氣不相順厥而微
陽在外陰之陰無所使陽者衛外而為客氣易內
使也無陽則陰無所使陽者衛外而為客氣易內
入納氣不復噎而出之聲音咽塞而難出
氣不通寒氣厥逆相為逐逐為熱氣所壅不得
寒為熱血凝自下狀如豚肝此營衛漸通亦非
陰之焦陽兩不相俱厥則脾氣孤而弱清便下利
不能五藏之液而注下焦而不關清便下利
收攝重欲令便而又不得數難施化而橫逆
後急重欲令便而又不得數難施化而橫逆
築而瀉痛難忍是神去機命將難全矣
傷寒分經卷七上脈法前篇
此條及下二條俱論陰陽錯雜之邪所謂三焦
相瀾內外不通為時行疫癘之總訣言寸口脈
陰陽俱緊者邪氣乘虛初犯中焦流布上下二
焦也寸脈浮而緊者清陽霧露之氣傷於陽故
曰清邪中於上焦尺部沉而緊者濁陰寒溼之
邪傷於陰故曰濁邪中於下焦清邪中上則有
發熱頭痛項強脛攣等證濁邪中下則陰氣為
慄言身不戰而但心惕惕然內慄足膝逆冷等
證今表氣微虛則陽氣內入裏氣微急則陰邪

傷寒分經

卷七上

版法前篇

美

附喻氏瘟疫論

秋無凄風冬無苦雨乃至民無

天札物無疵癘大和之氣漸漸於地安有勝邪
瘧疫哉然而周禮饑以逐疫方和氏掌之則瘧
疫之由來古有之矣瘧人饑孔子朝服而致其
誠敬蓋以裝演巨像爲饑神不遇彷彿其形
人以正氣充塞其間俾疫氣潛消乃位育之實
功耳古人元旦汲清泉以飲芳香之藥止三毒

傷寒分經

卷七上

服法前篇

衆

傷寒論以氣芳香之氣重。滌穢也。後漢張仲景著
 併入痘病以混常法。然至理已畢具於脈法中。
 叔和不爲細釋。究竟所指之疫。仍爲傷寒。傷溫
 而致病。初不名疫也。因病致死。病氣尸氣混合
 不正之氣。斯爲疫矣。以故雜痘死雞。豬瘟死豬。
 牛馬瘟死牛馬。推之於人。何獨不然。所以饑饉
 兵凶之際。疫病甚行。大率春夏之交。爲甚。蓋溫
 暑潛熱之氣。交結互蒸。人在其中。無隙可避。病
 者當之。喉汗淋漓。一人病氣。足充一室。況千連
 牀並榻。沿門闔境。共蒙之氣。益以出戶尸蟲。載
 道腐爛。瘴柴掩席。委壑投崖。種種惡穢。上混蒼
 天。清淨之氣。下敗水土。物產之氣。入受之者。親
 上親下。病從其類。有必然之勢。如世俗所稱大
 頭瘟者。頭面腮腫。如瓜瓠者是也。所稱蝦蟆
 瘟者。喉痺失音。頸筋腫大者是也。所稱瓜瓠瘟
 者。胸高脇起。嘔汁如血者是也。所稱疔瘡瘡瘟者。
 遍身紅腫。發塊如癰者是也。所稱絞腸瘟者。腹
 鳴鼓。水瀉不通者是也。所稱軟腳瘟者。便溺
 澀白。足重難移者是也。小兒痘瘡尤多。以上疫
 證。不明治法。咸委劫運。良可傷悼。大率瘟疫症
 疹。古昔無傳。不得聖言折衷。是以墮落叔和坑
 塹。曾不若俗見摸索病狀。反可顧名思義也。千
 幸徵覈仲景一辨其脈法篇云。寸口脈陰陽俱
 緊者。至臍築。湫瀕命將難全。凡二百六十九字。
 關發與理全。非傷寒中所有事。乃論疫邪從入
 之門。變病之總。所謂赤文綠字。開天闢地之寶
 符。人自不識耳。篇中大意。謂人之鼻氣通於天。
 故陽中霧露之邪。者爲清邪。從鼻息而上。入於
 陽。入則發熱。頭痛項強。頸攣。正與俗稱大頭瘟
 蝦蟆瘟之說符也。人之口氣通於地。故陰中水
 土之邪者。爲飲食濁味。從口舌而下。入於陰。人
 則其人心必先內濕。足勝逆冷。使溺妄出。清便下
 重。臍築絞痛。正與俗稱絞腸瘟軟腳瘟之說符
 也。然從鼻從口。所入之邪。必先注中焦。以次分

欲利其陰也前之陰陽錯雜不可定其至也陰邪之至也已有分明可因其陽邪之上行治之尚非不可治也

脈陰陽俱緊至於吐利陰邪極盛矣倘吐其緊脈

獨不解則知陽邪雖去而陰寒之木氣仍存

加夫入安此為正氣將欲解也若脈遲至六

日不欲食此為脾尚有不和為晚發變證水停

故也為未解以勝之若食自可者是水之為欲解

也

病六七日為週經應解之期手足三部脈皆至陰陽大小

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 三

病邪將去正氣大煩而甚口噤不能言其人躁

擾者知必欲汗而解也設非皆至之脈則為

今人但知六七日欲作戰汗而脈伏不知三部

脈皆至而煩躁口噤亦是作汗之兆故仲景重

申此義以明之

若其脈緊去和其人雖大煩淫熱之氣蒸日重其

臉內際黃中上之色者此散其大煩正為欲解

而也

上條但脈之而知其解此條兼望色而知其解

也

脈浮而滑非不治浮則為陽滑則為實陽實相搏

而其脈兼數疾是日重陽邪衛氣失度之所由浮

滑之脈數疾復發熱汗出者此為不治

衛有常度從虛而健運晝則行陽二十五度夜

則行陰二十五度今浮滑之脈數疾則風痰實

火壅塞於躔次間衛氣從何得署失陽度則不

寤所以有風痰卒壅昏迷不甦諸證失陰度則

不寐所以有癲狂厥怒目不得眴等證若復發

傷寒分經 卷七上 脈法前篇 三

熱汗出則陽氣噴薄出而不入遂致魚口氣粗

咽喉鋸响或為登高怒罵卒然僵仆而不可治

矣

傷寒欬逆上氣非死證其脈散者陰絕而陽死謂

其已形損故也

實證以欬喘為輕邪中表而不及裏中上而不

及下虛證以欬喘為重正自裏而損及表自下

而損及上二者須於脈中辨之傷寒脈浮虛則

浮而散漫無根傷寒脈數虛則數而散亂無緒

以上二條所以結此篇之大旨從前脈法先舉陰陽復舉表裏藏府反覆詳明者良以人身有正氣有邪氣邪氣盛則實而實其實則不治正氣奪則虛而虛其虛則死故於上條出一邪氣盛則實之脈法以示例此條出一正氣奪則虛之脈法以示例所以雙結上文也

卷七上

服法前篇

集

述第五種

南陽張

機仲景著

武原吳儀濱題

海昌周廣業廬

泰溪許栽培之

傷寒分經

脈法後篇

上篇明脈理之精微居多此篇示
診法之大要居多蓋脈理既無不

明而呼吸間又有一定之軌度則於凡病之來而藏氣而歲氣而形氣而陰陽二氣無不有以洞悉其盛衰卽相乘之脈殘賊之脈亦若然犀莫遁自此而可以守約自此而可以該博自此而可以傷寒之脈卒病之脈準諸雜證亦可以雜證之脈準諸傷寒卒病性脈

傷寒分經

卷七下

藏法後集

問曰脈有三部陰陽似有陰陽之相乘者無定邪
犯與不營衛血氣蓋營衛在人體躬必乘乎此營
外無不隨脈道呼吸而出入乎上下於中凡脈之
見於寸口跌陽少陰因息以遊布津液因營流通
者無非此也營衛如血氣津液皆得依隨時動作效象形容自是
營衛之盛衰呈現於脈隨時動作效象形容自是
如春而木用事營衛弦秋而金用事營衛浮冬而
用事營衛閉沉夏而火用事營衛洪間兼察形
藏脈應以觀脈象大小不同一時之間誰人不知惟其
色以觀脈象大小不同一時之間誰人不知惟其

變而無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或在或亡病至軌改易其進退低昂心迷意惑動便失持焉紀綱者願為其陳法診令得分明師曰取火於陽子之所問斯道之根源也脈有三部尺寸及關

寸關尺為三部之說從魚際至高骨有一寸故名寸從尺澤至高骨有一尺故名尺界乎尺寸之間故名關朱子曰俗傳脈訣詞最鄙淺乃能直指高骨為關似得難經本旨然則關有定位傷寒分經卷七下脈法後篇二

自脈訣始滑氏曰寸為陽為上部主頭項已下至心胸之分也關為陰陽之中為中部主膈脰肱脇之分也尺為陰為下部主腹足脛胫之分也

營衛流行於其間自不失其銓

素問曰營者水穀之精氣和調於五藏灑陳於六府乃能入於脈也故循脈上下衛者水穀之悍氣其氣慄悍滑利不能入於脈也故循皮膚之中分肉之間靈樞曰人氣受於穀穀入於胃

以傳與肺五藏六府皆以受氣其清者為營者為衛營行脈中衛行脈外難經同而紀氏云素問曰營者水穀之精氣則清衛者水穀之悍氣則濁精氣入於脈中則濁悍氣行於脈外則清然則三經之文雖少別而其旨則同清濁之分雖殊而其為氣則一然三十二難又曰心者血肺者氣血為營氣為衛營行脈中衛行脈外行中行外則同而營又以血言言心肺而不言水穀故王氏曰清者體之上也陽也火也離中傷寒分經卷七下脈法後篇三

之一陰降故午後一陰生即心之生血也故曰清氣為營濁者體之下也陰也水也坎中之一陽升即腎之生氣也故曰濁者為衛滑氏曰以用而言則清氣為營者濁中之清者也濁氣為衛者清中之濁者也以體而言則清之用不離乎濁之體濁之用不離乎清之體故謂清氣為營濁氣為衛亦可也謂營濁衛清亦可也又曰統而言之則營衛皆水穀之氣所為故悉以氣言可也析而言之則血為營氣為衛固自有分

平準也

附喻氏營衛論并答營衛五問

謂宗氣積於上焦營氣出於中焦衛氣出於下焦論其所從出之根柢也衛氣根於下焦陰中之微陽行至中焦從中焦之有陰有陽者升於上焦以獨生陽氣是衛氣本清陽之氣以其出

卷七下

朋法後集

四

於下焦之溺陰故謂濁者爲衛也人身至平以陰盡而陽獨治目開則其氣上行於頭出於口太陽膀胱經之睛明穴故衛氣晝日外行於手足六陽經所謂陽氣者一日而主生於太陽之經穴上出爲行次又謂太陽主外也衛氣慄悍不隨上焦之宗氣同行經隧而自行各經皮膚分肉之間故衛行脈外溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔也營氣根於中焦陽中之陰行至上焦隨上焦之宗氣降於下焦以生陰氣是營氣本潤陰之氣以其出於上焦之清陽故謂清者爲營也營氣靜專必隨上焦之宗氣同行經隧始於手太陰肺經太淵穴而行手陽明大腸經足太陽膀胱經足少陰腎經手厥陰心胞絡手少陽三焦經足少陽膽經足厥陰肝經而又始於手太陰肺經故謂太陰主內營行脈中也衛氣晝行於陽二十五度當其王卽自外而入交於營營氣夜行於陰二十五度當其王卽自內而出交於衛其往來貫注並行不悖無時或

卷七下

脈法後篇

五

哉凡醫不能察識營衛受病處深虛實寒熱先後之變治必顛倒誤人矣

問衛氣晝行陽二十五度晝至夜而伏耶營氣夜行陰二十五度晝至夜而伏耶曰人身晝夜循環不息只一氣耳從陰陽而分言二氣晝爲陽則衛氣主之夜乃陰則營氣主之衛氣夜行於陰營氣晝行於陽則不得而主之譬日月之行原無分於晝夜而其經天之度則各有分矣

問營行脈中衛行脈外果孰爲之分限耶曰此義前論中已明之矣今更推其義天包地陽包陰氣包血自然之理也營衛同行經脈中陰自在內爲陽之守陽自在外爲陰之護所謂並行不悖也

外男女居室男自正位乎外女自正位乎內聖神亦只道其常耳

問二十二難謂經言脈有是動有所生病一脈變爲二病其義至今未解曰此正論營衛主病

傷寒分經

卷七下

六

先後天二病也。一為先天不足，二為後天失調。先天不足，則氣血虧損，百病叢生。後天失調，則陰陽不調，諸疾蜂起。此二者，乃為百病之根。故欲求長生，必先固其本。本固則枝榮，枝榮則葉茂。此理之至明者也。

腎為水藏，水性就下，故其脈循骨而沉。心為火藏，火性炎上，故其脈浮。此二者，乃為人身之水火。水火既濟，則百病不生。水火不濟，則百病叢生。此理之至明者也。

傷寒之病，其起也，多由外感。外感之邪，初起之時，多在太陽。太陽受邪，則身熱、頭痛、惡寒。此為傷寒之始。若不早治，則邪氣內傳，變生他病。此理之至明者也。

傷寒分經

卷七下

七

藏而合血脈，故其脈洪猶洪水之洪。大而有力，為陽脈。此為心之脈。心火炎上，故其脈洪。此理之至明者也。

瀾之謂也。肺為金藏，而合皮毛。金得五行之清，故其脈浮。肝為木藏，木性曲直，其脈循筋而行。故其脈弦。此二者，乃為人身之風木。風木不和，則百病叢生。此理之至明者也。

此合四時為正。通常而可久也。說文：黍之重，曰銖。六銖為一分。蓋指脈之以三菽六菽約輕重而言也。然言四藏而不言脾者，脾之和平，不可得見。故其經常不可言。欲人當自推也。

出入升降，應漏刻以周。旋轉於水下二刻一息。命曰平人。故平人一呼脈行三寸，一吸脈行三寸。呼吸定息，脈行六寸。以呼吸之數言之，一日一夜凡一萬三千五百息。每刻一百三十五息。每二刻二百七十息。脈行一十六丈二尺為一周循環。

一周身也積而盈之每時八刻計一千八百息
脈行六十四丈八尺營衛四周於身十二時九
十六刻計一萬二千九百六十息脈行七百七
十七丈六尺為四十八周身刻之餘分得五百
四十息脈分行二周身得三十二丈四尺合一
萬三千五百四十息總之為五十度周身脈得
八百一十丈也此呼吸之息脈行之數周身之
度合晝夜百刻之詳也

傷寒分經 卷七下 脈法後篇 八
脈行周身當復於寸口以兩手脈為百脈流注朝
五十度

而虛實無不見焉
脈之變化相乘由陰陽之相干而風則為陽浮虛
陽主寒則為陰乘堅內也沉潛為水停蓄於內支
飲外薄於急而弦動則陰陽相搏聚為痛數則陽盛
熱煩此虛實所見之具

設或脈有不如此應者則知察識變所緣由三部
所與病有不相應又當虛實之見亦不可執前
屬不同病亦有異變端虛實之數者以為一定
之限也
太過實強可怪不及虛亦然病以邪之脈不空見府

中必有奸當審察其表裏并三焦分別焉
知其病所舍從舍消息診看之不料料度其藏府
舍枝派而獨見若神今為子大綱而條記其節且
授以傳與賢人

太過不及總虛實而言怪非常也言二者不當
見見則當知其怪異也奸傷犯也難經曰上焦
心下下膈在胃上口主內而不出其治在膻中
玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是中焦者在
胃中脘不上不下主熱腐水穀其治在臍旁下
傷寒分經 卷七下 脈法後篇 九

焦者當膀胱上三焦別清濁主出而不內以
傳道也其治在臍下一寸故名三焦舍謂病邪
客止之處也
以上八節設問答敷陳脈道之大槩故為首章
以發明診家入武之始事此節乃總結上文以
起下章示學者當從此以達彼因略以致詳也
師曰呼吸者脈之頭緒也
呼者氣之出脈之來也吸者氣之入脈之去也
脈隨氣之出入而來去名狀雖多呼吸則其源

頭也然此以兩手之脈言若以周身言之則循環無端無頭尾之可言矣

初持脈來疾去遲此呼出而疾入則遲名

口內虛外實陰不及陽太過也初持脈來遲去疾此呼出而疾入則遲名也

劉氏曰來者自骨肉之分而出於皮膚之際氣之升而上也去者自皮膚之際而還於骨肉之分氣之降而下也經曰來者為陽去者為陰此之謂也疾即上章之太過亦陽也遲即上章之

傷寒分經 卷七下 脈法後篇

不及亦陰也然來去出入者脈之大關鍵也內外虛實者病之大綱領也知內外之陰陽而明其孰為虛孰為實者診家之切要也為此章以次首章者示學者下手功夫之急務也

問曰上工望而知之中工問而知之下工脈而知之願聞其說師曰病家人來請云病人苦發熱身體疼及師到病人自安臥則不見有發熱診其脈沉而遲者則為表邪外解之証知其差也何以知之表有病者脈當浮大今脈反沉遲故知

愈也

假令病家人來云腹痛內舍卒作痛及師到病人

自安坐則不見有卒脈之浮而大者則為裏邪已

之陽知其差也何以知之若裏有病者脈當沉而

遲今脈浮大故知愈也

病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向

壁臥此熱已去也凡陽證多外向陰證多

已得陰設令脈不和但餘熱未處言已愈

假令病人向壁臥聞師到不驚起而盼視若三言

傷寒分經 卷七下 脈法後篇

三止脈之嚙唾者此詐病也設令脈自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數千百處乃愈詐者必吐露實情也

此復喻人恐足以勝詐覺人勿售欺之意盼恨

視貌○病非婦穉詐者殊少仲景為醫謀者至

矣

師持脈病人張口氣欠者惟陰陽和無病也

脈之有呻吟者病也

而舌強言遲者風也

言遲即語言蹇澀之謂經絡強急則舌強筋攣則經絡拘急肝屬木其合筋其主風搖頭言者裏痛也

痛深則艱於出聲故必待頭左右引而後能言步履不行遲者風邪束其表強也

表以經絡言強以拘急言

坐而伏者內短氣則增促也

坐而下一腳伸求者腰痛也坐久則裏實護腹其下如懷卵物者心痛則偏不傷寒分經

卷七下 脈法後篇 三

以上十二節言望聞問切而知之病

師曰伏氣之病伏藏於內不見於外以意候之知

何氣也今月之內欲有伏氣是謂以假令舊有伏

氣今時乃發既見於常須脈之若脈微弱者陰之

肺少陰支脈從腎上貫當喉中痛似傷非若喉

痺之有也病人云實咽中痛雖爾似熱今復欲下

利又似寒蓋咽痛下

此即冬寒伏藏少陰腎中至春分後夏至前始

發之溫病也喉痺一證挾時令之氣亦發於春夏之交病屬實熱痛必有傷此伏氣痛而無傷證似同而表裏寒熱實不同也

問曰人病恐怖者其脈何狀師曰脈形如循絲纆纆然不其面白脫色也

循理治也絲言細也腎主恐病恐則腎之精液不能營於脈華於色所以有卒然之變也○凡

病恐懼者十中難愈一二

問曰人不飲其脈何類師曰不飲則肺失滋養脈

傷寒分經 卷七下 脈法後篇 三

自溫唇口乾燥也

此以不飲而然非由此而不飲也

問曰人愧者其脈何類師曰愧則神消氣面色乍白乍赤血亂而變不一也

問曰脈有災怪何謂也師曰假令人病脈得太陽

與形證相應因為作湯比還送湯如食頃病人乃

大吐若下利腹中痛師曰我前來不見此證今乃

變異是名災怪又問曰何緣作此吐利答曰或有

舊時服藥已過於經今乃發作故名災怪耳

此勉醫家病家當兩相敬慎庶不為災怪致生疑累之意

問曰難經說脈有三菽六菽重者何謂也師曰凡

脈者越人^教人以指^候著意^候按之^{輕重有差等}如三菽

之重者肺氣也如六菽之重者心氣也如九菽之

重者脾氣也如十二菽之重者肝氣也如十五菽

之重者腎氣也^{之舊本有按之至骨四字乃傳訛}

菽大豆也滑氏曰肺最居上主候皮毛故其脈

如三菽之重心在肺下主血脈故其脈如六菽

傷寒分經 卷七下 脈法後篇 西

之重脾在心下主肌肉故其脈如九菽之重肝

在脾下主筋故其脈如十二菽之重腎在肝下

主骨故其脈如十五菽之重者腎氣也下指之

法輕重有差等蓋五藏以上下之次第而居故

其氣之至有如此遠近之約摸耳○此條言氣

難經言部部者一定之部位而氣在其中氣者

元氣穀氣之精而部位亦在不言之表也虞氏

有言假令左手寸口如三菽之重得之乃知肺

氣之至如六菽之重得之知本經之至虞氏以

氣推明越人言外之意如此然則此條以氣言

者豈非發明難經此意於虞氏未言之先與不

然既曰經說不易其部字也雖然難經有與皮

毛相得者與血脈相得者與肌肉相得者與肝

平者舉指來疾者五句在各起句重字下而此

無之則是難經詳而此略參看則義全矣

問曰脈有相乘有縱有橫有逆有順何也師曰水

行乘火金行乘木而水能剋火而乘火金能剋木

曰縱火行乘水木行乘金而火能剋水而乘水

傷寒分經 卷七下 脈法後篇 圭

乘金火生於木而反乘木名曰逆金行乘水木行乘

火金能生水而乘水木能生火而乘火母之及子其勢從故名曰順也

乘猶乘舟車之乘縱直也橫者縱之對順從也

逆者順之反○上條言脈原於五藏合二五而

成部位之次第乃推明脈之所以始也此條言

脈具五行刑生制化之義乃五藏六府吉凶生

死之樞機脈之大要也

問曰東方肝脈其形何似師曰肝者木也名厥陰

其脈微弦濡直而長是肝脈也肝病自得濡弱者愈也

脈以有胃氣為吉微微之弦有胃氣之謂也難經曰春脈者肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來實弱輕虛而滑端直以長故曰弦蓋肝主筋故其脈如此○此述素問難經之大意也

假令得純弦脈者死何以知之以其脈如弦直是肝藏傷故知死也

傷寒分經

卷七下 脈法後篇

六

純弦即素問難經所謂直肝脈至如弦直又謂中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦如新張弓弦是也

又問南方心脈其形何似師曰心者火也名少陰

其脈洪大而長是心脈也心病自得洪大者愈也

心主血脈其王在夏故其脈洪大而長應萬物

盛長之象也然素難皆言心脈鈎鈎以性情言

洪大以體勢言

心脈本

假令脈來微則舉之片大則按之片餘故

名曰反其沉取也脈來頭小木大者初

則為正虛故名曰覆因其大非病在表也若上

浮取微而沉取小者氣虛則汗出也下取微

而木白大者則為實邪關格不通也不得尿

後本木大者則為實邪關格不通也不得尿

化不下頭無汗者可治頭有汗者陽氣欲上死

又問西方肺脈其形何似師曰肺者金也名太陰

主皮毛上其脈毛浮也肺病自得此脈若兼得遲

緩胃土之者金得土皆愈也

若得數者則劇何以知之數者為南方火脈火尅

傷寒分經 卷七下 脈法後篇 七

西方金通調水道法當服壅腫是水火為難治

也肺癰肺脹言

又問北方腎脈其形何似師曰腎者水也名少陰

其脈石沉是腎脈也腎病自得石沉者愈也此

脫落今

腎主寒水其王在冬故其脈石沉應萬物收藏

之象也

假令下利則屬少寸口關上尺中悉不見脈是氣

泄而不上逆然或尺中時一小見是腎之生氣未

脈以再舉頭者三部之脈可以藉腎氣而生也若雖見而一息再損脈來至則生氣衰微仍為難治此節舊錯在本至之今移

問曰二月得毛浮脈何以處言至秋當死師曰二月之時春分後肝木用事應得濡弱之弦今反得後秋分毛浮者是肺脈也肺屬金金來尅木故知至秋死他皆倣此

二月肝旺之時不能自旺反為勝我者而乘之肝氣憊矣然不即死者以尚有旺氣相扶所謂傷寒分經

卷七下 脈法後篇

大

自得其位也至秋而死者金旺木空藏氣孤危全無所倚矣○此承上文復以四時脈氣屬五行生尅應病以主吉凶生死之理揭一以例其餘所以示人持診之要法也

師曰脈肥人責浮瘦人責沉肥人肌膚厚其脈深當沉今反浮瘦人肌膚薄其脈淺當浮今反沉故責之

諸氏曰肥人如沉而正沉者愈沉瘦人如浮而正浮者愈浮此之謂也

師曰寸脈為陽陽生於尺而動於寸故下不至關為陽絕尺脈

為陰陰生於寸而動於尺故上不至關為陰絕此皆不治決死也若計其餘命未盡之天年死生之日期期約以月節

師曰脈病作大乍小或至或損弦緊浮滑不一殘賊冲和之氣而病息不與形相應名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者短命死人病形體憔悴食脈反不病時之從無過不名曰內虛以無穀神雖困無苦及之偏

經曰形氣有餘脈氣不足者死行尸之謂也又曰人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五藏六府皆以受氣然則內虛以無穀神者穀氣弗充之謂也

卷七下 脈法後篇

九

問曰脈有殘賊何謂也師曰脈有浮滑陽盛也弦緊陰盛也沉澀陰盛也陽盛為太此六者若見於各部之中名曰殘賊能為諸部脈作病如人傷之為病脈之類所謂邪不空見者此之謂也

問曰翕奄沉名曰滑何謂也師曰沉為純陰設於翕為正陽盛於上陰陽和合併集無偏勝也故令脈滑關尺自平陽明胃脈微沉食飲自可病也少陰腎脈微滑

滑者水沉如石緊之浮名也此為陰實邪在腎也出膈內廉上股內貫脊屬腎腎主水陽熱陷入於陰熱鬱而蒸發其人必股內汗出陰下溼也

翕起而盛動於上旋復叢聚而合也與論語始作翕如之翕同奄忽然覆也沉沒於下也

問曰曾為人所難緊脈從何而來師曰假令無汗若吐以肺裏寒故令脈緊也假令欬者坐飲冷水故令脈緊也假令下利以胃中虛冷故令脈緊也此條一問三答以揭緊之為寒而有三因之不

傷寒分經 卷七下 脈法後篇

同以見脈非一途可取之意

寸口脈主病不一然不外諸微為無陽諸濡為無血陰虛則諸弱為發熱陽虛則諸緊為寒諸為寒所乘者虛而不通則為手足逆厥虛而壅閉鬱冒虛而不行於四肢夫氣血不自生必藉於上則為鬱冒於外則為不仁胃府之穀氣而生以胃無穀氣不能上輸脾澹不通於心則口急不能言遊溢於脾而戰慄也

脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上澹反在下微則陽氣不足澹則無血陽氣反微中風汗出

而反躁煩澹則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠

叔和以濡弱微澹之脈見為陽氣與陰血兩虛分類於不可發汗不可下二篇之首推其所以不可汗下之故豈非以陽證陰脈乎而陽證陰脈大率又歸重在陽微一邊觀下文云陽微發汗躁不得眠又云陽微不可下下之則心下痞

傷寒分經 卷七下 脈法後篇

變況於有汗之躁煩其亡陽直在轉盼間此卽用真武湯尙恐不及奈何可更汗更下乎

脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上澹反在下微則陽氣不足澹則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澹則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下痞

義已見前條

脈濡而弱弱反在關濡反在巔澹反在上微反在下弦為陽運動微為裏陰虛寒以上則邪實下

則裏虛意欲得溫微弦為虛不可發汗發汗則氣慄不能自還陽亡而陰獨治也。此條連下二條是首節舊本誤置中節

若此證欬者則加劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中饑煩晡時而發其形似瘧雖似有寒而無熱是虛而寒慄也若欬而發汗則肺金愈蹇而苦服滿腹中必復堅也。此條舊本誤置

諸脈得動數微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾胃燥而煩三者之變其形雖與寒慄不能自還相

傷寒分經卷七下脈法後篇

象而根本自異其源頭也。此條舊本誤置首節今移置末節脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽邪運動微為裏陰虛寒以上則陽實下

此舉前不可發汗發汗則寒慄不能自還此舉而復以不可下重出下文乃言下之之變也義已見前

微則為逆欬則吐涎下之則欬止而利因不休利不休則胸中如蟲齧入則出小便不利兩脇拘

急喘息為難頸背相引孽則不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此為除中口雖欲言舌不得前

寒以虛言故曰反汗出身冷若冰也不得前猶言不能出也

脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下浮為陽虛數為無血浮為虛數為熱浮為虛自汗出而惡寒數為痛振寒而慄微弱在關胸下為急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相

傷寒分經卷七下脈法後篇

搏形如瘡狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下為痞小便淋瀝小腹甚硬小便則尿血也

首三句與上虛者不可下也一條同上條弦反在上弦脈則為陰陰者寒也故曰微反在下此條浮反在上浮脈則為陽陽者風也故曰數反在下蓋兩舉傷寒中風之本虛者釋其變以曲

致叮嚀之意

脈數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣卻結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脈數者不可下

下之則必煩利不止

皮毛相得已上明脈之所以浮數也煩利亦協熱也

脈浮大應發汗醫反下之此為大逆

浮為太陽大為陽明二脈兼見但當從太陽而

發汗不當從陽明而下奪○凡太陽表邪未盡

以下為大禁

問曰濡弱既為病脈何以反適十一頭師曰五藏六府

相乘故令十一

傷寒分經

卷七下

脈法後篇

雷

此論先天之氣必賴後天水穀之氣而生以胃者五藏六府之本也五藏六府之中俱有胃氣如前所言肝脈微弦濡弱而長弦長者肝脈也濡弱者胃氣也以胃氣而間於五藏六府之中則為濡弱以胃氣而自見其脈則又遲而緩故曰跌陽脈遲而緩胃氣如經也由是而知遲緩與濡弱皆胃土之脈也故問濡弱之脈何以反適十一頭答以十一者五藏六府也濡弱者萬物之初始莫不皆濡弱適往也言五藏六府相

乘而往反初皆濡弱故濡弱者通該夫十一者之首事也

問曰何以知胃氣乘六府何以知胃氣之乘五藏師

曰五藏六府諸陽浮數而濡為胃氣乘六府諸陰

沉遲而濡為胃氣乘五藏也

胃為五藏六府之本十二經脈之長氣血生始

之根素問千言萬語總以胃氣為本而傷寒論

自始至終又無不歸重於胃氣先聖後聖其揆

一也○世俗有餓不死傷寒之說一見發熱即

傷寒分經

卷七下

脈法後篇

雷

禁其食而餓死者比比皆是可慨也夫

寸口衛氣盛豐隆而有充名曰高營氣盛潤澤而

之象名曰章高章相搏氣血俱盛則脈有網維之意故名曰綱

自此以至終論寸口跌陽少陰之脈有盛衰有

和平有太過與不及也

衛氣弱則心常自怖名曰慄營氣弱則心常自仰

名曰卑營衛相搏榮養則藏府因之有所傷

損名曰損

衛氣和舒而名曰緩營氣和徐而名曰遲營衛俱和緩遲相

搏沉實而名曰沉

上三節首以寸口候營衛之有餘不足以及和平也

寸口脈緩而遲衛氣為陽主氣緩則陽氣長其色鮮明其顏光澤其聲商而毛髮且長營氣為陰主血遲則陰氣盛骨髓日生血滿肌肉繁薄而鮮鞭陰陽相抱而不背營衛俱行而不剛柔相得於內外而不息名曰強

此復以寸口之脈論營衛以營衛陰陽之氣皆傷寒分經

大會於寸口也

跌陽脈主脾滑而緊滑者為食胃而氣實緊者為在脾邪氣強持實擊強兩相搏擊其痛還自傷以手把刃而坐作瘡非由別藏也

寸口脈浮而大浮為正虛大為邪實邪之浮大在於尺則為關陰浮大在於寸則為格陽關陰則得施化

主不得小便格陽則陽氣不能吐逆此以寸口論關格也

跌陽者上脈伏而牆土不宣通伏而不則中焦不

而吐逆由水穀不化也通而不則上焦食并不得入矣中上二焦壅塞而不通亦名曰關格

此以跌陽論關格也

脈浮而大浮為風虛虛邪不正大為氣強邪風傷和不柔風虛氣強相搏則干於皮膚必成隱疹隱疹欲出而不出故身體為痒痒者風行皮膚故名泄風久久皮膚肌腠入於經為痲癩矣

素問曰外在腠理則為泄風又曰泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾上漬其風不能勞事身

傷寒分經

關格者正氣虛而陰陽不交通也此傷胃大為泄風痲癩者正氣虛而虛風之邪干於皮膚經脈也均之浮大而見證不同如此

寸口脈弱而遲弱者衛氣微遲者營中寒然營中微亡陽微以諸營為血血寒陰則拒陽於發熱諸也衛為氣氣微者非邪心內饑饑而化穀故虛滿不能食也

營衛虛寒如此值醫者不察以致跌陽脈全無和

大而緊者當即下利為難治

寸口脈弱而緩弱者胃中陽氣不足則不能緩

者胃穀中之氣有餘則鬱而化穀噎飽而吞酸

食卒不下氣填於膈上此飲食也

跌陽脈緊而浮浮為陽氣越緊為陰寒盛浮為陽

而腹中滿滿為陰邪絞痛浮緊相搏則氣鼓腸

鳴而轉轉即為氣動膈中氣乃得下設少陰

之脈不至必其陰腫大而虛虛少陰之脈循陰

而主水惟跌陽之土敗也

傷寒分經卷七下

寸口脈微而濇微者衛氣衰不行濇者營氣弱不

逮營衛不能相和將三焦無所仰藉身體頑

痺不仁痛癢營氣不足則煩疼心虛神短口難言

衛氣虛則表疎不惡寒而數欠三焦不歸其部

各廢其所司之職事上焦不歸者噫而酢吞則受納中焦不

歸者不能消穀引食腐矣下焦不歸者則約制

遺洩矣

上焦主受納中焦主熟腐下焦分清濁主出而

專制因營衛不相和致三焦皆失其常也

跌陽脈以候脾沉而數沉以候裏故為穀實數

能消穀雖病不為緊者陰不化穀病為難治

寸口脈微而濇微者衛氣衰濇者營氣不足衛氣

衰面色黃營氣不足面色青營為根衛為葉營衛

俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也

首三句與上條差衰字然衰即不行不足即不

逮更互發明者也氣為衛色本白白屬金黃土

色也金生於土金無氣色不顯故土之色反見

也血為營色本赤赤屬火青木色也火生於木

傷寒分經卷七下

火無氣色不明故木之色反見也營為根者言

血營於人身之內猶木之根本也衛為葉者言

氣衛於人身之外猶木之枝葉也寒慄營不足

以養而衛亦不能外固也欬逆唾腥吐涎沫者

氣不利而血亦不調也○此言營衛外合於肺

而充於皮毛也內經云肺者氣之本其華在毛

其充在皮今營衛之氣衰微不能外合於肺華

於毛充於皮故面色青黃也

跌陽脈浮而芤浮者為風衛氣衰芤者為失營氣

傷形損則其身體必瘦營腸肌肉甲錯而枯拆浮

乾相搏宗氣衰微四屬斷絕

宗氣三焦隧氣之一也鍼經曰宗氣積於胸中

出於喉嚨以貫心脈而行呼吸是也四屬皮肉

肌髓也蓋三焦乃氣之道路衛氣衰而營氣傷

所以宗氣亦衰微四屬不相維而斷絕也

寸口脈微而緩微者衛氣不能固疎疎則其膚空

緩者胃氣有餘實實則穀消而水化也穀入於胃

脈道乃行而入於經其血乃成營盛則其膚必疎

傷寒分經 卷七下 脈法後篇

三焦絕經名曰血崩

衛主溫分肉肥腠理疎則分肉不溫腠理不肥

故曰空也穀入於胃至其血乃成乃承上文而

言水穀化消則胃益實而能淫精於脈以成其

血而使營盛營盛則衛益衰故曰其膚必疎也

三焦者氣之道路也經經也絕經言血不歸經

也崩山壞之名也陰血大下而曰崩者言不能

止靜與山壞之勢等也

跌陽脈微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏

虛寒不能化則為短氣而神氣

寸口脈洪而大數而滑洪大則營氣長滑數則衛

氣實營長則陽盛怫鬱不得出身衛實則堅難大

便則乾燥三焦閉塞津液不通此營衛強盛三

發其汗以散陽邪氣不能過須重復其汗以通

者不知更下之則熱留胃燥乾涸大便不通小便

不利營衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌

燥齒黃焦故大渴至過經成壞病針藥所不能制

勢亦危與水灌以潤其枯槁陽邪氣微散身覺寒以

傷寒分經 卷七下 脈法後篇

溫衣覆之汗出表裏得通而然其病即除以其營

蓋人之形脈多不同將余之何故此之愈非

正法治之但為醫者所當慎持於汗下之先勿使

若不辨形脈之強妄犯太過不及傷人營衛矣

凡為醫所誤治而不得以正法治之者謂之壞

病前三陽經後附太陽少陽之證此未過經之

壞病仲景揭此二條以昭成法不過舉隅為例

耳至於過經不解歷遍諸治無非誤治之壞病

但既列過經條即不名之為壞病耳其用變法

以救悞治則同也水灌者謂凡患陽邪怫鬱大熱體燥內外如焚不能得汗以水灌其身使之寒慄然後溫其蓋覆以取汗也北人有用此法者然唯陽氣素強之人間有得効者否則閉其腠理汗愈難得而斃者多矣○夏月貪涼飲冷水或以冷水灌身澡浴亦大非所宜靈樞云形寒飲冷則傷肺斯其最也

脈濡而緊濡則陽氣微緊則營中寒陽微衛中風外發熱而惡寒營緊胃氣冷則微嘔心內煩醫不知傷寒分經

卷七下 脈法後篇

三

其外熱以為大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱淺在皮膚悵快不得眠不知胃氣冷緊寒深在關元技巧無所施猶汲水灌其身客熱即應時而去致寒證慄慄而振寒重被而覆之汗出而胃顛體惕而又振小便為微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸出顛倒不得安手足為微逆身冷而內煩遲欲從從救安可復追還雖欲救之焉前發汗太輕加以悞下鍼藥莫制與之水而

倖痊以營衛素盛也此則營衛素虧雖不經下但只誤汗誤與之水即屬不救然則證同脈異不察其脈但驗其證徒法不能行矣過愆其可免乎

脈浮而大浮為邪氣實大為血虛血虛為無陰則孤陽之獨乘虛而入陰部當小便因陰難胸中因陽虛之證今反小便利而大汗出外有餘矣設衛氣之實法當衛家之微熱是與營無者因得汗利今反更堅實所以陽強於外陰必消亡於內今之脈反前更堅實所以陽強於外陰必消亡於內傷寒分經

卷七下 脈法後篇

三

津液四射之微營竭血盡乾煩不眠血薄肉消而成暴液下注之微此陰安其同其微調醫復以毒藥攻其胃奔迫此為重虛致客陽亦去而有期必下如汚泥而死之證最多醫不知脈其操刃可勝敬耶少陰脈弱而瀉弱者微煩瀉者厥逆弱為虛損而不足陰虛生內熱所以煩然屬少陰故雖煩亦微也瀉為陰血少而不能與陽相順接所以厥而逆冷也

跌陽主脾胃所關脈不出則脾不能運輸水穀之

身上下也脾胃主肌肉身冷則脾氣以榮養周

少陰為血氣生始脈不至必腎之氣微而少精血

也真氣不奔之氣反促通而二入於肺膈宗氣不

足者虛肺出反聚因而不行血結心下遇陽氣上不得

於左乳下入熱歸陰股與陰相搏動上下之氣不

反退下陰中而厥逆若尸此為尸厥當刺期門

令人身體不仁之脈逆也此為尸厥當刺期門

所以散心下巨關所以行宗氣之反聚也。期門

之血結也刺巨關穴見少陽篇巨關穴在上腕上

五分

傷寒分經 卷七下 脈法後篇

寸口脈微陽氣衰也尺脈緊陰邪盛也陽其人虛損而

多汗愈虛知其陰邪常在陽遂至絕不見陽也

此應前篇第一章陰病見陽脈者生陽病見陰

脈者死二句併結通篇陰陽之理以明諸病以

生陽為主而獨歸重於生陽之義也

吳氏醫學述第五種

南陽張機仲景著

武原吳儀洛遵程續註
秦溪許栽培之較訂

傷寒分經

諸方全篇 仲景一百十三方論之惜未經梓行致

原稿散失而徐忠可為論門之高弟其所以著

左國內外篇也洛因與論篇篇若合符節以此

註各處下而仲景立法之妙嘉言尚論之意精

於斯益見庶幾西河洙泗後先倡導之精當

者。諸家之註傷寒論者甚多其方解之精當

載之方切用其

桂枝湯 桂枝舊本凡於桂枝下俱誤入去皮二字諸家

桂枝湯 桂枝舊本凡於桂枝下俱誤入去皮二字諸家

桂枝湯 桂枝舊本凡於桂枝下俱誤入去皮二字諸家

桂枝湯 桂枝舊本凡於桂枝下俱誤入去皮二字諸家

桂枝湯 桂枝舊本凡於桂枝下俱誤入去皮二字諸家

桂枝湯 桂枝舊本凡於桂枝下俱誤入去皮二字諸家

桂枝湯 桂枝舊本凡於桂枝下俱誤入去皮二字諸家

清
適

寒溫服一升

去滓

古人藥大劑金鑑中

上後獸
太易粥
經諸法
上見法
卷

傷寒分經

卷八

桂枝湯

1114

二、
信

然赤白

補瀉不同

仲良
景月
易云

病發熱汗

出此爲營

86

五苓散

於衛故氣鬱而無汗必以麻黃氣開通勝
理又須桂枝和營散邪汗大泄而鬱熱解矣

豬苓去木古本草止言木不分蒼白至梁陶宏
後人添設也此方茯苓各十八銖。十黍為一
之木當用者木。茯苓銖約今四分一釐七毫

六銖為一分即今之二錢半也。澤瀉一兩桂
四分。成。一兩十六兩為一觔。六銖桂兩

欲兼治表必用桂枝。右五味為末以白飲和
服用利水則宜肉桂。

服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈方寸匕者
作七正方一寸抄散取不落為度也

太陽者膀胱也邪尚在表則經熱經熱則身熱

傷寒分經 卷八 五苓散

四

惡寒邪或入裏則府熱府熱則煩渴或小便不

利五苓散利水藥也而仲景用之反以有渴為

主或胃乾脈浮者或浮數煩渴者或渴而燥煩

者或小便不利欲飲水者豈不知燥渴數熱去

水則失潤耶謂渴雖燥熱亡津液而燥熱之由

則以膀胱為津液之府因太陽隨經之熱鬱於

膀胱故逆上而為燥熱為煩渴在本經則小便

不利是燥熱為渴之本膀胱又為燥熱之本惟

以五苓通調水道則邪熱自化而津液得全治

渴之本也然太陽之經與府氣本相通故有經

之餘邪襲入於府為煩渴而經熱未除者亦有

府邪盛而牽定經絡致表未全解者五苓中有

桂枝以解表煖水以助汗也苓澤以滲溼泄熱

術以理脾崇土而內外之邪頓清所以為兩解

表裏之首劑若無表則當去桂枝矣故又有豬

苓之制也白虎湯則正治煩渴之劑以表證已

解邪去太陽故不責膀胱也此逐內外水飲之

支飲眩暈用澤瀉湯治嘔吐思水用豬苓散止

用二三味總不出是方為和劑云凡太陽表裏

傷寒分經 卷八 五苓散

五

未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即

吐或小便不利者宜服之又治霍亂吐利燥渴

引飲及瘦人臍下有動悸吐涎沫而煩渴者咸

屬水飲停蓄津液因結便宜取用但須增損合

宜耳。若津液損傷陰血虧損之人作渴而小

便不利者若再用五苓利水劫陰之藥則禍不旋

矣

真武湯入後太
桂枝加附子湯陽下篇

於桂枝湯內加附子一枚炮去皮破八片。凡
兩淮一枚餘依桂枝湯法
此治太陽中風誤汗之變證未至亡陽而但成

傷寒分經

卷八

桂枝加附子湯

六

漏風也亡陽者是真氣大洩有虛無實故或陽虛而陰盛如入寒冰地獄為厥逆下利等證則以內寒為重宜四逆湯以溫經或內怯外虛則為心悸頭眩身動振振欲擗地者如身全無外廓則以汗洩為重宜真武湯以溫經攝水若漏是已得汗而復為風邪所襲風宜有汗因循不止雖非如亡陽之大脫然槩比太陽之中風證則加虛燥矣於是有表則惡風津液外泄而下燥則小便難兼以衛氣外脫而膀胱之氣化不行也筋脈無津液以養則為四肢微急難以屈伸兼以風入而增其勁也此陽氣與陰津兩虛更兼風氣纏綿若用四逆則不宜乾薑之剛燥用真武則不宜苓朮之滲溼故用桂枝湯加附子以固表驅風而復陽斂液也然觀此方更用於風溼相搏身體盡痛不能自轉側者則知此處尤著眼在四肢難以屈伸故加附子以溫經而通其邪鬱也

桂枝加桂湯

傷寒分經

卷八

桂枝加桂湯

七

於桂枝湯內更加桂二兩共五兩餘依桂枝湯法此乃太陽風邪因燒針令汗復感寒邪從太陽之府膀胱襲入相合之腎藏而作奔豚故仍從太陽治例用桂枝湯加桂以內洩陰氣兼驅外邪也仲景止言針處被寒核起而赤者必發奔豚原未嘗及驚成氏因金匱要略病有奔豚從驚發得之腎氣欲上乘心之語遂註心氣因驚而虛腎氣乘寒而動是又註腎水敢於乘心之故也然亦有心經素虛不盡由於驚者矣先炙核上

桂枝人參湯
以散寒次與桂枝加桂湯以泄奔豚之氣所加之桂當用肉桂為是

桂枝 甘草各四兩 人參 乾薑各三兩 右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升日再服夜一服桂枝辛香經火久煎則氣散而力有不及矣故須遲入凡用桂枝諸方俱當依此為例用肉桂亦當臨用去粗皮切碎俟藥煎好方入煎

此證之心下痞硬下利不止與生薑瀉心湯證心下痞硬下利同與大柴胡湯證心下痞硬下

傷寒分經

卷八

桂枝人參湯

八

利亦同此獨主桂枝人參湯者蓋生薑瀉心在汗出解之後有裏而無表故但條飲清熱大柴胡證與此證則俱表不解矣但大柴胡證曾汗出則似太陽已解又嘔吐亦類兼少陽故竟主大柴胡湯以表邪欲去未去因自汗而非因誤下則痞鞭為實邪故加大黃枳實以攻裏而兼芍藥以和之也若此證則數下之又利不止且表裏不解是裏虛不守而利正虛邪奏而痞也故用理中湯以救裏虛但表未解故用桂枝以

散表邪是理中而仍不礙表則因所誤而法偶變耳所以桂枝新加湯中倍芍藥者以誤汗而陽虛邪奏恐陽孤無偶用芍藥以和之俾不至散亂也此桂枝人參湯中獨去芍藥者以誤下而邪入於陰芍藥陰寒無溫散之力也況下藥皆寒內已陰寒何堪再益也

此方之木常用白朮

葛根黃連黃芩湯

葛根半甘草各三兩黃芩三兩黃連三兩右四味以水八升先煮葛根減至二升更入諸藥煮取二

升去渣分二次溫服

成謂下利脈微遲邪在裏也若促為陽盛此雖下利而脈促知邪在表是也又謂病有汗出而喘者為自汗出而喘也即邪氣外盛所致此之喘而汗出謂因喘汗出也即裏熱氣逆所致故用此湯以散表邪除裏熱是也獨用葛根義何取乎蓋證屬桂枝枝醫反誤下則熱邪之在太陽者未傳陽明之經已入陽明之府所以其脈促急其汗外越其氣上奔則喘下奔則泄故舍桂

傷寒分經

卷八

葛根黃連黃芩湯

九

桂枝去芍藥湯

枝而用葛根專主陽明之表加芩連以清裏熱則不治喘而喘自止不治利而利自止矣甘草甘溫調其胃耳

此與上條因同而變異故其治殊然兩解表裏之意則一也

於桂枝湯內去芍藥餘依桂枝湯法

此條之誤下脈促與用葛根芩連湯者同而無下利不止汗出等證更見胸滿則陽邪仍盛於陽位幾與結胸同變但滿而不痛且諸下證未具胸未結也故取用桂枝甘草之芳甘薑棗佐

之以亟散太陽表邪去芍藥者以誤下故不敢用恐其助內入之勢復領陽邪下入腹中勢必胸滿不已而為腹滿也且誤下則腸胃為苦寒所傷者不堪復寒芍藥屬陰非寒滯者所宜徒令下焦積虛而陽邪湊之耳此方主誤下而脈促胸滿也

桂枝去芍藥加附子湯

於桂枝湯內去芍藥加附子一枚炮去皮破八片餘依桂枝湯法

前桂枝湯去芍藥以陽邪盛於陽位欲一劑掃

傷寒分經 卷八 桂枝去芍藥湯 桂枝去芍藥加附子湯

之故不復用和陰之法而去芍藥以絕其留連此亦誤下而致脈促但邪盛挾虛而微惡寒又原病未解則陽邪欲解而頓虛陽證變陰之象變發可虞故即於去芍藥方中加附子以回陽使發表溫經各行其事政與麻黃附子細辛湯以發少陰表裏之邪相彷彿耳按此與芍藥甘草附子湯證表不解而惡寒者相似加附子則同而去桂枝去芍藥相懸者蓋彼以汗出不解營衛新虛而反惡寒則以惡寒為重而去桂枝

以收陰固陽此以脈促而因誤下則表邪留擾為急故去芍藥而以桂枝清表耳

桂枝加厚朴杏仁湯

於桂枝湯內加厚朴二兩杏仁五十箇去皮尖餘依桂枝湯法

此本為太陽中風下後微喘表未解者用之不言脈緊必非無汗者也故仍用桂枝湯但誤下該利不利而喘是氣因誤下而上逆與虛證不同故於桂枝解表中加厚朴杏仁以利下其氣

傷寒分經 卷八 桂枝加厚朴杏仁湯

亦微裏之意也太陽病誤下微喘脈促宜用此湯若陽明病誤下微喘胸膈不快者又屬小陷胸證矣

桃仁承氣湯

桃仁五十枚去皮尖桂枝三兩芒硝二兩甘草二兩大黃酒浸

右五味以水七升煮取二升半去渣入芒硝更上火微沸下火先食溫服五合日三服當

微利先食謂服藥先於飲食也

脈未至沉邪與血搏而蓄膀胱結未望也但膀胱為太陽寒水之經水得熱邪加血搏之則沸

傷寒分經

卷八

桃仁承氣湯

主

抵當湯

能解太陽隨經之瘀熱此雖桂枝而有硝黃以
挈之使下豈若甘草薑棗并作一隊其為辛甘
發散者乎五苓與桃仁承氣均為太陽犯府之方一利前主氣分一利後主血分

水蛭

熬去翅足 桃仁二十箇 大黃三兩

右四味為末以水五升煮取三升去渣溫服一

升不下再服

表邪在脈宜浮而反沉脈沉胸宜結而反不結
證極可疑乃少腹鞭滿小便自利而人反發狂

傷寒分經

卷八

抵當湯

主

然後知上焦之表證脈相反蓋經府本通總是
太陽之邪相為留戀不足慮也且前如狂而此
發狂則熱邪已攻心矣前血自下此小腹鞭滿
則血蓄更堅矣桃仁承氣自不足以動其血且
小便因氣化而出而血不自下是少腹中所結
之血既不附氣而行更有何藥可破其堅蟲哉
所以用抵當湯之峻單刀直入斯血去而邪不
留并無藉桂枝分解之力耳然抵當湯為重劑
當用而不用與不當用而用為害匪淺故復以

身黃一證如脈沉結少腹鞭小便不利為無血
申辨之見小便不利乃熱瘀膀胱無形之氣病
為發黃之候也小便自利則膀胱之氣化行然
又小腹滿者允為有形之血耳表證仍在脈微而無表脈熱在下焦可知非桂枝所能散故

所能散故 桃仁承氣湯人後陽明上篇

調胃承氣湯

十棗湯

芫花熬 甘遂 大戟 大棗十枚 將以上三

藥各等分各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去渣內藥末強人服一錢七歲人服半錢七平旦溫服之若下少病不除者明日更服加半錢七得快下利後糜粥自養

凡方家云等分者謂諸藥舂兩多少皆同耳多是丸散用之云一錢七者七者匙也謂錢大也

下利嘔逆上下交征病勢亦孔亟矣設非痰飲即是太陽表邪作嘔協熱下利也表裏不明禍在反掌故以汗出不惡寒知其表解心下痞鞭

傷寒分經

卷八 十漿湯

西

滿引腸下痛乾嘔短氣知其裏未和可疑者發作有時及頭疼耳不知痰溼壅燥氣溼困於中則滿燥攻於頭則疼且發作有時則與表證之晝夜俱篤者大不侔矣但較之結胸則位卑在心下而非陽邪較之痞證同屬陰邪而多頭疼乾嘔明是邪搏痰飲勢極洶湧水氣下胃而利邪隔在頭而疼也故以芫花之辛甘遂太戟之苦以散泄其水邪大棗之甘以益土而勝水其不用芩連乾薑等者痰飲竊據勢同篡漢之莽

非單刀直入則漢兵雖多無益成敗耳此邪實滿胸膈與結胸雖涉近似與胃實則大不相同故但以瀉飲逐水為急

大陷胸湯

大黃六兩 去皮芒硝升一 甘遂一錢以水六升先煮大

黃取二升去渣入芒硝煮一二沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

識得太陽結邪甚高必用陷胸之義不獨瀉心承氣可無混用即結胸證中種種變態自可意會而得如脈遲禁下有時脈浮誤下動數變遲

傷寒分經

卷八

大陷胸湯

五

以陽邪結上焦不能復鼓也然鬲內拒痛心中懊憹非汗多惡寒脈遲者比以驟變故也如結胸屬太陽有從心上至少腹鞭滿而痛不可近且舌上燥渴日晡所小有潮熱而似陽明者以從心上三字辨其為太陽陽明而治從太陽結胸例有時傷寒頭汗出而審其為邪結在高陽氣不能下達有時傷寒脈沉緊心下痛而非胃實知其為寒因以致熱實不同於中風之陽同於中風結胸之熱已上四證藥非大陷胸不可

傷寒分經

卷八

太陽胸湯

天

者蓋結胸非若痞之挾飲宜瀉然太室之地單氣不能結亦必藉痰淫而邪聚至高故用藥必由胸脇以及腸胃滂始無餘否則但下腸胃結熱反遺胸上痰飲也由是高之又高進而至頸項強則變而為大陷胸圓雖高不如正結降而為小陷胸湯總以極高稍下辨之而不離陷胸之名以為太陽裏邪必從高為辨也若諸瀉心則於挾熱挾寒挾飲辨之三承氣則於熱勢之微甚虛實辨之而不從高下起見矣若大

柴胡亦有因結在胸脇者然挾表則雖高而結未甚不得從陷胸之例矣豈非太陽結邪有必不可混同於他下證者惟此高下之間耶但以

痛不痛為辨似未詳矣胸脇滿者胸間氣塞滿

脇肋脹滿也非腹中滿蓋表邪傳裏必先胸以多帶半表半裏是以胸滿多帶表證宜微汗胸滿諸實燥渴便秘宜以此湯下之總宜以脈之浮沉為辨

大陷胸圓

凡云圓者皆大彈圓煮化而和

大黃

葶蘆

芒硝

杏仁

各半

右四

傷寒分經

卷八

大陷胸圓

七

味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚以凡云彈丸及鷄子黃者別搗甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法結胸邪高原比心下痞塞者不同所以仲景前另出正在心下之條見結不止在心下也然至項亦強如柔痙狀但仰而不能俯為高之至肺中膈滿至急可知矣故於大陷胸湯又加屬火性急逐水之葶蘆以洩陽分肺中之氣閉加杏

仁兼治肺中氣熱散結利氣但胸邪十分緊迫大陷胸湯恐過而不留即大陷胸圓又恐滯而不行故煮而連滓服之又加白蜜甕連而潤導以行其盡掃之能也

太陽中篇論列方

麻黃湯

麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十箇湯

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內

諸藥煮取二升半去渣溫服八合覆取微似汗

不須啜粥餘如桂枝法將息

表受邪必從表驅出之為便寒傷營而營血不

利則骨節皆痛頭身腰皆太陽經之所過也邪

在表故脈浮寒性動急故兼緊汗即血也在營

傷寒分經

卷八

麻黃湯

式

則為血在衛則為汗寒傷營營血內滯不能外
通於衛衛氣閉固津液自鬱故無汗發熱而惡
寒然邪必由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主
衛氣包羅一身是證雖屬太陽而肺實受邪氣
故輕則時兼面赤拂鬱咳嗽有痰胸滿重而暴
則為喘皆肺氣鬱也詳辨脈證而治之麻黃
中空味辛性熱為肺家專藥肺主氣血隨氣行
故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌
表佐以杏仁泄肺而利氣是則麻黃湯雖太陽

發汗重劑實兼發散肺經火鬱之藥也觀朱肱

於夏至後用此湯每加石膏知母意可知矣汪

山云辛甘發散為陽仲景發表藥中必用甘草

以載作邪氣不使陷入陰分也若邪既入裏則

內氣陷胸大柴胡等並不用甘草惟調胃承

氣桃仁承氣二湯以其尚兼太陽部分之表邪

故不得不用也當知發表藥中之甘草必不可

少此湯須脈證全在於表方可用之今人有執

一二日在表並宜發汗設尺中弦數虛大為陰

傷寒分經

卷八

小建中湯

充

小建中湯

膠飴升芍藥六兩桂枝三兩甘草炙生薑切各大棗

十二枚勞右六味以水七升先將干五味煮取三

升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三

服

證本傷寒而借川杜枝湯君以飴糖又加倍芍

藥則桂枝特和表而建功於中矣其所以先建

中者謂寒邪與風邪不同風邪頃刻外熱寒邪

值中氣虛寒之人畱連胸中雖只二三日邪氣

在表未當傳裏之時即為悸者陽氣內虛也煩

者陰火內動也將來邪與虛搏必至危困故乘

寒邪未盡變熱之前建立中氣則邪不易入即入亦易以禦之也如腹痛亦宜倍芍藥故陽澀陰弦腹中急痛者亦用之桂枝湯芍藥桂枝等以治衛氣小建中湯加倍芍藥桂枝等藥以治營氣更加膠飴以緩其脾故名之曰建中則其功用大有不同耳

桂枝湯見前太

五苓散同上

茯苓甘草湯乃桂枝五苓二方之變制也

桂枝 茯苓 芍藥 生薑 甘草 炙 一兩

右四

傷寒分經 卷八 茯苓甘草湯

味以水四升煮取二升去渣分溫三服

傷寒原無汗今忽自汗而又不解大抵是傳陽明然無陽明證是不傳陽明而傳太陽之腑矣有渴有不渴甚不甚之別也然曰傷寒汗出不曰表解是腑邪十之三而表邪仍十之七也故於桂枝湯去大棗芍藥以直解其邪加一味茯苓利膀胱之氣亦內外兩解但重在表也若傷寒厥而心下悸者厥則為寒邪內中假使無水氣雖甚陰寒不致陵心何為悸也既以水氣而

悸是全裏而無表亦以此湯解之者蓋水氣之壅有或為之主也若非太陽之邪不能上逆心間故以生薑為君茯苓為臣下其水桂枝甘草為佐解其初入太陽之寒邪稍久則陰勝而陽負人胃為利即此飲矣故須先治殆後治厥不過易以溫經之劑耳倘先施之於治水則太陽之邪非其宜矣彼少陽亦有悸小柴胡正兼飲為治亦先治之意也按此與茯苓桂枝甘草大棗湯茯苓桂枝甘草木湯不過大棗木生薑三

傷寒分經 卷八 茯苓甘草湯

味相為出入而主治各異蓋發汗後臍下悸雖有以臣伐君之勢地遠而卑此門庭外之寇故以大棗扶土固其城守而漸致蕩平心下逆滿

氣上衝胸如據防要君至誤汗而振搖傾覆之恐舉國共之此城社之禍故以木固本使剪伐有權而徐圖恢復若此之厥而心下悸則是削弱之國賊居肘腋寢殿為之振動非有勤王急師則苗劉之禍頃刻剝牀故以生薑之辛開痰逐逆一切城守固本之策皆屬迂濶非救時急

務耳因生薑亦能發散合桂枝甘草勢極犀利得茯苓而兼效兩解之績此如圍鄭之師而并剿外來之竇建德其將將者不同也

禹餘糧丸 缺

芍藥甘草附子湯

芍藥 甘草 附子 三兩 各一枚 炮去

水五升煮取一升五合去滓分溫再服

凡曰發汗證必外因則無不惡寒者也今汗後而表不解是證仍如故而惡寒獨曰反比前有

傷寒分經

卷八

芍藥甘草附子湯

三

加也惡寒表微也不因汗解而反有加豈表邪因汗而更甚乎其為營衛新虛而汗過陽弱可知故於陰則芍藥甘草以收之而和其未和之營衛於經則附子以溫之而固其已弱之陽比四逆則去乾薑之陽而加芍藥和陰為異比芍藥甘草湯之和陰則加熟附大熱為異比凡續行解表者則全不用麻桂為異似乎立方之意全不為表裏起見而但為陰陽起見藥雖只三其用法則神變矣蓋仲景於表未解原有更

汗之條此特拈出治法之獨異者以見惡寒在發汗後須作陽虛之慮有如此也否則將復解散不蹈虛虛之轍乎

陽虛則惡寒宜用附子固矣然既發汗不解可知其熱猶在也熱在而別無他證自是陰虛之

調胃承氣湯 明入後陽

桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯

此湯本為發汗後身疼痛脈沉遲者曰發汗其初為麻黃證可知汗後身疼或初挾微風汗大

傷寒分經

卷八

桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯

三

出陽氣暴虛邪不能盡出而餘邪挾虛作痛所謂如水流瀉病必不除也更脈見沉遲挾虛無疑矣然槩曰脈沉遲乃六部皆然與尺遲大異尺遲乃素虛此為發汗新虛即有餘寒必因微風相滯但非因誤下則裏未受寒故於桂枝方中但加芍藥生薑各一兩以去邪人參三兩以輔正然人參固表桂枝解肌合用非正治之法也故曰新加見權宜之意耳

此因發汗後津液

傷非津液素虧

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃

去節

杏仁

去皮尖

甘草

炙

石膏

半觔碎

碎

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

大青龍原為傷寒無汗而且煩躁者如發汗後無桂枝之證但汗出而喘無大熱明是肺有偶感之寒胃因鬱熱如大青龍證而不兼風者也其汗者已經汗而不復閉固也故於大青龍湯中去桂枝葶藶聚惟用麻杏仁石膏驅寒化熱一舉

傷寒分經

卷八

麻黃杏仁甘草石膏湯

證

傷寒

分經

卷八

麻黃杏仁甘草石膏湯

證

傷寒

分經

卷八

麻黃杏仁甘草石膏湯

證

傷寒

分經

卷八

麻黃杏仁甘草石膏湯

證

兩得耳若寒非偶感則內不鬱熱竟用麻黃湯無石膏矣若稍有桂枝證而兼寒多則必無汗而用大青龍矣故下以飲水必喘水灌必喘明其發汗後偶然得寒而喘之由見非如初感之寒可以竟用麻黃湯亦非風寒兩感而有鬱熱必須全用大青龍湯者比故斟酌而用青龍湯之四較麻黃湯則去桂枝加石膏也若下後亦無可行桂枝之證乃汗出而喘無大熱者亦用此湯謂本麻黃證誤下而表邪不去故下寒以

久鬱而熱上寒以未解而喘欲用桂枝而無其

證欲用麻黃而遺其熱故不若於麻黃湯中去

桂枝易石膏為恰當耳若藥言汗下後不可更

行桂枝湯為戒之之辭則仲景於誤汗下之證

復用桂枝湯者多矣此何獨戒之深且於汗後

復兩舉致喘之因而下後則不復舉也若所謂

大熱者惡熱譫渴之類不獨表熱也必察其無

大熱者恐類白虎證也蓋汗出乃白虎之一而

無大熱不若白虎之甚且喘則肺復因寒而火

鬱不若白虎之專有裏熱耳總是此湯意在解

鬱清熱而不主於發表發表不遠熱而石膏非

所宜矣然仲景所以諄諄者正恐人以傷寒已

得汗之證認為傷風有汗而誤用桂枝故拈出

誤汗誤下兩條示以警衛分途一涉於寒同歸

麻黃一治而不可混施有如此也

此因邪熱鬱於肺中故易

桂枝以石膏為

麻黃湯之變制

桂枝甘草湯

桂枝以石膏為

麻黃湯之變制

桂枝以石膏為

麻黃湯之變制

桂枝以石膏為

麻黃湯之變制

桂枝以石膏為

麻黃湯之變制

桂枝以石膏為

麻黃湯之變制

桂枝四兩甘草二兩上二味以水三升煮取一

升去滓溫服

陽本受氣於胸中發汗過多陽氣大洩則胸中陽氣不足故又手冒心然不說到陰血上方用桂枝甘草固表緩中亦非養血也彼臟結證則云脇下素有痞積故臟結無陽彼太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱則曰此無陽也今發汗過多而叉手冒心心下悸陽微故也不曰無陽者彼多熱邪此則單虛彼以見燥而無陽此則汗大洩而陽弱也故但以桂枝甘草扶其陽耳

傷寒分經

卷八

桂枝甘草湯

美

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓

桂枝

甘草

大棗

以甘

爛水

一斗

先煮茯苓減二升內諸藥煮取

三升

去滓溫服一升日三服

一名爛水一名勞水

爛水

取水二斗置大盤內以杓揚之千

萬過

水上取子五六千顆相逐取用之

腎水

能制心火所以無焚如之患然惟心陽本

強而

藉腎水調劑心雖受制而實受益如陽男

操家

而婦女之陰能為陽之守也汗本心之液

發汗

後臍下悸者心氣虛而不能自主腎邪欲

上陵心故臍下先悸前為陽之守者今欲為陽

之寇茯苓桂枝直搗腎邪甘草大棗扶脾土以制水土乃心之子子強而仇可制也煎用甘爛水者水性本鹹而重揚之干遍則甘而輕取其不助腎邪而益脾土也汗後餘邪挾北方邪水

厚朴生薑甘草半夏人參湯

厚朴

生薑

甘草

半夏

人參

湯

傷寒分經

卷八

茯苓桂枝甘草人參湯

毛

一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

凡吐後腹脹與下後腹滿乃因宜汗不汗誤與

吐下表邪乘虛入裏邪氣盛則實之證也若發

汗後表邪已解而腹脹滿知非裏實緣脾胃氣

虛津液搏結陰氣內動壅而為滿也故以厚朴

之苦泄腹滿半夏生薑之辛以散滯氣人參甘

草之甘以益脾胃

生薑瀉心湯

生薑

甘草

人參

黃芩

各三升半夏

乾薑 黃連各一兩 大棗十二枚 上八味以水一

斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三

服去滓復煎者要藥性合而為一漫無異同

者遂無不和所以方中既用人參甘草復加生

薑大棗不嫌其複全藉胃中天真之氣為輔旋

蓋取和之為義耳甘草瀉心湯半夏瀉心湯三

湯俱去滓復煎亦同此義以此三瀉心皆治裏

煎以共行其事之義

瀉心諸湯及陷胸湯本為太陽表邪未解誤下

而成痞與結胸證同是胃氣受傷之故但陽邪

從陽故結胸證當着眼在胃中空虛客氣動盪

傷寒分經 卷八 厚朴生薑瀉心湯

八字是正氣不運而陽邪先傷其胃故陽邪即

據陽位而熱聚其上甚則項強治法以驅熱為

主而用硝黃陰邪從陰故痞證當着眼在胃中

不和腹中雷鳴八字是胃氣餒弱而陰邪不能

上尋反注腹中故陰邪必與陰水為伍而搏飲

心下甚則下利治法以逐飲為主而用薑半然

亦有不因誤下胃氣本虛者津液素匱復因發

汗而外亡入而內結則心下亦遂痞鞭伏飲搏

聚胃氣不足以開之也於是胃病故乾噫食臭

食入而噎餒酸也胃病而水不下故膈下有水

氣飲入而旁滲脇肋也胃病而胃中水穀不行

腹中必搏擊有聲下利而清濁不分也或言生

薑瀉心因於食則謬矣水穀不分亦由胃虛也

故用人參甘草大棗以補中乾薑以溫胃生薑

半夏以開痰飲而以芩連兼清其邪也此不因

誤下而反大補其胃者要知不因下而致痞若

此虛非尋常之虛且未經誤下反受補而無變

爾

傷寒分經 卷八 生薑瀉心湯 甘草瀉心湯

甘草瀉心湯此即生薑瀉心湯去生薑

甘草四兩 乾薑二兩 黃芩各三兩 黃連二兩 半夏半升 大

棗十二枚 右六味以水一斗煮取六升去滓再

煎取三升溫服一升日三服

此方不專治結熱而治胃虛既治胃虛正宜用

人參而去之者胃經再下虛而加寒急當溫之

為要矣人參能補氣而溫中之力緩且扶陽而

去虛熱之功亦緩故寧去之而倍甘草甘草能

調中且生用則去虛熱也生薑止嘔而反去之

大黃黃連瀉心湯

上二味以麻沸湯二升漬之

卷八

大黃黃連瀉心湯

平

須臾絞去渣分溫再服也。麻沸湯者言滾沸一名百沸湯一名太

湯和
此湯與附子瀉心又瀉心湯之變法也諸瀉心湯主滌飲以驅熱此則主氣之虛熱矣浮緊之脈爲寒寒爲陰邪誤下入裏果與內飲搏結必鞭滿矣今不鞭而濡是證非挾飲乃外之陰邪與身中之陰氣相迎而痞聚心下也鬱熱上逆惟苦寒可瀉之故用大黃黃連然氣本輕浮故瀉上脈浮浮則易散故不用他藥以滯之猶恐

附子瀉心湯

大黃兩二黃連

黃芩

雨各
附子
破一枝
別煮炮
取去皮

右四味切三味以麻沸湯一升漬之須臾絞去

傷寒分經

卷八

附子瀉心湯

三

澤內附子汁分溫再服生薑甘草半夏三瀉心湯去澤復煎取共行其

大黃黃連瀉心湯專主瀉熱此則主瀉熱且兼溫經矣脈浮緊而復下之以致緊反入裏內氣餒而凝結成痞已切履霜堅冰之戒况復汗出惡寒耶然陽邪入陰而熱熾非三黃不能除熱其人復真陽內微而陰盛非附子不能回陽故於三黃湯內另煎附子汁和服以各行其事而共成頓瘥之功亦用麻沸湯漬絞而不煎以附

子性雖走下能救三黃之偏而敦其本不能因三黃之寒而無損於上故亦欲因水之氣薄者而速下也

小柴胡湯

入後少陽全篇

大陷胸湯

見前太陽上篇

半夏瀉心湯

半夏瀉心湯

半筋黃芩

乾薑

人參

甘草

炙各三兩黃

連一

兩大棗

右七味

以水一斗

煮取六升

去滓再煎

取三升

溫服一升

日三服

傷寒分經

卷八

半夏瀉心湯

三

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

卷八

傷寒分經

大腸為傳化之官得小腸而泌水膀胱清濁以分糟粕之不至淖澤而下泄賴大腸之屈曲關鎖也大腸或為風寒溼熱所侵於是清濁不分而水穀并出大便甚則謂之閉腸故能使下利者大腸又居其一腎為胃關主二便強則彼此氣行使無妄出衰則寒滑不禁或溼熱鬱利故能使下利不止者腎又居其一若此之下利不止心下痞硬明係心下水飲下注用瀉心治痞法以清致瀉之源不為誤也他藥下之胃以無

傷寒分經 卷八 赤石脂禹餘糧湯

辜受傷故利不止責在中焦而改用理中亦非誤也然利不止豈非下焦受寒腎不主事乎故以赤石脂之甘酸大溫禹餘糧之甘寒而澀性俱鎮重者以固其下亦非誤也然利又不止必下利時溼熱混雜清濁之分失其職矣故又曰當利小便以輔前方而成完守之功也

大柴胡湯

柴胡半斤 黃芩各三兩 芍藥半斤 半夏半升 生薑五兩 枳實四枚 大棗十二枚 大黃二兩 右八味以水

斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服去滓復煎與小

傷風發熱汗出不解心中痞硬嘔吐而下利者表既未解裏證已迫然非結胸者比也彼結在胸而表裏之熱反不熾盛是為水飲結在胸脇也或其人頭有微汗乃邪結在高而陽氣不能下達也故須以大陷胸速去之若外邪不解胸中痞硬而兼嘔吐下利蘊結必不定在胸中故以大柴胡兩解表裏無取於陷胸耳若傷寒十

傷寒分經 卷八 大柴胡湯

餘日熱結在裏復加往來寒熱亦用大柴胡謂陷入原少仍兼半表未全入於裏也若過經十餘日二三下後柴胡證仍在者其人之邪屢因誤下而深入即非大柴胡所能服故必先用小柴胡提其邪出半表然後用大柴胡也至若三承氣彼乃全裏無表視此更不侔矣此雖用大黃枳實有白芍藥加小柴胡中則兼有和解之力耳此湯治少陽經邪漸入陽明之府或誤下湯中除去人參甘芩助陽戀胃之味而加芍藥以除除熱滯也與桂枝大黃

易同義後以杜枝甘草兼大黃兩解大陽誤下之邪此以柴胡黃芩半夏兼大黃兩解少陽誤下之邪兩不移易之定法也

旋覆代赭石湯

旋覆花 甘草 各二兩 人參 二兩 生薑 五兩 代赭石 半斤

兩半夏 洗 大棗 十二枚 石七味 以水一斗煮

取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服去

復煎亦取其行其事之義與生薑瀉心湯等同義

邪因汗吐下而解矣然且心下痞鞭噫氣不除不問而知為胃氣虛逆其痞鞭者虛逆則津不

傷寒分經

卷八

旋覆代赭石湯

吳

得下而聚為飲以致痞也其噫者逆氣溢出不必有聲有聲則為呃矣前云乾噫食臭此但云噫氣比食臭則無滯而虛也故治法但以補虛鎮逆為主而兼消飲惟噫氣而飲留致痞痞之故不在飲而在虛也土虛則肝木乘之因假其氣而為逆故以人參補虛為君代赭石之苦寒鎮重而入肝領人參下行以鎮安其逆氣為臣旋覆花之鹹溫能軟堅行水下氣合生薑半夏開痞為佐甘草大棗味甘調胃之主藥故以為

使方中用代赭石領人參甘草下行以鎮胃中使之逆氣更用旋覆花領半夏大黃而滌腸土之風痰俱非尋常思慮所及設非此法承領上下將何以轉否為泰耶

降胃湯

黃連 兩半 夏 升 括蕒實 大者 上三味 以水六

升先煮括蕒實取三升去滓內二味煮取二升

去滓分溫三服

陷胸湯丸大槩為太陽誤下者設也若不因誤

下則胃中未致空虛客氣何能動扇即或有水

噤水洗為寒遏而成寒實結胸然而無熱則太

傷寒分經

卷八

小陷胸湯

毛

陽之邪已去表矣不見陽明證是未傳陽明矣非水飲搏結而何內未大傷外邪亦淺故以三物小陷胸主之更有不因水洗所遏而其痰飲素盛搏邪拒按者表邪不盛而結正在心下中尚未虛而脈見浮滑故亦以小陷胸驅之謂黃連半夏括蕒實已足泄熱散結無取硝黃甘遂之獵悍傷胸上和平之氣也仍曰小陷胸見未離太陽為治特別異於瀉心之治陰邪而低緩者耳

胸心山日結胸多挾痰飲凝結心胸故陷

皆為痰飲而設也

柴胡桂枝湯

柴胡兩四 桂枝兩二 生薑切 芍藥 黃芩 人參各一

水七升煮取三升去滓溫服

心下支結邪結於心之偏傍而不正中也病至

六七日心脇之間忽有此欲結之意明是太陽

之邪將傳少陽時阻連而未即離太陽之經所

以發熱肢節煩疼然惡寒微而嘔亦微其在外

傷寒分經

卷八 柴胡桂枝湯

者有向裏之意其陷入者有戀表之情無論外

証未去決無用大陷胸之理即小陷胸但能驅

飲豈能主表乎故合桂枝柴胡還治其表然實

以小柴胡和解為主觀其分兩之多寡而立方

之意顯然此即太陽證見一證少陽為治之意

也全不理支結者邪之源清而偏傍小結自無

不瓦解冰消耳

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡兩四 半夏洗 大黃各二 大棗六枚 生薑切 人

參 龍骨 牡蠣 桂枝 茯苓 鉛丹各一

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如棋

子更煮一二沸去滓溫服一升

下在八九日後為變特異致變之由因伏飲素

積外邪未盡乘虛陷入積飲挾之填滿胸中則

膈中之氣不能四布而身重熱壅方寸而心驚

此最為病機之要者矣又謂錯雜為治實專治

心蓋京師奠安而後方鎮用命此實勤王之捷

法也然細詳之大意以和解為主認證以風因

傷寒分經

卷八 柴胡加龍骨牡蠣湯

為要釀變以痰飲為本而治法之端緒則以寧

心為首務也蓋誤下之變風邪結胸寒邪則痞

一定之理今滿不在腹而在胸此陽邪在陽之

分也加煩則益明矣譫語者因下後而津液燥

熱也燥熱則氣不化而小便不利矣一身盡重

者陽氣內鬱而不榮於表也且伏飲搏邪外走

又加溼內攻而心為之驚矣此正如半表裏之

邪而錯雜稍甚者也故仲景以小柴胡為主治

因中滿而去甘棗因飲而加茯苓合薑半以逐

飲因證本風因而加桂枝以達表通陽因胃熱
胸滿微有痞意而加大黃以清結熱然而都城
震動非悉力入援則闔外圖維無補社稷故以
鉛丹之重鎮酸涼龍骨牡蠣之性濇而安神者
建匡主之元功觀其以柴胡首湯名和解之意
可知矣柴胡者小柴胡也猶之云桂枝加附子
也觀其以龍骨牡蠣獨表而出之重心為治可
知矣否則藥味十一何獨揭此為名耶此湯治
邪犯本之證故於本方中除去甘草減大棗上
行陽分之味而加大黃行陰以下奪其邪兼伏

傷寒分經

卷八

柴胡加龍骨牡蠣湯

早

苓以分利小便龍骨牡蠣鉛丹以鎮肝膽之性
桂枝以通血脈之滯也與救逆湯同義彼以龍
骨牡蠣鎮少陽經候下之驚煩亦不易之定法也
炙甘草湯一名復

甘草湯

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

甘草

炙

傷寒分經

卷八

炙甘草湯

早

陰結代之脈可除矣正以此證非亡陽之比乃
陽弱而陰枯也若更以薑附劫之則立槁矣
四逆湯入後太

梔子厚朴湯

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

梔子

厚朴

湊胸表腹裏間無可奈何之象故取梔子以輕拂其邪合枳朴以洩腹中之滿似乎表裏兩解然而梔子少枳朴多邪勢趨內故洩滿為主也

梔子乾薑湯

梔子十四枚乾薑二兩上二味以水三升半煮取

一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服身熱未去為煩亦微則襲入之邪原少但經大下中虛可虞他藥補之徒足助邪故惟以乾薑溫中得溫則氣壯邪乃不深入也梔子色赤

傷寒分經

卷八

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

望

味苦入心而治煩香豉色黑味鹹入腎而治躁此以微煩故并去豉不欲其大發也

梔子豉湯

梔子十四枚香豉四合上二味以水四升先煮

梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服

溫進一服得吐者止後服

梔豉之用虛煩實煩皆可大抵為下後有太陽餘邪未盡或先經汗吐而又下者總為胸中陽氣不足最虛之處便是容邪之處於是甚則身

熱胸中結痛或但窒塞而煩躁為實煩不甚則外熱除而心不窒但虛熱留壅煩而不眠或反覆懊憹為虛煩皆非大滿痞結者比故以梔豉輕劑湧之所謂邪高者越之也即有太陽病兼汗出不惡寒反惡熱身重舌胎皆見陽明之證亦湧以梔豉而微去膈熱則治太陽而無碍陽明耳即有熱鬱結氣致頭汗出而心中懊憹然不結胸則邪本輕微亦梔豉湧之以徹其熱則陽得下通於陰而澀然汗解耳蓋此湯主表邪

傷寒分經

卷八

梔子豉湯

望

妙在輕湧而宣揚之若舊微瀉服此湯不能上湧反為下泄矣故戒之

為汗下後虛煩不解之聖藥若嘔則加生薑以滋飲少氣則加甘草以緩中煩腹脹則去香豉而加枳朴邪在上而不在下也九藥傷胃則去香豉而加乾薑湧泄而兼安中之意也故欲湧虛煩必先顧慮中氣所以病

梔子甘草豉湯

於梔子豉湯內加甘草二餘依前法得吐止後

因少氣而加甘草似乎為補中也然觀彼脈結

代心動悸炙甘草湯主之此若但取補中何不
灸之而生用也要知既有虛熱中雖少氣未可
補也因推原氣少之故乃熱傷元氣故以甘涼
調中化熱調亦是補然非主補也使果宜補則
不敢湯之矣

梔子生薑湯

於梔子鼓湯內加生薑五兩餘依前法得吐止後
服

彼少陰陽上有寒飲乾嘔者不可吐今嘔而仍

傷寒分經

卷八

梔子生薑湯

醫

以梔鼓湯之但以生薑安其胃何也蓋虛煩不
得眠太陽餘熱也甚至反覆懊懣熱亦不小矣
然前嘔者非寒飲也乃胃氣為熱所搏而不散
故所以梔鼓湯邪上出復以生薑之辛散其結
耳然則雜病之嘔脈細喜溫飲不煩無熱非寒
而何脈浮數喜冷飲煩熱吐酸非熱而何以此
類推薑半止嘔之法可槩施耶

乾薑附子湯

乾薑兩附子一枚

生用去

上二味以水三升

煮取一升去滓頓服

下後復發汗其非無汗可知如過汗而陰虛則
應夜不安臥或嘔渴倘有復感則身必熱脈不
沉而有表證矣今下且汗後而夜安靜不嘔不
渴是無邪擾其陰也晝反煩躁甚至不得眠其
熱非少可矣明是陽王於晝陽欲復虛不勝邪
故相爭而然夫煩躁風微也否則陰躁也今脈
微無大熱是外無襲邪而更煩躁非陽虛發躁
之漸乎故以生附乾薑急溫其經比四逆不用

傷寒分經

卷八

乾薑附子湯

聖

甘草者彼重在厥故以甘草先調其中而壯四
肢之本此重在虛陽上汎寒極發躁故用直搗
之師而無取扶中為治耳

茯苓桂枝甘草湯

茯苓四兩桂枝三兩甘草二兩

各

上四味以水

六升煮取三升去滓分溫三服

心下逆滿氣上衝胸寒邪搏飲壅隔陰火於膈
間動即上炎所以起則頭眩已屬裏證設脈浮
緊亦止可兩解今脈沉緊明係飲中留結外邪

抵當圓

傷寒分經

卷八

茯苓桂枝甘草湯

吳

七合服之。晷時當下血。若不下者。更服。

傷寒蓄血較中風蓄血更爲凝滯況結在下焦
便自利血自結毫無欲下之意抵當湯誠爲不
易之定方矣但湯者蕩也陽邪入陰一蕩滌之
卽散丸者緩也陰邪入陰恐蕩滌之而不盡故
緩而攻之因熱甚血堅也不可餘藥見湯圓之
間卽已不同不必別用峻藥耳

桂枝附子湯

之變制也

此卽桂枝去芍藥加附子湯又加附
子二枚又卽後條之甘草附子湯以

桂枝四兩 附子三枚炮去皮破八片 生薑三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚勞 右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

桂枝湯本屬陽劑以芍藥一味和陰取其亦走經不比他血藥也然酸寒之性不黨於風而黨於溼故桂枝治風之劑兼芍藥爲和陰之善物用之驅溼則惡其滯矣今傷寒七八日反身體煩疼不能自轉側明是風溼相搏以不頭疼不嘔渴知風溼之邪不在表不在裏而在軀殼然

傷寒分經

卷八

拆書圖

桂枝附子湯

望

其原因於寒。幾於風寒。溼合而爲痺矣。芍藥非寒溼證所宜。故易以附子之辛熱。多至三枚。從桂枝之後。爲純陽剛劑。以開凝結之陰邪。然脈不單濡而浮虛。先見是溼少而風多也。故藉一附子而迅掃有餘。否則又宜去桂枝加朮湯驅溼爲主矣。八九月再經之時。既不傳經。復不入裏。者。周風溼持之也。煩疼者。風也不風也。虛則汗後不足。滴溼也。其脈正與相應。然後知風溼之邪在肌肉。而不在筋節。故以桂枝表之。不發熱爲陽氣素虛。故以附子逐溼。兩相結合。自不能留矣。金匱之治風寒溼者多矣。未嘗連用附子。獨於傷寒兼風溼者。三方均

用附子其理安在蓋傷寒熱證也加以風溼痰
裏勢必易熱乃至八九日之久不言身熱知其
人陽氣素虛矣陽虛者邪姿於裏內人則易而
外解極難何者無元氣以托送之也故仲景用
桂枝解外復重附子以溫經使經絡內無處不
到則無邪不驅矣

去桂枝加朮湯

於前方內去桂枝加朮兩餘依前法此方之朮或白或蒼

用之

溼從下受故身雖極重而無頭痛加以脈浮虛
而濇則表裏皆為風溼所搏故以桂枝湯去芍
藥加附子取其疾馳而迅掃表裏無不至也若

傷寒分經

卷八

去桂枝加朮湯

吳

其人小便利則內溼行矣更大便鞭則無溼而
有熱矣不渴則熱亦微矣不嘔則無表矣然且
身疼極重豈非風溼止搏於軀殼間乎故用朮
以去其溼莖葉行脾津以和營衛甘草佐之加
附子以行莖葉與朮之勢而反不用桂枝者邪
在軀殼之表不在經絡之表故易朮為君則風
之挾溼者不從表解而從熱化也彼去芍藥為
脈浮虛也則此之去桂枝脈不浮可知矣

甘草附子湯

甘草炙 朮各二兩 附子三枚炮去 桂枝四兩 上四

味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐

一升多者宜服六七合者為妙此方之朮或白

用之然意在培其根本白朮尤宜

此與桂枝附子湯證同是風溼相搏然彼以病

淺寒多故肢體為風溼所困而患止軀殼之中

此則風溼兩勝挾身中之陽氣而奔逸為災故

骨節間風入增勁不能屈伸大傷其衛而汗出

傷寒分經

卷八

甘草附子湯

吳

短氣惡風水亦乘風作勢而身微腫其病勢方
欲擾亂於肌表與靜而困者不侔矣彼以莖葉
行其津液而散困鬱之溼者此以行其津液而
益增擾亂之勢故并去莖葉之行而反以甘草
首湯名且加朮非止去溼也亦培其根本重地
以為禦侮之主而封疆傾危專托附子桂枝以
為撥亂之功臣耳風傷衛氣流關節風溼相
諸痛風勝則衛氣不調汗出短氣惡風不欲去
衣溼勝則水氣不行小便不利或身微腫故用
附子除溼溫經桂枝祛風和營朮去溼
實衛甘草附子湯諸藥而成散之功也

麻黃連軀赤小豆湯

麻黃去節連軀各二兩連翹根也赤小豆生梓白皮

升杏仁四十箇甘草炙一兩生薑切二兩大棗十二枚

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫

內諸藥煮取三升分溫三服半日服盡

凡傷寒發熱在裏身必發黃非謂表邪入裏而

瘧熱也凡言瘧字有挾溼之義焉此不曰表解

而曰傷寒表未解也不曰熱結而曰瘧熱非熱

邪驟結乃有相因而瘧之也不竟曰瘧熱而曰

傷寒分經

卷八

麻黃連軀赤小豆湯

辛

瘧熱在裏對表而為言也故遂揣測其表裏搏

邪之變而曰必發黃讀斷傷寒三字便醒明是

表裏之間寒熱不等有溼為之醞釀表邪不去

而遂巡生變觀仲景於發汗已身目為黃之例

詳之曰寒溼在裏不解故也此獨曰瘧熱在裏

則知此之發黃蓋有寒溼在表而另有瘧熱在

裏矣故以麻黃湯去桂枝加葛根以主表間之

寒邪加連軀梓白皮之苦寒入心胃而解熱連

白皮主心經客熱生梓赤小豆之甘平下水而滲溼

煎用潦水者取其味薄而不助溼氣且利熱也

於寒溼中求之不即言裏有瘧熱乃見寒溼之

變不同裏有瘧熱其一也然寒溼之在傷寒又

為偶異之證特揭言之欲人詳其因溼成變之

故當以治寒溼法參入治傷寒中相為斟酌耳

按海藏謂梔子檳皮湯連軀赤小豆湯治身黃

小便利而身不疼者此為乾黃活人謂桂枝附

子湯去桂枝加木湯治身黃小便利而身盡痛

者此為溼黃皆就發黃本證揣摩之詞未悉仲

景於傷寒表裏間回翔審顧而施其治法之妙

矣傷寒發熱在裏身必發黃者因其人素有溼

身熱汗出不盡則肌腠之裏為熱所凝而遍

身生黃故宜此湯以取微汗也麻黃發散表邪

杏仁生薑散此湯以取微汗也麻黃發散表邪

皮除肌肉之溼熱赤小豆降火利水甘草大棗

益和胃益上厚可以禦水溼之蒸觀金匱治

寒溼用麻黃湯加木湯其義可見此湯為汗後

表邪未解而溼熱發黃脈浮者取汗而設茵陳

蒿湯為表邪已散小便不利身黃脈沉者分利

而設梔子檳皮湯為表裏俱熱脈來輒大不可

汗下者而設若夫汗後渴而小便不利熱結津

傷寒分經

卷八

麻黃連軀赤小豆湯

辛

茵陳蒿湯入後陽明上篇

梔子槩皮湯

梔子五兩黃槩二兩甘草一兩上三味以水四升

煮取一升半去滓分溫再服

仲景凡見發黃而有陽明證標之為陽明病謂證見陽明即從陽明治例而變通之此其常也其有未見陽明證而發黃者特變其法曰於寒溼中求之謂證出寒溼之變即不得以太陽例治之也梔子槩皮湯此其一也故首揭曰傷寒

傷寒分經

卷八

梔子槩皮湯

三

身黃發熱者已別異於陽明病矣既太陽表邪即不可妄行攻下使邪乘虛陷入陽明中土況熱已發出自與內瘀者不同即當隨熱勢清解其黃故以梔子槩皮解散之蓋寒溼之證難以得熱熱則其勢外出而不內入故驅之為易也

小柴胡湯

入後少陽全篇

此太陽原有寒溼因傷寒發汗氣蒸而變熱故得發於外原非表邪發熱之謂故以梔子清肌表之溼熱黃槩去勝肌也

太陽下篇論列方
大青龍湯

麻黃六兩去節甘草二兩桂枝各二兩生薑三兩杏仁四十

皮尖大棗十二枚石膏如雞子上七味以水九

升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升

去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之

一服汗出者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁

不得眠也溫粉撲正汗法用麻黃根壯

大抵病之寒因者易致內熱蓋寒邪比風邪不

傷寒分經

卷八

大青龍湯

三

同風為陽為外為止為動寒為陰為內為下為靜故鬱閉則內熱隨生如仲景一百十三方白虎湯大黃黃連湯白虎加人參湯竹葉石膏湯諸涼劑皆於寒因後用之自可知矣大青龍湯仲景為風寒兩傷無汗而更煩躁者設也謂煩躁風微也證既因寒無汗矣又乃挾風而煩躁風欲自汗外閉以寒故不能自由徒躁擾於外寒為風閉即未入裏能無鬱熱乎所以桂枝麻黃二湯合用獨加石膏并去和陰之芍藥蓋風

卷八 大青龍湯

五

寒糾纏非疾驅不可恐雷芍藥助寒邪沉滯之性也發表不遠熱此兼石膏并去其鬱熱以石膏味辛氣雖涼而不滯麻桂之行也但全無調劑之意能免雷轟電掃之恐乎故曰大青龍言其聲勢之張而行雲致雨之驟也王實正以桂湯代之苓順之而而豈知枝麻黃各半共有不得不用之語也

抑寒因者熱易鬱此爲醫中至理雜證皆可類推不獨傷寒爲然所以後人於痰湧偏枯外顯肢體之證槩以中風統之謂寒鬱內熱風鬱外攻理有必然也若人陽寒分經

卷八 大青龍湯

本虛寒而寒邪直中者則單顯虛寒證與此大不相同矣或曰此方治脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁並不見中風之脈證而疏論云但據條首中風二字乃云木之風氣似此則寒化反顯釋風寒兩感者謬矣殊不知風多風少之證設果本隱標顯則治病當先其本何反倍用麻黃耶按內臺方云此病在表宜汗出三字藏機若風傷衛則自汗一而全在不汗出三句藏機若風傷衛則自汗惡風寒傷營則無汗而喘此云不能透出煩燥則知其諦蒸蒸發熱似欲汗而不能透出故生煩燥於此可見其重有風說而脈反浮緊是風中除去芍藥倍用麻黃而加石膏鼓動君相二火湯連令外泄則風被寒威內攻鼓動君相二火則周身皆爲火化矣所以不得不用麻黃也其去芍藥而加石膏者以其汗既不能透出原無積於蘊蓄然既鬱於心包則解煩燥不可緩明

真武湯

茯苓
芍藥

生薑三切兩各二附子一枚炮去

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日

服當此用方自之求求

加減法

若欬者水寒相搏也加五味子半升酸以細辛乾薑

各一兩辛以散水寒也小便利者去茯苓不須淡滲苦

傷寒分經

卷八

卷八

下利者陰邪下走也去芍藥之陰降加乾薑二兩以散

木有所制也。則若逆者。氣逆也。去附子之固。氣固也。如生。

氣以散逆也

然能補配以生薑之辛則補中有宣發之意

以芍藥之駿則宜中又有收歛之品復以苦

木益水木坎止淮夾外形而黃流迤寸八可

經而周刊之矣芥又復三番之

下久故也。陰陽四時。亦以氣者。謂之。木。

則不復上遊也。上之與下，有易也。然則

傷寒分經

卷八

真武湯

真

眩身瞤者亦用之水既內入則不復外溢也程
情曰水氣唯太陽與少陰有之以二經同司夫
水也然太陽從表得之膚腠不宜水氣為玄府
所遇故以小龍得深入而動其本氣緣胃陽衰
制服本水客邪得深入而動其本氣緣胃陽衰
而氣按小龍主太陽表水主少陰表水其陽衰
陰武少一舉而扶土制水其成溫經之功故
曰真武取其能鎮北方之水也蓋腎雖屬水父
母構精時一點真陽實伏藏於中以為發揚之
本正如北陸藏冰一陽內伏春夏敷榮賴此而
發但位居北極陰之至也更加客寒孤陽欲鏗
故必以薑附為主劑陽得熱而不散耳但邪之
凝結者非引之不出邪之阻遏者非暢之不遂
故有時汗下後無表證脈沉微者乾薑生附獨
用取其急溫也其四逆湯乾薑生附合甘草調
停以化其逆也其白通湯乾薑生附合葱白宣
發以通其勢也其附子湯及真武湯皆兼苓朮
芍藥飲外以同其內也但附子湯用生附比真
武又加人參而去生薑則有直補驅邪之不同
矣通脈四逆即四逆湯增甘草倍乾薑另加葱

傷寒分經

卷八

桂枝麻黃各半湯

辛

九莖則有隔逆淺深之不同矣且每以熟附配
生薑乾薑配生附總取宣補相濟已耳
麻黃湯見前太
桂枝麻黃各半湯
桂枝六兩十芍藥甘草炙生薑切麻黃各一
節大棗四枚杏仁二十四箇湯浸去
以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮
取一升八合去滓溫服六合
傷寒以驅邪為主但驅邪中有風寒之異有和
陰不和陰之別若桂枝去芍藥及去芍藥加附
子湯乃不欲和陰以滯其迅掃之勢也此桂枝
麻黃各半湯在熱多寒少日久脈微緩之時正
陽氣進而邪氣少本為欲愈之徵乃脈微而更
惡寒則脈微為裏虛惡寒為表虛汗吐下俱不
可行矣奈面反有熱色是風雖外薄為寒所持
而不能散所以面顯怫鬱之熱色必宜總風寒
而兩解之故桂枝麻黃二湯合用但此為寒持
日久比誤下脈促不同故彼去芍藥此仍用些

少之芍藥以和陰而馭麻黃之暴此猶用人之勇而去其暴也

桂枝二越婢一湯此即桂枝麻黃各半湯桂枝二越婢一湯但分兩俱極少而生

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

桂枝石膏為異麻黃各半湯芍藥各半湯甘草各半湯生薑各半湯切各半湯

傷寒分經

卷八 桂枝二越婢湯

美

傷寒分經

卷八 桂枝二越婢湯

美

此無陽也不可更汗宜此湯蓋無陽者亡津液之通稱也機關在熱多二字惟熱多故燥燥其液而亡陽似乎裏未傷而未成裏證也故既以脈微弱戒不可更汗復以石膏入合解風寒極小劑中有青龍之意而去青龍之猛謂石膏辛涼甚少胃兼得之則熱化津生而不得表寒柔緩過于女婢故云越婢耳生薑多者取其辛溫益胃且勝石膏也此湯與各半湯治相類方亦熱身發散減小桂枝湯之製而加麻黃杏仁此以胃熱為建而不能作汗故減小大小青龍之

桂枝湯見前太

桂枝湯見前太桂枝湯見前太

桂枝湯見前太桂枝湯見前太桂枝湯見前太

桂枝湯見前太桂枝湯見前太桂枝湯見前太

桂枝湯見前太桂枝湯見前太桂枝湯見前太

桂枝湯見前太桂枝湯見前太桂枝湯見前太

桂枝湯見前太桂枝湯見前太桂枝湯見前太

桂枝二越婢一湯

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

桂枝七銖麻黃一兩芍藥各一兩甘草各一兩生薑各一兩切各一兩

益誤矣故在表之風寒未除而發熱頭項痛無汗無汗者微寒之徵也在裏之水飲上逆而心下滿微痛小便不利不利者水不下行也桂枝已誤不可復用心下已微痛而滿可因無汗而復與麻黃耶故以小便不利加苓朮以導之取芍甘薑棗仍和其營衛而安其誤下之陰氣耳

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝 生薑 切 蜀漆 各三兩 牡蠣 五兩 龍骨 四兩

甘草 二兩 大棗 十二枚 上七味以水一斗二升

傷寒分經 卷八 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

此以火劫而亡陽乃方寸元陽之神被火迫劫而飛騰散越故驚狂不安此離中之火不復安而清之常而其邪滯仍留連上焦故于桂枝湯中去芍藥之酸寒陰滯使桂枝疾趨以達肌表蜀漆常山苗也取其苗性輕揚發散上焦之邪滯合甘草薑棗皆所以通調肌表助桂枝以成功龍骨牡蠣極動極靜之骨屬借彼飛伏之意

迎此散亂之機為之舟楫以載神而反其宅舍此而用養血安神之品皆緩不濟事卒難逆也問用龍骨牡蠣借彼飛伏之意迎此散亂之機古人未有此論其說有所本與答曰龍純陽之物也潛藏而飛以神用者也牡蠣則沉潛水底體用皆陰矣合而用之其能挽飛越而為安定又何疑焉總之此證之驚狂與桂枝甘草龍骨牡蠣易之煩躁證皆心神為病不比太陽之煩少陰之躁但有甚有不甚故皆以安神為先此以上焦之邪滯故用蜀漆薑棗彼以微故去三物耳

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝 兩 甘草 炙 龍骨 牡蠣 各二兩 上四味以

傷寒分經 卷八 桂枝甘草龍骨牡蠣湯

水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

此證之煩躁是天君未動而僅擾擾不寧且外邪雖未盡而上焦之邪滯已微故但用龍骨牡蠣之鎮定而夫蜀漆之輕揚因既經火逆又下且針脾中津液不堪再宣故并去薑棗而但以桂枝甘草微和其表所謂因時制宜稱物平施也

甘草乾薑湯 此即四逆湯

甘草 四兩 乾薑 二兩 上二味咬咀以水三升

煮取一升五合去滓分溫再服

傷寒分經

卷八

甘草乾薑湯

查

脈浮自汗出固是在表之風邪而小便數心煩則邪亦在裏加以微惡寒則在裏為寒邪更加脚絳急則寒邪頗重矣乃用桂枝獨治其表則陽愈虛陰愈無制故得之便厥桂枝止誤其可用麻黃大青龍平陰寒內凝總無攻表之理也故用甘草乾薑湯以調中而復其陽者即所以散其寒也若仲景論證象陽旦誤治而厥逆者於桂枝湯加附溫經增桂令汗矣又飲以甘草

芍藥甘草湯

此即桂枝湯去桂枝黃芩也

芍藥酒洗甘草四兩上二味咬咀以水三升煮取一升半去滓分溫再服
前用甘草乾薑湯厥愈足溫不但不必治寒且

茯苓四逆湯

傷寒分經

卷八

芍藥甘草湯

查

處前之辛熱有傷其陰而足學轉鋼故隨用芍藥甘草以和陰而伸其脚若陽旦誤治證增桂加附子而又用乾薑乃脛仍不伸似乎陰盛然咽乾語熱證相錯其非重陰淫寒可知故亦以芍藥甘草和其陰也
發熱而虛筋攣頭而赤熱過汗傷陰陽乘至夜或誤用辛熱擾其營血不受補益者並宜用之真血虛按熱之神方也設見脈浮自汗營衛不和縱非外感仍屬桂枝湯證矣
調胃承氣湯入後陽明上篇
四逆湯入後太陽全篇

茯苓六兩人參兩甘草二兩乾薑半兩附子一枚去皮破八片上五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

汗出煩躁風證之常也不汗而煩躁即為大青龙證然脈弱汗出諄諄相戒謂挾風表虛而又汗之其亡陽最易也今汗下不解轉增煩躁是正虛不能勝邪雖與之爭而有欲負之勢故用茯苓最多并人參甘草乾薑生附衍誤用大毒

黃連湯

龍施真武之例而去芍朮加參甘俾溫補兼施以安其欲亡之陽使虛熱自退煩躁自止而風寒之邪在所不計耳此證惑人在病仍不解四字仲景恐人因此而疑煩躁為風邪未服恣意表散危機一蹈噬臍無及也過汗則亡陽而表裏虛陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用人參茯苓入心以除煩附子乾薑入腎以解躁

傷寒分經

卷八

茯苓四逆湯 黃連湯

畜

黃連

甘草

乾薑

桂枝

人參

半夏

半升

大棗

十二枚

上七味

以水一斗

煮取六升

分三服

夜二服

去滓

去滓

溫服

一升

日三服

夜二服

去滓

溫服

一升

日三服

夜二服

去滓

溫服

一升

日三服

夜二服

去滓

溫服

一升

日三服

夜二服

去滓

人身之所恃以升降陰陽調和寒熱者全憑中氣故即有偶感之寒偶感之熱稍緩自化邪一而不爭也今胸有熱風邪在上也胃有邪邪者寒也寒熱之邪勢均力敵則心下胃上竟為越吳戰場往來不通乃人身自然之陰陽反各從賊勢為消長而不能勝調和之任欲嘔吐者熱邪上逼也然止言欲非真能嘔吐也為抗而已腹中痛者非胸中之熱能入腹與爭也盜據中

原而下土告陷失救援之望為困而後以黃

連合半夏清熱而降逆乾薑同桂枝溫胃而散

寒人參甘草大棗為維持調護之主庶陽精無

擾而陰精奉上矣其不用生薑者生薑止嘔功

在辛散上陽陷於賊熱下陰陷於賊寒而精氣

不貫病在兩頭故設法除賊以升陰降陽邪不

在中間無取辛散焉耳雜病欲嘔而不吐胸上

覺熱者亦當以此方推之成氏曰溼家下後舌

執胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此

傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣

使陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不

得降而獨治於上為胸中熱欲嘔吐宜與此湯

以升降

小黃龍湯

麻黃 芍藥 乾薑 甘草 桂枝 細辛

五味子 半夏 上八味以水一斗

先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去

滓溫服一升 加減法 若微利者水瀉去麻黃之液加薤白如雞子大

熱令赤色

以利水去則利止時珍曰藥花蓋亦花之類氣味上治大略相近

若渴者

津液不足也

去半夏

津液之類

加栝蒌根

三兩以微

生熱而

若噎者

水寒室

去麻黃

加附子

一枚炮以利

氣而散

若小便不利

少腹脹

水停下焦

去麻黃

利

加茯苓

四兩

以通氣而

若喘者

水氣射肺而

去

麻黃

加杏仁

半升

去皮尖

以潤肺

而

人身水飲停蓄

心下則變證不一

蓋水氣為陰

邪故逆上

則為喘為咳為嘔

注下則為腸鳴自

利小腹滿

小便不利

以心下為通衢

無所不至

傷寒分經

卷八

小青龙湯

矣

也至若在傷寒表未解時

災變尤急

攻表則遺

裏攻裏則遺表

豈不兩難乎

不知太陽之邪由

皮毛而入

皮毛為肺之合

水飲之逆

因氣為使

肺為氣之宗

故仲景一見水氣證如乾嘔微利

咳發熱不問全備與否

竟於桂枝麻黃中加五

味之酸以收肺氣

之逆乾薑之辛以瀉肺氣

之滿半夏細辛之辛入陰消飲下逆瀉肺耳

蓋細

辛能入心瀉肺

補肝潤腎而助其宜散故於風

藥中獨為入陰

劑更合五味芍藥乾薑半夏

夏

藥中獨為入陰

劑更合五味芍藥乾薑半夏

夏

夏

夏

夏

藥中獨為入陰

劑更合五味芍藥乾薑半夏

夏

夏

夏

夏

藥中獨為入陰

劑更合五味芍藥乾薑半夏

夏

夏

夏

夏

藥中獨為入陰

劑更合五味芍藥乾薑半夏

夏

夏

夏

夏

藥中獨為入陰

劑更合五味芍藥乾薑半夏

夏

夏

夏

夏

藥中獨為入陰

劑更合五味芍藥乾薑半夏

夏

夏

夏

夏

以遂其內搜之性雖有桂枝麻黃不能直達表

分而但助其擴清矣義取小青龍者欲其翻波

逐浪以歸江海不欲其興雲升天而為淫雨之

意後人謂小青龍為發汗輕劑昧其旨矣

白虎加人參湯

於白虎湯內加入人參兩餘依後白虎湯法

白虎湯但能解熱不能解表故必無表證而裏

熱者宜之煩渴裏熱之徵也至欲飲水知陰火

燥燄而液乾故加入人參以瀉陰火也若背微惡

傷寒分經

卷八

白虎加人參湯

矣

寒而口燥心煩者蓋背為至陰之地今表熱少

裏熱多挾虛故雖表退而有寒比通身惡寒不

同故亦加入人參若汗煩渴脈洪大者則雖熱而

虛可知故亦加入人參若傷寒七八日至大渴熱

燥而煩者甚至欲飲水數升其熱何如特以熱

結在裏所以表熱不除而時時惡風乃氣傷於

熱而餒不可泥為表邪亦宜白虎加人參湯以

表之微風為輕裏之因寒變熱結為重也設脈

但浮而不滑證兼頭疼身痛則雖表裏俱熱而

白虎湯

石膏

石卒 一
角力

知母 兩六

計
雨
二
粳米
合六

上四味以

水斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

傷寒分經



卷八 白虎湯

六

傷寒分經



卷八

白虎湯

1

1

究

重劑非他寒涼可比故以甘草粳米監之若三陽合病亦用白虎以合病之多熱者汗下皆非所宜故以白虎湯爲主治正如太陽少陽合病之主黃芩湯耳通云春不白虎爲瀉肺也蓋降下惡其瀉肺之陽而不得生發也此特指春不可用者恐人誤以治溫病之自汗煩渴也至於秋冬感冒傷寒反可混用以傷金水二藏之真氣乎此湯專主熱病中暍在氣虛不能蒸發者則加人參故張隱菴以爲陽明宣劑其於溼瀉則加蒼朮溫癰則加桂枝一皆夏月所見之證故昔人又有秋分後不可妄用白虎之戒然病有舍時從證者故雖非夏月亦有當用之證

陽明上篇論列方

桂枝湯

見前太陽上篇

麻黃湯

見前太陽中篇

小承氣湯

厚朴湯一名三物湯

大黃

四兩厚朴二兩

枳實

三枚大者炙

水四升

煮取一升二合

去滓

分溫二服

初服湯

傷寒分經

卷八

小承氣湯

主

堅者不可用蓋大黃清血分之熱故得大黃而瀉不止者飲粥湯胃得穀氣即止以胃之氣分不傷也合芒硝則并氣分而峻寒之矣非有大熱者何以堪之人身溫煖之氣乃元氣也一傷猝難驟復故必熱結太盛然後兼用之所謂有病病當之也觀仲景增此一味而曰大減此一味即曰小且諸所欲下者必曰先與小承氣則芒硝之峻可知至調胃承氣反去枳朴不去芒硝乃為熱盛而胃氣不和者恐其破氣故去枳

朴而加甘草以培養其根本故曰調胃非謂熱不盛者亦可用也

調胃承氣湯

比大承氣有甘草而無枳朴為異

大黃

四兩清酒浸

甘草

二兩炙

芒硝

半升

上三味

咀以水三升

煮大黃甘草

取一升去滓內芒硝

更上火微煮

令沸少溫服

仲景用此湯凡七見或因吐下津乾或因煩滿

氣熱總為胃中燥熱不和而非大實滿者比故

不欲其速下而去枳朴欲其戀而生津特加

傷寒分經

卷八

調胃承氣湯

主

甘草以調和之故曰調胃然胃既熱結至須硝黃開之則其氣之壅而不接可知承者順也順其氣而接之也故亦曰承氣合觀仲景治熱邪內入口陷胸邪高在胸上也曰瀉心邪居在心下也曰調胃邪竟在心下之胃也即心胸胃三字地分了然治胸曰陷謂邪雖在高比虛煩者全裏而不兼表矣故彼虛煩證以梔豉輕湧者此宜以大黃芒硝甘遂等陷之使下義取陷身陣內而攻克也治心曰瀉謂邪在此不過熱邪

傷寒分經

卷八

調胃承氣湯

三

痰飲膠結比胸則利低比胃則無實導而去之
 其勢順故曰瀉也
 勝膀胱運之木氣化則能出有熱有物以滯之
 氣不承順則壅而不和故義取調而下之其則
 大承氣不甚則小承氣也
 上為結乎且強則項下不可結胸者項下也
 故註病狀曰心下硬立揚名則曰陷胸也
 氣者用王以制亢極之氣使承順而陷胸也
 祕要曰王海藏論云仲景承氣湯有大承氣小承氣
 之殊今人以三承氣不分大承氣小承氣
 不失仲景本意大承氣實用上承氣小承氣實
 用下承氣
 緩其下而祛胃熱也病大用調胃承氣以甘草
 病小用大承氣過傷一氣病在上而用急下之劑
 則上焦受傷去芒硝恐傷下焦血分之真陰論
 曰上焦受傷去芒硝恐傷下焦血分之真陰論
 調胃承氣曰邪在中焦不用枳實厚朴以傷上
 焦虛無氣曰邪在中焦不用枳實厚朴以傷上
 下焦之證至堅而燥也仲景調胃承氣湯曰
 承氣之證至堅而燥也仲景調胃承氣湯曰
 八方中並無乾燥而燥也仲景調胃承氣湯曰
 腹滿則知此湯專主表邪悉罷初不入府而欲結
 之證也故知此湯專主表邪悉罷初不入府而欲結
 大黃註曰酒浸是以調胃承氣收未遠其病在
 上不當攻下故宜緩劑以調胃承氣收未遠其病在
 明則皆急下之而大承氣湯大黃註曰酒浸是以
 是洗腸於浸微升其走下之性以和其中至於
 少陽陽明則去正陽而通下之性以和其中至於
 在下陽明則去正陽而通下之性以和其中至於

傷寒分經

卷八

豬苓湯

三

吳茱萸湯入後少
 梔子豉湯陽中篇
 白虎加入參湯陽下篇
 豬苓湯
 豬苓湯茯苓 澤瀉 滑石 阿膠 各一 以上
 五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿
 膠烱消溫服七合日三服
 五苓太陽藥也故用桂枝與朮豬苓湯易以阿
 膠滑石則為導水滋陰蕩熱利竅之劑而非太
 陽藥矣故少陰病下利六七日咳而嘔渴心煩
 不得眠者用之謂下利六七日本熱去寒起之
 時尚兼咳渴不眠等證是熱邪搏結水飲以故
 嘔而不吐故用以利水潤燥若證見發熱渴欲
 飲水小便不利安知非太陽膀胱熱而亦用
 豬苓湯以其從陽明來即不得復責太陽而用
 五苓也唯義取滋陰導水故陽明病汗多而渴
 者豬苓湯即在所禁若五苓則一見陽明有汗
 證便禁用不必汗多而渴矣以邪不在太陽而

用半表即是誅伐無過

導熱止渴單清其裏而已

小柴胡湯入後少陽全篇

四逆湯入後太陽全篇

茵陳蒿湯

茵陳蒿湯兩梔子十四兩大黃去皮二兩上三味以水

一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓

分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一

宿復減黃從小便去也

傷寒分經 卷八 茵陳蒿湯 毒

發黃則邪遍周身以乎膚腠為病但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿則邪實有結意此穀疸之頭眩則頭汗為熱多且穀瘕飽而微煩不渴則此之渴飲水漿為熱盛又身無汗小便不利則中之熱因溼鬱而氣不化更可知故以茵陳山梔合大黃解散溼熱并下之也欲其自內而達外也大黃之性速入血分不能緩解氣分之熱同梔子茵陳則能宣溼而化熱傷寒六七日身黃如梔子色亦用此湯謂茵陳

合大黃則鬱去而黃退大黃合梔子則便利而

溼行耳若寇氏治僧之傷寒汗不微發黃熱多

期年不愈去大黃而加秦艽升麻則以外熱多

而全責肌表矣且為無結聚雖有熱非如頭汗

出劑頸而還湯入後太陽全篇之甚也

抵當湯見前太陽上篇

大承氣湯入後陽明中篇

傷寒分經 卷八 茵陳蒿湯 毒

陽明中篇論死方

調胃承氣湯見前陽明上篇

蜜煎導法

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦着欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長三寸許或加皂角末少許乘熱納穀道中冷則輒以手急抱大便出時乃去之

豬膽汁導法

大豬膽一枚瀉汁和醋少許用竹管長三四寸以一半納穀道中

傷寒分經

卷八

蜜煎導法 豬膽汁導法

美

隨以膽以灌穀道中如一食頃當大便出海藏
蜜煎導法 凡化寒消結可隨證陰陽所宜而
堅酒燥草烏能化寒消結可隨證陰陽所宜而
中脈遲弱元氣虛人便欲下而不能出者並
宜導之須分津液者用蜜導邪熱盛者用
下傍流水者導之無益非諸承氣湯攻之不效
以蜜煎內而導之生附子末或制陳醋也
導之凡此皆善於推廣仲景之法也
已上導法皆為大便將行而不能潤利者設也
結胸及痞胃有燥屎結皆有現證今一無現
證但自汗且小便利是鬱熱燥乾非堅結也故

或以甘潤或以苦寒而導之使下猶之硝黃開結而反從下達邪低故也若見實滿等證則小便利正屬可攻之候矣

大承氣湯

大黃四兩酒洗厚朴半兩炙枳實五枚炙芒硝三兩
四味以水一斗先煮枳朴取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分溫再服得下餘勿服

厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大黃泄實海藏

傷寒分經

卷八

大承氣湯

老

謂必痞滿燥實四證全而後可用不易之論矣
總以大便秘實為主便實必以手足濇然汗出為
第一驗蓋表解後周身無汗而手足濇然非燥
屎熱氣不能使諸陽之本獨蒸蒸而潤也但外
之解不解內之燥不燥虛不虛非手足汗之所
能盡故表則驗之惡寒或無汗或脈浮則表尚
未清也內則驗之不轉失氣或臍腹痛或脈弱
或便澀或小便不利或熱微或熱不潮則裏實
未盛也以消息燥實痞滿四字方確然脈證參

差又不可泥如汗多微惡寒脈遲禁下若脈遲汗出而兼不惡寒身重短氣腹滿喘潮熱即為外欲解可攻裏之象以裏熱多故知脈遲為表欲解也若煩躁心下硬而無太陽及柴胡證似可下矣然脈弱雖能食不可以為胃強而輕下也不大便六七日似可下矣然小便少屎未定鞭雖不能食不可以為燥屎而輕下也至譫語有潮熱反不能食等證則真胃中有燥屎矣大承氣雖重劑以此詳辨寧有誤乎

傷寒分經

卷八

大承氣湯 麻仁丸

表

小承氣湯

見前陽明上篇

麻仁丸

即脾約丸凡云九者皆小丸欲其直達下焦也後跋陰篇烏梅丸同

麻子仁

二升蒸枳實炙芍藥各半

杏仁

去皮尖熬別作

大黃

厚朴各一觔

上六味為末煉蜜為

丸如梧桐子大飲服十丸漸加以利為度

約者約少也乃脾中素有燥熱津液不足約二

三日所入之物為一二彈丸若外邪入裏必益

增燥熱此時雖急下之以存津液無及矣故仲

景大變太陽禁下之例早立麻仁丸以潤之不

比一時暫結者可用湯藥蕩滌耳仲景所謂胃強者亦謂脾土過燥使腸胃津液枯槁化熱致中消便少是胃亦因脾之強而強強即邪矣非強於脾之謂也使脾果弱非溇即瀉焉能反約小胃中之殺食乎此治法之妙也方中用麻子仁二升以潤腸胃芍藥以養陰枳實以破結大黃以瀉實為合機後世以此藥治老人津枯血燥之陽結但取一時之通利不顧急傷其真氣得

傷寒分經

卷八

麻仁丸

表

陽明下篇論列方

小柴胡湯入後少陽全篇

附少陰轉陽明方

大承氣湯見前陽明中篇

附厥陰轉陽明方

外承氣湯見前陽明上篇

傷寒分經

卷八

全

少陽全篇論列方

小柴胡湯

柴胡半升 黃芩 人參 生薑切 甘草各三兩 半夏

洗半升 大棗十二枚 上七味以水一斗二升煮取

六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

加減法見前三卷上少陽經全篇

傷風與寒有裏即不可攻表有表即不可攻裏

此定法也少陽半表半裏故凡見少陽一證即

不可從太陽為治而當用小柴胡也小柴胡湯

傷寒分經

卷八

小柴胡湯

全

為邪傳少陽恰在半裏從中而和之主方

又能散諸經血凝滯故凡邪之表裏混雜者

俱藉之以提出少陽俾循經次而出所以仲景

取川獨多而尤於傷寒中風五六日往來寒熱

胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者為的對

之劑也風寒之外邪挾身中痰飲結聚少陽本

位所以胸脇苦滿熱逼心間所以心煩喜嘔胸

脇既滿胃中之水穀亦不消所以不欲食於是

邪入而併於陰則寒出而併於陽則熱故槩以

小柴胡和之。柴胡者少陽主藥也。邪入內則熱，故用黃芩。有飲而嘔逆，故用半夏生薑。然小柴胡得擅和解之功，實賴人參甘草大棗以養正而調其陰陽也。人之氣體不同，所挾亦異，故以柴胡甘草生薑為定藥，餘則增減隨證耳。若口苦咽乾，熱聚於膽也；目眩木盛生風而旋運也；為少陽本病。前證中不槩列，亦有無是證者，不可拘也。

小建中湯 見前太陽中篇

傷寒分經 卷八 柴胡桂枝乾薑湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡 各半斤 桂枝 各四兩 黃芩 各三兩 乾薑 各二兩 甘草 各二兩 牡蠣 各二兩 六兩去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈 去滓再煎與小柴胡同義 太陽證見一證涉少陽即禁汗下以邪在半表非汗下之所能盡也此以傷寒發汗必有半裏之邪太陽證見內證而又復誤下也邪兼半表而攻其內外故邪在少陽者往來寒熱而心煩

邪本太陽者胸脇滿微結其小便不利渴而不嘔者汗下亡津液而內燥也若使邪盛而渴者其人必嘔矣其頭汗者必初發汗時下原未得汗而又下之於是津亡而渴又加胸滿微結邪已內入而身之汗益難初之誤汗徒虛其上而頭為之汗故從和解之法而用小柴胡以渴去半夏以胸滿微結去人參加桂枝以從太陽加乾薑以散滿加枳實根以滋內乾加牡蠣以裏結也彼以結胸無外熱裏熱為多故從下奪之

傷寒分經 卷八 柴胡桂枝乾薑湯

法而用陷胸此則往來寒熱表多裏少故惟和解為安耳

大陷胸湯 見前太陽上篇

半夏瀉心湯 見前太陽中篇

附合病論列方

桂枝加葛根湯

於桂枝湯內加葛根三餘依桂枝湯法太陽中風自汗凡凡項背強凡凡頸不舒也而項背強狀亦可意會矣頸項屬陽明故為太陽

陽明合病但太陽證多陽明證少所以仲景止以葛根一味加入桂枝湯中然不須歆粥蓋葛根之輕揚已足引陽明襲邪其桂枝成解肌之功耳

葛根湯

葛根四兩麻黃去節生薑切各三兩芍藥酒洗甘草炙桂枝各二兩大棗十二枚上七味咬咀以水一斗先煮

麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須歆粥餘如桂枝

傷寒分經

卷八

桂枝加葛根湯 葛根湯

金

法將息及禁忌

葛根陽明藥也頃強凡凡為陽明的證故太陽病兼見此一證即有汗為風無汗為寒而於桂枝麻黃湯中各加葛根以盡其用然彼不名葛根湯但言桂枝加葛根以桂枝全湯僅加此一味也此獨更名為葛根湯者見寒邪即兼入於陽明則胸間之喘自止自可不用杏仁故不於麻黃全方加葛根反用桂枝全方加麻黃葛根恐其寒少也雖意主加入麻黃湯而不得謂麻

葛根加半夏湯

黃湯加葛根耳若太陽陽明合病自下利者用葛根湯成說謂邪併於陽則陽實而陰虛陰虛下利故以葛根湯散其餘邪如是則葛根一味為陽明矣獨用入麻黃義何取乎蓋寒邪屬陰陰性下行故合陽明胃中之水穀下奔治寒以麻黃為主故必合麻黃葛根並加之亦不用杏仁因其勢已下趨不欲復利之也

於葛根湯內加半夏半升餘依葛根湯法

傷寒分經

卷八

加半夏湯

金

仲景於太陽陽明合病自下利者以為兼寒而用麻黃葛根加入桂枝全方矣若不利而加嘔則是兼風風屬陽故合陽明胃中之水飲而上逆故於葛根湯全方復加半夏以去其逆猶之小柴胡治半表半裏而未全入裏者不脫半夏為治也若榮如成無已邪併於陽則陽實而陰虛陰虛必下利之說則此之合病獨非邪併於陽乎何以不下利而獨嘔故知下利不下利有挾寒挾風之不同也

麻黃湯見前太

黃芩湯陽中篇

黃芩三兩甘草炙芍藥各二兩大棗十二枚上四

味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

太陽少陽合病下利既非若太陽陽明合病表證多亦非若陽明少陽合病裏證多汗下皆不宜故用小柴胡之三桂枝湯之二合而和之因此悟桂枝湯意桂枝為太陽主藥合薑棗行脾

傷寒分經

卷八 黃芩湯

矣

之津液而和其邪因其自汗陰陽不利以甘草芍藥和其內而其成解肌之功此以合病下利故單用甘草芍藥以和其內也并悟小柴胡湯意柴胡為少陽主藥合生薑半夏以去少陽之飲而和其半表因表邪入內則熱以黃芩甘草人參大棗之甘寒和其半裏而其成和解之用此以合病下利故單用黃芩甘草大棗以和其裏也因此而推廣之凡雜證因裏未和而下利者黃芩湯可為萬世之主方矣

黃芩加半夏生薑湯

於黃芩湯內加半夏升生薑二兩餘依黃芩湯法

黃芩湯既為太陽少陽合病下利不易之方非為其合二經而和調於一氣乎然氣一也下奪則利上逆則嘔多嘔加生薑半夏始知小柴胡之加薑棗蓋分而為用也意在生薑半夏以滌飲止嘔人參大棗甘草以和中黃芩以清熱也觀此之嘔加生薑半夏曉然自明否則不嘔何

傷寒分經

卷八 黃芩加半夏生薑湯

也

獨用大棗而不用生薑耶

大承氣湯見前陽

白虎湯見前太

附併病方

大承氣湯見前陽

附痰病方

瓜蒂散

瓜蒂一分

赤小豆一分

上二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合

煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少加得快吐乃止

痰飲在胸變態不一寒而不熱則有手足厥冷一證何以知非中寒則以乍緊之脈別之緊而曰乍是即診時前後不緊偶現緊形也熱而兼溼則有心下滿而煩餓不能食一證原無他證而但胸中作楚故不必以脈別之若病如桂枝證是發熱汗出而惡寒矣然且頭不痛項不强非全乎表證胸中痞鞭又類結胸寸脈不沉而

傷寒分經

卷八

瓜蒂散

矣

微浮是邪不在裏不在表而在胸中況氣上冲胸咽喉不得息如果表病初發何至於是明知是痰而口胸有寒者痰本於寒也已上三證槩以瓜蒂之苦赤小豆之酸以湧之所謂高者因而越之也其形容痰證寒熱微甚可謂備矣然特別之傷寒證中者謂厥冷似虛寒煩滿似痞如桂枝證似表故特拈出以示辨耳

太陰全篇論列方

桂枝湯

見前太
陽上篇

四逆湯

甘草二兩 乾薑一兩 附子一枚生用去皮破八片 上三

味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再

服強人可大附子一枚乾薑三兩從前附子皆

是難得重半兩者即少不若今時之種附子重

一兩外也近世用二三錢一劑即與仲景時二

劑相等耳 陰盛而格陽於上者宜冷服

傷寒分經

卷八

四逆湯

矣

痛與夫厥逆下利脈不至者為的對謂太陰主水穀病則自利內有真寒故不渴凡陰證病在裏故脈沉寒則血脈凝澀故身痛四肢受氣於裏裏寒則陽氣不得宣布故四肢逆冷或更下利則益里裏寒或脈不至則是寒極而脈伏也故以甘草合乾薑生附之大辛熱者主之經曰寒淫於內治以辛熱此皆主純乎陰寒者而以此中發其陽氣也然有傷寒誤下續得下利清穀不止身疼痛者云急當救裏宜四逆見四逆

雖專主厥寒然有表邪未盡裏寒為重者亦當
先以四逆救裏此又用四逆湯之變通矣涼服
者熱因寒用也此湯通治三陰厥逆手足
內溫外微肌表以溫經散寒乾薑亦用生者以
焦也陰盛而格陽於上者宜涼服所以變加蔥
之製恐陽氣之欲散未散者因蔥而上越耳

桂枝加芍藥湯

於桂枝湯內更加芍藥三兩連前共六兩餘依桂枝湯
法

太陰腹滿時痛有直中者有傳經者有誤下內

傷寒分經

卷八

桂枝加芍藥湯

半

陷者惟誤下為輕淺蓋太陽誤下之變每在胸
脇胸脇不虛而脾獨受傷是越經而為變也脾
之受邪原淺但邪雖入陰位而太陽之邪毫未
料理故但倍芍藥大和脾氣以收太陰之逆而
仍以桂枝治其本經之邪提之使出太陽不比
直中者竟治太陰耳若傳經者虛實寒熱所因
不同藥亦有異矣

桂枝加大黃湯

於桂枝湯內加大黃兩一餘依桂枝湯法

腹非胸脇之比腹滿時痛病淺宜和而大實大
滿勢在必下但邪既入陰又非寒下所宜蓋表
邪以誤下而乘虛陷入即實滿亦因表邪而增
勢非陽分熱結之比也故於桂枝原方加入大
黃實滿一去而桂枝生薑為功於表芍藥甘草
大棗効和脾之力所謂一舉而兩得耳

傷寒分經

卷八

桂枝加大黃湯

全

少陰前篇論列方

麻黃附子細辛湯

麻黃二兩 去節 附子一枚 炮 去皮破八片 細辛兩 上三味以

水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升去滓溫服一升日三服

三陰必以溫經之藥為發散使邪出而真陽不出故麻黃附子細辛湯人皆知附子溫經麻黃細辛表散而不知寒邪必由皮毛而入皮毛者肺之合也麻黃為肺家專藥故以治寒所從入

傷寒分經

卷八

麻黃附子細辛湯

奎

非即解少陰之寒也附子入少陰固矣細辛雖手少陰之引經乃足少陰本藥其氣香味辛且能驅表邪散浮熱是為達外賴此以為旗鼓故較麻黃附子甘草湯此為重劑然少陰病明有脈細沉數病為在裏不可發汗之禁又有八尤印一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血之條此脈沉身熱似乎非麻黃附子所宜豈知陰病難於得熱脈雖沉而發熱則邪猶在表矣況曰始得之則客邪尚淺非七八日邪已入裏之

比耶

附子湯

附子二枚 去皮破八片 人參二兩 白朮四兩 芍藥酒洗 茯苓各三兩

上五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

陰邪稍久每致變熱而為上下攻冲之證便須曲為酌量回護若但背惡寒乃陽弱陰勝之常更口中和則與咽乾煩渴者異矣故灸之而又以此湯溫補其中若身體痛手足寒骨節痛脈

傷寒分經

卷八

附子湯

奎

沉亦寒邪內中之本證故亦以此湯溫補之而無所回護取附子茯苓下溫其經不用乾薑之剛燥更以芍藥監之而附子之力乃更柔緩且以參朮培其中土而附子特為鎮攝之主羽翼綸中難以狀其從容決勝之度矣附子湯與真一味何黃武湯主行水收陰附子湯主回陽峻補耶蓋真武湯內生薑在熟附子湯中不過取辛熱之力以走散經中之水飲附子湯中人參助生附子純用其溫補之力以恢復陽散之真陽且附子湯中參朮皆倍於真武其分兩亦自不同所以主治迥異豈可比例而觀乎

麻黃附子甘草湯

麻黃二兩 附子一枚 炮去甘草二兩上三味

以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內二味煮

取三升去滓溫服一升日三服

此較麻黃附子細辛湯去細辛加甘草為調停

其藥勢之緩多矣因細詳立方之意言少陰病

二三日比初得之略多一二日矣日數雖略多

而無裏證寒邪所入尚淺是以陰象不能驟發

故將此湯微發汗微云者因病情不即內入而

輕為外引也此如桂枝麻黃二湯之有越婢同

傷寒分經

卷八

麻黃附子甘草湯

金

其委曲彌縫而已

吳茱萸湯

吳茱萸一升 洗人參三兩 生薑六兩大棗十二枚 勞上

四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三

服

凡治病因食作楚者藥作陽明此大法也故食

難用飽飽則微煩之陽明即為穀瘕嘔屬太陽

食穀而嘔即似陽明受寒故以吳茱萸治胸中

逆氣滿塞然而增劇則仍是因火故云屬上焦

也明非下焦寒逆之比所以用吳茱萸為誤也

若吐利厥逆至於煩躁欲死方是腎中之陰氣

上逆故以吳茱萸下逆氣人參黃耆培土腎氣

自不能上陵雖亦溫中實下其逆耳若乾嘔吐

涎沫是寒侵厥陰肝木乘脾土而陰氣逆上亦

用吳茱萸湯泄逆好古所謂衝脈為病逆氣裏

急宜此主之蓋腎肝同一治也按東垣曰濁陰

不降厥氣上逆咽膈不通食則令人口開目瞤

陰寒膈塞氣不得上下此病不已令人寒中腹

傷寒分經

卷八

吳茱萸湯

金

滿膨脹下利宜以吳茱萸之苦熱泄其逆氣用

之如神則知肝腎濁陰上逆自能致病於陽明

中即不寒尚能使寒況原有虛寒者乎中氣固

強自能鎮安腎肝使其不逆病分上下實則聯

貫一物而兼治之惟吳茱萸為能故以為君而

名湯觀此而仲景一方兩用之意不曉然哉

白通湯

葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚 生用 去上三味以

水三升煮取一升去滓分溫再服

言少陰病則既無熱脈沉細但欲寐矣因而下利是陰寒凝結統攝無主並無疑似之陽證凝結之寒漫無欲散之機故以生附配乾薑辛熱而迅發從朔雪中鼓動一陽以成開泰之功其用葱白者隆冬凜冽百草皆萎患不在虛而在陽氣之不通故以葱白之最通陽界者主湯之名謂陽春布德必先發管飛灰東風透谷而後凍解暉生否則單恃辛熱不足以引有腳之陽適足以益丹鼎之燥耳

傷寒分經

卷八

白通湯

白通加豬膽汁湯

亥

白通加豬膽汁湯

於白通湯內加入人尿一升膽汁一合以水三升煮白通湯三味取一升內膽汁人尿和令相得分溫再服

白通湯本取通脈服之宜乎沉者起微者盛也乃反厥逆無脈乾嘔而煩是葱白能通上而不能通下且微陽之欲散未散者因葱而越上故為嘔為煩然非葱白薑附之辛熱猝難宣發則葱白之用豈為過乎貴在無向導矣故以人尿

豬膽汁引之但炎上之火收之極難故脈息暴出謂與下之凝寒竟不相屬則相離而絕也

真武湯

兄前太陽下篇

通脈四逆湯

甘草

二兩炙

乾薑

三兩強人可四兩

附子

大者一枚去皮破八片生用

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

加減法

面色赤者

格陽於上也

加葱九莖

以通腹中痛者

傷寒分經

卷八

通脈四逆湯

亥

不足也

去葱加芍藥二兩

以散陰

嘔者加生薑二兩

以散

咽痛者

氣結也

加桔梗一兩

利止

脈不出者

陽氣未復也

去桔梗氣和也

人參二兩

和陰也

寒見寒證熱見熱證此其常也寒熱證並見是陰寒隔陽於外不能內返也故少陰病下利清穀厥逆脈微腹痛寒也而反外熱不惡寒而赤乾嘔咽痛則為陰陽相睽而元陽飛散之機即於四逆加葱以入陰而迎陽又倍乾薑以壯溫

煖之氣加甘草一兩。天和調之。用蒸通之於外。正攝之於內也。甚。戴陽汗出者亦用之。合甘草乾薑大甘大熱之間。有妙用焉。雖汗出而不忘葱。可知此證之急務。妙在通之也。亡故藥同四逆而另作湯名。重在加減也。至於利止服不出。正經所謂脈微而利亡血也。又非一通可愈。故更加以人參。然觀而色赤加葱九莖則知格陽之證。當以戴陽為確矣。

四逆湯

見前太陰生篇

傷寒分經

卷八

通脈四逆湯

天

少陰後篇論列方

黃連阿膠湯

黃連

阿膠

兩黃芩

兩芍藥

兩雞子黃

二枚

上

五味以水五升。先煮三物。取二升。去滓。內膠。烱

盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。

少陰本證。脈微細。但欲寐者。人身衛氣行陽則

寤。行陰則寐。邪入少陰。則衛氣搏於陰。而不能

出。故但欲寐。於是下利嘔逆。乃陰邪內熾也。因

而汗出。煩躁。是真陽欲亡也。若無此等證。但心

傷寒分經

卷八

黃連阿膠湯

先

煩不得眠。且在二三日。傳經陽邪至此。不為日

淺矣。明是真陰為邪熱所燦。始而衛氣從邪。而

陰而欲寐。陽之陷也。今且陰氣反從火化。行陽

分。致不得眠。陰心為煩。陰之消也。故以芩連直

折其火。為君。以雞子黃混沌。未鑿之元陰。阿井

乃天地尾間之真水。挾黑驪皮。潤燥驅風。而為

膠者。育其陰之本。復以芍藥之酸。寒收攝其外

亡之微陰。較之四逆等湯。一水一火。天地懸隔

此治少陰大分別。大關鍵也。不可草草略過。此

桃花湯

本治少陰溫熱之證。以其陽邪暴虐。傷犯真陰。故二三日已上。便見心下硬。不得臥。所以始病之際。即用芩連大寒之藥。而不得臥。所以始病之際。滋養陰血也。然傷寒人七日後。熱傳少陰。傷其陰血者。亦可取用。與陽明府實。用承氣湯法。雖虛實補瀉懸殊。而救熱救陰之意。則一耳。

赤石脂

用一升。全乾薑一兩。粳米一升。上三味。

以水七升。煮米令熟。去滓。內赤石脂末方寸七。

溫服七合。日三服。若一服愈。餘勿服。

下利便膿血。腹痛小便不利。有以爲寒者。以其

所用之藥皆溫熱之品。然小便不利。每多熱證。

傷寒分經

卷八 桃花湯

百

且有見血無寒及血得熱而妄行之語。蓋病既屬少陰。邪或因經而寒。自二三日。至四五日。則寒鬱而熱矣。正如滯下之證。必由於暑而暑氣之所以陷入。則由寒冷遏抑。使然。故涼藥清暑熱藥劫鬱。皆可愈此。以石脂固脫。粳米調中。而以乾薑爲散本寒。劫標熱之總司。始無貽患。否則以寒藥治熱。熱未去而寒復傷。如之何。故只自利便膿血而無腹痛小便不利。證亦主之。謂下泄必由中虛。是方碩本慮標溫中以固洩當。

下之寒熱總不深較耳。石脂之瀉。以固下焦。滑

理中氣之虛。虛能受熱。故雖熱邪下利。不妨仍用。然此之辛。以佐石脂之瀉。湯中用石脂半觔。不爲大寒。又必加末方寸匕。取酒滓以洗。能清火。火起少陰。土禁固二便。腎水爲火所灼。不

豬膚湯

其熱耳。法猶白通湯之用人尿。豬膽。彼假其

豬膚一升。上一味。以水一斗。煮取五升。去滓。加

白蜜一升。白粉白米五合。熬香和相得。溫分六

服。

傷寒分經

卷八 豬膚湯

百

下利咽痛心煩胸滿。少陰之熱邪。挾水飲以充。斥上下中間。無處不到。而腎陰亦大虧。下奪與清熱諸法。俱不敢擅用。故用豬膚本經之水。畜以潤澤。其枯用白蜜白粉者。不特潤燥也。蓋少陰證見唯恐土不能制水。而水得以汎溢。故用中州大甘之品。予其權於土。而後平成可幾也。此與真武湯醒脾崇土之意同。但彼係陽虛。可用剽燥。此係陰虧。宜用甘潤耳。豬膚。腎而膚主。經中伏邪。陰火乘脾。咽痛之證。但當取厚皮。湯泡去肥。白油刮取皮上一層。白膩者爲是。

甘草湯

甘草二兩 上一味以水三升煮取一升半去滓
溫服七合日二服

甘草一味單行最能和陰而清衝任之熱每見
生便癰者驟煎四兩頓服立愈則其能清少陰
客熱可知所以為咽痛專方也

桔梗湯

桔梗一兩 甘草二兩 上二味以水三升煮取一升
去滓分溫再服

傷寒分經

卷八

甘草湯 桔梗湯

宣

若此湯則與甘草一味迥然不同矣桔梗有開
提之功又桔梗味苦甘草味甘甘苦相合有和
其陰陽之義初用甘草不瘥便須防其陰陽不
和故續用之然必客熱之淺者與少陰之陰尚
可支持者為宜故此與甘草湯皆必二三日內
纔用之耳

半夏散及湯

半夏 洗去 桂枝 甘草 等分 上三味各別搗
篩已合治之白飲和服方寸七日三服若不能

散服者以水一升煎七沸內散兩方寸七更煎
三沸下火令小冷少少嚥之

此又咽痛方中之變者也蓋咽痛常清少陰客
熱故豬膚湯以之調中而滋腎甘草及桔梗湯
雖清熱開提不同同於清少陰之邪若苦酒湯
及此湯皆以去痰為務然少陰之邪原從太陽
來故於去痰藥中用桂枝甘草仍欲向太陽提
出其邪但必審其微有表意者方為合法耳

傷寒分經

卷八

半夏散及湯 苦酒湯

宣

半夏 十四枚 洗 雞子 一枚 去黃內上苦 上三
味內半夏著苦酒中雞子殼置刀鐔中安火
上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑服
之

此為痰飲咽痛設也雞子兼清其熱耳然此與
黃連阿膠湯之用雞子黃又不同矣黃象地氣
為濁陰血分藥也白象天氣為清陽氣分藥也
故去黃以清在上之氣熱合苦酒以斂浮越之
虛火而無取乎劑之重但盡散中所有少少含

嘔而已

四逆散

甘草炙枳實破水漬柴胡芍藥上四味各

十分搗篩白飲和服方寸匕日三服

加減法

欬者前見加五味子乾薑各五分并主下利亦散

之意悸者加桂枝五分通心氣也小便不

利者加茯苓五分前見腹中痛者寒盛也加附子一

枚以溫之炮令拆泄利下重者先以水五升煮薤

傷寒分經

卷八 四逆散

五

白三升取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮

取一升半分溫再服下重氣滯也用

邪入陰經而陰勝或誤汗下而擾動其真陽固

有從權溫經之法矣然傳經之邪本係熱邪清

熱奪邪是為正治之法四肢者諸陽之本也邪

在三陽則熱至太陰則溫至少陰則逆而不溫

至厥陰則厥冷而甚於逆客邪漸入其熱漸深

正氣不相接故厥也蓋四逆為邪壅正氣或欬

悸小便不利或腹痛泄利下重雖上下寒熱不

同總陰之不與陽通而各自為病也故取柴胡

以解其邪甘草芍藥以和其陰而以枳實為通

達陰陽之主以其治四逆為主故亦以四逆名

方而復設種種加減法耳

豬苓湯見前陽

大承氣湯見前陽

傷寒分經

卷八 四逆散

五

厥陰全篇論列方

烏梅丸

烏梅三百 黃連一 乾薑十 附子六 人參 黃

檨 細辛 桂枝 蜀椒 當歸 兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去

核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內

臼中與蜜杵上千下丸如梧桐子大先食飲服

十九日三服稍加至二十丸禁生冷滑物臭食

等

傷寒分經

卷八 烏梅丸

真

虵厥比厥厥雖為易治然厥厥由無陽虵厥亦
因臟寒不能自安而上入其膈特邪有淺深一
則須與得止一則無暫安時故須以吐虵辨腎
邪之微甚而類聚辛熱以溫之監以黃檨烏梅
黃連以安其虵人參當歸以補其虛也然此方
寒熱兼施氣血並補故便膿之久痢以陰陽錯
雜亦能主之况烏梅黃連正為滯下之主藥也
仲景每以生附配乾薑此獨用熟附彼兼解散
此專治寒耳烏梅丸主胃氣虛而寒熱錯雜之

當歸四逆湯

上攻故仍用寒熱錯雜之方中烏梅之
酸以安胃芎藭之辛以溫通連藥之苦以降氣
蓋虵聞酸則定見辛則伏遇苦則下也其他參
歸飲則補氣血之虛寒當附以溫中而之寒飲若
寒邪則無寒邪雖有寒飲亦不致嘔逆若不嘔
逆則胃氣縱虛亦不致嘔厥矣

當歸 芍藥 桂枝 細辛 甘草 通草

各二 大棗 上七味以水八升煮取三

升去滓溫服一升日三服

脈主血虛細主亡血至細而欲絕則血虛已甚

傷寒分經

卷八 當歸四逆湯

真

不但不可下并不可溫故以桂枝全湯君以當
歸以大和其陰陽通草以通其心腎不用
薑附以劫其陰謂之虛細本是陽氣衰微而
陰血更為不足但宜用此以調和其陰陽宣通
其心腎而已
當歸四逆加吳茱萸生薑湯
於當歸四逆湯內加吳茱萸二升去
以水六升清酒六升和煮取五升去滓溫分五
服

手足厥寒脈細欲絕是經絡無所不寒氣血俱虛之至故當歸四逆丸為合劑矣更察內有久寒是一陽不足以為開泰之本而經絡之虛乃相因以至故加吳茱萸生薑溫中而通逆亦不用附子而寒自化并可通於雜證之血虛極寒者矣

四逆湯見前太陰全篇

白虎湯見前太陽下篇

瓜蒂散見前少陽篇後痰病條

傷寒分經卷八

茯苓甘草湯見前太陽中篇

麻黃升麻湯

麻黃二兩半升麻當歸各一分知母黃芩

芍藥八銖天門冬心甘草炙石膏碎綿白茯苓

桂枝各六銖上十四

味以水一斗先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥

煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃

令盡汗出愈

大下後則氣血俱傷可知於是寸脈沉遲明是

頁

傷寒分經

卷八

見

不舉故藥品十四而以二味名湯此方之於或白或蒼隨宜

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑皮去黃連去黃芩人參各三上四味以

水六升煮取二升去滓分溫再服

傷寒二字讀斷則所云本自寒下其為平日胃

氣虛寒明甚但傷寒誤吐下則應變結胸等證

今以本自寒下變反在中宮而成寒格故以人

參乾薑大溫補其中而以芩連下其逆也此乃

誤吐下之變證故亦以變法治之耳

通脈四逆湯見前少陰前篇

桂枝湯見前太陽上篇

白頭翁湯

白頭翁兩黃連去黃蘗去秦皮各二兩上四味

以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服此主熱利下重舊謂熱傷腎腎欲堅故食苦以堅之似矣然苦藥多何獨取此蓋下重者乃熱傷氣故陷下而重也陷下則傷陰陰傷則血熱

傷寒分經卷八

車

故以白頭翁清血熱即其善治鼻衄可知腎肝同治故以秦皮和肝陰即其善治目疾可知黃連清脾中鬱熱黃蘗堅北方元陰雖後重而不用一味調氣之藥病已不在氣耳後人以紫血証熱利二字似也然不若仲景自註云下利欲飲水者以有熱故也飲水與渴不同渴但津乾欲飲水則是陰分爲火燥欲得涼以解之也而陰血之熱亦在其中矣飲水者陰虛生熱也欲飲宜苦寒之藥治之不可作陽虛而用溫劑也所以用白頭翁以升木氣之下陷秦皮以堅肝

腎之滑脫連藥以泄腸胃之溼熱較少陰證便膿血桃花湯之用乾薑迴乎角立也蓋少陰之風氣推挽木火既衰內動不可復用辛溫鼓激也

小承氣湯見前陽明上篇

梔子豉湯見前太陽中篇

小柴胡湯見前少陽全篇

吳茱萸湯見前少陰前篇

附過經不解論列方

小柴胡湯見前少陽全篇

傷寒分經卷八

大柴胡湯見前太陽中篇

柴胡加芒硝湯

於小柴胡湯內加芒硝六餘依小柴胡湯法服

不解更服

此即大柴胡兩解之意也但此無枳實芍藥大黃而加芒硝謂此之脇滿潮熱嘔利雖似大柴胡證曾經誤用丸藥下之引熱邪內陷而下利非芒硝無以蕩胃中之熱且陰已被傷無所事芍藥之和也然此以加芒硝名湯則知大柴胡

設無大黃不成湯矣。大柴胡乃未經汗下而熱邪自盛者。故以小柴胡解半表裏。加枳實芍藥大黃以緩解其上下之裏熱。此湯乃因丸藥誤下引邪陷入之故。則客邪驟而淺上乃因邪而熱下未必即熱矣。故但以芒硝加入小柴胡內使和解之外假硝性之急暴而清熱者驟解其上則下之協熱暫利者不治自清矣。

調胃承氣湯見前湯明上篇

附差後勞復論列方

傷寒分經

卷八

枳實梔子豉湯

聖

枳實梔子豉湯

枳實三枚

梔子十四枚

豉一升

上三味以清

漿水七升

一名酸漿水

炊粟米熟投冷水中浸

浸至敗者五六日味酸生白花色類漿故名若

中宜氣通關開胃解煩渴化滯物空煮取四升

內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓

分溫再服覆令微似汗

仲景治勞復食復亦槩用和解汗下三法但和

解以小柴胡為主而汗下惟枳實梔子豉一方

梔豉本為湧劑此獨用之以微發汗非謂病後

傷寒分經

卷八

枳實梔子豉湯

聖

合法耳梔豉之宜

水枳實下墜之勢既

為驅熱定方於是

者加大黃僅如博基

子大餘熱不殺殺厚非如表邪內入者之堅結

而難開也

小柴胡湯

見前少陽全篇

牡蠣澤瀉散

牡蠣洗去

澤瀉

枯蘗根

蜀漆洗去

葶藶

海

藻洗去

商陸根

各等分

上七味異擣下篩為散

更入白中治之白飲和服方寸七日三服小便

利止後服

腰以下有水氣乃陰邪不盡由汗解故滯而為水也然人之身半以上為陽身半以下為陰陰病極而侵陽勢所必至故於未侵陽界之時峻劑以攻之所謂未濟而擊之稍緩則有滅趾之慮也專利小便者金匱曰腰以下腫當利小便也然藥止七不用淡味而取鹹者四苦寒者二辛平者一蓋陰邪久結必成溼熱堅凝在下驟難開發故鹹以軟堅寒以清熱利水以滲溼也

傷寒分經

卷八

牡蠣澤瀉湯

五

蜀漆栝蒌根兼導飲而散結葶藶洩氣閉以開水道謂水非氣閉不能結耳大病差後脾胃氣虛不能約制腎水逆陽位治無及矣故用牡蠣澤瀉海藻之鹹以入腎而利水葶藶商陸之苦以入肺而泄氣枯葶藶之甘黃蜀漆之辛苦以泄其結而除腫溼也

理中圓及湯

人後夏熱生篇霍亂條

竹葉石膏湯

竹葉二石膏一半夏一觔麥門冬一升人參二兩甘草二兩粳米半升上六味以水一斗煮取

六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服

傷寒分經

卷八

竹葉石膏湯

五

俗醫不知氣盛與氣逆之不同槩以枳朴傷其至高又不知中氣虛逆與火逆不同槩以生薑為嘔逆仙藥試觀仲景竹葉石膏一湯則虛熱之辨涇渭了然傷寒解後虛羸少氣氣為餘熱所傷故飲食不能為肌膚也氣逆欲吐胃弱而餘邪復挾津液上逆也故以竹葉石膏清熱人參甘草麥冬粳米固本半夏散逆蓋竹葉能除新久風邪之煩熱能止喘促氣勝之上衝故以為君合人參麥冬等用之治熱而無損其真導逆而不傷其氣也若生薑可以宣偶鬱之火而不能清凝結之熱枳朴可以下客氣有餘而不能解熱傷之逆故皆不用也至石膏一味因能涼肺氣清暑熱故有白虎之名今人不察證之陰陽熱之高下不思芩連之苦寒而畏石膏之辛涼不知傷寒之邪皆屬陽經之邪非沉寒之藥所能勝其餘邪上逆何獨不然故必用之以

清邪之原也

附陰陽易病方

燒視散

右取婦人中視近陰處剪燒灰以水和服方寸
匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取

男子視襠燒灰

男女相易之病氣入骨中乃陰毒熾盛之病其
體重非復陰寒下重之謂也陰毒盛陽為陰所
吸故不用而體重氣本入陰故少氣少腹裏急

傷寒分經

卷八

燒視散

真

陰不和也引陰中拘攣膝脛拘急者熱邪下注
也熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花者陰中毒
氣隨衛氣上升如陽邪之上入但氣本濁陰故
為重為花耳用燒視散者始以一綫之氣引之
使入仍以同氣之陰相易引之使出也

春溫篇論列方

瓜蒂散見前少陽篇
後痰病條

文蛤散

文蛤兩五

用五合

上一味為散以沸湯和一錢匕服湯

鹹能軟堅能清熱能走腎以勝水故有止煩化
痰欬逆胸痺之用此仲景以之為因寒鬱熱宿
飲膠結主劑也然觀易五苓之意則知此為清
熱消飲之輕劑故必不寒而後為兩解之圖也

傷寒分經

卷八

文蛤散

白散

真

且必於欲飲水反不渴者用之則知能洩偶鬱
之熱而不能勝實結之熱矣

五苓散

見前太
陽上篇

三物小陷胸湯

見前太
陽中篇

白散

桔梗

貝母各三

巴豆一分去皮心
熬黑研如脂

上二味

為末內巴豆更於臼中杵之以日飲和服強人

半錢

癰人減之病在膈上必吐在膈下必利不

利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮

粟不解欲引衣自覆者若以水熨之洗之益令熱卻不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

桔梗之開提貝母之辛散巴豆之大熱峻下較小陷胸湯是從治以劫之也此湯本為寒實結胸然劑稍峻矣又設言汗出已腹中痛與芍藥三兩謂失汗而煩用文蛤散或雖汗而邪下溜腹痛仍以大和脾氣為主也活人不拘寒熱服陷胸湯不瘥用枳實理中丸應手而驗庶能推

傷寒分經

卷八 白散

真

廣此意者乎起行功日寒實結胸欲絕心膈高下後虛逆氣已不近毒復上攻當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾其效如神渴者加花粉自汗者加牡蠣活人云誤下未成結胸者急頻與理中湯自然解了蓋理中湯治中焦故也設蓋前之下未是也此皆能推廣仲景之意者也

桂枝湯

陽上篇太

大承氣湯

明中篇陽

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

四逆湯

陰全篇太
見上二方俱
見少陰前篇

終

夏熱篇論列方

瓜蒂散見前少陽篇後痰病條

五苓散見前太陽上篇

理中圓及湯

人參 甘草 炙 乾薑 各三兩

為末蜜和圓如雞子黃大以沸湯數合和一圓

研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三

四圓然不及湯湯法以四物依兩數切用水八

升煮取三升去滓溫服一升日三服

傷寒分經

卷八 理中丸及湯

真

加減法

若臍上築者腎氣動也去木以其壅加桂

四兩以伐腎邪吐多者氣逆去木加生薑三兩

以散下多者淫勝還用木以燥悸者飲水過度

加茯苓二兩以利水渴欲得水者脾虛也加

木足前成四兩半以緩腹中痛者加人參足前

成四兩半以補寒者以不用水加乾薑足前成

四兩半以散腹滿者氣滯去木加附子一

枚以行服湯後如食頃飲熱粥一升許藥力助微

自汗亦取微欲而身痛不休者表退而常消息勿發揭衣被防重吐利止裏和

桂枝湯

以固衛

小和之

不令過度

病後喜唾久不了了此胃虛寒伏宜理中以培

其本也霍亂頭痛發熱身疼但不飲水亦用理

中者蓋頭疼發熱邪由風寒中乃陰陽之界也

未知陽熱陰寒故以飲水為熱熱則陽邪居陽

分而宜清以不飲水為寒寒則陰邪居陰分而

宜溫耳陽邪用五苓者責在太陽也陰邪用理

傷寒分經

卷八

理中丸及湯

聖

中者責在太陰也然中土為萬物之本故理中

政可通治一切所以加減法獨多若臍上築去

木吐多去木腹滿去木皆惡其壅也差後渴欲

得水反加木者津液不足則邪反營之故加木

以壯其正氣而虛熱去津自生矣若今人則反

加涼藥以清之滑藥以潤之寧知此理哉此方

白術

四逆湯見前太陰全篇

通脈四逆加豬膽汁湯

於通脈四逆湯內加豬膽汁合半餘依通脈四逆湯法

吐汗厥相續而至邪總不解而反四肢拘急脈

微欲絕陽因汗吐而欲亡矣唯宜內和不堪外

散但恐扞格不入故同白通湯之用豬膽汁而

獨不用葱白內有甘草乾薑之多為功於裏猶

加生薑大棗之為功於表耳

四逆加人參湯

於四逆湯內加人參兩一餘依四逆湯法

傷寒分經

卷八

通脈四逆加豬膽汁湯

聖

惡寒似有太陽未罷之表證而脈微復利則陽

虛而陰勝矣急當用四逆湯以溫經回陽然下

利每多亡陰今利雖止而惡寒脈微如故則知

其非陽回而利止乃津液內竭而利止也故曰

亡血又當加人參以生津益血矣

以上一百一十三方內缺禹餘糧丸一方其新

加湯乃最後增人者

按論方不離辨證本篇於一方數用者循次論

註各為劃斷而原證關係者則槩用尖圈以別

之其論中析理精入決不可易者則用密罔有
翻跌以醒正文者則用密點無非欲爽觀者之
心目云爾
再按成註槩引內經辛甘發散酸苦湧洩等雖
無大謬然隨文釋義近於籠統不足以啟後人
之悟故特比類較辨或罕譬而喻之又推類
而及於雜證總欲使學者觸類引伸一方不作
一方看并不作一百十三方看也

吳氏醫學述第五種

西昌喻 昌嘉言著

武原吳儀洛遵程
秦溪許 栽培之參
新安胡承會天宗較

傷寒分經

補卒病論大意

卒病論十卷治傳經陽病者卒陰病即直中陰
卒陰病斯民不幸其卒病論當時即羅兵火
之厄晉初即無可搜求故王叔和編次仲景
書但抱其空名曰傷寒卒病論其實祇有傷
寒論而無卒病論也喻氏醫門法律中寒一
門所以補卒病論之大意今特錄之以載於
傷寒分經

卷九

補卒病論大意

此卷由是而卒病論雖亡
而卒病論之旨實未亡也

陰病論

太極動而生陽靜而生陰陽動而不息陰靜而有
常二氣交而人生二氣分而人死二氣偏而病起
二氣乖而病篤聖神憂之設為醫藥調其偏駁使
歸和平而民壽已求觀於生氣通天論中論人身
陽氣如天之與日失其所則折壽而不彰是其貴
陽賤陰之義昭然可見陽立說曰陽道陰道之
日陽常有餘陰常不足曰陰氣難成易虧故早衰
製為補陰等九時重乎陰又近日醫流宗景岳全

謂天地黃等陰陽不行之藥曰藏。但三皇之世，生陽之氣皆於內經之義有未悉耳。如春陽和司令陰靜不擾，所以內經凡言陰病，但啓其端，弗竟其說。漢末張仲景著傷寒論十卷，治傳經陽病，著卒病論六卷，治暴卒陰病，斯民不幸其卒病論當時卽已失傳，豈非其時賢士大夫莫能深維其義，金匱玉函置而弗收，其流布民間者，悉罹兵火之厄耶？仲景以後，英賢輩出，從未有闡揚其烈者。唯韓祗和於卒暴中寒一門，微有發明，誨人以用附子，乾薑爲急，亦可謂仲景之徒矣。

傷寒分經

卷九 陰病論

二

尙論傷寒論於凡陰病見端，當以回陽爲急者，既一一表之。今欲并度金針，暢言底裏，易云：通乎晝夜之道而知夫晝爲陽，羣陰莫不潛伏，夜爲陰，羣陰得以現形，諸鬼爲之夜食。一切山精水怪，揚氛吐燄，伎倆無窮。比鷄鳴則盡隱矣。蓋鷄鳴夜雖未央，而時則爲天之陽也。天之陽開，故長夜不至，漫漫而將旦也。陰病之不可方物，此見一斑，而誰爲燃犀之照也哉？佛說四百四病，地水火風各居其一，是則四百四病皆爲陰病矣。夫水火木金土在

天成象在地成形，原不獨畸於陰，然而五形皆附地而起，水附於地，而水中有火，火中有風，人所以假合成身，身所以相因致病，率稟四者，金性堅剛，不受和合，故四大唯金不與，證無生者必脩西方佛土，有由然也。世人但知地氣靜而不擾，偶見地動便駭爲異，不知地氣小動則爲災眚，大動則爲劫厄。劫厄之來，天地萬物凡屬有形，同歸於壞，然地氣有時大動，而世界得不速壞者，則以玄天真武坐鎮北方，攝伏龍蛇，不使起陸，以故地動而水

傷寒分經

卷九 陰病論

三

不動，水不動而水中之火，火中之風，自不動也。仲景於陰盛亡陽之證，必用真武湯以救逆者，非以此乎？至於戊亥混茫，亦非天翻地覆互相混也。天原不混於地，迺地氣加天而混之耳。蓋地水火風四輪同時轟轉，雷礮冲射之威，千百億道震盪於五天之中，頃之攪毀太空，混爲一區，而父母所生血肉之軀，其陰病之慘烈，又當何如？禪宗有白浪滔天，劫火洞然大千俱壞等語，豈非四大解散之時，實有此象乎？究竟地氣之加於天者，止加於欲

界色界等天不能加於無色界天也大地氣所加之天至子而開陰氣下而高覆始露至丑而陰氣盡返於地而太空始廓兩儀分奠而位日月星辰麗乎天華嶽河海附乎地五天之氣散佈於列曜九地之氣會通乎山澤以清以寧曰大曰廣庶類以漸萌生而天界隙中所餘暴悍濁陰動輒綿亘千萬丈排空直墜摧殘所生靡有孑遺天開地闢以後陰慘餘殃尙若此其可畏必至寅而駁劣悉返冲和天光下濟地德上承名木嘉卉纍纍垂實

傷寒分經

卷九

陰病論

四

光音天天下食其果不復昇舉因得施生乃至繁衍而成天地人之三界也此義關係人身性命病機安危豈不最宏最鉅哉昌每見病者陰邪橫發上干清道必顯畏寒腹痛下利上嘔自汗淋漓肉瞶筋惕等證卽忙把住關門行真武坐鎮之法不使龍雷升騰霄漢一遵仲景已傳之祕其人卽刻獲安倘失此不治頃之濁陰從胸而上入者咽喉腫瘰舌脹睛突濁陰從背而上入者頸筋粗大頭項若冰轉盼渾身青紫而死謂非地氣加天之劫

厄乎唯是陰迫附子乾薑純陽之藥承驅陰邪下從陰竅而出非與迅掃濁陰之氣還返地界同義乎然必盡驅陽隙之陰不使少畱乃得功收再造非與一洗天界餘氛俾返冲和同義乎昌會仲景意中之法行之三十年治經多人凡遇藥到莫不生全雖曰一時之權宜卽擬爲經常之正法可也

論卒暴中寒證韓祇和一家言之外尙有朱

丹溪曰中寒者倉卒受寒其病卽發而暴蓋中

傷寒分經

卷九

陰病論

五

寒之人乘其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可散溫補自解此胃之大虛不急治去生甚遠法當溫散理中湯甚者加附子其見解超出尋常矣然又曰有卒中天地之寒氣口傷生冷之物有外感無內傷用仲景法若挾內傷補中益氣湯加發散藥必先用參耆抵住正氣可見丹溪宗尙東垣猶在仲景宮牆之外未知其中宗廟百官之富美也

戴元禮曰中寒是身受肅殺之氣口食冰水瓜果

冷物病者必脈沉細手足冷息微身踈雖身熱亦
不渴倦言語須急用薑附治之或遇熱病誤服此
藥輕者至重重者至死在脈數者或飲水者煩躁
動搖者皆是熱病寒熱二證若水火也不可待而
同治誤則殺人學者真之按元禮國朝名醫中之
翹楚也其於中寒略窺大意未識奧旨且不曰以
熱病法治之則死反曰熱病用此藥即死殊失主
客然二老外更無有言及中寒者又當推其登壇
建幟之功矣

傷寒分經

卷九 陰病論

六

論卒暴中寒病情脈理五條

卒中寒者陽微陰盛最危最急之候內經曰陰盛
生內寒因厥氣上逆積於胸中而不泄不泄則溫
氣去寒獨留留則血凝血凝則脈不通其脈盛大
以濇故中寒內經之言若此今會仲景表章內經
之意敷陳其大略焉

經既言陰盛生內寒矣又言故中寒者豈非內寒
先生外寒後中之耶經既言血凝脈不通矣又言
其脈盛大以濇者豈非以外寒中故脈盛大血脈

傷寒分經

卷九 卒暴中寒病情脈理

七

閉故脈濇耶此中伏有大疑請先明之一者人身
衛外之陽最固太陽衛身之背陽明衛身之前少
陽衛身之兩側今不由三陽而直中少陰豈是從
天而下蓋厥氣上逆積於胸中則胃寒胃寒則口
食寒物鼻吸寒氣皆得人胃腎者胃之關也外寒
斬關直入少陰腎藏故曰中寒此內經所隱而未
言者也一者其脈盛大以濇雖曰中寒尚非卒病
卒病中寒其脈必微蓋內經統言傷寒卒病之脈
故曰盛大以濇仲景以傷寒為熱病卒病為寒病

分別言之傷寒之脈大要以大浮數動滑為陽沉
瀯弱微為陰陽病且有陰脈況陰病卒急必無
反見陽脈之理若只盛大以瀯二陽一陰亦何卒
急之有哉此亦內經所隱而難窺者也

再推仲景以沉瀯弱微為陰脈矣其傷寒傳入
少陰則曰脈微細今寒中少陰又必但言脈微不
言細矣蓋微者陽之微也細者陰之細也寒邪傳
腎其亡陽亡陰尚未可定至卒中寒但有亡陽而
無亡陰故知其脈必不細也若果見細脈則其陰
傷寒分經

卷九

卒暴中寒病情脈理

八

先已內虧何由而反盛耶

在傷寒證惟少陰有微脈他經則無其太陽膀胱
為少陰腎之府纔見脈微惡寒仲景早從少陰施
治而用附子乾薑矣蓋脈微惡寒正陽微所致詩
云彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀在天
之陽且不可微然則人身之陽顧可微哉腎中既
已陰盛陽微寒自內生復加外寒斬關直中或沒
其陽於內滅頂懼凶或逼其陽於外陷胸避舍其
人頃刻云亡故仲景以為卒病也

人身血肉之身皆陰也父母構精時一點真陽先
身而生藏於兩腎之中而一身之元氣賴之以生
故謂生氣之源而六淫之外邪毫不敢犯故謂守
邪之神暗室一燈炯然達旦耳目賴之以聰明手
足賴之以持行者矣昔人踏雪衝寒尋訪友猶
曰一時之興到至如立功異域嚼雪膚庭白首猶
得生還者幾曾內寒生而外寒中耶故以後天培
養先天百年自可常享苟為不然陽微必至陰盛
陰盛愈益陽微一旦外寒卒中而以經常之法治
傷寒分經

卷九

卒暴中寒病情脈理

九

之百中能有一活耶卒病之吉其在斯乎

腎中真陽得水以濟之雷戀不脫得上以堤之蟄
藏不露除施泄而外屹然不動而手足之陽為之
役使流走周身固護腠理而捍衛於外而脾中之
陽法天之健消化飲食傳布津液而運行於內而
胸中之陽法日之馭離照當空消陰除曠而宣布
於上此三者豐亨有象腎中真陽安享太寧故有
八十而御女生子餘勇可買者矣即或施泄無度
陽痿不用尚可遷延歲月唯在外在上在中之陽

衰微不振陰氣迺始有權或膚冷不溫漸至肌梗
不柔衛外之陽不用矣或飲食不化漸至嘔泄痞
脹脾中之陽不用矣或當膈阻礙漸至窒塞不開
胸中之陽不用矣乃取水土所封之陽出而任事
頭面得陽而戴赤肌膚得陽而燥燥脾胃得陽而
除中即不卒病其能久乎

傷寒分經

卷九

卒暴中寒厥陰脈

十

卒暴中寒色脈六條

卒中寒之色必青青乃肝之色也故仲景云鼻頭
缺少陰腎水為寒寒極則亡陽亡陽則死耳

唇口青身冷為入藏即死五藏治內屬陰主藏精
道皆絕營絕則唇口青身冷樞機化滅升降出入而
則肝絕氣絕

脈脫入藏即死入府即愈脫者去也經脈乃藏府
經氣脫去其脈而入於內之

經曰血氣并走於上則為大厥暴死上者膻中三
焦之府也又

傷寒分經 卷九 卒暴中寒色脈

不盡指入藏言矣又如邪客五絡狀若尸厥者以
通血脈為治此但以頭面絡脈所過通其血脈則
愈又不盡指入府言矣可見脈脫入藏入府者脈
之微也血氣走痺於上者證之微也參互考訂然
後其死其愈可得詳爾

卒中寒脈散者死脈脫內入脈散外出內入猶有
不返

尺脈遲滯沉細寒在下焦溫經散寒
其病可愈

論治卒暴中寒證用藥八難

寒中少陰行其嚴令埋沒微陽肌膚凍慄無汗而喪神守急用附子乾薑加葱白以散寒加豬膽汁引入陰分然恐藥力不勝熨葱灼艾外內協攻迺足破其堅凝少緩須臾必無及矣此一難也

若其人真陽素擾腠理素疎陰盛於內必逼其陽亡於外魄汗淋漓脊項強硬用附子乾薑豬膽汁即不可加葱及熨灼恐助其散令氣隨汗脫而陽無由內返也宜撲止其汗陡進前藥隨加固護腠

傷寒分經

卷九

卒暴中寒用藥八難

主

理不爾恐其陽復越此二難也

用附子乾薑以勝陰復陽者取飛騎突入重圍塞旗樹幟使既散之陽望幟爭趨頃之復合耳不知此義者加增藥味和合成湯反牽制其雄入之勢必至迂緩無功此三難也

其次前藥中即須首加當歸肉桂兼理其營以寒邪中入先傷營氣故也不爾藥偏於衛弗及於營與病即不相當邪不盡服必非勝算此四難也其次前藥中即須加人參甘草調元轉餉收功帷

幄不爾薑附之猛直將犯上無等矣此五難也

用前藥二三劑後覺其陽明在躬運動頗輕神情頗悅更加黃耆白朮五味白芍大隊陰陽平補不可歇手蓋重陰見現浪子初歸斯時搖搖靡定怠緩不為善後必墮前功此六難也

用羣隊之藥以培陰護陽其人即素有熱痰陽出蚤已從陰而變寒至此則無形之陰寒雖散而有形之寒痰阻塞竅隧者無由遽轉為熱薑附固可勿施其牛黃竹瀝一切寒涼斷不可用若因其素

傷寒分經

卷九

卒暴中寒用藥八難

主

有熱痰妄投寒劑則陰復用事陽即躁擾必墮前功此七難也

前用平補後已示銷兵放馬偃武崇文之意茲後縱有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通不宜辛辣助熱壅塞蓋辛辣始先不得已而用其毒陽既安堵即宜休養其陰何得喜功生事徒令病去藥存轉生他患漫無寧宇此八難也

卒暴中寒律三條

凡治陰寒暴病恣用清涼藥者百無一活如此死者醫殺之也

凡治卒暴中寒病胸中茫無真見雖用辛熱或以漸投或行監制時不待人倏然而逝醫之罪也凡醫起一陰病者即可免一劫厄天理人事必至之符也其不能起人卒病而求幸免劫厄自不可得世有藹藹吉人其擇術當何如耶

傷寒分經

卷九 卒暴中寒律

古

卒病論雖亡傷寒論固存也仲景於傷寒陽

微陰盛惡寒之證尚不候其彰著早用附子乾薑治之并灸之矣况於卒病乎况於卒病彰著之極者乎茲特重加剖釋非但治卒病有據即遇傷寒危證毫髮莫違耳

因誤汗致心悸頭眩身瞤動無可奈何者用真武湯其證發汗不解仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地

汗雖出而熱不退則邪未盡而正已大傷况裏虛為悸上虛為眩經虛為瞤身振振搖無往而傷寒分經

卷九 比類傷寒論陽虛陰盛治法

五

非亡陽之象所以行真武把關坐鎮之法也誤用發汗藥致汗漏不止者用桂枝加附子湯其證惡風小便難四肢微急難以屈伸

風傷衛之證原有汗惡風加以誤汗則腠理益開汗愈難乾惡風愈甚小便難者津從汗出而下燥也四肢微急難以屈伸者因汗多液泄且外風復襲斯骨屬不利也此誤汗後之變證若依正法單服桂枝必有亡陽之變故加附子以為救法也仲景於桂枝湯中加附子加人參不

一而足其防微之旨深矣

誤下而致脈促胸滿復微惡寒者用桂枝去芍藥加附子湯

脈促雖為表邪未盡然胸但滿而不結則以誤下而損其胸中之陽也加以微惡寒則其腎中之真陽亦損而溺陰用事矣故去芍藥之陰加附子以回陽也

發汗不解反惡寒者虛故也用芍藥甘草附子湯未汗而惡寒表邪盛也已汗而惡寒陽氣虛也

傷寒分經

卷九

比類傷寒論陽虛陰虛治法

夫

陽虛惡寒固宜用附子矣然既曰發汗不解則知其熱猶在也熱在而別無表證自是陰虛之熱又當用芍藥以收陰此營衛兩虛之救法也心下痞而惡寒汗出用附子瀉心湯復陽瀉痞兼而行之

瀉心湯有五曰甘草曰半夏曰生薑曰黃連曰附子以惡寒汗出陽虛之證較陰痞更急故用麻沸湯漬去痞之藥而浸入濃煎之附子汁雖曰一舉兩得其所重從可識矣

下之後復發汗脈沉微身無大熱者用乾薑附子湯其證晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱

此證前一條云下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也誤汗亡陽誤下亡陰故云內外俱虛然不出方以用附子回陽人參益氣已有成法不必贅也此復教人以精微之蘊見亡陽一證較亡陰倍多然陽用事於晝者也熱煩躁擾見於晝者若此陰用事於夜者

傷寒分經

卷九

比類傷寒論陽虛陰虛治法

七

也安靜不嘔不渴見於夜者若彼豈人參仁柔之品所能理乎必乾薑附子之偏於辛熱者乃足以回其陽以協於偏勝之陰也

風溼兩邪搏聚用甘草附子湯分解其證骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫

風則上先受之溼則下先受之逮至兩相搏聚注經絡流關節滲骨髓軀殼之間無處不到則無處不痛也於中短氣一證乃陽微之徵故用

木附甘草桂枝為劑以復陽而分解內外之邪也又寒傷營而無汗之證用桂枝附子湯即本方去木加薑棗之制也其寒傷營無汗而大便鞭小便自利者知其邪不在表則本方去桂枝仍用木藉其益土燥溼之用也三方原三法今併為一見治風溼相搏亦且以回陽為急務耳誤用陽旦湯致逆用四逆湯救逆

陽旦湯者仲景以前之方乃桂枝湯加黃芩之制也凡陽氣素衰者雖當夏月陽外陰內桂枝

傷寒分經

卷九

比類傷寒論論陰虛陽虛治法

大

湯中可加附子不可加黃芩今誤用之所以得湯便厥也若再發汗或燒針者誤上加誤非四逆不能回其陽矣

發汗若下之病仍不解煩躁者用茯苓四逆湯

誤汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而裏虛陰陽俱虛邪獨不解乃生煩躁故用此湯以救之前營衛兩虛之證用芍藥甘草附子湯此表裏兩虛之證用茯苓四逆湯製方之妙又非表裏一言可盡蓋煩為心煩躁為腎躁故用茯苓人參

入心以解煩乾薑附子入腎以解躁也

以上太陽經九法

陽明少陽二經絕無用附子之法而太陽經則有不得不不用

之說蓋太陽膀胱為腎之府腎中陽虛陰盛熱必傳出於麻以故傷寒當邪在太陽之初幾見脈微惡寒漏汗惡風心悸頭眩肉瞤筋惕躁擾等症縱是傳經發熱不得不用薑附以消陰復陽也而暴病不由傳經發熱卒然而至尚何等待而不用附子乾薑乎

傷寒傳太陰經有自利不渴一證因其人平素溼土之藏有寒也用四逆輩以溫土

太陰溼土之藏有寒固當用理中矣而宜用四逆者亦可見仲景之精義蓋水土同出一源冬

傷寒分經

卷九

比類傷寒論論陰虛陽虛治法

九

月水燠則土亦燠夏月水寒則土亦寒所以土寒即陰內陽外非細故也用四逆以溫土抑何神耶

以上太陰經一法

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者用灸及

附子湯外內協攻

口中和而不燥不渴其無裏證可知况背為督脈統督諸陽上行之地他處不寒獨覺背間寒者其為陽虛而陰邪上凑可知故外灸內攻兩

法並於必求陰消陽復而後已也不知者謂傷寒邪傳少陰纔一二日外證且輕何反張皇若此詎識仲景正以一二日即顯陽虛陰盛之證不得不同暴病施治所謂見微知著也若待至三四日勢必極盛難返不可救藥矣

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

傷寒分經 卷九 比類傷寒論陽虛陰盛治法 辛
邪傳少陰纔二三日無吐利躁煩嘔渴之裏證其常從外解無疑然少陰絕無發汗之法汗之必至亡陽惟此一證其外發熱無汗其內不吐利躁煩嘔渴乃可溫經散寒取其微似之汗此義甚微在太陽經但有桂枝湯加附子之法並無麻黃湯加附子之法蓋太陽病無脈微惡寒之證即不當用附子及見脈微惡寒吐利躁煩等證亡陽已在頃刻又不當用麻黃即此推之凡治暴病而用麻黃者其殺人不轉睫矣
少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者用附子湯一身骨節俱痛者傷寒太陽經病也若手足寒

而脈沉則中其陽之虛審矣可見身體骨節之痛皆陽虛所致而與外感不相涉矣故用附子湯以助陽而勝腎寒斯骨屬之痛盡除也若以其痛為外感之痛寧不殺人乎

少陰病下利為腎藏陽虛而寒邪盛也脈微者與白通湯驅寒助陽斯利止脈健矣服之利不止

傷寒分經 卷九 比類傷寒論陽虛陰盛治法 辛
轉至無脈嘔煩有加此因以熱藥治寒寒盛而格藥不入徒增其逆亂之勢也加豬膽汁為嚮導斯藥入而寒不為拒陽可回脈可出矣然脈必微續乃生暴出反死甚哉虛陽之易出難回也

少陰病下利有水氣或咳或嘔者用真武湯加減陰寒盛而水汎濫由陽虛不能攝水復不能生土以制水以故腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利或小便亦利或咳或嘔水性汎濫無所

不之也因其見證不一故有加減法

少陰病下利裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕用通脈四逆湯加減

面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脈不出去桔梗加人參二兩

以上少陰經六法

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治

陰盛無陽也

傷寒分經

卷九

比類傷寒論陽虛陰盛治法

三

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

陽回利止則生若利止更加眩冒則其止也乃

陰已先亡故陽無依附浮越於上而神氣散亂

時時自冒也

少陰病四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死

脈不至陽已先絕不煩而躁孤陰頃刻自盡矣

少陰病六七日息高者死

息高則真陽上越其下無根綿綿若存之地神

機化滅故主死也

少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

傷寒忌見陰脈故仲景謂少陰病脈沉者急溫之今脈之微沉細具見外證嗜臥汗出不煩陽不為用矣但欲吐陰邪上干矣更加自利則藏氣必至盡絕矣况始先不煩今更煩躁始先欲寐今更不得臥寐所存一綫之陽擾亂若此可復收乎

以上少陰死證五條

傷寒分經

卷九

比類傷寒論陽虛陰盛治法

三

病者手足厥冷言我不結胸少腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

陽邪當結於陽不結胸則陽虛可知陰邪當結

於陰冷結在膀胱關元則陰盛可知

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡

寒用四逆湯

大汗出而邪不除陽則反虛矣內拘急四肢疼

下利厥逆惡寒則陽之虛者已造於亡而陰之

盛者尚未有極故用四逆湯以勝陰復陽也

傷寒脈促手足厥逆者當灸之

脈見喘促陽氣內陷急遽不舒之狀也加以手足厥逆陽微陰盛必懼滅頂之凶故當灸之以通其陽

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者用通脈四逆湯下利裏寒加以外熱是有裏復有表也然在陽虛之人雖有表證其汗仍出其手足必厥繞用表藥立至亡陽不用表藥終是外邪不服故於四逆湯中加葱為治

傷寒分經

卷九

比類傷寒論陰陽證治法

論

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治用四逆湯

嘔與微熱似有表也脈弱則表邪必不盛小便利則裏邪必不盛可見其嘔為陰邪上干之嘔熱為陽氣外散之熱見厥則陽遭陰掩其勢駸危非用四逆湯莫可救藥矣難治二字回互上條多少叮嚀見嘔而微熱與裏寒外熱毫釐千里用四逆湯即不可加葱以速其陽之飛越也以上厥陰經五條

傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

灸所以通陽也厥不還則陽不回可知矣傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

腎主躁躁不得臥腎中陽氣越絕之象也

發熱而厥七日下利者為難治

先熱後厥病邪已為加進其厥復至七日之久所望者陽回厥返耳若更加下利是其虛寒深錮陽固無回返之機陰亦有立盡之勢故難治

傷寒分經

卷九

比類傷寒論陰陽證治法

論

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也

發熱而利裏虛而外邪內入也故曰有陰汗出不止表虛而內陽外出也故曰無陽

以上厥陰經死證四條

少陰腎中內藏真陽其

他故矣乃厥陰之死證亦因厥逆不返下利不止汗出不止致腎藏真陽久出不返乃成死候然則腎藏之真陽豈非生命之根乎觀此則卒病論之真全現全彰矣

比類金匱水寒證五條

少陰腎藏之真陽性真陽微不振外寒始得卒然中之前陰病論已暢發其義矣透此一關於以讀仲景之書無往而非會心之妙如金匱水氣證治條下汎而觀之以爲論水而巳初不解其所指也詳而味之乃知水雖有陰陽之分要皆陰象要皆少陰腎所專司而與腎氣同其收攝無水患之可言也必腎中魚陽虧損然後其水得以汎溢於週身而心火受其澀鬱脾土受其漂沒其勢變成滔天不返矣故特發金匱奧義數則以明治法之一斑

金匱五水之分曰風水曰皮水曰正水曰石水曰黃汗其風水皮水黃汗雖關於腎屬在陽分至

傷寒分經 卷九 此類金匱水寒證

於正水石水則陰分之水一切治陽水之法所不得施之者矣正水其脈沉遲外證自喘北方壬癸自病故脈見沉遲腎藏水肺生水子病累母標本俱病故外證自喘內經曰腎者胃之關關門不利故聚水成病上下溢於皮膚跗腫腹大上爲喘呼不得臥金匱正水之名蓋本諸此石水其脈自沉外證腹滿不喘此因腎氣并於心而不動故脈沉水畜膀胱之內胞但少腹滿硬氣不上干於肺故不喘內經曰陰陽結斜陰

多陽少名曰石水又曰腎肝并沉爲石水以肝

腎兩藏之氣皆得貫入胞中故也而巢氏病源

又謂石水者引兩脇下脹痛或上至胃脘則死

其說果何所據耶蓋石水既關肝腎二藏然則

腎多卽下結而難上肝多則挾木勢上犯胃界

亦勢所必至者耳葉水言少腹有瘕卽石水之

察誤以柴胡藥動其肝氣且微發痛楚叫喊醫不

泥而死巢氏所指殆此類矣且微發痛楚叫喊醫不

言病施何法則愈答曰經言先痛而後病者治

其本當先溫其痛瘕可用附子肉桂勝而後寒救其

陽止其痛後治其感可用附子肉桂勝而後寒救其

胡湯不應見其大便不通用導法不應又微下

傷寒分經 卷九 此類金匱水寒證

之詎知濁陰上逆必用溫藥陰發過通設行寒

下則重陰沍寒助其橫發敗濁之物傾囊倒上

貫胃出口所不免矣仲景既有動氣在下不可

汗下之戒又謂跌陽脈當伏今反緊本自有寒

疝瘕腹中痛醫反下之則胸滿短氣蓋見

及此蓋不溫其疝瘕反用寒下則胸滿短氣蓋見

則陽不布化陰得上下遇至胸滿短氣敗濁一

齊上湧而死也卽是推之凡有疝瘕腹痛之證

重受外邪其常溫經救陽允爲定法矣本

卷後採仲景治寒疝州烏頭煎方可參閱

金匱云少陰脈緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便

卽難脈得諸沉當責有水身體腫重水病脈出者

死

此論少陰病水之脈出見浮大則主死然風水

皮水其脈皆浮妊婦病水其脈亦浮不在此例也。夫少陰者至陰也。於時主冬。沉脈見者水象與經氣皆所當然。故其脈反出。卽是少陰經氣不得藏而外絕。必主死矣。究竟所謂脈出主死者。非但以其浮也。惟沉之而無脈。然後浮之而主死耳。

金匱云。寸口脈沉而遲。沉則爲水。遲則爲寒。寒水相搏。跌陽脈伏。水穀不化。脾氣衰則驚漉。胃氣衰則身腫。少陽脈卑。少陰脈細。男子則小便不利。婦

傷寒分經

卷九

比類金匱水寒證

完

人則經水不通。經爲血。血不利則爲水。名曰血分。寸口脈沉爲水。遲爲寒。是水與寒皆非外入之邪。乃由脾胃與衝脈二海合病所致。蓋胃海水穀之陽不布。則五陽虛竭。故生寒。衝脈血海之陰不生化。則羣陰內結。故生水。水寒相搏於二海。故十二經脈所稟水寒之狀。應見於寸口也。跌陽脾胃之脈。隱伏難於推尋。其人必水穀不化。脾氣衰則清濁不分於裏。而驚漉胃氣衰則陽氣不行於表。而身腫。兩有必至者。衝脈爲血

之海。屬右腎之藏。三焦是其府。男子以之。女子以之。繫胞同一源也。然在女則陰血海多主病。在男則陽三焦多主病。其流各有不同焉。且衝脈無可診也。男子診其少陽脈卑。知爲三焦氣不化。而小便不利。婦人診其少陰脈細。知爲血海受病。而經水不通。是則男子之水由於氣不化。女子之水由於血不通。誠一定之理矣。然男子亦有病血者。女子亦有病氣者。仲景方中。氣病多有兼血藥者。血病多有兼氣藥者。蓋

傷寒分經

卷九

比類金匱水寒證

完

必達權通變。然後可造精微之域耳。金匱舉治水寒次第之法。設爲問答。問曰。病者苦水。而目身體四肢皆腫。小便不利。脈之不言水反言胸中痛。氣上冲咽。狀如炙肉。當微欬喘。審如師言。其脈何類。師曰。寸口脈沉而緊。沉爲水。緊爲寒。沉緊相搏。結在關元。始時尚微。年盛不覺。陽衰之後。營衛相干。陽損陰盛。結寒微動。腎氣上衝。咽喉塞。噎腳下急痛。醫以爲留飲。而大下之。氣繫不去。其病不除。重複吐之。胃家虛煩。咽燥欲飲水。小便

不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象若奔豚其水揚溢則欬喘逆當先攻擊冲氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後

脈沉爲水脈緊爲寒爲痛水寒屬於腎足少陰之脈自腎上貫肝膈入肺中循喉嚨其支者從肺出絡心注胸中凡腎氣上逆必衝脈與之並行隨脈所過與止氣相冲擊遂成以上諸病陽衰之後結寒之邪發而上冲醫不治其冲氣妄

傷寒分經

卷九

比類金匱水寒證

辛

吐下之遂損其熟腐水穀傳化津液之胃於是渴而飲水小便不利至積水四射冲氣乘虛愈擊尚可漫然治其水乎故必先治冲氣之本冲氣止腎氣平則諸證自差未差者各隨所宜補陽瀉陰行水實胃疎通關元之積寒久痺可也師曰寸口脈遲而濇遲則爲寒濇爲血不足跌陽脈微而遲微則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則營衛不利營衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱營衛俱勞陽氣不通即身冷陰

氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通即痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

寸口以候營衛趺陽以候脾胃脾胃虛寒則手足不得稟水穀氣日以益衰故逆冷也逆冷之氣入積於中而不瀉則內之溫氣去寒獨留故腹滿也脾之募在季肋章門寒氣入於募正當少陽經脈之所過少陽之府三焦也既不能行升發之氣於上焦必乃引其在腹與入募之寒

傷寒分經

卷九

比類金匱水寒證

辛

相逐入於膀胱留積不去營衛愈益不通腹滿何由而散耶有時陽雖前通然孤陽獨至終不充於腠理故惡寒陰雖前通然孤陰獨至終不能溫分肉故痺而不仁必陰陽二氣兩相協和營衛通行無礙而膈中之宗氣始轉宗氣一轉則離照常空濁陰之氣自從下焦二陰之竅而散第其散分虛實兩途氣實則從後陰噴吹而出氣虛則從前陰淋漓而出是則寒氣之聚散總關於溫氣之去存故名之曰氣分也

比類金匱要略反胃一論金匱要略

四段其脈其證皆主陽氣衰微立論而後見人

問曰病人脈數為熱常消穀引飲而反吐者何

也師曰以發其汗令陽微腸氣虛脈乃數數為客

熱不能消穀胃中虛冷故也脈弦者虛也胃氣無

餘朝食暮吐變為胃反寒在於上醫反下之令脈

反弦故名曰虛

此條仲景形容脈證之變態最為微妙凡脈陽

傷寒分經

卷九

比類金匱要略

三

盛則數陰盛則遲今病人陽氣既微何得脈反

數脈既數何得胃反冷此不可不求其故也蓋

脈之數由於誤用辛溫發散而遺其客熱胃之

一冷由於陽氣不足而生其內寒醫不達權通變

見其脈數反以寒劑瀉其無過致上下之陽俱

損其脈遂從陰而變為弦上之陽不足日中已

前所食亦不消化下之陽不足日暮已後陽亦

不入於陰而糟粕不輸於大小腸從口入者唯

有從口出而已故曰胃氣無餘言胃中之陽氣

所存無幾所以反胃而朝食暮吐也

寸口脈微而數微則無氣無氣則營虛營虛則血

不足血不足則胸中冷

此條論脈理雖不言證隱緯上條反胃之證

不重舉耳人身之脈陽法天而從陰法地而食

兩相和合不剛不柔不疾不徐冲和純粹何病

之有哉今微則陽不健遲數則陰不靜翕陰陽

兩乖其度營衛不充而胸中冷又不啻上條客

熱已也夫營衛之氣出入藏府流布經絡本生

傷寒分經

卷九

比類金匱要略

三

於穀復消磨其穀是營衛非穀不充穀非營衛

不化胸中既冷胃必不能出納其穀證成反胃

又何疑乎

跌陽脈浮而濇浮則為虛濇則傷脾脾傷則不磨

食朝食暮吐暮食朝吐宿食不化名曰胃反脈緊

而濇其病難治

脾氣健運則脈不濇胃氣堅固則脈不浮今脈

浮是胃氣虛不能傳化水穀脈濇是脾氣傷不

能消磨水穀所以陽時食入陰時反出陰時食

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

嘔則穀氣不資於脈故脈弱弱則陽氣虛不能
傷寒分經

卷九 比類金匱要略

黃

卷九

比類金匱要略

術

充於內外下焦虛則小便冷自利上焦虛則濁氣升上逼迫其陽於外外雖假熱內實真寒證成厥逆所出之陽頃刻決離而不返矣治之誠難也惟四逆湯勝陰回陽之劑差有可用耳嘔證而兼厥下利乃陰寒之極陽氣衰微可知反胃之嘔乃關格之嘔陰陽兩病殊不與下利厥逆相雜不知金匱緣何重錄傷寒論中厥陰證一條入在反胃一門豈其誤以嘔與反胃爲同證耶醫學之不明自昔已然可慨也已茲

並辨明以見胸中之陽與腎中之陽大不同也
胸中之陽如天之有日其關係營衛納穀之道
最爲扼要前三條所云是也蓋胸中下連脾胃
其陽氣虛者陰血亦必虛但宜用沖和之劑以
平調藏府安養營衛如參苓木草歸耆藥薑大棗之類復氣之中卽寓生
血腎中之陽如斷鰲立極其關係命根存亡之
機尤爲宏鉅後一條所云是也蓋腎中內藏真
陽其陽外亡者陰氣必極盛惟從事剛猛之劑
以摧鋒陷陣勝陰復陽如烏附薑桂之類并不
可多用藥味以牽制其

陽寒分經 卷九 比類論廣胃寒證 壹

雄入下焦如是而讀此四章庶幾用法之權衡因悞
編而愈益明矣

傷寒分經

卷九

比類全圖問寒證

三

雄入下焦。如是而讀此四章度幾用法之權衡因悞編而愈益明矣

比類仲景虛寒下利六條

內經曰下利發熱者死此論其常也仲景曰下利手足不逆冷反發熱者不死此論其暴也蓋暴病有陽則生無陽則死故虛寒下利手足不逆冷反發熱者或其人藏中真陽未漓或得溫補藥後其陽隨返皆是美徵此但可收拾其陽協和其陰若慮其發熱反如常法行清解之藥鮮有不殺人者矣吁嗟萬物觸陽舒之煖而生觸陰慘之寒而殺世人戕賊其陽猶或諉為不知

傷寒分經

卷九

比類仲景虛寒下利

美

醫操活人之術乃戕賊夫人之陽以促人之亡者豈亦諉之不知耶

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死

手之三陽起於手足之三陽起於足故手足為諸陽之本而脈又為氣血之先平人氣動其息血充其形出陽入陰互為其根若陰寒極盛則陽氣不布於經脈五液不行聚而下利其脈則無其手足則冷去生遠矣此時藥不能及姑灸

之以艾試其人陽氣之存否若微陽未絕得艾

火之接引重布經脈手足轉溫隨用溫經回陽

藥以繼之若無根之陽反從艾火逆奔為喘則

陽從上脫不復返矣

下利有微熱而渴脈弱者令自愈

上條仲景之意灸後手足轉溫隨用溫經回陽

藥以繼之今觀此條不藥自愈之證其奧妙愈

推愈廣蓋重緯下利脈沉弦者下重脈大者為

未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死之交

傷寒分經

卷九

比類仲景虛寒下利

毫

而致其精耳彼脈微弱而數利欲自止但得不死耳病未除也此獨言脈弱乃陰退陽復在表作微熱在裏作微渴表裏之間微有不和不治自愈治之必反不愈矣仲景喫緊叮嚀處俱金針未度今僭明之蓋外感證在表則發熱在裏則作渴不但微熱不可去即作渴亦有不同如少陰病五六日自利而渴其小便白者則不為裏熱而為腎虛引水自救設以裏熱之渴治之寧不殺人乎茲故會仲景意云不治自愈治之

必反不愈謂夫慮周千變之哲隣誠舉世所難輕觀者耳

下利脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也

此一條病機不但治傷寒病為扼要即治陰病最宜消息蓋下利而本之陽虛陰盛得至脈數而渴是始焉陰盛今則陽復矣故自愈也設不愈則不但陽復必其陽轉勝夫陰而固膿血也五運六氣有勝必有復內經謂無贊其復是謂

傷寒分經

卷九

比類仲景經下利

美

至治可見復則必有過甚之害夫既復矣而更贊之欲何求耶治陰病者其陽已復而更贊之寧不亢而有悔哉

下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

太陽陽明併病面色緣緣正赤者為陽氣怫鬱在表宜解其表此之下利脈沉遲而面見小赤身見微熱乃陰寒格陽於外則身微熱格陽於

上則面小赤仲景以為下虛者謂下無其陽而

反在上在外故云虛也虛陽至於外越上山危候已彰或其人陽尚有根或服溫藥以勝陰助陽陽得復返而與陰爭差可恃以無恐蓋陽返雖陰不能格然陰尚盛亦未肯降必鬱冒少頃然後陽勝而陰出為汗邪從外解自不下利矣鬱冒汗出儼有龍戰於野其血玄黃之象陽入陰出從危轉安其機之可畏倘若此誰謂陰邪可聽其盛耶

傷寒分經

卷九

此條亦外邪傳少陰當用溫經之證與經證虛寒下利不同

美

下利後脈絕手足厥冷時脈還手足溫者生脈不還者死

脈絕不惟無其陽亦無其陰陽氣破散豈得陰氣不消亡乎晬時脈還乃脈之伏者復出耳脈豈有一息之不續耶仲景用灸法正所以通陽氣而觀其脈之絕與伏耳故其方即名通脈四逆湯服後利止而脈仍不出是藥已大應其非脈絕可知又加人參以補其亡血斯脈自出矣成法具在宜究心焉

其類內經金匱胸腹寒痛十七條寒痛多見於身之前
以心之背為陽身之前為陰也而身之前又
多見於腹以胸為陰之陽腹為陰之陰也仲
景論心腹之痛屬寒者十之二三論腹
之痛屬寒者十之七八亦可顯然明矣茲
舉內經金匱之
與相更詳之

經曰真心痛者寒邪傷其君也手足青至節甚則旦發夕死夕發旦死

心為神明之藏重重包裹百骸衛護千邪萬惡莫之敢干必自撤其藩神明不守寒邪乃得傷犯其用勝寒峻猛之劑僭逼在所不免必大劑

傷寒分經 卷九 此類內經金匱胸腹寒痛 早

甘草人參中少加薑附豆蔻以溫之俾邪去而藥亦不存乃足貴耳若無大力者監之其敢以暴易暴乎

鍼經云足太陰之脈其支者復從胃別上注心中是動則病舌根脹食則嘔胃脘痛腹脹善噫心中急痛

此以脾病四逆之邪連及於心其勢分而差緩不若真心痛之卒死矣即太陰推之足少陰厥陰客邪皆可犯心惟陽虛陰厥斯舟中皆敵國

矣

厥心痛乃中寒發厥而心痛寒逆心胞去真心痛一聞耳手足厥冷而通身冷汗出便溺清利不渴氣微力弱亦主旦發夕死急以木附湯溫之諸經心痛心與背相引心痛徹背背痛徹心宜亟溫其經諸府心痛難以俯仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄瀉其勢甚銳宜亟溫其府至藏邪乘心而痛不可救藥者多宜亟溫其心胞并注邪別脈經絡藏府淺深歷然乃可圖功

傷寒分經 卷九 此類內經金匱胸腹寒痛 早

心痛者脈必伏以心主脈不勝其痛脈自伏也不可因其脈伏神亂駭為心虛而用地黃白朮等補之蓋邪得溫藥則散加泥藥即不散不可不慎之也溫散之後審其果虛可陰陽平補之金匱論胸痺心痛之脈當取太過不及陽微陰弦以太過之陰乘不及之陽即胸痺心痛然總因陽虛故陰得乘之陽本親上陽虛知邪中上焦設陰脈不弦則陽雖虛而陰不上于惟陰脈弦故邪氣厥逆而上此與濁氣在上則生膜脹同

一病源也胸痺有微甚不同微者但通其上焦不足之陽甚者必驅其下焦厥逆之陰通胸中之陽以栝蒌薤白白酒湯治之不但苦寒不入即清涼盡屏蓋以陽通陽陰分之藥所以不得預也甚者則用附子烏頭蜀椒等大辛熱之品以驅下焦之陰而復上焦之陽臨病之工宜取則焉

金匱又錯出一證云病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憤憤然無奈者生薑半夏湯主之

傷寒分經

卷九

比類內經金匱胸腹疾病

聖

此即胸痺一門之證故用方亦與胸痺無別必編者之差悞今併論於此蓋陽受氣於胸陰乘陽位阻其陽氣布息呼吸往來之道若喘若嘔若噦實又不然但覺憤亂無可奈何故用半夏生薑之辛溫以燥飲散寒患斯愈也緣陰氣上逆必與胸中之飲結為一家兩解其邪則陽得以布氣得以調而胸際始曠也其用橘皮生薑及加竹茹人參皆此例也

金匱心痛徹背背痛徹心用烏頭赤石脂圓

心痛徹背背痛徹心乃陰寒之氣厥逆而上干者橫格於胸背經脈之間牽連痛楚亂其氣血紊其疆界此而用氣分諸藥則轉益其痛勢必危殆仲景用蜀椒烏頭一派辛辣以溫散其陰邪然恐胸背既亂之氣難安而即於溫藥隊中取用炮薑之泥赤石脂之瀦以填塞厥氣所橫衝之新隧俾胸之氣自行於胸背之氣自行於背各不相犯其患乃除此煉石補天之精義也今人知有溫氣補氣行氣散氣諸法矣亦知有

傷寒分經

卷九

比類內經金匱胸腹疾病

聖

堵塞邪氣攻衝之實令胸背陰陽二氣並行不悖者哉

金匱治胸痺緩急用薤苡仁附子散

胸中與太空相似天日照臨之所而膈中之宗氣又賴以苞舉一身之氣者也今胸中之陽痺而不舒其經脈所過非緩即急失其常度總由陽氣不運陰寒凝滯故致然也用薤苡仁以舒其經脈用附子以消其凝結之寒則陽氣通行宗氣大轉陰濁不而胸際曠若太空矣

傷寒分經

卷九

此類金匱胸腹病

圖

方治九種心痛之理也

金匱云跌陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩
胕疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之
跌陽脾胃之脈而見微弦為厥陰肝木所侵侮
其陰氣橫聚於腹法當脹滿有加設其不滿陰
邪必轉攻而上決無輕散之理蓋陰邪既聚不
溫必不散陰邪不散其陰竅必不通故知其便
必難勢必逆攻兩胕而致疼痛較腹滿更進一
步也虛寒之氣從下而上由腹而胕纔見一班

或以溫藥服之俾陰氣仍從陰竅走散而不致
上攻則善矣○仲景所謂虛寒從下上當以溫
藥服之苞舉陰病證治了無剩義蓋虛寒從下
上正地氣加天之始用溫則上者下聚者散直
捷痛快一言而終故卒病論雖亡其可意會者
未嘗不宛在也

金匱云病者腹滿按之不痛為虛
腹滿時減復如故此為寒當與溫藥
中寒其人下利以裏虛也

傷寒分經

卷九

此類金匱胸腹病

圖

裏虛下利即當溫補藏氣防其竭絕
病者痿黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死
痿黃乃中州土敗之象躁而不渴乃陰盛陽微
之象胸中寒實乃堅冰凝沍之象加以下利不
止此時即竭力溫之無能濟矣蓋堅在胸而瑕
在腹堅處拒藥不納勢必轉趨其瑕而奔迫無
度徒促其藏氣之絕耳孰謂虛寒下利可不乘
其胸中陽氣未漓陰寒未實早為溫之也乎
金匱治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆瀉嘔吐用附

子粳米湯

腹中寒氣奔迫上攻胸脇以及於胃而增嘔逆
頃之胃氣空虛邪無所隔徹入陽位則殆矣是
其除患之機所重全在胃氣乘其邪初犯胃尙
自能食而用附子粳米之法溫飽其胃胃氣溫
飽則土厚而邪難上越胸脇逆滿之濁陰得溫
無敢留戀必還從下竅而出曠然無餘此持危
扶顛之手眼也

腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行卽惡寒緊則不欲
傷寒分經 卷九 比類金匱胸腹諸病

食邪正相搏卽爲寒疝寒疝繞腹痛若發則自汗
出手足厥冷其脈沉弦者大烏頭煎主之

由內經心疝之名推之凡腹中結痛之處皆可
言疝不獨疝丸間爲疝矣然寒疝繞腹痛其脈
陽弦陰緊陽弦故衛氣不行而惡寒陰緊故胃
中寒盛不殺穀邪卽胃下之陰邪正卽胃中之
陽氣也論胃中水穀之精氣與水穀之悍氣皆
正氣也今寒入營中與衛相搏則繞臍腹痛自
汗出手足厥冷陽微陰盛其候危矣故用烏頭

之熱合蜜之甘入胃以建其中而緩其勢俾衛
中陽旺營中之邪自不能留亦不使虛寒自下
上之微旨也

附胡養神病證治法并及運會之理勦寇之事

胡養神少腹有痛形如雞卵散發以後其形漸
大而長從少腹墜入臍中甚易返位甚難下體
始得軟滿而發時必俟塊中冷氣漸轉暖熱
也近來其塊益大發時如臥酒瓶於隘口不能入
少腹半在臍中堅緊如石其氣逆入前腰大
各道筋中同時俱發由是上攻入胃大嘔大吐
由是上攻頂顛戰慄畏寒安危止關呼吸去冬
偶見其發光景如爲地氣上攻厥以爲大劑參附
藍桂投之一劑而愈已後但遇舉發悉用桂附
傷寒分經 卷九 比類金匱胸腹諸病

連効今五月末旬值日他往其證連日爲累服
十全大補湯二十餘劑其効甚速然疑證重不
疑藥輕也咸謂十全大補湯仍用薑桂參附取決
意服至仲秋其證復發昌仍用薑桂參附取決
夫人陽不足則合四君而加味爲十全大補此
供不足和平之道也若夫濁陰之氣結聚少腹而
中正和氣陰極盛矣安得以此陰虛之法治之
助邪而滋陰乎何以言之婦人陰虛之病治之
寒不得已而用麻桂納黃等傷胎之藥但加入
四物則屬藥印不能入胞而傷胎之藥但加入
之邪反可助身血而護之乎此一役也凡生癥瘕
病塊者其勢至身血而護之乎此一役也凡生癥瘕
增患此又一微也人身之血脈全賴飲食而充
長四物之滯脾原非男子所貴既已濁陰極盛
時至極引陰筋直冲陽絡則地氣之上陵者大
可慮何得以半陰半陽之藥戔而圖之四物

傷寒分經

卷九

附論胡春和諸治法

吳

之氣從空注下者動輒綿亘千百丈如木石之
直墜如箭等之橫流人物非不萌生其中但為
諸暴氣所摧殘而不能長育也必至質而發劣
之氣悉返冲和然後人物得遂其生以漸趨於
繁衍耳陰氣之慘浩暴烈一至於此佛說世界
成毀之內無此等論說者蓋已包括於地水火
風之說也哉羣陰之邪釀成劫運昌之所謂地氣
之混於天者非臆說矣堪輿家向知趨地氣之
吉而避地之凶奈何醫家之為道遇地氣上奔
論六氣值漢末兵火之後遂湮沒不傳後人無
由獲見因愚昧之說地氣混天之理凡陰邪上
冲孤陽擾亂之證陽進陰退之象急陰邪上
吸有從大孔而出以開乾坤而揚日月之功
亦既彰彰如此證屢用蓋附奏續者母謂一時
之補宜實乃萬世經常用之也但悍烈之性似
宜宜所宜服即舉發時服之未免有口乾舌

之氣從空注下者動輒綿亘千百丈如木石之
直墜如箭等之橫流人物非不萌生其中但為
諸暴氣所摧殘而不能長育也必至質而發劣
之氣悉返冲和然後人物得遂其生以漸趨於
繁衍耳陰氣之慘浩暴烈一至於此佛說世界
成毀之內無此等論說者蓋已包括於地水火
風之說也哉羣陰之邪釀成劫運昌之所謂地氣
之混於天者非臆說矣堪輿家向知趨地氣之
吉而避地之凶奈何醫家之為道遇地氣上奔
論六氣值漢末兵火之後遂湮沒不傳後人無
由獲見因愚昧之說地氣混天之理凡陰邪上
冲孤陽擾亂之證陽進陰退之象急陰邪上
吸有從大孔而出以開乾坤而揚日月之功
亦既彰彰如此證屢用蓋附奏續者母謂一時
之補宜實乃萬世經常用之也但悍烈之性似
宜宜所宜服即舉發時服之未免有口乾舌

傷寒分經

卷九

附論胡春和諸治法

吳

於繁驥驥而縛孟賁我兵可以買勇而前或擊
其首尾或搗其中心堅或苦息夜奮以亂其鳥食
而擲清之功自致矣況有監督以護之於外諸
凡外人之兵不敢越伍而譁庶幾民不化為寇
而寇可近焉民耶山澤之瘴何知當世然聊舉
醫法之一端為民耶有可通者因并及之其子諫議
問曰古法用此者頗多如用何法不見子諫議
答曰古法用此者頗多如用何法不見子諫議
南方青色入通於心可以最速諸藥而達於心
也如用青色入通於心可以最速諸藥而達於心
可以如用青色入通於心可以最速諸藥而達於心
藥包人慈藥之更勝於肝也至於攻治惡瘡之
傷喉而直達於中更勝於肝也至於攻治惡瘡之
大劑桂枝而直達於中更勝於肝也至於攻治惡瘡之
取起侯非外邪之意然青內行下生者上滾即
外行非外邪之意然青內行下生者上滾即
兩附子而煎之則生諸陰也誠曰善

不用也即如兵者毒天下之物而不知之而不知不得
從不善用之則民叛今討寇之師而不知之而不知不得
而又不善用之則民叛今討寇之師而不知之而不知不得
同至矣所過之地搶劫一空民不得與寇相和
盡驅良民而為寇矣廟堂之上荆棘生而百年非
無策良民而為寇矣廟堂之上荆棘生而百年非
在少腹漫無平期而為寇矣廟堂之上荆棘生而百年非
始得下究其病未除而為寇矣廟堂之上荆棘生而百年非
法先以毒桂枝而為寇矣廟堂之上荆棘生而百年非
桂附子而為寇矣廟堂之上荆棘生而百年非
者附子而為寇矣廟堂之上荆棘生而百年非
壯士金錢飽他大人在以兵護監督不以監督
寇固也而其大功在兵護監督不以監督
兵所以監督於附近賊界令兵護監督不以監督
習且耕且戰之法以厚為兵之外則不至
習且耕且戰之法以厚為兵之外則不至

暴卒中寒諸方

附薑白通湯 治暴卒中寒厥逆嘔吐瀉利色青

氣冷肌膚凜慄無汗陰盛沒陽之證

附子炮去乾薑炮各五錢葱白取汁豬膽大者半枚取汁

水二大盞煎附薑二味至一盞入葱汁并豬膽

汁和勻溫服再用葱一大握以帶輕束切去兩

頭留白二寸許以一面熨熱安臍上用熨斗盛

炭火熨葱白上面取其熱氣從臍入腹甚者連

熨二三餅又甚者再用艾炷灸關元氣海各二

傷寒分經

卷九

三

三十壯內外協攻要在一時之內令得陰散陽

回身溫不冷次用第三方

附薑湯 治卒暴中寒其人腠理素虛自汗淋漓

身冷手足厥逆或外顯假熱躁煩乃陰盛於內

逼其陽亡於外即前方不用葱白也

附子炮去乾薑炮各五錢水二大盞煎至一盞略

加豬膽汁一蛤蜊殼和勻冷服不用葱熨及艾

附薑歸桂湯 治暴病用附薑湯後第二服隨用

此方繼之因附薑顯主回陽而其所中寒邪先

傷營血故加當歸肉桂驅營分之寒纔得藥病

相當也

附子炮去乾薑炮肉桂去皮各二錢水二

大盞煎至一盞入蜜一蛤蜊殼和勻溫服

附薑歸桂參甘湯 治暴病用前方後陽氣將回

陰寒少殺略有端緒第三服即用此方

傷寒分經

卷九

三

甘草炮去乾薑炮當歸肉桂去皮各一錢人參

煎至一盞入蜜三蛤蜊殼和勻溫服若自汗者不用煨薑

辛溫平補湯 治暴中寒證服前三方後其陽已

回身溫色活手足不冷吐利漸除第四方即用

此平調藏府營衛俾不致有藥偏之害

附子炮去乾薑炮肉桂去皮各五分當歸人參

甘草炙黃耆炙白朮炒上白芍藥酒炒各一錢五味子

研十粒 水二大盞煨薑三片大棗二枚煨煎至

一盞人蜜五蛤蜊殼和勻溫服若自汗者不用煨薑

甘寒補氣湯 治暴中寒服藥後諸證盡除但經

絡間微有室塞辛溫藥服之不能通快者第五

方用甘平助氣藥緩緩調之

生地黃 麥冬去心各二錢 黃耆蜜炙一錢 白芍藥酒炒

人參錢一 甘草炙七分 牡丹皮八分 淡竹葉草汁少許

更妙乾者用七分 水二大盞煎至一盞加梨汁一杯

熱服如無梨汁用竹瀝一蛤蚧殼

以上六方次第昌所自訂者也然仲景卒病方

論無傳難以徵信再取傷寒論并金匱治虛寒

諸法發明為例見治傷寒雜證之虛寒者用藥

傷寒分經 卷九 舉本中藥方

且若此而治暴病之法可深信不疑矣更取諸

家方治評定得失大意以昭法戒傷寒論十四

方金匱十二方通用成方十則共得四十八方

引證傷寒論方治

真武湯 治太陽悞汗不解悸眩瞤振亡陽之證

又治少陰腹痛下利有水氣之證

若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩細辛

之辛以散水寒五味子若小便利者去茯苓

之酸以收肺氣而止欬防陰津暗竭不當更滋

乾薑二兩乾薑散寒而停液非下利者去芍藥加

嘔者去附子加生薑足前成半觔嘔者去附子

逆正當用附子何以反去之耶益真武湯除附

傷寒分經 卷九 引證傷寒方治

而去之又法外之法耳觀後通脈四逆湯嘔者

但加生薑不去附子豈不甚明所以暴病之嘔

不相當也

桂枝加附子湯 治太陽悞發汗後汗漏不止惡

風小便難四肢微急

桂枝去芍藥加附子湯 治傷寒下之後脈促胸

滿微惡寒陽虛之證 又治風溼相搏之證

去芍藥加朮亦治風溼相搏

芍藥甘草附子湯 治傷寒發汗不解反惡寒陽

附子湯 治傷寒心下痞惡寒汗出邪熱既盛真陽復虛之證金匱有大黃附子湯亦同此意見下

乾薑附子湯 治傷寒下之後復發汗晝煩躁夜安靜脈沉微陽虛之證

甘草附子湯 治風溼相搏煩疼掣痛短氣惡風陽虛之證

四逆湯 治三陰經四肢厥冷虛寒下利等證急溫其藏之總方

傷寒分經

卷九

引證傷寒方治

書

茯苓四逆湯 治傷寒汗下屢誤陰陽兩傷煩躁之證

附子湯 治少陰病一二日口中和背惡寒陽虛之證灸後用此方又治少陰身體痛手足寒脈沉陽虛之證

麻黃附子甘草湯 治傷寒少陰經二三日無裏證用此方溫經微發其汗金匱用治少陰水病少氣脈沉虛脹者發其汗即已又少陰無裏證而有表證反發熱者去甘草加細辛名麻黃附

子細辛湯三方皆少陰表法也

白通湯 治少陰病但見下利藏寒陰盛用此以通其陽勝其陰

白通加豬膽汁湯 治少陰下利脈微與上白通

湯服之利不止厥逆無脈乾嘔煩者用此加豬

膽汁湯為嚮導服湯脈暴出者死微續者生

通脈四逆加減湯 治厥陰下利清穀裏寒外熱

厥逆惡寒脈微欲絕之證即用前四逆湯方

面色赤者加葱九莖面色赤者格陽於上也加葱通陽氣也故以通脈名湯

傷寒分經

卷九

引證傷寒方治

書

腹中痛者去葱加芍藥二兩腹中痛裏陰不足也去葱惡其通陽

也加芍藥收陰也嘔者加生薑二兩其飲氣聚陰也加生薑利也咽痛者去芍藥

加桔梗一兩咽痛者陰氣上逆也去芍藥惡利

止脈不出者去桔梗加人參二兩利止邪欲罷陽氣未復也脈者氣血之先陽氣未復亦難陰

血不充故加人參補其氣血也去桔梗者惡其

上載而不四逆也

以上引證仲景傷寒論治法共十四方方解俱

諸方全篇

引證金匱方治

桂枝去芍藥加麻辛附子湯 治氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

桂枝 生薑各二兩 甘草炙 麻黃細切

辛附子一枚炮去皮 上七味以水七升

先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

金匱論水氣病寸口脈遲而濇至名曰氣分一

段與義前明之矣今觀此證氣分之水結聚心

傷寒分經

卷九

引證金匱方治

吳

下堅大如盤內水與外風相挾漫無解散之期營衛之氣且無由通行相得臆中之大氣更無由豁然而轉其氣祇從邊旁走動如旋杯之狀苦且危矣此方桂枝湯去芍藥之酸收而合麻黃附子細辛湯之溫散明是欲少陰之水寒及所挾之外風一汗而雙解無餘故云當汗出如蟲行皮中即愈其非少陰水寒及不挾外風之證自是胃中蓄積水飲至多上結心下若胸中之陽不虧者但用枳實白朮二味治其水飲腹

中氣自當散矣若胸中之陽不足者用苓桂朮

甘湯使脾肺氣行水飲自不停蓄矣金匱雖未

明言究竟氣分之水不越此數者治法故不厭

其複重繹於此方之下

崔氏八味丸 治腳氣上入少腹不仁又治虛勞

腰痛少腹拘急小便不利又治短氣有微飲引

從少便出

熟地黃八兩 山茱萸 薯蕷各四兩 澤瀉 茯苓

牡丹皮各三兩 桂 附子炮各一兩 上八味末之煉

傷寒分經

卷九

引證金匱方治

毫

蜜和丸梧子大酒下十五丸日再服

金匱用崔氏八味丸成方治腳氣上入少腹不

仁者腳氣即陰氣少腹不仁即攻心之漸故用

之以驅逐濁陰也其虛勞腰痛少腹拘急小便

不利則因過勞其腎陰氣逆於少腹阻遏膀胱

之氣化小便自不能通利故用之以收攝腎氣

也其短氣有微飲者飲亦陰類阻其胸中空曠

之陽自致短氣故用之引飲下出以安胸中也

乃消渴病飲水一斗小便亦一斗而亦用之者

何耶此不但腎氣不能攝水反從小便恣出源
泉有立竭之勢故急用之以逆折其水不使順
趨也夫腎水下趨則消腎氣不上騰則渴舍此
安從治哉後人謂八味丸為治消渴之聖藥得
其旨矣然今世以為壯水益火兩腎平補之套
藥曾不問其人小便之利與不利口之渴與不
渴一槩施之總於金匱之義有未悉耳

栝蒌瞿麥丸 治小便不利有水氣其人渴

栝蒌根 茯苓 薯蕷各三兩 附子一枚炮去皮

傷寒分經

卷九

引證金匱方治

疑

瞿麥一兩 上五味末之煉蜜丸梧子大飲服三
丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫
為知

金匱治小便不利而淋且渴者用之以其胃中
有熱腹中有寒故變八味丸之制為此丸見其
人跌陽脈數即胃中有熱胃熱必消穀引飲大
便必堅小便必數是其淋而且渴為胃熱中消
明矣故用栝蒌根以清胃熱茯苓瞿麥以利小
水然腎中寒水之氣上入於腹則腹中必冷故

用附子以勝其寒方下云以小便利腹中溫為
知製方之義可繹思也

術附湯 治風溼相搏身體煩疼不能轉側脈浮
虛而濡者用桂枝附子湯若大便堅小便不利
者用此方

術 甘草炙各一兩 附子一枚半炮去皮 生薑一兩

大棗六枚 上五味以水三升煮取一升去滓

分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡

服後半日許方再服也三服
亦然比一日三服稍緩也 其人如冒狀勿怪

傷寒分經

卷九

引證金匱方治

疑

即是術附並走皮中逐水氣未得除故耳

方解見前

又近効術附湯附子一枚半炮 術 甘草炙各

三味剉每五錢煨薑五片棗三枚水盞半煎七

分去渣溫服治風虛頭重眩苦極不知食味煖

肌補中益精氣

腎氣空虛風邪乘之漫無出路風挾腎中濁陰
之氣厥逆上攻頭重眩苦極兼以胃氣亦虛不
知食味此非輕揚風劑可愈故用附子煖其水

藏白木甘草煖其土藏水土一煖猶之冬月井中水土既煖陽和之氣可以立復而濕陰之氣不驅自下矣

烏頭赤石脂丸 治心痛徹背背痛徹心

蜀椒 赤石脂各一兩 烏頭炮去皮 附子炮去皮 乾薑炮各半兩 上五味末之煉蜜丸如梧子大先食服一丸日三服不知稍加服證係久寒故丸服最輕以緩圖其效

方解見前

薏苡仁附子散 治胸痺緩急之證

傷寒分經 卷九 引證金匱方治

薏苡仁二兩 大附子一枚炮 上二味杵為散服方寸七日三服

方解見前

久痛丸

治久寒心痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷衝上氣落馬墜車血疾等

附子三兩炮 巴豆去皮心熬 生狼牙 吳茱萸

人參 乾薑各一兩 上六味末之煉蜜丸

如桐子大酒下強人初服三九日三服弱者二

平

丸少而弱者宜更減之

方解見前

大黃附子湯 治脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之

大黃 細辛各二兩 附子一枚炮去皮 上三味

以水五升煮取二升分溫三服此一日內盡 若強

人煮取二升半分服三服每服後如人行四五

里進一服此一時內盡

仲景治傷寒熱邪痞聚心下而挾陽虛陰盛之

證用附子瀉心湯之法矣其維證脇下偏痛發

熱為陽其脈弦緊為陰寒上逆者復立此溫藥

下之一法然仲景醇醇傳心後世領略者鮮金

匱又別出一條云其脈數而緊乃弦狀如弓弦

按之不移數脈弦者當下其寒脈緊而遲者必

心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之讀者罔

識其指証知其皆以溫藥下之之法耶其曰當

下其寒曰陽中有陰試一提出其金鍼不躍然

乎

附子粳米湯 治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿

嘔吐

附子一枚炮去皮半夏半升甘草一兩大棗十枚

粳米半升上五味以水八升煮米熟湯成去滓

溫服一升日三服

方解見前

大烏頭煎 治心腹痛脈弦緊邪正相搏即為寒

疝繞臍痛若發則自汗出手足厥逆者

烏頭大者五枚熬去皮不咬咀蜜二升以水三升先將烏頭

傷寒分經 卷九 引證金匱方治 奎

煮取一升去滓內蜜煎令水氣盡取二升強人

服七合病人服五合不差明日更服不可日再

服用蜜最多取其留戀而緩以下行也故服法相悖亦宜緩之又緩若日再服則與多用蜜之意

矣

方解見前

又方治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身體痛

灸刺諸藥不能治用本方以桂枝湯五合解令

少清初服二合不知即服三合又不知復加至

五合其知者如醉狀得吐者為中病

外臺烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入攻五藏

拘急不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆

即此合桂枝湯也

大建中湯 治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中

寒氣上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸

近者

蜀椒二合炒出汗乾薑四兩人參二兩膠飴一升先將上

三味以水七升煮取二升去滓內膠飴微火煎

取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後

傷寒分經 卷九 引證金匱方治 奎

更服當一日食糜粥溫覆之當一日者一劑也服盡此一劑也

陽受氣於胸中陽虛則陰邪得以中之陰寒之

氣逆而上衝橫格於中焦故見高起不可觸近

之證寒乘於脾脾冷弱不能消水穀故痛而嘔

復不能飲食也蜀椒煖胃散寒乾薑助陽逐冷

人參大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩可和中

蓋人以中氣為主用辛辣甘熱之藥大建其中

藏之陽以祛其逆上之濁陰也

赤丸 治寒氣厥逆

半夏用桂枝扶苓各四兩烏頭去皮細辛一兩

上四味末之內真朱即朱砂為色煉蜜丸如

麻子大先食酒下三九日再夜一服不知稍增

之以知為度

胸腹無所苦而止厥逆蓋四肢乃諸陽所起寒氣格之故陽氣不順接而厥陰氣衝滿而逆故以烏頭細辛伐內寒苓半以下其逆上之痰氣用真朱為色者恐烏頭細辛之僭上故重以鎮之且以護其心也

傷寒分經 卷九 引證金匱方治

齒

已上十二方引證金匱方治因係久遠之寒病故半用丸藥以緩

治之然必用烏附黃桂之辛熱以勝寒而卒病又何疑乎

論增損八味丸

古方崔氏八味丸用桂附二味陽藥入地黃等六味陰藥之中金匱取治腳氣上入少腹不仁其意頗微蓋地氣上加於天則獨用薑附之猛以勝之地氣纔入少腹適在至陰之界無事張皇所以但用陽藥加於陰藥內治之不必偏於陽也至腎水汎溢婦人轉胞小便不利則變其名為腎氣丸而藥仍不變蓋收攝腎氣則腎水歸源而小便自行亦無取偏陽為矣觀此則治陽虛陰盛之卒病其

傷寒分經 卷九 詳定通用成方

奎

當用純陽無陰更復何疑後人於腳氣上入少腹不仁而見上氣喘急嘔吐自汗不識其證地氣已加於天藥用此方不應乃云此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵用本方加桂附各一倍終是五十步笑百步不達卒病大關徒以腎乘心水尅火五藏受尅為最急不知五藏互相尅賊危則危矣急未急也厥後朱奉議治腳氣變八味丸為八味湯用附子乾薑芍藥茯苓甘草桂心人參白朮其義頗精於中芍藥甘草人參臨證更加裁酌則益

精矣奈何無識之輩復以此湯插入已見去桂心加乾地黃以陰易陽奚啻千里而方書一槩混收詎識其爲奉議之罪人乎

論附子理中湯

理中湯古方也仲景於傷寒證微示不用之意故太陽誤下協熱而利心下痞鞭表裏不解用理中湯加桂枝而更其名曰桂枝人參湯及治霍亂證始仍理中之舊見理中非解外之具矣然人身脾胃之地總名中土脾之體陰而用則陽胃之體陽

傷寒分經

卷九 評定通用成方

寒

而用則陰理中者兼陰陽體用而理之升清降濁兩擅其長若脾腎兩藏陽虛陰盛本方加附子又以理中之法兼理其下以腎中之陽較脾中之陽關係甚重也後人更其名曰附子補中湯換一補字去兼理之義遠矣寶鑑復於本方加白芍藥白茯苓厚朴草豆蔻陳皮名曰附子溫中湯治中寒腹痛自利完穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜臥等證反重健運之陽不重蟄藏之陽燖亂成法無足取也夫既重溫脾附子可以不用既用

附子溫腎卽不當雜以白芍藥之酸寒況完穀不化亦豈厚朴陳皮豆蔻所能勝哉嗟夫釜底有火乃得腐熟水穀冷竈無烟世寧有不炊自熟之水穀耶後人之不逮古昔遠矣今人競爭補腎不如補脾不知此語出自何典而庸淺方信爲實有是說豈非俚淺易入耶又三因桂香丸潔古漿水散未免太過仲醇脾腎雙補丸未免不及太過則陽亢不及則陰凝總不若附子理中湯之無偏無陂也

傷寒分經

卷九 評定通用成方

寒

論建中之法

傷寒有小建中湯乃桂枝湯加膠飴共六味治二三日心悸而煩欲傳不傳之邪以其人中氣餒弱不能送邪外出故用膠飴之甘小小建立中氣以驅邪也金匱有黃耆建中湯於小建中湯內加黃耆治虛勞裏急自汗表虛肺虛諸不足證而建其中之衛氣也金匱復有大建中湯以其人陰氣上逆胸中大寒嘔不能食而腹痛至極用蜀椒乾薑人參膠飴大建其中之陽以驅逐濁陰也後人推

廣其義曰樂令建中湯治虛勞發熱以之並建其
中之營血曰十四味建中湯治藏氣素虛以之兩
建其脾胃中之陰陽仲景為祖後人為孫一脈淵
源猶歟盛矣建中如天子建中和之極揖遜征誅
皆建中內當然之事虛羸之體服建中後可汗可
下誠足恃也至理中則變理之義治中則分治之
義補中溫中莫非惠先京國之大端矣緣傷寒外
邪逼處域中法難盡用仲景但於方首以小之一
字示其微意至金匱治雜證始盡建中之義後人

傷寒分經

卷九

評定通用成方

卷

引伸觸類曲暢建中之旨學者必於前人之方一
一會其大意然後臨證之時隨所施而恰當矣

論東垣升陽益胃湯黃耆補胃湯二方彙方

諸書採治惡寒之證其誤最大

惡寒一證除表邪而外大率陽虛所致有微甚之
不同微者用桂枝湯加人參黃耆甚者并加附子
仲景之法精且備矣後世但曰外感遵仲景內傷
法東垣取東垣升陽益胃黃耆補胃二湯為表虛
惡寒之治此不可不辨也蓋表為陽表虛即表之

陽虛故惡寒也與升陽益胃之方迥不相涉升陽
益胃者因其人陽氣遏鬱於胃土之中胃虛不能
升舉其陽本內經火鬱發之之法益其胃以發其
火也方中半用人參黃耆白朮甘草益胃半用獨
活羌活防風柴胡升陽復以火木宜降雖從其性
而升之不得不用澤瀉黃連以分殺其勢製方之
義若此至黃耆補胃湯則并人參不用而用白芷
藁本升麻麻黃黃芩大升小降之矣然陽火鬱於
胃土之中其時寒必兼時熱其脈必數實其證必

傷寒分經

卷九

評定通用成方

卷

燥渴若不辨而簡其方以治陽虛陰盛有寒無熱
脈微不渴之惡寒寧不殺人乎

論扶陽助胃湯

此方乃東垣弟子羅謙甫所製治虛寒逆上胃痛
之證遵內經寒淫於內治以辛熱佐以苦溫之旨
用附子乾薑之大辛熱者溫中散寒用草豆蔻益
智仁辛甘大熱者驅逐胃寒同為主治用甘草之
甘溫白朮陳皮之苦溫溫養脾氣以佐之寒水挾
木勢侮土故作急痛用桂以伐肝邪用芍藥以瀉

肝木用吳茱萸以泄胸中厥逆之氣三使分猷而出井井有條謙甫師事東垣二十年盡得東垣之學觀此方以扶陽助胃名湯明是卒暴中寒由於胃寒一似韓祗和法較之升陽益胃不啻岐途矣要知東垣治火鬱發其火則煙熄謙甫治無火補其土則氣溫用方者可不辨之於早乎

論三因治自汗用者附木附參附三方

黃耆一兩附子五錢名者附湯白朮一兩附子五錢名木附湯人參一兩附子五錢名參附湯三方

傷寒分經 卷九 評定通用成方

半

治自汗之證審其合用何方煎分三服服之其衛外之陽不固而自汗則用者附其脾中之陽遏鬱而自汗則用木附其腎中之陽浮游而自汗則用參附凡屬陽虛自汗不能舍三方為治耳然三方之用大矣者附可以治虛風木附可以治寒溼參附可以壯元神三者亦交相為用其所以祇用二物比而成湯不雜他味者用其所當用功效若神治自汗一端不足以盡三方之長也以黃耆人參為君其長駕遠馭附子固不至自恣木雖不足以

制附然遇陽虛陰盛寒溼沉錮即生附在所必用亦何取制伏為耶近效木附湯即本方加甘草一味金匱取之以治痺證豈非以節制之師緩圖其成乎急證用其全力即不可制緩證用其半力即不可不制至如急中之緩緩中之急不制而制制而不制妙不容言矣

論得効革撥丸

虛寒泄瀉宜從溫補固矣然久瀉不同暴病且有下多亡陰之戒方中用附子勝寒當兼以參朮如

傷寒分經 卷九 評定通用成方

圭

理中之例可也乃用乾薑復用良薑用革撥復用胡椒用丁香復用豆蔻唯恐不勝其瀉曾不思五藏氣絕於內則下利不禁其敢以一派香燥坐耗藏氣耶後人復製萬補丸雖附子與人參當歸白朮同用而仍蹈前轍丁沉乳茴草蔻肉蔻薑桂革撥既無所不取更加鍾乳陽起赤脂石性之悍冀圖瀋止其瀉而不知盡劫其陰徒速人藏氣之絕耳用方者鑒諸

論寶鑑桂附丸

方用川烏黑附乾薑赤石脂川椒桂六味爲丸瘵風邪冷氣入乘心絡藏府暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊乍間乍甚經久不差按此方原倣金匱久痛丸之例治久寒心痛而此云暴感風寒入乘於心令人卒然心痛則是素無其病卒然而痛矣卒病宜急治豈宜緩治以丸且服至一料之理千萬方中獲此一方有合往轍又不達製方之蘊學者將何所宗乎况邪在經絡則治其經絡邪在府則治其府邪在藏則治其藏此方卽

傷寒分經

卷九

評定通用成方

三

改爲湯但可治藏病不可治府及經絡之病蓋藏爲陰可勝純陽之藥府爲陽必加陰藥一味以監制其僭熱經絡之淺又當加和營衛并宣導之藥矣因併及之

論本事溫脾湯

學士許叔微製此方用厚朴乾薑甘草桂心附子各二兩大黃四錢煎六合頓服治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可畏虛以養病也叔微所論深合仲景以溫藥下之之法其大黃

止用四錢更爲有見夫錮冷在腸胃而滑泄矣卽溫藥中寧敢多用大黃之猛重困之乎減而用五之一亦與仲景之法合也仲景云病人舊微溲者梔子湯不可與服又云太陰病脈弱便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也卽是觀之腸胃錮冷之滑泄而可恣用大黃耶不用則溫藥必不能下而久留之邪非攻不去多用則溫藥恐不能制而洞下之勢或至轉增裁酌用之真是法矣玉機微義未知此方之淵源不爲首肯

傷寒分經

卷九

評定通用成方

三

亦何貴於論方哉

論本事椒附散

治項筋痛連背髀不可轉移方用大附子一枚炮去皮臍爲末每服二錢用川椒二十粒以白麵填滿水一盞生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服叔微云予一親患此服諸藥無効嘗憶千金髓有腎氣攻背強一證處此方與之一服瘥此卽陰病論中所謂地氣從背而上人之證雖輕重緩急不同而其病源則同也夫腎藏真陽陽盛則自骸

溫煖陽衰則一身沍寒至陽微則地氣上逆者其
冷若冰勢所必至此但項筋痛連背髀殊非暴證
且獨用附子爲治則暴病必藉附子全力大劑服
之不待言矣

已上評定通用成方共二十四首

傷寒分經

卷九

評定通用成方

蓄

冒既著陰病論復粗陳病槩明告人難良工苦心
此道庶幾可明可行矣然鹵莽拘執之輩用法必
無成功愚昧鮮識之人服藥必生疑畏蓋以從不
見聞之說定爲幸由坦道按劬而詫不祥在所不
免因復比類傷寒論及金匱證治并評定成方之
得失請正海內明哲巨眼懇祈互相闡發俾卒病
之盲人共明坦然幸由詎非生民之厚幸乎

傷寒分經

卷九

蓄

仲景著傷寒論十卷治傳經陽病著卒病論六卷治暴卒陰病是卒病論與傷寒論對峙各自名書者也奈卒病論散失無傳喻氏止於醫門法律暴卒中寒一門補其大意茲特錄之列於九卷姑以傷寒之名統之所望於後有作者從此而推廣之出其博大精深之蘊俾仲景寒灰火傳將卒病論仍與傷寒論對峙各自名書以其垂不朽斯實天下後世之大幸矣

傷寒分經

卷九

丙戌初夏吳儀洛識

美

吳氏醫學述第五種

西昌喻昌嘉言著

武原吳儀洛遵程訂
秦溪許栽培之參
新安胡承曾天宗較

傷寒分經

秋燥全篇

此篇喻氏所以補仲景傷寒論之未備也蓋四時生病之大綱冬月

太陽寒水經以厥陰風木繼以少陽相火故有溫之病風溫之主病夏月少陰君火繼以太陰濕土故有熱濕之主病在傷寒矣如是而六氣配四時與五運始不相背戾也。仲景於春月

傷寒分經

卷十

秋燥全篇

之病溫夏月之濕皆以冬月之傷寒統之則秋月之傷燥亦可以傷寒之名統之矣因錄秋燥論於此卷而四序中之外感證始全也

秋燥論

燥之與溼有霄壤之殊燥者天之氣也溼者地之氣也水流溼火就燥各從其類此勝彼負兩不相謀春夏地氣動而溼勝斯草木暢茂秋冬天氣肅而燥勝斯草木黃落故春分以後之溼秋分以後之燥各司其政今指秋月之燥為溼是必指夏月之熱為寒然後可奈何至真要大論病機一十九

條脫遺燥氣他如生氣通天論所云秋傷於燥皆謂秋傷於溼歷代諸賢隨文作解弗察其訛今特正之大意謂春傷於風夏傷於暑溼秋傷於燥冬傷於寒覺六氣配四時之音與五運不相背戾而千古之大疑始一決也然則秋燥可無論乎夫秋不遽燥也大熱之後繼以涼生涼生而熱解漸至大涼而燥令乃行焉六元正紀大論謂陽明所至始為燥終為涼者亦誤文也豈有新秋月華露湛星潤淵澄天香遍野萬寶垂實歸之燥政迨至山

傷寒分經

卷十

秋燥論

二

空月小水落石出天降繁霜地凝白鹵一往堅急勁切之化反謂涼生不謂燥乎或者疑燥從火化故先燥而後涼此非理也深乎深乎上古脈要曰春不沉夏不弦秋不數冬不濇是為四塞謂脈之從四時者不循序漸進則四塞而不通也所以春夏秋冬蓋月之脈仍循冬春夏秋季月之常不改其度俟二分二至以後始轉而從本令之王氣乃為平人順脈也故天道春不分不溫夏不至不熱所以春溫病多在春分後夏暑病多在夏至後秋燥病多在秋分後自然之運悠久

無邪使在人之脈方春即以弦應方夏即以數應躁促所加不三時而歲度終矣其能長世乎即是推之秋月之所以忌數脈者以其新秋為燥所勝故忌之也新秋未當為燥而忌數者以秋燥勝於春風故也若不病之人新秋而帶微數乃天真之脈何反忌之耶且夫始為燥終為涼涼已即當寒矣何至十月而反溫耶涼已反溫失時之序天道不幾頓乎不知十月之溫不從涼轉正從燥生蓋金位之下火氣乘之以故初冬常溫其脈之應仍從乎金之濇由濇而

傷寒分經

卷十

秋燥論

三

沉其濇也為生水之金其沉也即為水中之金矣珠輝玉映傷燥云乎哉然新秋之涼方以卻暑也而夏月所受暑邪即從涼發金匱真言論云當暑汗不出者秋成風癰興一瘧而凡當風取涼以水灌汗迺至不復汗而傷其內者病發皆當如瘧之例治之矣其內傷生冷成滯下者并可從瘧而比例矣以其原來皆暑溼之邪外內所主雖不同同從秋風發之耳若夫深秋燥金主病則大異焉金匱真言論曰燥勝則乾夫乾之為害非遽赤地干

里也有乾於外而皮膚皺揭者有乾於內而精血枯涸者有乾於津液而營衛氣衰肉燥而皮着於骨者隨其大經小絡所屬上下中外前後各為病所燥之所勝亦云熯矣至所傷則更厲燥金所傷本摧肝木甚則自戕肺金蓋肺金主氣而治節行焉此惟土生之金堅剛不撓故能生殺自由紀綱不紊若病起於秋而傷其燥金受火刑化剛為柔欲仍清肅之舊其可得耶至真要大論謂欬不止而出白血者死白血謂色淺紅而似肉似肺者非

傷寒分經

卷十

秋燥論

四

肺金自削何以有此試觀草木菁英可掬一乘金氣忽焉改容焦其上首而燥氣先傷上焦華蓋豈不明耶詳此則病機之諸氣贖鬱皆屬於肺諸痿喘嘔皆屬於上二條明指燥病言矣生氣通天論謂秋傷於燥上逆而欬發為痿厥與病機二條適相照合也祇以誤傳傷燥為傷溼解者競指燥病為溼病遂至經旨不明今一論之而燥病之機了然矣其左脇痛不能轉側噤乾面虛身無膏澤足外反熱丈夫癰疽婦人少腹痛目昧皆瘡則燥

病之本於肝而散見不一者也茲併入燥門細商
良治學者精心求之固不獲矣若但以潤治燥不求病情不適病所猶未免涉於粗疎耳

傷寒分經

卷十

秋燥論

五

推廣經義以論秋燥治法四條

痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡下文但言飲食自倍腸胃乃傷曾不及於肺也其所以致躁而令陰氣消亡之故引而未發也至邪氣藏府病形篇云形寒飲冷則傷肺始知傷肺關於寒冷矣可見肺氣外達皮毛內行水道形寒則外寒從皮毛內入飲冷則水飲從胸中上溢遏抑肺氣不令外揚下達其治節不行周身之氣無所稟仰而肺病矣究竟肺為嬌臟寒冷所傷者十之二三火熱所傷者十之七八

傷寒分經

卷十 推廣經義以論秋燥治法

六

傷者十之七八寒冷所傷不過裏束其外火熱所傷則更消燥其中所以為害倍烈也然火熱傷肺以致諸氣贖鬱諸痿喘嘔而成燥病百道方中率皆依樣葫蘆如烏藥香附紫蘇半夏茯苓厚朴丁沉訶薤薑桂蓬稜枳榔益智之屬方方取足祇因內經脫遺燥謠後之無識者競皆以燥治燥恬於操刃曾不顧陰氣之消亡耳

氣厥論云心移熱於肺傳為膈消肺燥之由來者遠矣苟其人腎水足以上升而交於心則心火下

降而交於腎不移於肺矣心火不移於肺曾何傷燥之虞哉即腎水不足其腸胃津血足以上供肺亦不致過燥也若中下之澤盡竭而高源之水猶得措於不傾則必無之事矣所以陰陽別論又云二陽結謂之消手陽明大腸熱結而津不潤足陽明胃熱結而血不榮證成消渴舌上赤裂大渴引飲與心移熱於肺傳為膈消文雖異而義則一也治膈消者用白虎加人參湯專救其肺以施於諸氣贖鬱諸痿喘嘔罔不合矣

傷寒分經

卷十 推廣經義以論秋燥治法

七

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲男子少精女子不月其傳為風消其傳為息責死不治此亦肺燥所由來也夫燥而令男子精少女子血枯亦云極矣然其始但不利於隱曲之事耳其既則胃之燥傳入於脾而為風消風消者風熱熾而肌肉消削也大腸之燥傳入於肺而為息責息責者息有音而上奔不下也是則胃腸合心脾以共成肺金之燥三藏三府陰氣消亡殆盡尚可救療乎夫由心之肺已為死陰之屬惟脾氣鼓二陽之

精上輸於肺。猶得少懸。猶今以燥之爲害。令生我者盡轉而浚我之生。故直斷爲死不治也。至真要大論病機十九條內云。諸滿枯涸乾勁。燥揭皆屬於燥。燥金雖爲秋令。雖屬陰經。然異於寒溼同於火熱。火熱勝則金衰。火熱勝則風熾。風能勝溼。熱能耗液。轉令陽實陰虛。故風火熱之氣勝於水土而爲燥也。

論諸家治燥諸方

雖以東垣之大賢其治燥諸方但養營血乃腎虧損潤利二便而已總不論及於肺是非下二焦有燥病而上焦獨無也不過闕經旨之疑遂因仍不察耳夫清氣膈鬱之屬於肺者於肺之燥非屬於肺之溼也苟肺氣不燥則諸稟清肅之令而過身運行亦何致膈鬱耶諸痿嘔之屬於上者上字亦指肺不指心病不主喘及嘔也惟肺燥甚則肺葉痿而不用肺氣逆傷寒分經

喘鳴食難過膈而嘔出三者皆燥證之極者也四氣調神論原有逆秋氣則大陰不收肺氣焦滿之文其可稱爲溼病乎更考東垣治肺消方中引用白豆蔻草澄茄及治諸氣方中雜用辛香行氣之藥覺於傷燥一途有未悉耳又如丹溪折衷雜證爲後代所宗亦無一方一論及於肺燥但於熱鬱湯下云有陰虛而得之者有胃虛食冷物遏抑陽氣於脾土中而得之者其治法皆見發熱條中云此治非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解

者夫蒸蒸不解非肺氣爲熱所內蒸而不能外達耶方用連翹薄荷黃芩山梔麥冬甘草鬱金瓜蒌八味竹葉爲引方後復設爲問答云何不用蒼朮香附撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也似此一方其不欲以燥助火之意於熱鬱之條其不敢以燥益燥重傷肺金隱然可會何爲不立燥病一門暢發其義耶又如繆仲醇治病所用者無非四君四物二冬二母沙參元參黃耆山藥蘇子橘紅桑葉枇杷葉杏仁棗仁扁豆蓮心瓜蒌五味升傷寒分經

卷十

論燥證之本及治法

十

論燥證之本及治法七條
燥之木多在肺而證多見於肝肝主筋風氣自盛燥熱加之則液聚於胸膈不榮於筋脈而筋燥故勁強緊急而口噤或痰癰昏目僵仆也風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者善伸數欠筋脈拘急或時惡寒或筋惕而搖脈浮數而弦若風熱燥并鬱甚於裏則必爲煩滿必爲悶結故燥有表裏氣血之分也至於筋緩不收痿痺不仁因其風熱勝澤爲燥日傷寒分經

卷十

論燥證之本及治法

十

久乃燥病之甚者也至於諸氣贖鬱諸痿喘嘔皆屬於肺金從燥化金且自病而肺氣日見消亡又何論痿痺乎五臟五志之火皆有真液以養之故凝聚不動而真液尤賴腎之陰精胃之津液交灌於不竭若腎胃之水不繼則五臟之真陰隨耗五志之火翕然內動而上中下三消之病作矣河間云燥太甚而脾胃乾涸則成消渴亦其一也燥病必渴而渴之所屬各不同有心肺氣厥而渴

有肝痺而渴有脾熱而渴有腎熱而渴有胃與大腸熱結而渴有小腸痺熱而渴有因傷害胃乾而渴有因風而渴五藏部分不同病之所遇各異其為燥熱亡液則一也

腎惡燥急食辛以治之故腎主五液真陰足則津液潤而大便如常若饑飽勞逸損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥仲景云小便利大便硬不可攻下以脾約丸潤之戒輕下而重傷津液也然便結傷寒分經

卷十

論燥證之寒及治法

主

復有陽結陰結之不同陽結者以辛涼潤之陰結者以辛溫潤之其辨又在微芒之間矣

治燥病者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸中燥熱之甚濟胃中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不滯則病日已矣凡天氣久晴即非秋時每多燥火證其治法與秋時同

凡大慾大勞久病疴歲耄耆之年陰津已耗再感燥證俱不治

秋燥律五條

凡秋月燥病誤以為溼治者操刃之事也從前未明咎猶可諉今明知故犯傷人必多孽鏡當前悔之何及

凡治燥病燥在氣而治血燥在血而治氣燥在表而治裏燥在裏而治表藥不適病醫之過也

凡治雜病有兼帶燥證者誤用燥藥轉成其燥因致危困者醫之罪也

凡治燥病須分肝肺二藏見證肝藏見證治其肺傷寒分經

卷十

秋燥律

主

燥可也若肺藏見證反治其肝則坐誤矣醫之罪也肝藏見燥證固當急救肝藥勿令焦損然清其肺金除其燥本尤為先務若肺金自病不及於肝即專力救肺焦枯且恐立至尙可分功緩圖乎

凡治燥病不深達治燥之音但用潤劑潤燥雖不重傷亦誤時日祇名粗工所當戒也

燥門諸方

清燥救肺湯 治諸氣膹鬱諸痿喘嘔為治肺燥

之主方

二桑葉經霜而青白者得金氣而柔潤 麥門冬

去心二錢 石膏煨熟清肅之氣極 生甘草和胃生

人參肺之氣七分 黃芩清肺熱二錢五分 杏仁炒去皮尖

胡麻仁炒研 枇杷葉刷去毛淨蜜 水一碗煎

六分入甘蔗汁梨汁和勻頻頻二三滾熟服

痰多加貝母瓜蒌血枯加生地黃熱甚加增石

傷寒分經

卷十

燥門諸方

商

膏

按諸氣膹鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古

今治氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之

燥者諸痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也

而古今治法以痿嘔屬陽明以喘屬肺是則嘔

與痿屬之中下而惟喘屬之上矣所以千百方

中亦無一方及於肺之燥也即喘之屬於肺者

非表即下非行氣即瀉氣間有一二用潤劑者

又不得其肯綮總之內經六氣脫悞秋傷於燥

一氣指夏之溼為秋之燥後人不敢更端其說

置此一氣於不理即或明知理燥而用藥夾雜

如弋獲飛蟲茫無定法示人也今擬此方大約

以胃氣為主胃土為肺金之母也如天門冬雖

能保肺然味苦而氣滯故不用也如知母能滋

腎水清肺金亦以苦而不用其他苦寒降火傷

胃之藥尤在所忌蓋肺金自至於燥所存陰氣

不過一綫耳倘更以苦寒下其氣傷其胃其人

尚有生理乎誠倣此增損以救肺燥變生諸證

傷寒分經

卷十

燥門諸方

主

如沃焦救焚不厭其頻庶克有濟耳

柴胡清燥湯 治肝燥左脇脇痛不能轉側噎乾

而應身無膏澤足外反熱腰痛驚駭筋攣丈夫

癩疝婦人少腹痛目昧背瘡寒熱等證

柴胡蜜水并 當歸 白芍藥酒炒各 甘州枸杞

子三錢 天花粉一錢 乾地黃三錢 真茶菊錢四 生甘草

分五錢 真廣陳皮三分 水三盞煎一盞將甘蔗汁

梨汁和勻溫服

燥病多本於肺金若止見以上肝藏之燥證而

絕不見有肺藏之證相雜者治法當急救其肝
葉勿令焦損宜此方主之若木火生風而眩運
者加鈞藤鈞三錢或去柴胡亦可若肝家風火
盛者加羚羊角一錢若痰多者加淡竹瀝少許
冲服

白虎加人參湯 治肺金氣分之燥火渴欲飲水
者

竹葉石膏湯 治肺金氣分之燥火發渴氣逆欲
吐

傷寒分經

卷十

柴門諸方

夫

芍藥甘草湯 治腹中不和而痛或因誤表腳攣
用此湯以和其陰其腳即伸

炙甘草湯 治肺痿咳唾多此以肺金燥甚將胃
燥熱化
涎沫也

已上四方俱見卷八諸方全篇

金匱麥門冬湯 火逆上氣咽喉不利用此湯以
止逆下氣

麥門冬去心
七升半夏洗
升人參三兩甘草二兩大棗十二
枚粳米三升
上六味以水一斗二升煮取六升

溫服一升日三夜一服

此胃中津液乾枯虛火上炎之證用寒涼藥而
火反升徒知與火相爭知母貝母屢施不應不
知胃者肺之母氣也仲景於麥門冬人參粳米
甘草大補中氣大生津液隊中增入半夏之辛
溫一味用以利咽下氣此非半夏之功實善用
半夏之功擅古今未有之奇矣

金匱甘麥大棗湯 治婦人臟燥悲傷欲哭象如
神靈所作數欠伸亦補脾氣婦人血室先受積
冷而鬱久為熱則

傷寒分經

卷十

柴門諸方

七

絕而主悲則知燥氣乘肝為悲傷欲哭象如神
靈所作數欠伸血來後見陰象也陽明脈解篇曰
胃病者津液不足則知燥氣侵胃為欠伸但
使胃氣悲傷欠伸其肝陰之熱可知心脾之熱
亦可知故以甘
麥大棗湯主之

甘草三兩小麥一斗大棗十枚

升去滓分溫三服

以水六升煮取三

小麥能和肝陰之客熱而養心液且有消煩利
溲止汗之功故以為君甘草瀉心火而和胃生
金故以為臣大棗調胃而通津液利其上壅之

燥故以為佐蓋病本於血心為血主肝之子也
心火瀉而土氣和則胃氣下達肝藏潤肺氣調
則燥止而病自除也

麥門冬湯

治肺燥熱水溢高原肢體皆腫靈蘭秘典

曰三焦者決瀆之官水道出焉上焦不治水溢
高原中焦不治水停中脘下焦不治水蓄膀胱
麥門冬去心五枚 晚白粳米五十粒 水二盞煎七

分溫服

肺非無為也飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾
氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱肺金燥

傷寒分經

卷十 燥門諸方

大

熱則失其清肅下行之令以致水溢高原淫於
皮膚而為水腫醫罕明此實脾導水皆不能愈
故用麥門冬清肺開其下降之源粳米益胃培
乎生金之母此治病必求其本也或問此證何
以辨之曰肢體皆腫小腹不急初起便有喘滿
此其候也

甘露飲

治胸中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出

膿血吐血衄血目眵垂重常欲合閉或即饑煩
不欲食飲及目赤腫痛不任涼藥口舌生瘡咽

喉腫痛瘡疹已發皆可服之又治脾胃受溼癰
熱在裏或醉飽房勞溼熱相搏致生疳病身目
皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澀
或時身熱

生地黃

熟地黃

天門冬

去心

麥門冬

去心

斛

茵陳

黃芩

枳殼

甘草

枇杷葉去毛

炙

水煎服

一方加桂苓名桂苓甘露飲

此方以固本丸為主而加入他藥原因胃中溼

傷寒分經

卷十 燥門諸方

九

熱下流歸坎則水源濁汎故見證如此而當日
立方之意實從救腎起見清胃者自清胃而救
原者自救原若肝經有鬱火者去石斛甘草枇
杷葉加丹皮山梔水木同源之義也若原有胃
火而又挾肝木之勢者竟以原方加丹皮山梔
等味亦無不効也丹溪以為此心肺胃三經之
藥然必大便乾燥纔合手足陽明之藥爾火盛
渴甚者加知母走馬疳而急者加石膏黃連元
氣虛者加人參真胃中燥火之神劑也

東垣導滯通幽湯 治大便難幽門不通上冲吸

門不開噎塞不便燥祕氣不得下治在幽門以

辛潤之幽門即下脘胃之下口也人身上下有

即會原氣上推飲食者也幽門上衝吸門不

得下降而人便乾燥不行胃之滯與陰火皆在

其申則腹脹生矣治在幽門使幽門通利泄其

陰火潤其燥血生其新血則幽門通利吸門亦

地不受邪隔壅得開脹滿與去矣是謂陰得下歸

當歸 升麻 桃仁 生地黄 熟地黄 紅

花 甘草 或加枳榔

傷寒分經 卷十 燥門諸方

當歸二地滋陰以養血桃仁紅花潤燥而行血

枳榔下墜而破氣滯加升麻者天地之道能升

而後能降清陽不升則濁陰不降經所謂地氣

上為雲天氣下為雨也東垣曰大便難者取足少

陰火腎主五液津液是則大便如常若饑飽勞

役損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪火

伏血中耗散真陰津液虧少故大

便燥結少陰不得大便以辛潤之

加大黃麻仁名當歸潤腸湯

滋燥養營湯 治火燥肺金血虛外燥皮膚皴揭

筋急爪枯或大便風秘肺主皮毛肝主筋爪肝

故外見皮毛枯槁肌膚燥

當歸二錢 生地黄 熟地黄 白芍藥 秦莖

黃芩 五分 防風 錢一 甘草 五分 水煎服

前證為血虛而水涸當歸潤燥養血為君二地

滋腎水而補肝芍藥瀉肝火而益血為臣黃芩

清肺熱芩防散肝風風藥多燥芩防味辛

能潤為風藥中潤劑又秦

莖能養血榮筋防風乃血藥之使吐血血崩甘

草甘平瀉火入潤劑則補陰血為佐使也

丹溪活血潤燥生津湯 治內燥津液枯少

傷寒分經 卷十 燥門諸方

當歸 白芍藥 熟地黄 天門冬 麥

門冬 心 枳實 各一錢 桃仁 研 紅花 各五

服 歸芍地黃滋陰養血枯槁二冬潤燥生津桃仁

紅花活血去瘀凡陰虛血燥而兼瘀滯者此方

最宜

錢乙瀉白散 治肺火皮膚蒸熱肺主皮毛輕按

是熱在 瀉漸寒熱邪在 日晡尤甚申酉時燥金

喘嗽氣急肺苦氣

皮毛

喘嗽氣急

喘嗽氣急

桑白皮蜜炙一錢地骨皮錢二生甘草五晚白粳米百粒

水煎

此瀉肺金氣分之火兼清表之燥也

玉女煎

治水虧火燥六脈浮洪滑大少陰不足

陽明有餘煩熱乾渴頭疼牙疼失血等證其効

如神若大便溏泄者大非所宜

石膏

熟地黃錢五麥門冬錢三知母錢五牛膝各一錢五

去牛膝

如燥火在表者加地骨皮生甘草以清之

如肺氣不實者加人參

如小水不

傷寒分經

卷十

燥門諸方

三

利或火不能降者加澤瀉或茯苓

玉泉散

治陽明內熱煩渴頭痛二便

祕傳瘟疫斑黃及肺經熱極欬嗽喘急等證

石膏

粉甘草兩一為細末每服二錢新汲

水或熱湯或人參湯調下或加硃砂三錢

此益元散之變方也

雪梨漿

解煩熱退燥火此生津止渴之妙方也

用清香甘美大梨削去皮用大碗盛清冷甘泉

將梨薄切浸於水中少頃水必甘美但頻飲其

水勿食其滓退燥火極速也

六味地黃丸

治下焦燥熱小便澀而數又治腎

氣虛新久惟瘵瘦弱虛煩骨蒸下血自汗盜汗

水汎為痰咽燥目昏耳聾等證功効不能

盡述

熟地黃

山茱萸肉各四錢懷山藥各四錢牡丹皮

白茯苓

澤瀉各一錢各另為末和地黃膏

加煉蜜丸

桐子大每服七八十丸空心食前滾

湯下

須用煎藥

傷寒分經

卷十

燥門諸方

三

此純陰重味潤下之方也

左歸飲

治肝腎陰虧大便燥結口渴等證

熟地黃

懷山藥各五錢山茱萸肉各五錢甘州

枸杞子

白茯苓各一錢甘草各一錢如肺熱

而煩者加麥門冬二錢血滯者加牡丹皮二

錢心熱而躁者加元參二錢血熱妄動者

加生地黃三錢陰虛不寧者加女貞子二錢

上實下虛者去甘草加牛膝二錢以導之

血虛而燥滯者加當歸二錢脾熱易饑者加

芍藥二錢 骨蒸而多汗者加地骨皮二錢

此壯水之劑也凡六味湯用之而不能得効者

此方良在六味乃陰精虧少兼滋陰而潤者
此方良在六味乃陰精虧少兼滋陰而潤者
此方良在六味乃陰精虧少兼滋陰而潤者

一陰煎 治肝腎陰虧煩渴不止潮熱不退等證

熟地黃錢五 麥門冬錢三 生地黃 白芍藥 丹參

錢各二 杜仲半錢 甘草錢 火盛躁煩者入真龜膠

二錢化服 氣虛者加入參一錢 陰虛不寧

者加女貞子二錢 虛火上浮或吐血或衄血

傷寒分經 卷十 燥門諸方

不止者加澤瀉一錢五分茜根二錢 去杜仲

丹參加知母一錢地骨皮二錢名加減一陰煎

治證如前而火較甚者

四陰煎 治燥火燥肺金津枯煩渴咳嗽吐血多

熱等證

生地黃錢三 麥門冬錢五分 沙參 白芍藥 百合

錢各二 白茯苓錢五分 生甘草錢一 夜熱盜汗加地

骨皮二錢 痰多乾澀加川貝母二錢五分阿

膠一錢五分或天花粉二錢 金水不能相滋

而乾燥者加熟地黃四錢 熱甚火升咽燥者

加元參二錢 血熱吐衄加茜根二錢 多火

便燥或肺乾咳嗽者加天門冬二錢或加童便

亦可 如火載血上行者去甘草加炒黑山梔

仁一錢五分若氣虛者少加入參以統攝之

此保肺清金之劑也

貞元飲 治肝腎陰虧氣急似喘等證

熟地黃錢五 當歸錢二 炙甘草錢一 如氣虛脈微至

極者急加入參隨宜

傷寒分經 卷十 燥門諸方

經曰肝苦急食甘以緩之此類是也

局方逍遙散 治血虛肝燥骨蒸勞熱潮熱咳嗽

往來寒熱口乾便澀脇痛頭眩等證

當歸錢五 白芍藥錢五 冬白朮錢五 柴胡錢五

粉甘草錢五 加煨薑一片薄

荷三分煎

肝燥則血病當歸芍藥養血而斂陰木盛則土

衰甘草白朮和中而補土亦以平木柴胡升陽

散熱合芍藥以平肝而使不得條暢故以薄荷

補取疎通之義茯苓清熱利便助甘朮以益土而令心氣安寧茯苓能通心腎煨薑祛痰而解鬱薄荷理血而消風此治燥證之和劑乃養血而兼滲溼者也加牡丹皮山梔仁各八味逍遙散治血少目暗肝加熟地黃名黑逍遙散滋腎陰取腎肝同四物湯治一切血虛血瘀燥證頭痛及婦人經病

當歸酒洗乾地黃各三錢白芍藥二錢錢五分此燥在血分之方也加桃仁紅花名元戎四物

傷寒分經 卷十 燥門諸方

美

湯治臟結秘澀撲損瘀血加防風秦艽名治風六合湯治風虛眩運風秘便難蜜丸名補肝丸肝以散為補

百合固金湯治燥火傷肺咽痛喘咳痰血肺金受傷

則腎水之源絕腎脈挾咽燥火上炎故咽痛燥火蒸肺故喘咳痰因燥生血因火過

熟地黃錢三生地黃錢二麥門冬錢二百合白芍

藥炒生甘草當歸川貝母錢一元參桔

梗各八水不制火以致火尅金而肺傷故以二地助

腎滋水退熱為君肺腎為子母之藏故百合保肺安神麥冬清熱潤燥元參利咽喉而清金貝母散肺鬱而除痰歸芍養血兼以平肝肝火盛則金桔梗清金功成上部諸藥皆以甘寒培元清本不欲以苦寒傷生發之氣也李士材曰趙觀見然土為金母金之不足也宜顧母否則金終不能足也

補肺阿膠散治肺虛有火嗽無津液而氣哽者

阿膠蛤粉拌炒成馬兜鈴炒五錢甘草五錢牛蒡子

傷寒分經 卷十 燥門諸方

老

錢五分杏仁去皮尖糯米一兩馬兜鈴清熱降火兜鈴象肺朱芩子利膈滑痰

潤肺解熱杏仁潤燥散風阿膠清肺滋腎益血

故治火嗽杏仁潤燥散風阿膠清肺滋腎益血

補陰氣順則不哽液補則津生阿膠補火退而

嗽寧矣上為金母故加甘草糯米以益脾胃時

日錢乙補肺阿膠散用馬兜鈴非取其補肺取

其清熱降氣而肺自安也其中阿膠糯米乃補

正藥 濟川煎 凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃

攻擊等劑必不可用若勢有不得不通者宜此

主之此用通於補之神劑也

當歸錢四懷牛膝錢二肉苁蓉酒洗去鱗澤瀉一錢五分

升麻分八枳殼者一錢虛甚如氣虛加人參無妨

碍有火加黃芩腎陰虛加熟地黃

蜜煎導法

豬膽汁導法

已上二法俱見八卷諸方全篇

傷寒分經

卷十

藥門諸方

天

附醫案

治陸令儀母肺燥證奇驗

陸母平日持齋腸胃素枯天癸已盡之後經血猶不止似有崩漏之意余鑑姜宜人交腸之流弊急為治之久已痊可值今歲秋月燥金太過溼蟲不生方白露節即無人不病咳嗽而陸母血虛津枯之體受傷獨猛胸脇緊脹上氣喘急臥寐不寧咳動則大痛身不能轉側痰中帶血而腥食不易入聲不易出寒熱交作而申酉二時燥金用事諸苦

傷寒分經

卷十

附秋燥病醫案

天

倍增其脈時大時小時牢伏時弦緊服清肺藥如以勺水沃焦無俾緩急諸子知為危候徬徨無措余亦明告以肺癰將成高年難任於是以葶蘆大棗瀉肺湯先通其肺氣之壅即覺氣稍平食稍入痰稍易出身稍可側大有生機諸子甚喜余曰未也吾見來勢太急不得已而取快於一時究竟暫開者易至復閉迨復閉則前法不可再用矣迄今乘其暫開多方以圖必在六十日後交立冬節方是愈期立冬燥金之氣雖未全退而其勢已殺矣蓋身中之燥與時之

燥膠結不解必俟燥金氣退而肺金乃得太寧耳
令儀昆季極懇專方治之此六十日間屢危屢安
大率皆用活法斡旋緣肺病不可用補而脾虛又
不能生肺肺燥喜於用潤而潤滯又艱於運食今
日脾虛之極食飲不思則於清肺藥中少加參朮
以補脾明日肺燥之極熱盛咳頻則於清肺藥中
少加阿膠以潤燥日續一日扶至立冬之午刻病
者忽自云內中光景大覺清爽轉得生矣奇哉天
時之燥衰而肺金之燥遂下傳於大腸五六日不

傷寒分經

卷十

附秋燥病論

辛

大腸略一潤腸旋即解散正以客邪易去耳至
小雪節天時之燥全退矣康健加食倍於曩昔蓋胃中空
虛已久勢必加飡復其水穀容受之常方為全愈
也

胡直臣曰還丹不過九轉舉世模之不就陳詮
可襲活法難通也

附面論姜宜人奇證與交腸不同治法迥別
姜宜人得奇證簡本草經疏治交腸用五苓散之
說以為神祕余見之辨曰交腸一證大小二便易

位而出若交易然故用五苓散治之專為通前陰
而設也若此證閉在後陰二便俱從前陰而出擬
之交腸誠有似是實非者况交腸乃暴病驟然而
氣亂於中此證乃久病以漸而血枯於內有毫釐
千里之不同安得擬之原夫疾之所始始於憂思
結而傷脾脾統血者也脾傷則不能統攝而錯出
下行有若崩漏實名脫營脫營病宜大補急固乃
悞認為崩漏以涼血清火為治則脫出轉多不思
天癸已盡潮汛已絕萬無是病其年高氣弱無血

傷寒分經

卷十

原病論

三

以實漏卮者毫不念也於是胞門子戶之血日漸
消亡勢不得不借資不仰給矣借資於大腸轉將
大腸之血運輸而滲入胞囊久之大腸之血亦盡
而大腸之氣附血而行者孤而無主為拳為塊奔
騰渙散與林木池魚之殃禍同矣又如救荒者剝
鄰國為立盡之墟所不顧矣猶未也仰給於胃脘
轉將胃脘之血吸引而滲入胞囊久之胃脘之血
亦盡下脫之血始無源自止夫胃脘之血所以榮
週身而灌百脈者今乃暗歸烏有則苞稂失潤而

黍離足憂血盡而止較之血存而脫又倍遠矣故血盡然後氣亂氣亂然後水穀舍故趨新舍寬趨臨江漢兩渠併歸一路身中爲之大亂勢必大腸之故道復通乃可撥亂返治與五苓散一方全無干涉又況水穀由胃入腸另有幽門泌別清濁今以滲血之故釀爲穀道是爲幽門爲坦徑矣尙可用五苓散再開之乎又況五苓之劫陰爲亡血家所深戒乎今之見一病輒有一藥橫於胸中與夫執成方奉爲靈祕者大率皆悞人者也若宜人之傷寒分經

卷十 傷寒醫案

三

病余三指纔下便問曰病中多哭泣否婢媼曰時時泣下乃知臟燥者多泣大腸方廢而不用也交腸云乎哉今大腸之脈繫臍而現於指可虞之時其來年聚藥生乎聚藥生而言果驗

胡尚臣曰此等證他人不能道隻字似此河漢無極而更精切不可移易爲難能矣

論吳吉長乃室悞藥并治驗

吳吉長乃室秋月病灑淅惡寒寒已發熱漸生咳嗽然病未甚也服表散藥不愈體日羸羸延至初冬飲以參朮補劑轉覺厭厭欲絕食飲不思有咳無聲瀉利不止危在旦夕醫者議以人參五錢附子三錢加入薑桂白朮之屬作一劑服以止泄補虛而收背水之捷吉長徬徨無措延僕診畢未及交語前醫自外亟至見僕在座卽令疏方僕飄然而出蓋以渠見既訛難與語至理耳吉長辭去前

傷寒分經

卷十

秋燥病醫案

三

醫堅請用藥僕因謂曰是病總因悞藥所致始先皮毛間灑淅惡寒發熱肺金爲時令之燥所傷也用表散藥已爲非法至用參朮補之則肺氣錮閉而咳嗽之聲不揚胸膈滿脹不思飲食肺中之熱無處可宣急奔大腸食入則不待運化而直出食不入則腸中之垢污亦隨氣奔而出是以瀉利無休也今以潤肺之藥兼潤其腸則源流俱清寒熱咳嗽泄瀉一齊俱止矣但取藥四劑服之必安不足慮也方用黃芩地骨皮甘草杏仁阿膠初進一

劑瀉即少止四劑畢而寒熱俱除再數劑而咳嗽俱全愈矣設當日與時輩商之彼方執參附爲是能從我乎

胡貞臣曰毫釐有差千里懸絕案中治法似乎與證相反究竟不爽大難大難

傷寒分經

卷十

秋燥病證案

論

治葉茂卿小男奇證効驗并詳誨門人

葉茂卿乃郎出痘未大成漿其殼甚薄兩月後尙有着肉不脫者一夕腹痛大吐而絕余取梨汁入溫湯灌之少甦頃復痛絕灌之又甦遂以黃芩二兩煎湯和梨汁與服痛止令製膏子藥頻服不聽其後忽肝大無倫一夕痛吐小腸突出臍外五寸交紐各二寸半如竹節壺頂狀莖物交摺長八九寸明亮如燈籠外證從來不經聞見余以知之素審仍爲治之以黃芩阿膠二味日進十餘劑三日

傷寒分經

卷十

肺經燥熱證案

論

後始得小水五日後水道清利臍收腫縮而愈門人駭而問曰此等治法頑鈍一毫莫解乞明示用藥大意答曰夫人一身之氣全關於肺肺清則氣行肺濁則氣壅肺主皮毛痘不成漿肺熱而津不行也殼着於肉名曰甲錯甲錯者多生肺癰癰者壅也豈非肺氣壅而然與腹痛吐絕者壅之甚也壅甚則并水道亦閉是以其氣橫行於其中而小腸且爲突出至於外腎弛張尤其刺事矣吾用黃芩阿膠清肺之熱潤肺之燥治其源也氣行而壅

自通源清斯流清矣緣病已極中之極惟單味多用可以下行取效故立方甚平而奏効甚捷耳試以格物之學爲子廣之凡禽畜之類有肺者有尿無肺者無尿故水道不利而成腫滿以清肺爲急此義前人闡發不到後之以五苓五皮八正等方治水者總之未明此旨至於車水放塘種種劫奪膀胱之劑則殺人之事矣可不辨之於蚤乎趙我完孝廉次郎秋月肺氣不能下行兩足腫潰而小水全無臍中之痛不可名狀以手揉左則痛傷寒分經

卷十 肺經燥熱諸案

美

攻於右揉右則痛攻於左當臍揉熨則滿臍俱痛叫喊不絕利水之藥服數十劑不効用敷臍法及單服琥珀末至兩許亦不効余見時淵留已極無可救藥矣傷哉胡尚臣曰凡求同理者必不求同俗嘉言之類光刺采寧甘訕謗曾不令人窺識者無意求之而得聞之而有不心折者耶

附論治傷寒藥中宜用人參之法以解世俗之惑

傷寒病有宜用人參入藥者其辨不可不明蓋人受外感之邪必先發汗以驅之其發汗時惟元氣大旺者外邪始乘藥勢而出若元氣素弱之人藥雖外行氣從中餒輕者半山不出陷連爲困重者隨元氣縮入發熱無休去生遠矣所以虛弱之體必用人參三五七分入表藥中少助元氣以爲驅邪之主使邪氣得藥一湧而去全非補養虛弱之傷寒分經

卷十 附論解世俗之惑

毫

意也卽和解藥中有人參之大力者居間外邪遇正自不爭而退舍設無大力者當之而邪氣足以勝正氣其猛悍縱恣安肯聽命和解耶故和解藥中之用人參不過藉之以得其平亦非偏補一邊之意也而不知者方謂傷寒無補法邪得補彌熾斷不敢用豈但傷寒一證卽痘疹初發不敢用瘡痢初發不敢用中風中痰中寒中暑及癰疽產後初時藥不敢用而虛人之遇重病一切可生之機悉置之不理矣古今諸方表汗用五積散參蘇飲

敗毒散和解用小柴胡湯。清熱用白虎湯。竹葉石膏湯。皆用人參。皆藉人參之大力。領出在內之邪。不使久留。乃得速愈。為快。奈何世俗不察。耶獨不見。感入體虛之人。大熱呻吟。數日間。燥盡津液。身如枯柴。初非不汗之汗。之熱不退。後非不和之下。之。和之下。之熱亦不退。醫者技窮。委身而去。不思內經所言。汗出不為汗。衰者死。三下而不應者死。正謂病人元氣已瀉。而醫不應手耳。夫人得感之時。元氣未瀉也。惟壯熱不退。灼乾津液。元氣始瀉。傷寒分經

卷十 附論解世俗之惑

美

愚哉愚哉。倘始先藥中用人參三五七分。領藥深入。驅邪即刻熱退。神清何致汗下不應。況乎古今時勢不同。膏粱藜藿異體。李東垣治內傷兼外感者。用補中益氣加表藥一二味。熱服而散。外邪有功。千古姑置不論。止論傷寒專科。從仲景以至於今。明賢方書。充棟無不用人參在內。何為今日醫家。單單除去人參。不用以阿諛求容。全失一派相傳宗旨。其治體虛病感之人。百無一活。俟聞君對簿。日知之悔無及矣。乃市井不知醫者。又交口勸

病人不宜服參。目覩男女親族死亡。曾不悟旁操鄙見害之也。謹剖心瀝血。相告且誓之曰。今後有以發表和解藥內。不宜用人參之言。悞人者。死入犁耕地獄。蓋不當用參。而用之殺人者。皆是與黃耆白朮當歸乾薑肉桂附子等藥同行溫補之悞。所致不與羌獨柴胡前胡桔梗正等藥半等藥同行汗和之法所致也。汗和藥中兼用人參。從古至今。不曾傷人性命。安得視為砒鴆刀刃。固執不用耶。最可恨者。千百種藥中。獨歸罪人參。君主之藥。世道

傷寒分經

卷十

附論解世俗之惑

美

人心日趨於疾。視長上其醞釀。始於此。昌安敢與亂同事。而不一亟辨之乎。

附人參敗毒散證驗

嘉靖己未年五六月間。江南淮北時行瘟疫。病沿門闔境。傳染相似。用木方倍人參。去前胡獨活。服者盡效。全無過失。萬歷戊子己丑年。時疫盛行。凡服本方發表者。無不全活。又云。凡饑饉兵荒之餘。飲食不節。起居不常。致患時氣者。宜同此法。按彼時用力之意。倍加人參者。以瘟氣易染之

人體必素虛也。其用柴胡卽不用前胡用羌活卽不用獨活者。以體虛之人不敢用複藥表汗也。饑饉兵荒之餘。人已內虛。久困非得人參之力以驅邪邪必不去。所以服此方者無不全活。今崇正辛巳壬午時疫盛行。道殣相望。各處醫者發汗和解藥內惟用人參者多以活人。更有發癰一證最毒。惟用人參入消癰藥內全活者多。此人人所共見。其聞者而庸愚之執者不破誠可哀也。又有富貴之人平素全賴參朮補助及遇感發尙不知而誤傷寒分經

卷十

附論解世俗之惑

早

用臂之賊已至家閉門攻之反遭凶禍者有之。此則誤用人參爲溫補不得借之爲口實也。

胡尚臣曰。將傷寒所以用人參之理反覆辨論。卽婦人孺子聞之無不醒然。此立言之善法也。

仲景爲醫門之孔子。所著傷寒論。辨析四時六經之脈證精義入神。功在軒岐之上。其三百九十七法一百一十三方。誠千古不可移易者也。然古今元氣不同。南北稟受各異。其間有宜師其意而遵用其法者。有宜師其意而不盡泥其方者。惟能神明於規矩之中。變通於法度之外。斯爲善讀仲景書爾。

乾隆丙戌三月上巳日。漱水吳儀洛遵程又書於硤川之利濟堂。

傷寒分經

卷十

傷寒分經十卷

浙江巡撫
採進本

國朝吳儀洛撰此書爲其醫學述之第五種取喻嘉

言所撰尙論篇重爲訂正凡太陽經三篇陽明經

三篇太陰經一篇少陰經二篇厥陰經一篇春溫

三篇夏熱一篇脈法二篇諸方一篇補卒病論一

篇秋燥一篇共十有九篇

醫貫砭二卷

〔清〕徐大椿撰

北京大學圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目》·醫貫砭二

卷《提要》

序

小道之中切於民生日用者醫卜二術也。醫者不可憑而可憑，醫者不可憑而不可憑者也。蓋卜之為道，布策開兆，毫無據依，而萬事萬物之隱微變態，俱欲先知洞察，此其不可憑者也。然驗者應若桴鼓，不驗者背若冰炭，愚夫愚婦皆能辨其技之工拙也。若醫之為道，辨症定方，彰々可考，薑桂入口，即熱茶連下咽，知寒已黃，必瀉參朮，必補，莫不顯然，但病無即愈，即死

序

之理，症有假熱假寒之異，上下殊方，六經異治，先後無容，顛越輕重，不得倒施，愈期有久暫之數，傳變有淺深之別，或藥不中病，反有小效，或治依正法，竟無近功，有效後而加病者，有無效而病漸除者，有藥本無誤，病適當劇，即歸咎于藥者，有藥本大誤，其害未發，反歸功于藥者，病家不知也。醫者亦不知也，因而聚訟紛紜，遂至亂投藥石，誰殺之誰生之，竟無一定之論。此其不可憑者也。事既無憑，則技之良賤，何由而定？曰

有之世故熟形狀偉勦說多時命通見機便捷
交遊推獎則為名醫殺人而人不知也知之亦
不怨也反此者則為庸醫有功則曰偶中有咎
則盡歸之故醫道不可憑而醫之良賤更不可
憑也若趙養葵醫貫之盛行于世則非趙氏之
力自能如此也晚邨呂氏負一時之盛名當世
信其學術而并信其醫彼以為是誰敢曰非况
祇記數方遂傳絕學藝極高而功極小然則
而名極美有不風行天下者耶如是而殺人之

序

術遂無底止矣嗚呼為盜之害有盡而賞盜之
害無盡蓋為盜不過一身誅之則人盡知懲賞
盜則教天下之人胥為盜也禍寧有窮哉余悲
民命之所關甚大目擇其反經背道之尤者力
為辨析名之曰醫貫願以請正于明理之君子
冀相與共弭其禍雖甚便于崇信醫貫之人
或遭謗黷止所不惜也乾隆六年二月既望泗
溪徐大椿題

醫貫砭卷上

吳江徐靈胎湘溪著

男

歲時

十二官論

心者君主之官也神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝
者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膈中者
臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者
傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作
強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州
都之官津液藏焉氣化則能出矣凡此十二官者不得相

醫貫砭

卷上

失也故主明則下安王明主字緊頂上文主字以此養生

則壽殁世不殆以為天下大昌主不明則十二官危使道

閉塞而不通形乃大傷以此養生則殃以為天下者其宗

大危戒之戒之至道在微變化無窮孰知其原窘乎哉消

者霍亂孰知其要閉關之當孰者為良恍惚之數生於毫

釐毫釐之數起於度量千之萬之可以益大推之大之其

形乃制此書專為八味六味而作欲表章二方必先講明

一語又足斷斷不可用二方者只得將命門二字增

入然後二方可為十二官之主藥其作偽之心如此

玩內經註文即以心為主愚謂人身別有一主非心也

即謂內經此
乃邪說之根 謂之心主之官當與十二官平等不獨獨尊
心之官為主若以心之官為主則下文主不明則十二官
危當云十一官矣此理甚明何計經者昧此耶 明明說君
之稱矣何以不得尊之其曰十二官危者蓋主不明則心
亦自病也若曰十一官則主不明之病反不在內於義為
不備 蓋此一主者氣血之根生死之關十二經之綱維也
或問心既非主而君主又是一身之要然則主果何物耶
何形耶何處安頓耶余曰悉乎問也若有物可指有形可
見人皆得而知之矣惟其無形與無物也故自古聖賢因
心立論而卒不能直指其實 因心立論仍是說心不是說
命門也據爾言則從古聖賢
醫貫砭 卷上 二
當以命門 孔門之一貫上紹精一執中之統惟曾子子貢
立論矣 得其傳而二子俱以心悟而非言傳也設以言傳當時問
人之所共聞不應復有何謂之問也後來子思衍其傳而
作中庸天命之性以中為大本而終於無聲無臭孟子說
不動心有道而根於浩然之氣而又曰難言也 人因外感
疾病用草木金石之藥補之瀉之寒之熱之以調其氣此
乃極平常之理偏要說到四書六經義性誠命傳道等語
與疾病何涉即內經所云司天運氣義極精微 老氏道德
亦不過指六淫之氣感入耳何嘗大言欺人耶 老氏道德
經云谷神不死是曰玄牝玄牝之門造化之根又曰恍恍
惚惚其中有物佛氏心經云空中無色無受想形識無眼

耳鼻舌身意又曰萬法歸一一歸何處夫一也中也性也
浩然也玄牝也空中也皆虛名也不得已而強名之也立
言之士皆可以虛名著論至於行醫濟世將以何味的為
君主之藥而可以綱維一身之疾病耶 此乃萬法歸一之
大本難言萬法歸一皆暗指命門為言 命門者腎道統之
傳並與心上毫無干涉祇是傳此腎中命門之法而八味
六味一方乃是一貫大本難言萬法歸一之補救此等怪
論自開闢以來未之或有小人之欺世至於此極而相通
文理之人說之不但不怪且以此人
為真知孔孟之學者亦大可怪矣
腎有二精所舍也生於脊脊十四椎下兩旁各一寸五分
形如豇豆相並而曲附於脊外有黃脂包裹裏白外黑各
有帶二條上條係於心包下條過屏翳穴後趨脊骨兩腎
俱屬水但一邊屬陰一邊屬陽越人謂左為腎右為命門
非也命門即在兩腎各一寸五分之間 此本舊說然亦影
經全不當一身之中易所謂一陽陷於二陰之中內經云
七節之旁有小心是也名曰命門是謂真君主 內經何不
言主之乃一身之太極無形可見 既云小心兩腎之中是
其安宅也 按內經並無命門之說惟靈樞經結篇云太陽
命門者目也素問陰陽離合論云太陽根於目也陰結於
命門王啓玄註云命門者藏精光之所則兩目也經文
所指命門皆以目言蓋以目為五藏六府精氣所注故曰
命門又門者出入開闔之地目之精光內瑩外照而啓閉

隨時於門字義為切若腎中一其右旁有一小竅即三焦
點通陽而謂之門義亦不合
內經明云上焦如霧中焦如沤下焦如瀉三焦者是其臣使之官
焦如瀉乃指腎旁小竅杜絕不倫
經云三焦者決瀆之官膈中者臣使之官前段明明
引過今乃以三焦為命門臣使之官何顛倒如是
而行周流於五藏六府之間而不息名曰相火相者言如
天君無為而治宰相代天行化此先天無形之火與後天
有形之火不同決瀆之官如何代天行事且其左旁有一
小竅乃真陰真水氣也亦無形火無形猶可水如何說無
三焦及此竅為真火真水將心火腎水為假形且真字乃對假而言以
火假水耶且前篇名三焦此竅又名何物耶上行夾脊至
腦中為髓海泌其精液注之於脈以榮四末真陰之氣所

醫貫

卷上

四

精液且利以見得也內注五藏六府以應刻數亦隨相火
運行周身與兩腎所主後天有形之火不同按靈樞論中
焦云此所受氣者泌精粕蒸津液化其精微上注於肺脈
乃化而為血以奉生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰
營氣又云上焦亦與營俱行於陽二十五度行於陰二十
五度一周也還文據靈樞指營氣而言今乃移作腎中水
氣杜絕不顛倒但命門無形之火在兩腎有形之中為
黃庭無形之火前指三故曰是誰五藏之真惟腎為根腎
五藏之真何物指命門日為五藏之真惟腎為根腎
為五藏之真何物指命門日為五藏之真惟腎為根腎
先具有命門然後生心心主血有心然後生肺肺主皮毛
有脾然後生腎腎主骨髓有腎則與命門合二數備是以

腎有兩岐也前云命門在中腎在兩旁今又引此
可見命門為十二經之主腎無此則無以作強而技巧不
出矣膀胱無此則三焦之氣不化而水道不行於膀胱與
然兩府云膀胱無命門則三焦不化如何按脾胃無此則不能蒸腐水穀而五
味不出矣肝膽無此則將軍無決斷而謀慮不出矣大小
腸無此則變化不行而二便閉矣心無此則神明昏而萬
事不能應矣命門尚足當君主之稱耶此所謂主不明
則十二官危也此所謂主不明則十二官危也
譬之元宵之熬山走馬燈拜者舞者飛者走者無一不具

醫貫

卷上

五

其中間雖是一火耳火旺則動速火微則動緩火熄則寂
然不動而拜者舞者飛者走者軀殼未嘗不存也走馬燈
皆是死物所以惟恃火氣衝突機關而動若五藏六府各
有生氣豈專恃命門耶惟其視五藏六府皆為死物所以
後文別無治五藏六府之方專恃一八故曰汝身非汝所
陳九治五藏六府之病其根皆在此也引莊子語亦
有是天地之成形也引莊子語亦余所以諄諄必欲明此
論者欲世之養身者治病者的以命門為君主而如意於
火之一字養身補火已屬偏見况治病必視其病夫既曰
立命之門火乃人身之至寶何世之養身者不知保養節
欲而日夜戕賊此火不節欲亦非專於戕賊此火倘以斷
喪之人一概補陽又為戕賊人之術矣

既病矣治病者不知溫養此火而日用寒涼以直滅此火焉望其有生氣耶治法多端原不是專用寒涼亦不是專於補火也經曰主不明

則十二官危以此養生則殃戒之戒之余今直指其歸元之路而明示其命門君主之火命門竟指為君火乃水中

之火相依而永不相離也永不相離何以有上越之病耶火之有餘緣

水之不足也毫不敢去火只補水以配火壯水之主以鎮

陽光上文俱為八味作地步又恐遺却六味此處忽然轉出水不足之論那說害人其苦心亦如此所謂作偽

也心勞火之不足因見水之有餘也水有餘之病不知是何形象若是虛寒等證不得專

得為水之有餘若是水腫等證亦不得專於補火總是欺人之大言殺人之捷徑耳亦不必瀉水就

醫貴確卷上

於水中補火益火之原以消陰翳所謂原與主者皆屬先天無形之妙非曰心為火而其原在肝腎為水而其主屬

肺蓋心脾腎肝肺皆後天有形之物也須以無形之火配無形之水直探其君主之穴宅而求之是謂同氣相求文理

不斯易以入也所謂知其要者一言而終也若夫風寒暑濕燥火六者入於人身此客氣也非主氣也主氣固客氣

不能入六淫未入之先專一用補服八味六味無甚害若六淫既感邪已傷正仍一概用二方則非補主氣

反補邪氣矣能不殺人耶且無病之人亦何必服藥既服藥則必視人之氣體如何而後製方亦何得專用二方也

今之談醫者徒知客者除之漫不加意於主氣何哉縱有

言固主氣者專以脾胃為一身之主焉知坤土是離火所

生而艮土又屬坎水所生耶命門既是太極何以又屬坎

離火又屬心仍不關乎命門矣明乎此不特醫學之淵源有自聖賢道統

之傳亦自此不昧將命門為道統言而所謂一貫也浩然

也明德也假如孔子云參乎吾道是火孟子云吾善養吾火大學云在明明火豈不絕倒耶玄牝

也空中也太極也同此一火而已太極是一團為聖賢為

仙為佛不過克全此火而歸之耳小子之一論闢千古之

未明見者慎勿以為迂仙佛我不能知若全此火即為聖賢真乃千古之怪論宜其自稱為

闢千古之未明也。此篇之論專為盡天下之病皆用入

味而設便講出儒釋道三教之合一以見八味之不可不

醫貴確卷上

用此等亂道無一字連貫稍通文理之人見之宜無不知其狂悖即使其醫道果精見此等議論亦并其醫道而疑

之乃世之號為通文理者讀之反以為真知性命之理因

此益信其醫學之精而八味竟不但為治病之藥實性命

之所係一日不可廢者嗚呼吾憐趙氏尤憐讀趙氏之書而崇信之者其愚更勝趙氏百倍也

陽火 金判謂之太極今於白圈之中先有黑白

○ 土二點為一陰一陽之象然後生出太極

陰水 木矣太極圖可改則古聖之書何不一

繫辭曰易有太極是生兩儀周子懼人之不明而製為太極圖 無極而太極無極者未分之太極也惟其未分所


有未分之時為無極已分之時為太極太極已分則陰陽矣尚得為太極耶太極者已分之陰

陽也既名陰陽則不可名太極矣蓋太極動而生陽靜而生陰豈有分爲陰陽而猶稱太極者性理之說原不足與此等無知妄人辨吾恐世之讀之者偶不經意卽爲所惑貽誤不小也

兩腎俱屬水左爲陰水右爲陽水

以右爲命門非也命門在兩腎中

○命門左邊小黑圈是真水之穴



右邊小白圈是相火之穴此一水

火俱無形日夜潛行不息○兩

腎在人身中合成一太極



醫貫

卷上

人

云兩旁俱是腎命門在中間雖非經旨而其言尚有影響至分左爲陰水右爲陽水又陰水爲真水陽水爲相火又左一黑圈爲真水之穴右一白圈爲相火之穴種種杜撰支離真屬謬語○按甲乙經腎骨十四椎下有命門穴膂下二十亦有命門穴此穴名也非真有物如小心者在脊骨之內爲太極也若穴而必有物可指將周身七百二十穴竟有七百二十

十如小心者耶

命門在人身之中對臍附脊骨自上數下則爲十四節自

下數上則爲七節內經曰七節之旁有小心是也此句出素問利

禁論云兩腎之上中有父母七節之旁中有小心王註云小心謂真心神靈之宮室乃指心而言似得小字之意按靈邪客篇論云心者精神之所舍也其藏堅固邪勿能容也故諸邪之在心者皆在心之包絡可知心藏於內必有出入之慮別有脂膜結聚於包絡之間形如小心似有此理鍼者中之卽有害故在刺禁之列並非表明小心卽命

門爲十二經之主也豈可因此刺禁中偶及之遂以一部內經專爲小心立論而天下之病專治小心則無不愈乎卽晚村亦辨之云曰父母曰小心尊卑自見趙氏單摘此句是欲以小心爲父母之主也恐與經旨不合此晚村一陳之

或又問曰如上所言心爲無用之物耶古之聖賢未有不

以正心養心盡心爲訓與醫病何干而先生獨外心以言道恐

心外之道非至道也余曰子細玩經文自得之矣經曰神

明出焉則所係亦重矣豈爲無用哉蓋不觀之朝廷乎皇

極殿是王者向明出治之所也乾清宮是王者向晦晏息

之所也指皇極殿而卽謂之君身可乎蓋元陽君主之所

醫貫

卷上

九

以爲應事接物之用者皆從心上起纏綿故以心爲主至

於棲真養息而爲生生化化之根者獨藏於兩腎之中故

尤重於腎其實非腎而非心也云元陽爲君身心是皇

身在皇極殿則不在乾清宮在乾清宮則不在皇極殿其

理甚彰然則元陽到心則有心火而無腎火到腎則有腎

火而無心火有心火之時腎惟一團陰頭之氣有腎火之

時心遂爲空室湯蕩之物向也以命門爲主今又以命門

之君甘卽心之君主心之君主卽命門之君主而心與命

門皆見空器皆非君主前後背脊腰脊乃隨口亂道非其人

批云此段語甚沾太抵呂氏之心先死也

再氏評曰自評學士開補脾不如補腎之理薛院使因之

用八味六味通治各病通治各病四字何等不通趙氏又

醫貫疏

卷上

十

從薛氏發明其要一歸之命門一歸之八味益火二字乃全書之宗旨也其提綱快當親切處有前此所未及者其立齋之功臣矣薛氏所謂其父殺人報仇其願為機傳變轉相因治法逆從淺深異用趙氏所言皆窮原反本之論撥亂救弊功用甚大各病有各病之本原各病有各病之偏弊若微用八味一方則正大亂之然以之治敗證則神效敗證亦有補瀉寒熱虛實味則八味直是而以治初病則多疎蓋緣主張太過立言不能無偏遂欲執其一說而盡廢諸法亦不可行也學者識其指歸以明生化斡旋之機又當詳考古今立法相因

陰陽論

陰陽之理變化無窮不可盡述姑舉其要者言之夫言陰陽者或指天地或指氣血或指乾坤此對待之理其實陽統乎陰天包乎地血隨乎氣故聖人作易於乾則曰大哉乾元乃統天於坤則曰至哉坤元乃順承天古人善體易義治血必先理氣血脫益氣故有補血不用四物湯之論

醫貫疏

卷上

十

四物湯本為補血而設謂不得專用則可謂不用則不可如血虛發熱立補血湯一方以黃芪一兩為君當歸四錢為臣氣藥多而血藥少使陽生陰長又如失血暴甚欲絕者以獨參湯一兩頓煎服純用氣藥斯時也有形之血不能速生幾微之氣所當急因使無形生出有形血聚脫者氣亦隨之而脫勢極危殆故用補血之品以填之生之非謂一時之氣即能生血也即氣固之後仍當大補其血而以氣藥佐之亦非專補氣也蓋陰陽之要原根於無也故曰無名天地之始忽引老子倫謂不生死消長陰陽之常度豈人所能損益哉聖人裁成天地之化輔相天地之宜每寓扶陽抑陰之微權方復而

先憂七日之求未濟而預有衣衾之備血脫之後陰已大全然無陰而後已耶且既欲抑之又何必補氣以生之蓋扶陽抑陰又是一義非補氣不補血之謂若云聖人扶氣抑血成何語耶總之此人心理已絕凡所引證皆全然而不思隨口亂道本無足責所恨者崇信之人耳防未然而治未病也現在血脫而將死此時救之不暇神農嘗藥按陰陽而分寒熱溫涼辛甘酸苦鹹之辨凡辛甘者屬陽溫熱者屬陽寒涼者屬陰酸苦者屬陰陽主生陰主殺司命者欲人遠殺而就生甘溫者用之辛熱者用之使其躋乎春風生長之域一應苦寒者俱不用神農本草上品內經論司氣勝復宜寒宜熱亦相半歷古以來所傳養生方中寒熱溫涼亦間雜互用此有目所共見乃敢肆然曰

一應苦寒俱不用此其衷心之語據所云則神農本草宜只載溫熱諸品其餘俱編入毒藥條內禁用可也也要之服藥原是治病無病本不必服藥內經云五穀為養五果為助五菜為充五毒為攻邪凡藥用之不當而或太過皆有毒故古人謂人參甘肅皆能殺人惟六淫七情有偏勝則以藥救之且內經云寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之何等明白乃不問病之何因而一不特苦寒不用至於涼者亦少用蓋涼者秋氣也萬物逢秋氣不長矣服藥原為治病而設並非藉以生長氣血也

天上地下陰陽之定位然地之氣每交於上天之氣每交於下故地天為泰天地為否聖人參贊天地有轉否為泰之道如陽氣下陷者用味薄氣輕之品若柴胡升麻之類

醫貫砭

卷上

主

舉而揚之使地道左旋而升於九天之上陰氣不降者用感秋氣肅殺而生若瞿麥扁蓄之類抑而降之使天道右旋而入於九地之下此東垣補中益氣湯萬世無窮之利不必降也升清濁自降矣動筆便自相甘謬據云地天為泰天地為否則宜乎陽降而陰升矣乃反欲升陽而降陰是欲反泰為否也據云瞿麥扁蓄降濁降陰於九地之下又云不必降也升清而濁自降矣種種背謬總是慎以大言欺人全不思其中義理所以如此須知補中益氣湯不過因胃陽因濕下陷以此提出陽分耳不必著此大話頭也

年月日時皆當各分陰陽此其大略也獨甲子運氣內經雖備言之往往不驗當時大撓作甲子即以本年本月本

日本時為始統紀其數如此未必直推至上古甲子年甲子月日時為曆元也指為無稽之談爾知上古甲子確是何年何月大撓且不足憑誰為可憑者耶小人之無忌憚固不足責讀者見此等荒唐而不察亦有喪心之疾者也內經特明氣運有如許之異民病亦有如許之別如此讀內經者不可執泥譬如大明統曆選擇已定竟將千古陰擇祿命占候等書一味抹殺翻覺痛快細思之不能不嘔然失笑也可信乎不可信乎陽一而實陰二而虛蓋陰之二從陽一所分故曰秉全體

月有盈虧人之初生純陽無陰賴其母厥陰乳哺而陰始生如此說則小兒正有命門並無左腎直待乳哺足方生出左腎來蓋純陽無陰者謂小兒正當發生之時秉初

醫貫砭

卷上

主

陽之氣生氣極旺猶如四時之春陽氣方張不必更助其陽非謂其體中全無陰氣也何得扯合是以男子二八而精始通六十四而精已竭女子二七而經始行四十九而經已絕人身之陰止供三十年之受用可見陽常有餘陰常不足前段要扶陽抑陰此處又要扶陰抑陽總是隨口亂道況縱慾者多節慾者少故自幼至老補陰之功一日不可缺此陰字指陰精而言不是泛言陰血今之四物湯補陰者誤也補血亦有時必用何以必不可補蓋補陰補血補精確是三項事補陰不專指精血而言而精血則皆屬陰也此段議論專要放出六味來所以作此地步

談陰陽者俱曰氣血是矣詎知火為陽氣之根水為陰血

之根易有太極是生兩儀兩儀生四象則五行乃陰陽所分豈有水火反為陰陽之根者蓋觀之天地間日為火之精故氣隨之月為水之精故潮隨之然此陰陽水火又同出一根朝朝稟行夜夜復命周流而不息相偶而不離惟其同出一根而不相離也故陰陽又各互其根陽根於陰陰根於陽無陽則陰無以生無陰則陽無以化從陽而引陰從陰而引陽各求其屬而窮其根也世人但知氣血為陰陽而不知水火為陰陽之根能知水火為陰陽而誤認心腎為水火之真此道之所以不明不行也試觀之天上金木水火土五星見在而日月二曜所

以照臨於天地間者非真陰真陽乎內經之論陰陽極為之也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也又曰陽化氣陰成形又曰水為陰火為陽又曰陰勝則陽病陽勝則陰病又曰陰陽者氣血之男女也左右者陰陽之道也水火者陰陽之徵兆也陰陽者萬物之能始也故曰陰在內陽之守也陽在外陰之使也其言陰陽也詳而且明故五臟合言之則心肝脾肺腎陰分言之則五臟各有陰陽惟腎有兩則左屬水而為陰右屬火而為陽人之元氣藏於腎中腎之陰陽必宜保護不宜戕賊比諸臟為尤重何等明白乃幻成真假無形有根原本人身心肝脾肺腎五行具存而所以運行五臟六腑之間者何物乎有無形之相火行陽二十五度無形之腎水行陰亦二十五度行陽行陰內經指而其根則原於先天太極

之真此所以為真也一屬有形俱為後天而非真矣非根矣謂之根如木之根而枝葉所由以生也如此說則入味陽真陰是補太極矣嗟乎五臟六腑孰非有形之體草根木皮亦孰非有形之物不過氣性各殊借以補偏救弊耳何必過高其論自投魔境乎既有真陰真陽何謂假陰假陽曰此似是而非多以誤人不可不知如人大熱發燥口渴舌燥非陽證乎余視其面色赤此戴陽也切其脈尺弱而無力寸關豁大而無倫此係陰盛於下逼陽於上假陽之證余以假寒之藥從其性而折之頃刻平矣如人惡寒身不離複衣手足厥冷非陰證乎余視其面色滯切其脈濇按之細數而有力此係假寒之證寒在皮膚熱在骨髓余以辛涼之劑溫而行之一汗而愈此亦有不可汗者凡此皆因真氣不固故假者得以亂其真陰盛格陽陽盛格陰此病變之不同何得指假陽者不足而示之有餘也假陰者有餘而示之不足也此假字又與前真字耳此乃以陰盛似陽陽盛似陰之證對真而言則前所云真乃指熱為實熱寒為實寒也不虛謬之甚乎總之真字本不通之至一身之中原無所謂假陰假陽也既已識其假矣而無術以投其欲彼亦扞格而不入經曰伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使去邪而歸於

正矣

五行論

以火言之有陽火有陰火有水中之火有土中之火有金中之火有木中之火陽火者天上日月之火生於寅而死於酉陰火者燈燭之火生於酉而死於寅此對待之火也水中火者霹靂火也即龍雷之火無形有雷即有電何謂無形而有聲不焚草木得雨而益熾見於季春而伏於季秋原夫龍雷之見者以五月一陰生水底冷而天上熱龍為陽物故隨陽而上升驚蟄已後龍已漸升何待五月欲遷就已說遂不顧義理如此冬至一陽來

醫貫砭

卷上

七

復故龍亦隨陽下伏

然則冬至已前一陽未生水底終日寒冷龍竟日在天上耶豈非笑談

雷亦收聲人身腎中相火亦猶是也平日不能節慾以至

命門火衰腎中陰盛

不節慾有傷陰者有傷陽者何得專指為火衰若云陰盛則精脫者必陰

虛豈有陽

反盛者耶龍火無藏身之位故遊於上而不歸是以上焦

煩熱咳嗽等證善治者以溫腎之藥煩熱咳嗽明係陰虛溫腎藥豈可亂投

從其性而引之歸原使行秋冬陽伏之令而龍歸大海此

至理也奈何今之治陰虛火衰者以黃柏知母為君而愈

寒其腎益速其斃良可悲哉

滋陰以治虛火苦寒以治實火此一定之法至庸醫之誤

治原非正法也

金中火者凡山中有金銀之礦或五金埋瘞之處夜必有火光此金氣非火光也此金鑿土中而不得越故有光耀發見於

外人身皮毛空竅中自覺針刺蚊咬及蟻頂如火炎者此

肺金氣虛火乘虛而現肺主皮毛故也肺家之火何得專

啞面熱氣悶肺痿肺癰吐血消渴種種天證皆是肺火之證而乃遺却何故經曰東方木實因

西方金虛也既曰肺火何又以又曰肺虛補北方水即所以瀉南方火雖

曰治金中之火而通治五行之火無餘蘊矣

金中之水礦中之水銀是也水銀乃未成之金也何得指之為水在人身為

骨中之髓至精至貴人之寶也木中水者異木入於坎水

醫貫砭

卷上

七

而上出其水即木中之脂膏異木入坎水乃是井卦之象

之水皆木中之脂膏耶欲欺人而又不深思遂亂道如此人身足下有湧泉穴腎何以

指為木指為木肩上有肩井穴此暗水潛行之道凡精液潤布於

皮膚之內者皮膚之內亦非木中之水皆井泉水也夫水有如許之不

同總之歸於大海天地之水以海為宗人身之水以腎為

源而其所以能晝夜不息者以其有一元之乾為太極耳

一元之乾為太極試看此七字有一字連貫否醉生夢死之人談理談性本不足與辨特無恥已極為可厭耳

水中之五行也明此水火之五行而土木金可例推矣

中風論

中風之疾愚意謂邪之所湊其氣必虛外感者間而有之

間字當作五百年間出之間當專主虛論不必兼風

中風乃非但云不盡是風并云不必兼風當時聖人何不

竟云純虛之證反將五百年間出之病立為名號使人因

名責實竟作風病治誤人不淺耶譬如論中暑病可日不

必兼暑中暑病而日不必兼寒即有之亦五百年間出之

事豈成說乎蓋真中風則專以風治類中風則病各有

因現其所感何因而分別治之何等明白穩當要其意專

先以此病為純虛之證也是何肺腑

河間東垣治中風專治本而不治風可謂至當不易之論

既名中風又專治本而不治風則是本原虛弱之病不是

中風矣况劉李之書具在雖各有所偏並無專治不治

風之說豈學者必須以陰虛陽虛為主自後醫書雜出使

後學狐疑不決

除虛用六味陽虛用八味自古並無以此

專用二方治中風者何當醫書雜出之後始不

力耶

或問人有半肢風者必須以左半身屬血右半身屬氣豈

復有他說乎曰未必然人身劈中分陰陽水火男子左屬

水右屬火女子左屬火右屬水男子半肢風者多患左女

子半肢風者多患右即此觀之可見以陰虛為主

何嘗以男女而別蓋左屬陽而右屬陰男陽左陰故病亦

分屬然亦非盡如此者若以此為一定之病則男子患右

女子患左者又何說耶

或問曰當此之時小續命湯可用乎曰未必然小續命湯

此仲景金匱要略治冬月直中風寒之內方即麻黃桂枝

之變方也

此又亂道直中風寒四字已屬不接冬月二字

下乃風痺風痺之風與麻黃桂枝治傷寒傷風者何涉其

痛處或拘急不得轉側其間隨六經之形證逐一加減未

便可按方統用其全方也

中風之證雖亦有各經之殊然

之變證可分者加減法皆後

人所提非金匱原方所有也

如太陽無汗於本方中倍麻

黃杏仁防風如有汗惡風於本方中倍桂枝芍藥杏仁如

陽明無汗身熱不惡風於本方中加石膏

無汗不得用白

青知母甘草有汗身熱不惡風於本方中加葛根

有汗不

何得反

用葛根桂枝黃芩如太陽無汗身涼於本方中加附子乾

薑甘草少陰經中有汗無熱於本方中加桂枝附子甘草

凡中風無此四證六經混淆係於少陽厥陰或肢節攣痛

或麻木不仁每續命湯八兩加羌活四兩連翹六兩此係

六經有餘之表證須從汗解如有便溺阻隔宜三化湯或

局方麻仁丸通利之雖然邪之所湊其氣必虛世間內傷

者多外感者少間而有之

既云邪之所湊則此方終不可

輕用

考補小續命湯

麻黃 人參 黃芩 白芍 防已 桂枝 川芎

防風 甘草 附子 杏仁 石膏 當歸

傷寒論

傷寒專祖仲景凡讀仲景書須將傷寒與中寒分為兩門

始易以通曉傷寒從來無人以中寒併為一病者即同一傷寒亦有傷風傷寒之不同况本屬兩病耶

為因年久殘缺補遺註釋者又多失次錯誤幸歷代考證

者漸明逮陶節菴六書吳綬蘊要二書刊行而傷寒之理

始著二書却是自開簡便門戶不足以發明仲景仲景書細讀本自了然也子於至理未暇

詳辨先將傷寒中寒逐一辨明庶不使陰陽二證混亂此中

醫貫

卷上

三

寒其意蓋指直中陰經之傷寒言若雜證之中寒別是一病非傷寒也非直中也乃寒邪太甚入於肌膚血脈或內

依經傳變亦不必盡在冬月此感冒之至重者其法以溫

中散寒為主亦不得誤用辛熱之藥使夫傷寒治之得其

綱領不難也若求之多岐則支離矣先以陽證言之夫既

云傷寒則寒邪自外入內而傷之也其入則有淺深次第

自表達裏先皮毛次肌肉又次筋骨傷寒之病不入筋骨腸胃此其

漸入之勢然也若夫風寒之初入必先太陽寒水之經便

有惡風惡寒頭痛脊痛之證寒鬱皮毛是謂表證三陽皆

何獨以太陽為表三陽亦若在他經則無此證矣有兼證脈若浮緊無汗

為傷寒以麻黃湯發之得汗為解浮緩有汗為傷風用桂

枝湯散邪汗止為解桂枝湯非止汗之藥乃解肌之藥也

已故用桂枝湯和其營衛仍令微微出汗而解此謂之正

汗但不苦麻黃之發汗為補甚耳若云汗止則桂枝反為

止汗之藥邪風若無頭疼惡寒脈又不浮此為長風濕而

將何從出邪

在中中者何表裏之間也乃陽明少陽之分脈不浮不沉

在乎肌肉之間謂皮毛之下也然有二焉若微洪而長即

陽明脈也外證身乾不眠用葛根湯以解肌脈微而數少

陽脈也其證脇痛耳聾寒熱往來而口苦以小柴胡湯和

之蓋陽明少陽不從標本從乎中治也若有一毫惡寒尚

醫貫

卷上

三

在表雖入中還當兼散邪過此為邪入裏為實熱脈不浮

不沉沉則按至筋骨之間方是若脈沉實有力外證不惡

風寒而反惡熱譫語大渴六七日不大便明其熱入裏而

腸胃燥實也輕則大柴胡湯重則三承氣湯大便通而熱

愈矣以陰證言之若初起便怕寒手足厥冷或戰慄踈臥

不渴兼之腹痛嘔吐泄瀉或口出涎沫面如刀刮不發熱

而脈沉遲無力此為陰證三陰傳變之證乃不竟其說反

以直中陰經之證當之何也

不從陽經傳入熱證治例直中陰經固宜

陽經傳入三陰之證其間熱極宜涼者固多如上文證

陰經之方未嘗爲直中陰經設也 更當看外證如何輕則理中湯重則薑

附湯四逆湯以溫之由此觀之可見傷寒者由皮毛而後

入腑臟初雖惡寒發熱而終爲熱證 傳入三陰亦其人必

素有火者 何嘗無中寒之病 中寒者直入臟腑始終惡

寒而並無發熱等證其人必無火者 無火之人熱邪入裏

如此則仲景當時著傷寒論不必細細分別祇一則發表

問其人之素體而寒熱立辨矣豈非謹語耶 一則發表

攻裏一則溫中散寒兩門判然明白何至混雜使人疑誤

耶 此則以傳經爲陽證直中爲陰證至傳經之三陰證則

耶 置而不論豈傳經即直中耶抑三陰宜溫之證亦陽證

已極

卷上

重

桂枝湯 治太陽經傷風發熱自汗惡風 桂枝 芍藥

甘草 桂枝湯中薑棗爲至要之品成無已註云以甘緩

二味 之以辛散之是也開卷第一方面五味之中遺去

何耶 葛根湯 赤芍 葛根 蔥白 生薑 桂枝 麻黃

甘草 大棗 古時芍藥赤白不分而傷寒方亦從無用赤

芍藥之品不宜用於表之方也然則桂枝湯亦用赤芍

耶○葛根湯中並無蔥白傷寒論中惟少陰經中白通湯

等三四方溫散邪邪 治陽明胃經目痛鼻乾不寐如有惡

用之與陽明無涉也 寒證本方加麻黃 惡風加桂枝 如正陽明病不惡

寒有汗而渴當用白虎湯 正陽陽明病是胃家實也承

虎則治陽明經汗出煩渴之證與肺病迥別此最大關節經文緊要誤治立死矣

小柴胡湯 治少陽胆經耳聾脇痛寒熱往來口苦 柴

胡 黃芩 甘草 小柴胡只載三味遺去人參半夏薑棗

得者專以有人參也用人黃則爲大柴胡矣今法入參已

失原方之義且并去半夏之辛散以治煩嘔去薑棗之甘

辛以和營衛而只此三味經無出入路不可汗下止有此

味何以治少陽諸證耶 此經無出入路不可汗下止有此

湯和解之如兼陽明證本方加葛根芍藥如尚有惡寒等

證用大柴胡湯 惡寒則病尚在表大黃豈可 兼表兼下

大柴胡湯 表證未除而裏證又急汗下兼行 柴胡

黃芩 芍藥 半夏 人參 大黃 枳實 大柴胡本無

卷止

重

人參小柴胡原有人參偏去 人參發亂古方是何肺腸

白虎湯 治身熱大渴而有汗脈洪大者如無渴者不可

用此藥爲大忌倘是陰虛發熱服之者死若五六月暑病

者必用此方又當審其虛實 石膏 知母 甘草 人

參 竹葉 糯米 此又蒙混之極者白虎湯治陽明外熱

煩渴甚皆用白虎加人參湯又是一方至於人參竹葉同

用又是竹葉石膏湯中之藥俱不得竟指爲白虎湯也至

尤爲不典 小承氣湯 治六七日不大便腹脹滿悶病在大陰無表

證汗後不惡寒潮熱狂言而喘者 此又大誤害人者大

病皆屬寒邪傷寒太

全篇無一用藥下之法即有用大黃者亦與桂枝同用謂之溫下一用寒涼必繫此第一大關節也乃以此為大陰之藥豈不誤極蓋小承氣乃陽明正藥正氣大陰相反大陰病豈有汗後潮熱狂言等證真乃自得狂疾發此狂也

大黃 厚朴 枳實

大承氣湯

治陽明大陰證

氣法在前三

五六日不大

便腹滿煩渴并少陰舌乾口燥日晡發熱

少陰證無日晡

發熱之證日晡

陽明也

脈沉實者

大黃 厚朴 枳實 芒硝

四逆散

治陽氣亢極

此是熱邪漸深至於少陰

極則惟有急下之法四逆諸品何能愈之故成無已云非

在三陽則手足熱在太陰則手足溫在少陰則手足微

足逆而不溫也

用四逆散

血脈不通四肢厥逆在臂脛之

以散傳經之熱此為正解

醫貫疑

下若陰證則上過乎肘下過乎膝以此為辨也

柴胡

芍藥 甘草 枳實

仲景傷寒論中諸方字字金科玉律不可增減一字猶之

錄六經四子語豈可擅自刪改將杜撰之語亂入耶惟臨

病增減未嘗不可因時出入若抄錄古方先為變易仍指

為某方則大亂之道矣此人凡引錄唐宋諸方皆非原本

其方本非聖經姑不置辨乃漢以前諸方歷古無人敢易

一字而錯誤如此則後人以謠傳謠全失製方之義為害

不小

初病無熱使四肢厥冷或胸腹中滿或嘔吐腹滿痛下利

脈細無力此自陰證受寒即真陰證非從陽經傳來便宜

溫之不宜少緩經云發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者

發於陰也治宜四逆湯

此又亂道之至者發熱二句傷寒

人人皆見何嘗以無熱句為陰證耶無熱惡寒乃太陽經

宜麻黃湯發汗之證四逆湯乃太陰少陰經宜溫裏之證

遠隔三四經將治宜四逆湯連局上

腹滿腹痛皆是陰證

文治正相反一投即危可恨極矣

只有微甚不同治難一槩腹痛不大便桂枝芍藥湯腹痛

甚桂枝大黃湯

此又殺人之術也仲景治太陰中云大

陷入太陰故兼表裏下若以之治直中純寒之證

而用大黃則寒邪益陷而下脫其危可立待也

若自利

腹痛小便清白宜溫中理中四逆看微甚用輕者五積散

重者四逆湯無脈者通脈四逆湯使陰退而陽復也

子又有說焉若讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而

醫貫疑

卷上

蓋

殺人多矣讀東垣書而不讀丹溪書則陰虛不明而殺人

多矣讀丹溪書而不讀薛氏書則真陰真陽不明而殺人

亦多矣

此又隨口亂道矣豈有仲景不知內傷東垣不知

真陽之論此乃薛氏自創之邪說已前諸公豈能預料後

世有創造邪說之人而先講明之耶蓋仲景論傷寒則說

傷寒傷寒中何得以內傷立論東垣論內傷則說內傷內

傷中何得以陰虛立論丹溪論陰虛則說陰虛陰虛中何

得以真陰立論彼所謂真者指腎中之陰陽也然東垣曰

謂五臟各有陰陽則可謂腎為真陰為真陽則不可

邪之所湊其氣必虛世間內傷者多外感者間而有之此

問字當作五百年間出之間甚言其無外感也

明明云邪

云非外感則邪是何邪湊將安湊耶若五百年間出之間

則是千中無一云云內傷中無傷寒可矣何以又入傷寒

條內 東垣脾胃論與夫內傷外感辨深明飢飽勞逸發熱

等證俱是內傷悉類傷寒切戒汗下 東垣原指內傷之類

治並非指天下之傷寒皆內 傷寒者不可從傷寒

傷也引書失旨自誤誤人 以為內傷多外感少只須溫

補不必發散外感多而內傷少者溫補中少加發散以補

中益氣湯一方為主加減出入如內傷兼傷寒者以本方

加麻黃兼傷風者以本方加桂枝兼傷暑者以本方加黃連

兼傷濕者本方加羌活 查東垣脾胃論謂中益氣條下並

時方法之亂原自東垣其端然尚不至如此之甚觀之

治病必求其本一病自有一方自然隨手皆效必立一方

以治盡天下之病開簡便之路為下愚立法則必自陷於

下愚之境蓋醫者人命所關固至難極重之事原不可令

卷上

寒

下愚之人 實萬世無窮之利東垣特發明陽虛發熱之一

為之也 陽虛發熱從來所無經云陽虛生外寒未聞陽虛反

門也 發熱者若陽虛外越之證則又是一端正與補中益

氣治法相反投 然世間真陰虛而發熱者十之六七亦與

升柴即死也 傷寒桂枝麻黃二證具在豈有 反不論及何哉

傷寒無異 陰虛發熱而類此者真怪謬也 公之人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而斃則曰傷

寒之法已窮奈何豈知丹溪發明之外尚有未盡之旨乎

子嘗於陰虛發熱者見其大熱面赤口渴煩躁與六味地

黃大劑一服即愈 若係有外邪者服六味未必即死而病

者不可勝計所以痛心疾首而批此書者其 如見下節惡

寒足冷上部渴甚躁極或欲飲而反吐即於六味湯中加

肉桂五味甚則加附子冷飲下嚔即愈 此陽虛之證附桂

氣未盡則熱地五味黃 且舉傷寒口渴一證言之邪熱入

肉俱能留邪為害也 於胃府消耗津液故渴恐胃汁乾急下之以存津液其次

者但云欲飲水者不可不與不可多與並無治法縱有治

者徒知以芩連知柏麥冬五味天花粉甚則石膏知母以

止渴此皆有形之水以沃無形之火安能滋腎中之真陰

乎若以六味地黃大劑服之其渴立愈何至傳至少陰而

成燥實堅之證乎 口渴宜下有二證一則熱邪在陽明一

則熱邪傳少陰下之所以驅邪使出也

卷上

寒

若以熱地黃肉補之斂之安有不死者况六味為腎經滋

補之藥昔邪火未入少陰之時反引入少陰使邪氣竅藏

而無出路從此之後雖小疾亦無愈期而多變證矣近日

庸醫凡遇有邪而用此藥者以後百藥不效不咎其用六

味之害反以為曾用過六味而 既成燥實堅之證仲景不

得已而以承氣湯下之此權宜之霸術然諄諄有虛人老

弱人之禁故以大柴胡代之 八味湯即仲景之方也去桂

得之方計不出此而遺承氣之霸術又自知此方之為害

造大柴胡代之仍舊不離大黃等藥其識識仲景之思

味誤人如此嗚呼下愚之無忌憚至於此極真病狂之人

本不足與辨所以辨者為天下有一隙之明者亦為所惑

而不 陶氏以六一順氣湯代之豈以二湯為平易平代之

而愈所喪亦多矣况不愈者十之八九哉 六一不知 當時

若多用六味地黃飲子大劑服之取效雖緩其益無窮

傷寒死不論陰虛發熱者小便必少大便必實其上證口

渴煩燥與傷寒無異云與傷寒無異則實非彼之承氣者

不過因亢則害下之以承真陰之氣也何承步語也

直探其真陰之源而補之如亢旱而甘霖一施土木皆濡

頃刻為清涼世界矣何不可哉況腎水既虛矣復經一下

之後萬無可生之理如果腎虛之證則絕不是傷寒仲景

仲景當日用承氣亦不從未嘗以承氣治虛勞如係傷寒則

論中詳言之一矣竟無一生者耶慎之慎之吾為此懼故於補大要

醫貫砭

卷上

天

合而言之真知其為陽虛也則用補中益氣湯陽虛者最

害反用升柴以提之乃速之死也東垣製此方為胃陽下

陷而設非泛指陽虛也如此誤解即東垣亦不瞑目於地

矣真知其為陽虛直中也則用附子理中湯真知其為陰

虛也則用六味腎氣湯如有邪不得用真知其為陰虛無火也則

用八味腎氣湯有邪亦不得用其間有似陰似陽之假證也則用

寒因熱用之法從之不可少誤惟以補正為主不可攻邪

正氣得力自然推出寒邪汗出而愈前此泛說不辨邪之

直云不可攻邪竟不論何經傷寒只將六味八味二方大

劑與服使熱地杜附等發汗而愈將仲景當日一片苦心

也養好泰盜百戰百勝戰之善者也不戰而屈人之兵善

之善者也故曰善戰者服上刑傷哉仲景

呂氏曰正氣得力二句灼然妙理與景岳論參看更明白

然二字妙甚從東垣補中益氣論來此等絕滅天理之談

其肺腸亦獨有會心贊嘆如此

溫病論

治溫病者將如何予有一法經曰不惡寒而渴者是也不

惡寒則知其表無寒邪矣曰渴則知其腎水乾枯矣溫病

陰之證且渴者多屬陽非少

明何以知其必腎乾也蓋緣其人素有火者冬時觸冒寒

氣雖傷而亦不甚惟其有火在內寒亦不能深入所以不

即發而寒氣伏藏於肌膚溫是天氣非指人之本體也如

寒病耶是何等人自冬至三四月歷時既久火為寒鬱於

中亦久將腎水熬煎枯竭從無外感之邪藏於

木也精癸水而生腎水既枯至此時強木旺無以為發生

滋潤之本故發熱而渴非有感冒也明明說是冬時觸冒

何前後海藏謂新邪換出舊邪非也等不通若復有所感

表又當惡寒矣予以六味地黃滋其水以柴胡辛涼之藥

舒其木鬱隨手而應此方活人者多矣柴胡為少陽疎散

之藥加入腎經滋

醫貫疏

卷上

三

補藥中將引六味入少陽耶將并紫胡納入少陰耶製方之義已絕彼曾駁人參不可入六味中乃紫胡反可入六味真喪心予又因此而推廣之凡久時傷寒者亦是鬱火之證也

證何云鬱火若其人無火則為直中矣有人者變為溫病無火者便是直中天下之證豈可派定無火入必患此耶惟其有火故由皮毛而肌肉而腑臟傷寒無不由皮毛入者今人皆曰寒邪傳裏寒變為熱既曰寒邪何故入內而反為熱又何為而能變熱耶不知即是本身之火為寒所鬱而不得泄一步反歸一步日久則純熱而無寒矣所以用三黃解毒解其火也升麻葛根即火鬱發之也三承氣即土鬱奪之小柴

胡湯木鬱達之也此理甚簡而易只多了傳經六經諸語支離多岐傷寒傳經之說自內經熱論及仲景傷寒論諸書相傳以來數千年守之不變淺學不能全窺少有所誤非殺入即寡效然無有能出範圍者今乃敢肆然以為無傳經六經等法且譏訕古聖以為支離多岐此大理絕滅之談原無足辨但恐世之崇凡雜證有發熱者信者終無悟日故又不能已於言也凡雜證有發熱者皆有頭疼項強目痛鼻乾脇痛口苦等證何必拘為傷寒局傷寒方以治之也雜證原不必守定傷寒法但傷寒諸方加減出入雜證所不能外惟六味則斷斷無治余於冬月正傷寒獨麻黃桂枝二方作寒鬱雜感之理也

治鬱亦其餘但不惡寒者作鬱火治鬱火另是一證非傷寒類也此二語專為欲用道途此不佞之創論也聞之者孰不駭然吐舌及閱

醫貫疏

卷上

三

虞天民醫學正傳傷寒篇云有至人傳曰傳經傷寒是鬱病如此亂道不知余一見之不覺竊喜以為先得我心之同然及考之內經帝曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰寒氣外凝內鬱之理也何等文理腋理堅緻玄府閉密則氣不宣通濕氣內結與濕何涉中外相薄寒盛熱生寒極生熱便不故人傷於寒轉而為熱汗之則愈則外凝內鬱之理可知觀此而余以傷寒為鬱火者不為無據故特著鬱論一篇此為造內經又怪異之極者內經熱論云人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死帝曰願聞其狀下文岐伯即以傷寒傳經及兩感病狀分別言之明白詳悉何嘗有外凝內鬱等語

經文無思憚已極至云傳而為熱尤不憚人事蓋傷寒第一日在水陽即已發熱不必傳也故本經名為熱論今改則字為傳字或固不知熱之何以為熱所以上文造出有火無火等邪說也

鬱病論

內經曰木鬱則達之火鬱則發之土鬱則奪之金鬱則泄之水鬱則折之然調其氣過者折之以其畏也所謂瀉之

內經五法之註乃出自張子和非唐玄菟文故多誤無之論口予既改釋其誤又推廣其義以一法代五法自而出可怪予既改釋其誤又推廣其義以一法代五法自從無一法可代幾法者若爾此書何止可代五神而明之法直以六味八味代盡自古以來萬病萬法也

屢獲其效故表而書之蓋東方先生木水者生生之氣即

火氣空中之火附於木中木鬱則火亦鬱於木中矣在木中則

非空不鬱此也火鬱則土自鬱土鬱則金鬱而水亦鬱矣

然則非五鬱也此五行相因自然之理惟其相因也予以一

方治其木鬱則諸鬱皆因而愈一方者何道遙散是也方

中惟柴胡薄荷二味最妙蓋人身之胆木乃甲木少陽之

氣何以只是肝氣尚柔軟象草穿地始出而未伸此時被寒

風一鬱何以鬱必由寒風即萎軟抑遏而不能上伸不能上伸則

下冠脾土而金水併病矣何以一病必皆病惟得溫風一吹鬱氣

即暢達蓋木喜風肝為風藏最惡者風反云喜風風搖則舒暢若寒風則

畏矣溫風者所謂吹面不寒楊柳風也木之所喜也柴胡

薄荷辛而溫者柴胡薄荷正驅風之藥非即風也真乃亂道惟辛也故能發散

溫也故入少陽立方之妙如此其甚者方中加左金丸左

金丸止黃連與柴胡二味黃連但治心火吳茱萸氣燥黃連

以風為燥氣又燥能傷血也肝之氣亦燥同氣相求故入

肝以平木同氣相求如木平則不生心火火不利金而金

能制水不直伐木而佐金以制木此左金之所以得名也

此又法之巧者然猶未也一服之後繼用六味地黃加柴

胡芍藥服之以滋腎水俾水能生木此處又要生木而後

心火又旺銷鑢肺金左金又無用矣其意專為製用六味

而鬱則六味斷難下所以立山生木一法來則六味

又為必用之方作為必用之方作逍遙散者風以散之也地黃飲子者雨

以潤之也木有不得其天者乎此法一立木火之鬱既舒

木不冠脾土且土亦滋潤無燥痛之病金水自相生予謂

一法可通五法者如此必聯連說下方可一法代五法否則又要立一方矣豈惟是

哉推之大之千之萬之其益無窮凡寒熱往來似瘧非瘧

惡寒惡熱嘔吐吞酸嘈雜胸痛脇痛小腹脹悶煩躁盜

汗黃疸瘧疾疝氣殭泄等證皆對證之方也一法可代推

而至於傷風傷寒傷濕除直中凡外感者俱作鬱看可代

鬱實也

傷寒諸法余所謂不但一法可代五法凡天下萬病諸法

俱可代者誠然然然然然然然然然然然然然然然然然

然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然

然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然

然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然

然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然

然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然

法不則拒格不入非惟無益而反害之病有微甚治有逆從玄機之士不須予贅

古方逍遙散 柴胡 薄荷 當歸 芍藥 陳皮 甘草 白朮 茯苓

呂氏曰六味加柴芎亦立齋法也合逍遙散謂腎肝同治

但立齋去芍藥趙氏單用芍藥為不同二方同用萬無此理薛氏本庸醫之

首經此二人一表章九候人無盡矣

薛氏又曰以加味逍遙散六味丸治鬱自薛長洲始也說

然長洲之法實得之丹溪越鞠之芍藥即逍遙之歸芍

醫貫

卷上

舊

也越鞠之蒼朮即逍遙之白朮也越鞠之神麴即逍遙之

陳皮也越鞠之香附即逍遙之柴胡也越鞠之梔子即逍

遙之加味也但越鞠峻而逍遙則和矣越鞠燥而逍遙則

潤矣此則膏出於鹽後來居上亦從古作述之大凡如東

垣之補中益氣比枳朮萬全無弊矣然豈可謂枳朮之謬

而禁不用哉此段議論不但明末庸醫之技盡盡見而呂氏之分毫亦不曉亦和盤托出矣古人治病一

病有一病之方一方有一方之藥一藥有一藥之性一藥

增損方名即別七情六淫各有專治譬如父子夫婦有天

地諸病配合者分毫不可假借肉桂不容易以附子黃連

何得易以石膏此醫道之所以難也今云此藥即可當某

藥倘有人曰某人即我之父也某人即我之夫也人盡以

為亂倫矣為此說者於古人治病之法立方之義用藥之

妙何嘗夢見哉

醫貫卷上終

醫貫

卷上

舊

醫貫卷下

吳江徐靈胎泗溪著

男 燦陽和校

論血證

六淫中雖俱能病血其中獨寒氣致病者居多寒氣致病亦間有之

備要以此為主是何肺腸何也蓋寒傷榮風傷衛自然之理又太陽寒

水少陰腎水俱易以感寒一有所感皮毛先入肺主皮毛

水冷金寒肺經先受血亦水也故經中之水與血一得寒

氣皆凝滯而不行咳嗽帶痰而出問其人必惡寒切其脈

必緊視其血中間必有或紫或黑數點此皆寒淫之驗也

醫貫

卷下

一

以上數種極之病何醫者不詳審其證便以為陰虛火

嘗無之一誤則立斃矣動而概用滋陰降火之劑病日深而死日迫矣余嘗用麻

黃桂枝湯而愈者數人皆一服微汗而愈蓋汗與血一物

也奪血者無汗奪汗者無血此二語出靈樞營衛生會論

不可再發其汗汗多之人不可再去其血乃反引為脫血

者必重出汗之證其顛倒至於此極而呂氏偏以至理二

字贊之瘧人說夢寐余讀蘭室秘藏而得此意因備記以

廣其傳

麻黃桂枝湯 人參 麥冬 桂枝 當歸 甘草

黃芪 白芍 五味子 此方出東垣蘭室秘藏治吐血門

寒鬱為火而得吐血證者仍從表

散原有此理但亦須有先後次序即使一方之中欲兼顧

本原亦須擇其兩不相礙古人曾有合用者用之始不害

製方之義乃散者散者寒者寒者熱者熱者上者下者輕者重者表

者裏者燥者潤者一齊并用將使此劑何所適從哉蓋藥

味既亂生人固難殺入亦不易服之或不至於死而竟愈

亦間有之但古聖立方原不有定法最為嚴謹至唐人專重

藥性規矩雖寬然古法仍不甚失至宋末猶有存者自東

垣出而法度乃遂蕩然特功夫頗深自成一派推崇已久

有言不信惟願天下後世將內經及金匱傷寒

等書沉潛參究有得於心自能明辨其是非也

客曰吐血可用辛熱為扶陽抑陰始聞命矣然復有真陰

真陽之說可得聞乎曰世之言陰陽氣血盡之矣誰則豈

知火為陽氣之根水為陰血之根乎陰陽屬二氣水火屬

五行吾所謂水火又非心腎之謂人身五行之外另有一

者五行醫貫

醫貫

卷下

二

無形之火無形之水流行於五臟六腑之間陰陽二氣內

謂之氣自然無形謂之水火則有形矣乃又云無形

之水火故作多妙之談以欺世其實只見其支離耳惟其

無形故人莫知試觀之天日為火之精故氣隨之月為水

之精故潮隨之日月未如星家看五行者必以太陽太陰

為主然此無形之火又有一太極為之主宰將辛熱之

恐尚則又微乎微矣此天地之正氣而人得以生者是立

命之門謂之元神無形之火謂之元氣無形之水謂之元

精寄於兩腎中間故曰誰如此五臟之中惟腎為真餘臟

理乎此真水真火真陰真陽之說也

又問曰真陰真陽與血何干乎曰子但知血之為血而不知血之為水也人身涕唾津液淚汗便溺皆水也獨血之水隨火而行故其色獨紅腎中之真水乾則真火炎血亦隨火而沸騰腎中之真火衰則真水盛血亦無附而之上從未聞有真水盛而得病者○火無附而升理之所惟水有水亦無附而升非笑談乎水之為物何必有附也惟火莫其位而氣血各順布焉故以真陰真陽為要也

薛立齋遇張東谷談命時出中庭吐血一二口云久有此證遇勞即發余意此勞傷肺氣其血必散視之果然與補中益氣湯加門冬五味山藥熟地茯神遠志服之而愈

醫貫砭

卷下

三

呂氏云此證今人必混入歸脾矣看古人分明不苟處肺氣吐血用歸脾湯間或有之但斷斷不用補中益氣耳況補中益氣湯中門冬五味熟地與升柴同用惟薛氏效法東垣者有之於古人製方之義全失繆種流傳至趙氏等而極真堪痛心者也或云既如此不通何以服之有效蓋製方與選藥原屬二道苟其藥不盡與病相反一味合宜即有小效但藥是而不成方或不能速愈或不能全愈或愈而有弊耳非謂製方無法人參竟不補附子竟不熱也惟急證危證大證奇證緊要關頭而製方有乖則徒有害而無益學者豈可因其有小效而遂奉為章程耶且安知無陰受其害而不覺者亦安知無明受其害而諱言者

論八味丸

八味丸 治命門火衰不能生土致脾胃虛寒飲食少思大便不實下元衰憊臍腹疼痛夜多漩溺等證 熟地

山藥 山黃 丹皮 茯苓 澤瀉 肉桂 附子 按八

於仲景金匱要略中凡五見一見於第五篇云治脚氣上入少腹不仁再見於第六篇云虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣丸主之三見於第十二篇云夫短氣有微飲當從小便去之腎氣丸主之四見於第十三篇云男子消渴小便反多飲一斗小便亦一斗腎氣丸主之五見於第十四篇云婦人轉胞不得溺但到小便則急腎氣丸主之觀此五條皆瀉少腹腰膝寒濕之藥為多蓋腎者水藏凡水病皆歸之故用茯苓澤瀉山藥等利水之藥而腎虛惡燥故又用熟地黃肉桂等滋陰之藥又水為寒邪故用附桂等助陽通痹之藥相濟而和成德以通腎氣利小便為主此八味之正義也孰知趙氏竟以之為補先天真火并能補太極之方不但仲景之所不料即自古遺方者亦不料也○又按古法只有乾地黃生地黃並無熟地黃熟地黃乃後人製法以之入滋補下焦藥中頗為得宜若入湯劑及涼血等藥甚屬不合蓋地黃專取其性涼滑利熱則膩滯不能流行矣况外感未消痰火未除一藥用熟地

醫貫砭

卷下

四

為害加減不依易老亦不效今人有加人參者人參乃是尤甚加減不得腎經人參不可加柴 有知黃柏知母者有脾經藥到不得腎經人參不可加柴 有知黃柏知母者有欲減澤瀉者皆不知立方本意也 加知柏不知立方之本本意 意加柴胡獨知立方之本

水火論

坎乾水也氣也即小而井大而海也兌坤水也形也即微而露大而雨也 井海之水為氣雨露 一陽陷於二陰為坎坎以水氣潛行地中 坎為水何以為萬物受命根本故曰潤萬物者莫潤乎水一陰上徹於二陽為兌兌以有形之

水普施於萬物之上兌澤也如何普施萬物之上為養生之利澤故曰

說萬物者莫說平澤明此二水可以悟治火之道矣心火

者有形之火也相火者無形之火也無形之火內燥熱而

津液枯然則命門之火以五行有形之兌水制之者權也

兌水是身中何物火害人是耶吾身自有上池真水氣也無形者也以

無形之水沃無形之火無形之水又是身中何物如何是

也自解常而可久者也是為真水真火升降既宜而水火既

濟矣醫家不悟先天太極之真體又說到太極更說范矣不窮無形

水火之妙用而不能用六味八味之神劑者其於醫理尚

醫貫砭

卷下

五

欠大半上文說乾說坤說坎說兌以及有形無形真水真火太極真體何等廣大淵微不知有何等出神入

化之治法乃竟不過六味八味二方而八卦太極之道已

無不貫串通天徹地學問只要記此二方足矣豈非夢境

六味丸說

六味丸 治腎虛作渴小便淋秘氣壅痰涎頭目眩暈眼

花耳聾咽燥舌痛腰腿痠軟等證及腎虛發熱自汗盜汗

便血諸血失音水泛為痰之聖藥水泛為痰是濕在上焦

血虛發熱之神劑又治腎陰虛弱津液不降敗濁為痰血虛

源所或致欬逆黃肉熟地亦非治欬之藥又治小便不禁

收精氣之虛脫為養氣滋腎制火導水使機關利而脾土

健實健地黃肉豈熟地 黃肉 山藥 丹皮 茯苓

澤瀉

地黃山藥澤瀉皆潤物也此方所補之水無形之水六味

之藥何以能補無形之物愈說得高妙愈淺陋矣物之潤者亦無形此又亂道之

有潤者皆無形然則天下有潤者皆無形然則天下故用之

呂氏曰明薛新甫治陰虛火動用丹溪補陰法不驗者以

六味代之立應自此以來為補陰之神方矣趙氏得力於

薛氏醫案而益闡其義觸處旁通外邪雜病無不貫攝雜病一方治盡稍有

而六味之用始盡然趙氏加減之法知該者決不為此言

醫貫砭

卷下

六

甚嚴又稍異於薛氏高鼓鑒嘗詳論兩家加減之法而附

以己意呂氏之學實得之高鼓鑒高鼓鑒則首宗趙氏之

呂氏選時文講性理之故而信其醫且只記兩方可治

盡天下之病愚夫又甚樂從從貽害遂至於此極所以罪首

禍魁高不能辭而承流揚波呂之選尊更無窮世所刻鼓

峰心法高呂醫案等書一派相承辨之不勝其辨知趙氏

之謬則餘者以授其門人甚辨今述之左

六味丸薛氏一變而為滋腎生肝飲用六味減半分而而

加柴胡白朮當歸五味合逍遙而去白芍藥加五味合都

氣意也柴胡白朮自是二藥何以見得必以生肝故去芍

藥而留白朮甘草以補脾六味方中何以補脾者生金而

制木也以制爲生相生之法別是一義不得如此講告云

味補腎即便生白木補脾生金而制木遠隔幾藏則六

肝奈何奈何天地自然之序也又一變而爲人參補氣

湯其義愈變化無窮真游龍戲海之妙去澤瀉而加參芪

木歸陳皮甘草五味門冬參芪木陳又加夫白木之與六

味其化相反焉得合之曰從合生脈來生脈中無白木且

耶則有自然相通之義借茯苓以合五味異功之妙

是異攻用當歸黃芪以合養血之奇其不用澤瀉者蓋爲

發熱作渴小便不調則無再竭之理理無再竭當歸生

生小便也生脈之所由來既當生脈異功之可以轉入

醫貫砭卷下

也且水生高原氣化能出肺氣將敗故作渴不調此所以

急去澤瀉而生金滋水復崇土以生金其苦心可不

枉勞苦心又一變而爲加味地黃丸又名抑陰地黃丸

抑之加生地柴胡五味復等其分愈出奇矣柴胡從道

遙來生地從固本來五味仍合都氣自是一方自是一方一藥

併名曰偶方之外絕無可以牽連之道乃必指方中某藥

從某方求則六味之中熟地從何方求黃肉從何方求耶

其曰耳內痒痛或眼昏痰喘或熱渴便澀而總爲肝腎陰

虛則知其陰虛半由火鬱而致也柴胡以疎之鬱火非生

非疎不可疎之所以抑之生地涼血便有瀉義瀉之所以

抑之也生地又是瀉陰之藥非但

丸以赤茯苓換白茯苓加川棟子當歸史君子川芎

怪者史君子治小兒疳積諸藥俱在胃中各同六味

入腎將疳蟲已入腎即又川芎乃升提之品將提六味於

川芎亦入腎也盡是直瀉厥陰風木之藥仍是肝腎同治

之法緣諸疳必有蟲皆風木之所化肝有可伐之理但伐

其子則傷其母故用六味以補其母去澤瀉者腎不宜再

洩也趙氏則以爲六味加減法須嚴其善用六味雖薛氏

啓其悟端而以上變化藥未透其根底故盡廢而不能用

醫貫砭卷下

見其能合當歸柴胡而去芍藥則反用芍藥爲疏肝益腎

此則其聰明也乃謂白木與六味水土相反人參脾藥不

入腎此二句乃趙氏一隅之明但不

細參薛氏畢竟趙氏拘淺薛氏諸變法似乎寬活然其實

嚴密學者當善悟其妙薛氏諸加減法皆憤已極趙氏之

意蓋以爲六味一方不必多用加減之法而已無病不治

耳然其以薛之加減爲未當不可謂其無一陰之明乃呂

氏又不以爲然而轉崇薛氏則其昏憤更甚於趙矣○古

氣血陰陽輕重奇偶種種不同絲毫不可假借其間亦有

方中曾有合用者乃可加入否則即爲杜撰其云從某方

某方知有人作文自註云此也字從某書來此者字從某
文來豈不令人噴飯耶呂氏述其說而稱之我不厭薛氏
而概呂氏矣 而以意通之大旨以肝腎為主而旁救脾肺則安
頓君相二火不必提起而自然帖伏矣亂道一篇到底是其心殆如糞土矣

八味丸說

君子觀象於坎而知腎中具有水火之道焉夫一陽居於
二陰爲坎此人生與天地相似也今人入房盛而陽事易
舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真水竭則陰
冬不寒真火息則盛夏不熱素問調經論云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛生外熱陰

醫貫

卷下

九

盛生內寒蓋陰陽或偏則畏寒畏熱此之謂病若陰冬不
寒盛夏不熱則是陰陽充足之候去天神不遠矣豈反是
真水真火已竭爲將死之人乎是方也熟地山萸丹皮澤瀉山藥茯苓皆
濡潤之品澤瀉茯苓丹皮所以能壯水之主肉桂附子辛
潤之物能於水中補火所以益火之原水火得其養則腎
氣復其天矣益火之原以消陰翳即此方也蓋益脾胃黃肉並不
能益脾胃而培萬物之母其利溥矣

相火龍雷論

火有人火有相火人火者所謂燎原之火也過草而熱得
木而燔可以潛伏可以水滅可以直折黃連之屬可以制

之相火者龍火也雷火也得濕則燐過水則燔不知其性
而以水折之以濕攻之適足以光焰燭天物窮于止矣識
其性者以火逐之則焰灼自消炎光撲滅今人率以黃柏
治相火是水滅濕伏龍雷之火愈發矣龍雷之火每當濃
陰驟雨之時火焰愈熾或燒燬房屋或擊碎石石其勢誠
不可抗惟太陽一照火自消滅此得水則熾得火則滅之
一驗也非附引火歸原引之下達耳是補龍雷之火非滅之也不顧文理專以大言惑愚人耳

陰虛發熱論

世間發熱類傷寒者數種至於勞心好色內傷真陰真陰

醫貫

卷下

十

既傷則陽無所附故亦發熱其人必面赤煩躁口渴引飲
骨痛脈數而大或尺數而無力者是也惟丹溪發明補陰
之說以四物湯加黃柏知母此用血藥以補血之不足者
也世襲相因屢用不效何耶蓋因陰字認不真誤以血爲
陰耳當作腎中之真陰即先天也內經曰諸寒之而熱者
取之陰諸熱之而寒者取之陽所謂求其屬也王太僕先
生註云大寒而盛熱之不熱是無火也大熱而盛寒之不
寒是無水也又云倏忽往來時發時止是無火也晝見夜
伏夜見晝止時節而動是無水也當求其屬而主之無火

者宜益火之原以消陰翳無水者宜壯水之主以鎮陽光
必須六味八味二丸出入增減以補真陰此又自造王太僕語而誤者諸
藥之五句出素問至真要大論王註言益火之源以消陰
翳壯水之主以制陽光故曰求其陽也此五句是原文
乃熱仍在此不可以驅當於陰分增其水以配火則陰
虛而陽自代不用而用補所謂壯水之主也寒病以熱
藥治其寒寒宜自已乃寒仍在此不可以驅當於陽分增
益其火以配水則陽旺而陰自衰亦不用而用補所謂
益火之源也何等明白下文即接云但益心之陽寒亦通
行強腎之陰熱之猶可明指心為陽腎為陰即經文司大
運氣已屬不倫又造出無數亂道且指出必須六味八味
九一之句似亦是王太僕之言何等荒唐自此說行人竟以
王太僕以來不易之神方矣嗚呼豈不冤哉 屢用屢效

若有產後及大失血後陰血暴傷必大發熱亦名陰虛發
熱此陰字正謂氣血之陰若以涼藥正治立死正所謂象
白虎湯證誤服白虎湯必死當此之時偏不用四物湯有
形之血不能速化幾希之氣所宜急固須用獨參湯或當
歸補血湯使無形生出有形來血脫氣亦脫故急固其氣
則其始終用參亦非一用參而不必服藥也若不使脫盡乃可用大補之
云生出非但緩不及事且全失用參之義矣 此陽生陰
長之妙用不可不知也或問曰子之論則詳矣氣虛血虛
均是內傷何以辨之予曰悉乎子之問也蓋陰虛者而必
赤無根之火戴於上也若是陽證火入於內而必不赤

之證陽明火旺而面赤腎火上淨而亦赤何云陽證無面赤者其口渴者腎水乾枯引水
自救也渴最甚但口渴雖渴而舌必滑脈雖數而尺必無
力甚者尺雖洪數而按之必不鼓此為辨耳雖然若問其
人曾服過涼藥脈亦有力而鼓指矣戴復菴云服涼藥而
脈反加數者火鬱也宜升虛人敗證總無升宜補切忌寒
涼犯之必死臨證更宜詳辨毫釐之差枉人性命慎哉

咳嗽論

外感風寒而咳嗽者今人率以麻黃枳殼紫蘇之類發散
表邪謂從表而入者自表而出如果係形氣病氣但實者
一汗而愈若形氣病氣稍虛者宜以補脾為主治嗽正與
安見有外感咳嗽而佐以解表之藥補脾中如何容得解
而用芩木等藥者表之藥宜立方之蓋
不通何以故蓋肺主皮毛惟其虛也故湊理不密風邪易
以入之若肺不虛邪何從而入耶然則竟不必問其何
人所以製參蘇飲中必有參人參本不為補脾而設且桂
枝湯中有芍藥甘草解表中兼實脾也芍藥甘草並非為
家註其明且桂枝補脾而設傷寒諸
亦非治嗽方也 脾實則肺金有養皮毛有衛已入之邪
易以出邪已在內而補之則補邪矣世有賊未去而堅築
身不出墻垣以為如此則賊易去者非至愚乎當改云已
入之邪終後來之邪無自而入矣若專以解表則肺氣益

虛腠理益疎外邪乘間而來者何時而已

芪甘草以補脾兼桂枝以驅邪

肺而治脾虛則補其母之義也

之疾能行藥氣相生耶

仁齋直指云肺出氣也腎納氣也肺為氣之主腎為氣之

本凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此

腎虛不能收氣歸元當以地黃丸安腎九主之

母徒從事於肺此虛則補子之義也

焉五行之間惟肺腎二臟母盛而子宮受邪

醫貫疏

則何以何則肺主氣肺有熱則氣得熱而上蒸不能下生

反受邪何則肺主氣肺有熱則氣得熱而上蒸不能下生

又何以蓋母藏子宮子隱母胎凡人肺金之氣夜臥則歸

藏於腎水之中今因肺受心火之邪

而腎水乾枯有火

是肺自病耶是邪病耶若是肺病肺氣歸肺不得為病

若邪病則肺氣欲歸之邪藏於腎而後為不病乎

問吐血多起於欬嗽欬嗽血者肺病也方家多以止嗽藥

治肺兼治血而不效何也曰諸書雖分咳血嗽血出於肺

咯血唾血出於腎余謂咳嗽咯唾皆出腎蓋腎脈入肺循

喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中故二臟相連病

則俱病而其根在腎

每語必與古人相戾誠何心也

下焦之血必由咳吐血也

六味八味咳唾六味八味兩藥方耳不知與趙氏何恩每

病非此不治即使與此兩藥方耳不知與趙氏何恩每

經然後用此二方其或可也

極極之夫陰陽太極則虛處可假借者於是二方

書津液論云天地定位水位乎中人

上為痰在下為水

血從毛竅中出為汗可見痰也水也血也一物也

意者諸氏明人身上下皆有水並非謂

四者即一物也其動輒誣古人如此

乃腎水挾相火炎上也

九獨補腎水

不損脾胃久服則水升火降而愈又須用人參採肺

喘病在於熱條下華佗云肺氣盛為喘活人書云氣有餘

喘論

醫貫疏

卷下

三

則喘後世集證類方不過遵此而已獨王海藏辨云氣盛
當作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛與有餘則清肅下
行豈復爲喘以其火入於肺炎癰真陰衰與不足而爲喘
焉蓋衰二字誤解不得經云邪氣盛則實精氣奪則虛故
凡言盛者皆指邪氣凡言虛者皆指精氣然盛虛有二
種有外感及別藏之氣來乘而盛者有本經之氣血結聚
而盛者有外感及別藏之邪消伐而虛者有本經之氣血
衰少而虛者病情不同治法亦異嗟乎盛衰二字所宜
極淺極易而醫者聚訟紛紜千古夢夢可勝長嘆所言盛
與有餘者非肺之氣也肺中之火也此何夢夢即如腎有
偏六淫之氣皆爲有餘何但火哉海藏之辨超出前人
發千古之精奧惜乎起其端未竟其火之所由來愚謂火
之有餘水之不足也此專爲要用六味然外來
之火不必盡水之不足也陽之有餘
陰之不足也凡諸逆衝上之火皆下焦衝任相火出於肝
腎者也故曰衝逆腎水虛衰相火偏勝壯火食氣銷鑠肺
金烏得而不喘焉內經云腎者主水主臥與喘也喘何嘗
頭腦但喘雖屬腎而因各不同治
法亦異非六味一方所能盡耳須用六味地黃加門冬
五味大劑煎飲以壯水之主如上焦未清痰涎湧結服此
終無愈則水升火降而喘自定矣蓋緣陰水虛故有火有
火則有痰有痰則咳嗽咳嗽之甚則喘謂凡喘諸只此陰
虛一病六味一方豈不當與前陰虛和火論參看
孟浪

喉咽痛論

喉與咽乃一身之緊關繫也經曰足少陰所生病者口
海舌乾咽腫上氣噤乾及痛素問云邪客於足少陰之絡
令人咽痛不可納食又曰足少陰之絡循喉嚨通舌本凡
喉痛者皆少陰之病此又亂道靈素手足少陰足厥陰少
陽足陽明手少陽少陰諸經皆有喉
咽之證今皆抹殺專指爲腎經之疾
然後可獨用六味八味真苦心也但有寒熱虛實之分
少陰之火如奔馬逆衝到咽喉緊鎖處氣鬱結而不得舒
故或腫或痛也其證必兩頰口乾面赤痰涎湧上其火脈
必數而無力蓋緣腎水虧損亦有實
火者相火無制而然須用

醫貫疏

卷下

其

六味地黃門冬五味大劑作湯服之喉痛之扶風火者十
居八九即以滋膩酸
敏之藥投之百不一生如辛酉壬戌之間咽喉痛者中人
而五不但服溫燥之藥者立斃即清涼之藥而少加重濁
者尚且不救余治以百數皆以辛寒清涼之藥又有色慾過
散之藥不失一人若依此方無一活者矣度元陽虧損無根之火遊行無制客於咽喉者須八味腎
氣丸若遇陽明有火
者不立斃手大劑煎湯水冷與飲使引火歸原庶
幾可救此論陰虛咽痛治法如此正諸氏所謂上病瘵下
也人之喉咽如曲突曲突火災若以水自上灌下突爆裂
矣如曲突之火已熾炎及
屋宇安得不以水沃乎惟竈牀下以盆水映之上炎即
熄此上病瘵下之一驗也

有急喉痺者其聲如鼽痰如拽鋸此為肺絕之候此乃氣證宜入類中風條下急喉痺乃風火之證上脫之耳不得誤引且果係喉痺人參薑汁豈不立殆耶連宜人參膏用薑汁竹瀝放開服如未得膏先煎獨參湯救之服早十全七八次則十全四五遲則不救

眼目論

經曰五臟六腑之精皆上注於目而為之精腎藏精故治目者以腎為主明說為之精則即眼之精矣明說五臟六腑之精則五臟六腑各有精矣若指腎藏精之精即是此精將目中之脂膏盡在目中耶目雖肝之竅子母相生腎肝同一治也併肝腎為一絕要專用六味一方耳

醫貫砭

卷下

七

又有陽虛不能抗陰者若因飲食失節勞役過度脾胃虛弱下陷於腎肝濁陰不能下降清陽不能上升天明則日月不明邪害空竅令人耳目不明夫五臟六腑之精皆稟受於脾土而上貫於目此精字乃飲食所化之精非天之元精也內經明云五臟六腑之精皆上注於目而為之精又云目者五臟六腑之精也營衛視聽之所常營也神氣之所生也其營衛如此偏要說是脾土飲食所化之精反經背道已極至稟受脾土二句又是假造經文用東垣益氣聰明湯

張子和云目不因火則不病白輪病赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與脾也赤脈貫目火

自甚也能治火者一句可了亦病之見六淫但子和一味寒涼治火余獨補水以配火亦一句可了若係邪火豈至於六淫七情錯雜諸證詳倪仲賢原機啓微此書甚好而時立證又為之參補深明壯水之主益火之原甚有益於治目者也益火之六味何可用耶

口瘡論

口瘡上焦實熱中焦虛寒下焦陰火中焦何以必定虛寒虛寒而通陽於上者各經傳變所致當分別而治之如發熱作渴飲冷此實熱也輕則用補中益氣實熱反重則

醫貫砭

卷下

六

用六君子湯實熱而至發熱作渴反用參耒橘半是何肺腸飲食少思大便不實此中氣虛也亦有邪火用人參理中湯大熱大補之藥用於口瘡之證其不變為危險乎足逆冷肚腹作痛此中氣虛寒用附子理中湯此是口瘡兼證或是口瘡本證兼證者因口瘡誤治誤成此等敗證也本證者本有虛寒之證通火而成瘡也此則不治瘡而治本不可以此為治口瘡之方補熱內熱也且口瘡治法多端豈寒熱虛實四字所能盡乎發熱豈宜不時而熱此血虛也用八物加丹皮五味麥冬發熱豈宜用五味發熱作渴唾痰小便頻數此腎水虛也用八味九作渴吐痰何得用八味且小便數日晡發熱或從少腹起陰虛也用四物亦不盡屬虛寒也日晡發熱或從少腹起陰虛也用四物參朮五味麥冬不應用加減八味九口瘡而日晡發熱則屬陽明矣以下兩方

皆不合且四物湯加入參未確能無章生治口瘡之法又
不應而忽改作八味丸則是以人試藥矣○按不應二字
出之薛氏醫案薛氏治病每云某病余投某藥不應又改
某藥又不應乃曰然則非此病矣又換某藥數劑而愈
如此極多不明明是以藥試病矣幸而天命未絕能待換方
而愈豈無不應之時不及換方而死且再換一方仍不應
而致死者豈少哉蓋能醫藥者何病病則思藥力不至不
能有功況全熱相反以藥試之耶醫案便鄙庸陋遊移恍
惚至薛而極後人猶奉為模範何愚之甚也 或問虛寒何以能生口瘡而反用

附子理中耶蓋因胃虛穀少則所勝者腎水之氣寒亦何
之氣或因他藏或因本藏上盛必腎水逆而下承之反為寒中脾胃
衰虛之火被迫炎上作為口瘡經曰歲金不及炎火乃行
復則寒雨暴至陰厥乃格陽反上行民病口瘡是也故用

醫貫砭

卷下

七

參朮甘草補其土薑附散其寒既成瘡則火已凝結不先
安有不則火得所助接引而退舍矣散解降納而惟峻補助火

消渴論

消渴之疾余有一說馬人之水火得其平氣血得其養何
消之有其間攝養失宜水火偏勝津液枯稿以致龍雷之
火上炎熬煎既久腸胃合消五臟乾燥令人四肢瘦削精
神倦怠故治消之法無分上中下先治腎為急內經云心
傳為胃消大腸移熱於胃善食而瘦謂之食亦則上中二
消明明是心與大腸之火與腎無干反盡從腎治耶兄腎
火上衝之證往往不甚渴即渴亦不能多飲蓋腎中之火
既上則下焦之陽衰陽衰則陰盛水為陰屬故不能多飲

也凡辨陰火實火之法俱視此惟六味八味及加減八味
奈何欲用二方遂不及詳察耶九隨證而服降其心火滋其腎水則渴自止矣

或問曰下消無水用六味丸以滋少陰腎水矣又加附子
肉桂者何蓋因命門火衰不能蒸腐水穀水穀之氣不能
薰蒸上潤乎肺如釜底無薪鍋蓋乾燥故渴至於肺亦無
所稟不能四布水精並行五經其所飲之水未經火化直
入膀胱正謂飲一升溺一升飲一斗溺一斗此是下消之
證與肺又無試嘗其味甘而不鹹可知矣故用桂附之辛熱壯其少
陰之火竈底加薪枯龍蒸濕稿不得而生意維新惟明者

醫貫砭

卷下

三

知之味者鮮不以為迂也昔漢武帝病渴張仲景為處此
方仲景是漢獻帝時人與武帝相去二百餘年明明可考
乃造出此語何耶趙氏所談無往非夢而此則又夢之
最不至聖玄關今猶可想八味丸誠良方也瘡疽瘰癧後及
將瘡口渴甚者舌黃堅硬者及未患先渴或心煩燥渴小
便頻數或白濁陰痿飲食少思肌膚消瘦及腿腫腳軟口
齒生瘡服之無不效
經云諸痛瘡瘡皆屬於火又云水液
陰血大傷作渴煩躁孤陽欲越乃反
以辛熱逐水之藥速之死譬何深也

氣虛中滿論

中滿者證與鼓脹水腫無異何故屬之氣虛請得明言之

否曰氣虛者腎中之火氣虛也如此該腎中滿者中空似

鼓虛滿而非實滿也大略皆脾腎兩虛所致故治腫者先

以脾土為主須補中益氣湯或六君子湯溫補之水未去而補之

則補其脾脾土旺則能散精於肺通調水道下輸膀胱水

精四布五經並行矣或者疑謂喘脹水滿而又加純補之

劑恐益脹滿必須補藥中加行氣利水之品方妙此說深

似得病情終非大方家體治病而講體統無恥已甚蓋肺氣既虛不可

復行其氣腎水已衰不可復利其水利邪水正所以衛正水瀦之驅邪氣正所以保正氣豈并腎

精而亦利之耶純補之劑初時似覺不快過時藥力得

醫貫疏

行漸有條理矣

至於補腎以治腫其說難明蓋禹之治水行其所無事也

若一事疏鑿則失之矣當時禹亦何嘗不濬川鑿河哉據爾云必須補腎則禹當日祇日益

水之源今人之治腎水者牽牛大戟粗工之小智正禹之

所惡也間有用五苓五皮者以為中正亦轉利轉虛腎氣

愈衰而愈不能推送矣故須用補腎經曰腎開竅於二陰

腎氣化則二陰通二陰閉則胃腹脹故曰腎者胃之關

門不利故水聚而從其類也可知要利關門不是要補關門也引來却正與爾相左

又曰腎主下焦三焦者決瀆之官水道出焉可知以決瀆為主

號者州都之官津液藏焉必待三焦之火化始能出也內改

經文氣化二字為大化意在八味也孰知換此一字其獎遂百出乎經曰三焦病者氣滿小

腹光堅不得小便溢則水而為脹日溢口水而尚惟張仲景製金匱腎氣丸補而不滯通而不泄誠治腫之神方

薛立齋屢用屢效詳載醫案余依其案試之甚驗故詳著

焉世有患此幸無誕之乎

金匱腎氣丸 白茯苓 附子 牛膝 肉桂 澤瀉

車前子 山藥 山萸 丹皮 熟地

中滿之病原於腎中之火氣虛不能行水此方內八味丸

為主以補腎中之火八味為利水之劑說見前山藥茯苓

故以附子溫之肉桂通之澤瀉俱制土驅濕之藥而水為陰類陰然初起猶不即須利之惟生地黃肉桂為能滋潤以保腎

景製方之義也知腎氣丸為治水之藥即可知非全補腎

陽大極之藥若以此方治盡天下之病則是舉天下之病

皆以治水腫之法治之則三焦有所稟命浩然之氣塞乎

天地不必作如腎氣不虛而能行水矣內有附子肉桂辛

熱之品熱則流通又火能生土土實而能制水矣又有牛

膝車前二味最為切當方見金匱要略故名金匱腎氣丸

金匱並無車前牛膝少後

人所加亦後人所名也

又有一等純是陰虛者下一純字專為要用其證腹大臃

醫貫發

卷下

三

腫腰痛兩足先腫小水短澀喘嗽有痰不得臥甚至頭面皆腫或面赤口渴但其人飲食知味大便反燥醫見形腫氣喘水證標本之疾雜用利水之藥而益甚不知陰虛三焦之火旺與衝脈之屬火者同逆而上由是水從火溢水不能相合豈有水反從火溢者即有上積於肺而嗽甚則之亦宜引火達下不得用純陰藥也

為喘呼不能臥散聚於陰絡而為跗腫隨五臟之虛者入而聚之為五臟之脹皆相火泛濫其水而生病也

於火從無此論。腫脹用八味固是正治用六味則無此理矣蓋水勢橫逆得純陰之品則陰氣益旺且無辛力之藥則水道必不能開便或遇陰虛之人則用藥忌太燥熱耳此人治病六味八味不可缺一此論用八味而遺六味

則真陰又無著落所以勾出陰虛一種則六以六味地黃味仍不可缺六味有知亦感此周旋之德否

加麥冬五味大劑服之

飲之不殺不休親試有驗故錄

噎膈論

內經曰三陽結謂之膈三陽者大腸小腸膀胱也

明為二陽少陽為一陽此處三陽舊註指手太陽小腸足太陽膀胱言乃增出大腸來蓋誤以三陽為三陽經也

結結熱也大腸主津小腸主液大腸熱結則津涸小腸熱結則液燥膀胱為州都之官津液藏焉膀胱熱結則津液竭然而三陽何以致結熱皆腎之病也

蓋腎主五液又腎主大小便腎與膀胱為一臟一腑腎水

醫貫發

卷下

五

既乾陽火偏盛熬煎津液三陽熱結則前後閉澀下既不通必反干上直犯清道上冲吸門咽喉所以飲食不下也

何為水飲可入食物難下蓋食入於陰長氣於陽

之時陽氣已反引動胃口之火故難入水者陰類也同氣相投故可入

白沫者所飲之水沸而上騰也

食入者少渣滓消盡腸亦乾小而不寬大也

太僕云食入即出是無水也食久反出是無火也無水者壯水之主無火者益火之原

滋味可也若曰溫胃胃本不寒

虛此則又亂道矣爾論病必曰邪之所安其

燥之品

劉氏下以承氣鹹寒損胃津液愈竭無如補陰

絕少

夢遺并精滑論

治以腎肝為主經曰陰陽之要陽密乃固陽強不能密陰

氣乃絕陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃絕夫所謂陽強者乃肝腎所寄之相火強也所謂陰絕者乃腎中所藏之真陰絕也腎為陰主藏精肝為陽主疏泄誰此處疎泄不係肝也是故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則火不秘腎中相火偏要說是肝火凡肝火動者必上升而以不秘之火加易怒今人每入房之時必火升而大怒耶臨不藏之精有不夢夢即泄矣薛立齋專用六味地黃以補腎而治夢遺屢效縱有相火水能滋木水升而木火自息矣倘有脾胃不足濕熱下流者以前九為主煎服補中益氣湯以升提之此又怪異之極者濕熱如何提得且既有濕又屬脾胃亦何可用六味也

卷下

論補中益氣湯

補中益氣湯 黃耆 當歸 人參 炙甘草 陳皮

升麻 柴胡 白朮

或問曰古今稱補中益氣湯為萬世無窮之利其義云何曰此發前人所未發繼仲景不河間而立意義深遠也世人一見發熱便以為外感風寒暑濕之邪非發散邪從何出又不能灼見風寒暑濕對證施治乃通用解表之劑雜然並進因致斃者多矣東垣深痛其害創立此方以為邪之所湊其氣必虛內傷者多外感者間或有之蘇在明立此方以治

內傷而兼外感者何等平常必云天下竟無外感之病則亂道矣此人每舉一方必云此方能治天下之病不必更用別方縱有外邪亦是乘虛而入但補其中益其氣是何等肺腸將虛占治病之方一齊剿却而邪自退不必攻邪攻則虛者愈虛而危亡隨其後矣攻邪不足攻正倘有外感而內傷不甚者即於本方中酌加對證之藥而外邪自退所謂仁義之師無敵於天下也仁義之師亦非竟不用兵刃也或問曰余見先生動輒以先天後天立論余攷之易中先天後天之圖乾南坤北離東坎西等卦位於圖中甚無所合而先生屢言之不已其義云何曰怪乎予之問也余所謂先天者指一點無形之火氣也以火氣為先天其玄妙如此後天者指有形之體自藏府及血肉皮膚與夫涕唾津液皆是也既曰先天此時天尚未生何況有乾南坤北八卦對待之圖乎先天在天未生之前却不知到在人腹中專恃八卦之象非夢境曰然則伏羲此圖何為而設也余曰此非先天之圖乃中天八卦之圖歷古天之圖造出此名以遷就自天之圖造出此名以遷就自已亂道此等直是無人心者天位乎上地位乎下日出乎東水源乎西以承對日亦是怪論風雨在天上山雷在地下人與萬物位乎中予嘗見誰不邵子排列如此有先天八卦數其當今所用者止一文王後天圖誰用此出乎震齊乎巽相見

卷下

三

乎離致役乎坤悅言乎兌戰乎乾勞乎坎成乎艮以春秋
晝夜十二時相配因以定陰陽決生剋推而天文地理星
相醫卜無一不以此圖為則至於先天者無形可見何以圖
無形可見後天圖之有形可即易中帝出乎震之帝神也
見在何處神散人胡說此二句却是文王後天圖之
者妙萬物而為言之神是也此二句却是文王後天圖之
帝與神即予先天要論中所稱真君真主本係無形何以圖
在後天不得已而強立此名以為主宰先天之體以為何以圖
行後天之用東垣先生獨會其宗而以補中益氣方何以圖
柴胡升麻者正以升發先天之氣於脾土之中先天之氣
醫貴砭 **卷下** **圭**
味八味則云在腎中此要用補中益氣則云在脾土中况
先天之氣立於天尚未生之前獨升麻柴胡足以左之右
之真乾坤在真萬世無窮之利余所以諄諄為言也若飲
食失節寒溫不適脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣脾胃氣
衰元氣不足而火獨盛火者陰火也起於下焦元氣之賊
也壯火食氣少火生氣火與元氣不兩立必要將火滅盡
也壯火食氣少火生氣火與元氣不兩立必要將火滅盡
胡一勝則一負脾胃氣虛則下流肝腎名曰重強何以虛
說且流去是何物內經重強二字亦不如此講經云脾脈
太過則令人四肢不舉其不及則令人九竅不通名曰重
強此乃指脾之病脈言脈病則五臟陰火得乘其土位故
皆不和順也何嘗指下流肝腎耶陰火得乘其土位故
脾證始得則氣高而喘身熱而煩脈洪大而頭痛或渴不

止其皮膚不任風寒而生寒終又終外蓋脾胃之氣下流
使穀氣不得升浮是春生之令不行皆學舌語也則無陽
以護其營衛衛即衛身之陽氣也如遂不任風寒而生寒
熱此皆脾胃之氣不足所致也
傷寒發熱拂拂如羽毛之熱熱在皮毛三陽俱有壯熱之
肌膚為尤劇如內傷者肌體壯熱捫之烙手內傷者肌體壯熱捫之烙手
何皆只微熱內傷者肌體壯熱捫之烙手內傷者肌體壯熱捫之烙手
甚如何反右手氣口脈大於左手人迎三倍右手氣口脈大於左手人迎三倍
以為極熱右手氣口脈大於左手人迎三倍右手氣口脈大於左手人迎三倍
格之脈危證其氣口脈急大而數時一代而清代脈亦是其氣口脈急大而數時一代而清
內傷即現此脈且瀉是肺之本脈代是氣不相接乃脾胃瀉是肺之本脈代是氣不相接乃脾胃
脈亦不可承定也
醫貴砭 **卷下** **圭**
不足之脈大是洪大洪大而數乃心服刑肺急是弦急乃
肝木挾心火克肺金也其右關脈屬脾比五脈獨大而數
數中時顯一代此不甚勞役是飲食不時寒溫失所又何
鑒派定胃脈損弱隱而不見惟內顯脾脈如此胃脈損弱隱而不見惟內顯脾脈如此
如此胃脈損弱隱而不見惟內顯脾脈如此胃脈損弱隱而不見惟內顯脾脈如此
傷肺又俱說肺金若外傷則人迎脈大於氣口也若外傷則人迎脈大於氣口也
受冠絕無頭緒
或問曰丹溪云東南之人陽氣易以升不可服補中益氣
湯當令江以南之人果盡不當服乎曰東南指人之臟腑
而言也何云東南之臟不可服補中益氣湯耶然則肺何云東南之臟不可服補中益氣湯耶然則肺
腎謂之西北人矣作此語者其臟腑殆無人氣
其人上盛者必下虛其腎氣大虛矣急須填補北方先天

之元氣為要總而言之先天後天不得截然兩分上焦元氣不足者下陷於腎中也元氣本不存上焦即使上焦當亦有元氣如何陷入腎中當取之至陰之下下焦真陰不足者飛越於上部也陰氣如何能飛越焉可不引而歸原耶引陰歸原從水前問是以補中益氣湯與腎氣丸並用即前怪法朝服補陽暮服補陰互相培養

傷飲食論

大凡元氣完固之人多食不傷過時不飢若夫先因本氣不足致令飲食有傷矣過劑之藥一用飲食雖消但脾既已受傷而復經此一翻消化愈虛其虛明後日食復不化

醫貫砭

卷下

五

猶謂前藥已效藥力欠多湯丸並進展轉相害羸瘦日增良可悲哉痛化之藥原不敘人長服也余痛此獎因申言之凡太平丸保和丸肥兒丸之類其名雖美俱不敢用蓋名之美者其藥必惡然則陷胸抵當等名皆大補之劑而天真大造等方皆傷生之藥耶故以美名加之以欺人耳目非大方家可用也古人立此名專為欺人而欲騙人入其个中耶大方家以其名之美設不知古人與後世何嘗不可用然則大方家所用皆惡名之方耶夫有醫術有醫道術可暫行一時道可流傳千古道中無術術中無道洵之人不妨為千古之人必須補不藥是術補藥是道一時知其心何若而能作此不通之談有古方有今方有聖方有俗方余以為今人不及古人不敢自立一方六味八味三方已足

用原不必更立方也若脾胃惟東垣為聖選而用之以調中益氣補

中益氣二方出入增減真知其藥物傷也本方中加熟藥

如薑桂之類熟物傷也加黃連之類真知有肉食傷也加

山查數粒酒食傷也加葛花一味隨證調理二方必有用

則怪談矣此東垣之法方士之繩墨也然以寒治熱而熱

不去以熱治寒而寒不除奈何經曰寒之不寒是無水也

熱之不熱是無火也壯水之主益火之原此東垣之未及

也治脾胃原不專講寒熱蓋飲食勞倦所調不內外因與

壯水益火何涉蓋一時偶不及說到六味八味忽然記

起遂著此如有食填太陰名曰食厥者上部有脈下部無

醫貫砭

卷下

三

脈不吐則死此語出難經謂上部有脈下部無脈者若其

脈暫時無脈吐定之後氣下而脈自復非謂無脈之人必

令其吐也又並非指食厥而言況食厥證又未必下部無

脈者句急以陰陽鹽湯探吐其物即愈如有食積腸腹絞

痛手不可按者不得不下食未消化審知其為寒積必用

巴豆感應丸何不用八審知其為熱積必用大黃承氣湯

何不用六味下之不當死生立判慎之哉

人身水火原自均平偏者病也火偏多者補水配火不必

去火水偏多者補火配水不必去水凡人身水火有虛實

邪火與臟腑偏盛之火也虛火者陰氣衰少而火覺有餘

也惟水亦然若陰氣並未虧而外來實火及臟中淨火自

肝亦補陰以配之將配到幾千百分而後平耶宜其治傷寒陽明壯熱等疾皆用六味也譬之天平此重即彼輕一邊重者只補足輕之一邊決不擊去馬子蓋馬子一定之數今人欲瀉六降火者鑿馬子者也紫蘭亦知馬子一定若一重者必要增馬子耶

或曰正當胸膈飽悶之時數日粒米不下陳皮枳殼木香烏藥日夜吞咽尚且不通復可補乎曰此正固初先不知補益擅用發散伐太過虛痞之病也經曰下文經語皆是日造無思斷無着內經者故耳下焦虛之中焦痞滿欲治其虛則中滿愈甚欲消其痞則下焦愈虛庸醫值此難以措手疏

醫貫砭

卷下

三

啓其中峻補其下少用則邪壅於上多用則峻補於下所謂塞因塞用者也善用者能以人參一兩或七八錢少加升麻一錢反用升提且二大劑一服即愈此內經之妙用內經何嘗不可不知也

中暑傷暑論

中暑者面垢自汗口燥悶倒昏不知人背冷手足微冷或吐或瀉或喘或滿是也當是時切勿便與冷水或臥冷地如行路踞死者即置日中熱地上以小便溺熱土上取熱土覆病人臍上急以二氣丹同蘇合香丸湯調灌下如無

二氣丹研蒜水灌之亦可蓋中傷暑毒外陽內陰諸暑藥多用暖劑如大順散之用薑桂枇杷葉散之用丁香蒜亦

辛熱之物又蒜氣臭烈能通諸竅也中暑用熱又是暑中剛好涼太過或其人本屬虛極或因暑邪入中汗出太過

陽越於外古方仍有用辛熱者然必審其沉寒之脈證全具方可一用乃以為暑證盡然則殺人如麻矣此人

凡論一病必以此病中之極少者立論真可恨也傷暑而苦頭痛發躁惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗

大泄齒燥無氣以動乃為暑傷氣蒼朮白虎主之有暑而若未亦若人元氣不足用前藥不應惟清暑益氣湯或補

中益氣湯為當自汗多而氣上反用升柴熱氣未大抵夏

月陽氣浮於外亦知陽浮何陰氣伏於內若人飲食勞

倦內傷中氣或酷暑勞役外傷陽氣者多患之法當調補元氣為主暑氣未清而補即補暑矣夏月服補而卒而佐

以解暑若陰寒之證用大順散桂附大辛熱之藥此內經

舍時從證之良法內經何嘗不可不知

清暑益氣湯 黃芪 蒼朮 升麻 人參 白朮

陳皮 神麴 澤瀉 甘草 黃柏 葛根 青皮

當歸 麥冬 五味雜出不倫古人製方之義

白虎湯 石膏 知母 甘草 人參 糯米此是白虎

加人參湯

不得誤名 此方是暑月熱病發熱之正方 白虎湯仲景治
白虎湯 此方是暑月熱病發熱之正方 白虎湯仲景治
等證加人參名曰白虎湯治汗後表解大渴之證金匱
亦借以治太陽中喝之證乃隨手錄一方而有數誤焉非
治暑正方一也以白虎加人參湯指為白虎湯二也以梗
米收糯米三也以爲祇夏月可用餘月不可用四也其每
動必誤 如此

濕論

東垣曰治濕不利小便非其治也又曰在下者引而竭之
聖人之言雖布在方策其不盡者可以意求耳夫濕淫從
外而入裏若用淡滲之劑是降之又降乃復益其陰而重
竭其陽 利濕如何是 益陰竭 則陽氣愈消而精神愈短矣
陽豈濕氣是陽耶

醫貫秘

卷下

三

是陰重強陽重衰反助其邪之謂也 是濕而利之故用升陽
風藥即痿以羌活獨活柴胡升麻各一錢水煎熱服 四味
亦不 大法云濕淫所勝助風以平之 又假造內經經云濕
以酸辛以苦燥之以淡泄之正上文淡 淫所勝平以苦熱佐
滲利水之義乃捏出此怪語是何肺腸 又曰下者舉之 下
舉之爲正氣下陷則 得陽氣升騰而愈矣又曰客者除之
提之非欲舉濕也 利水即是除客反要提在上焦將 夫
是因曲而爲之直也 何以除之耶曲直二字亦翻穿 夫
聖人之法可以類推是舉一而知百也有脚氣類傷寒者
發熱惡寒必脚腫問腫痛俱從濕治 脚氣大段因濕爲多
有濕熱發黃者當從鬱治凡濕熱之物不鬱則不黃禁用

茵陳五苓散 此方是治濕之正方也 凡古人用傳治病
疏下之則加減法也或米或麥之食五穀一定不易其以育
五果五菜之單食則變通法也若謂古方不可用則猶云
凡飢者禁食五穀服者十不一 凡見用茵陳五苓散者十
生也嗟乎是尚得爲人言哉 凡見用茵陳五苓散者十
不一 仲景殺 當用逍遙散方見鬱論

予一日患陰九一个腫如鴨卵發熱以濕熱證治之不效
細思之數日前從定海小船回有濕布風帆在坐下比上
岸始覺以意逆之此感寒濕在腎丸也乃用六味地黃加
柴胡吳黃肉桂各一錢獨活五分 知其爲濕仍必用六味
服此而病倖愈者蓋一時輕疾得柴黃肉桂 一服熱退再
獨活等辛散之藥自然六味不能爲害耳

醫貫秘

卷下

三

服腫消後有患偏墜者此方多效

癰論

或問曰經云夏傷於暑秋必病瘧前人雖備言之旨殊未
暢盡明示諸曰不發於夏而發於秋此亢則害承乃制子
來救母之義 內經瘧論言之甚詳不容再贅一語偏要扯
不曉其義 蓋暑令當權君火用事肺金必受傷冠火位之
豈不汗煩 下水氣承之腎水爲肺之子因母受火傷子來承之 如此
乃肺病而寒熱則心腎交戰 以制火救母於是水火相戰
之病也亂道無理一至於此 陰陽交爭大勝則大復小勝則小復此陰陽勝復之常理

瘧之所由作也然而有病有不病者蓋邪之所湊其氣必

虛故其人元氣不固者暑邪得以承之所以治瘧以扶元

氣為主瘧邪方熾如何扶元且爾所謂扶元必是六味助

熱奈何

發在夏至後處暑前者此三陽受病傷之淺者近而暴也

發在處暑後冬至前者此三陰受病陰陽受病之故內經

之前後陰陽傷之重者遠而深也

至於陰虛者其寒熱亦與正瘧無異而陰瘧中又有真陰

真陽之分先微之味人所不知經曰晝見夜伏夜見晝止

按時而發是無水也晝見夜伏夜見晝止倏忽往來時止

時作是無火也又假造經文以寒熱為準皆非是無無水者

壯水之主以益陽六味湯主之無火者益火之原以消

陰八味湯主之二方豈是治寒熱之藥非但作世患久

瘧而不愈者非瘧不可愈乃治之不如法也丹溪云夜發

者邪入陰分宜用血藥引出陽分當歸川芎紅花生地黃

柏治之亦未及真陰真陽之至理偏攻諸書瘧論並未能

諸其意天下之病盡用六味八味千古只有爾且余常試

奇神驗故特表而出焉

痢疾論

世有瘧後痢者亦有痢後瘧者夫既為瘧後發洩已盡必

無暑熱之毒復為痢疾瘧邪未清中氣復虛邪從內陷此

此是元氣下陷脾氣不能升舉似痢非痢也非痢將指

既為痢後下多則亡血氣又隨痢散陰陽兩虛陽虛則惡

寒陰虛則惡熱故寒熱交戰似瘧非瘧也離係氣血兩虛

則是邪仍向外仲景傷寒論中凡陰病轉陽皆易愈之候

此乃痢轉為瘧病屬可治若不指為瘧竟作陰虛陽虛論

則久病壞證死期將至亦則俱作虛論俱用補中益氣加

溫補其病自愈細閱此書何必曉曉著成數卷只兩言括

之曰陰虛用六味陽虛用八味足矣讀者

亦不必終帙只記二方而千萬之妙訣已傳濟世之良法

已盡所以天下庸醫一見此書無不狂喜以為天下有如

此彼名醫之捷徑恨讀之猶晚也殺人之法從此偏天下

矣嗟乎無源亂道何地無之原不足與辨因曉村輩力為

崇奉而流毒遂無盡故作書者

之罪小而表章者之罪大也

醫貫砭卷下終

醫貫砭二卷

江蘇巡撫
採進本

國朝徐大椿撰大椿有神農本草百種錄已著錄初
明趙獻可作醫貫發明薛氏醫案之說以命門真
水真火爲主以八味丸六味丸二方通治各病大
椿以其偏駁作此書闢之攷八味丸卽金匱要畧
之腎氣丸本後漢張機之方後北宋錢乙以小兒
純陽乃去其肉桂附子以爲勿科補劑名六味丸
至明太醫院使薛己始專用二方爲補陽補陰要
藥每加減以治諸病其於調補虛損未嘗無效獻
可傳其緒論而過於主持遂盡廢古人之經方殆
如執誠意正心以折衝禦侮理雖相貫事有不行
大椿攻擊其書不爲無理惟詞氣過激肆言辱置
一字一句索垢求瘢亦未免有傷雅道且獻可說
不能多驗今其書已不甚行亦不必如是之誦爭
也

臨證指南醫案十卷

〔清〕葉桂撰

浙江圖書館藏清乾隆三十三年刻本

附《四庫全書總目·臨證指南

醫案十卷》提要

醫之為道微矣七情六
氣之感病非一端溫涼
寒熱之性藥非一類非
天資高妙者不可以學
醫非博極羣書者亦不

足以語醫也今之醫者
或記醜而不精於審脉
或審脉而不善於處方
或泥古而不化或師心
而自用或臨症不多或

狃於偏見不能已疾而轉以益疾又烏可以言醫哉吳門葉天士先生天分後人於書無兩不讀終身不能忘其視脉

也不待病者相告語而推述病源有病者惡而後得之者不啻曰周旋於病者之側而同其寢興飲食熟其喜怒驚悲

也蓋以其意深識病者之意而又神明乎古人處方之精意而直以意斷之故其處方也一二味不為少十餘味不為

多習見不妨從同獨用不嫌立異輕重繫於杪忽之間而其效在乎呼吸及數十年之後投之所向無不如意迎刃而

解渙然冰釋先生之名
益高從遊者日益衆而
先生固無日不讀書也
嘗記余鄉人有患痼疾
者問詣先生所為處方

授之曰服此百劑終身
不復發矣其人歸服至
八十劑蓋已霍然者月
餘矣乃止不服逾年病
復興復詣先生所先生

曰是吾令服某方百劑
者何乃如是其人以實
告令再服四十劑即永
不發矣卒如言其神妙
如是是豈俗手之意為

增損者可同年而語哉
今所存醫方若干卷皆
門弟子所錄存者學者
能讀其書以通其意則
善矣

乾隆丙戌嘉平錫山拙
脩嵇璜書於徇秋書

屋



序

六

夫事之最切於日用者
莫如醫故自軒岐道興
而靈素以下代有名入
歷有著述盧扁以後如
仲景所著傷寒金匱直

啓靈蘭之秘洩玉版之
文至若河間東垣丹溪
亦迥出凡流合仲景稱
爲四大名家傷寒暨雜
證之治療法云備矣世

咸宗之但仲景之書辭
義古奧雖經諸名家之
註疏亦未能盡晰其理
近代以來薛立齋張景
岳喻嘉言等皆本之靈

序

二

素或作或述其於諸證
皆有發明迨柯韻伯所
註傷寒能獨開生面惜
其書尚未廣行於世其
他則間有心悟闡揚亦

皇上仁育爲懷命太醫院考
覈前賢精義彙輯金鑑
錄一書頒行海內集諸
賢之大成開後人之心

序

三

法壽世福民孰有善於
此哉夫醫者意也方者
法也神明其意於法之
中則存乎其人也父子
不相授受師弟不能使

巧也吳閬葉君天士稟
賦靈明造詣深邃其於
軒岐之學錯綜融貫處
方調劑立起沉疴故名
播南北所遺醫案與方

序

四

膾炙人口華君岫雲婆
心濟世輯而成帙別類
分門將付剞劂而請序
於余余繙閱再過實足
以啓迪後人使好學深

思者觸類引伸未必非
濟世之一助至進而求
其所以然彼靈素諸書
具在而心領神會則又
存乎其人也云爾

序

五

乾隆二十九年歲次甲
申秋七月旣望吳江李
治運題於太薇清署



吾吳葉天士先生以岐黃妙術擅名於時者五十餘年凡一時得奇疾而醫藥罔效者先生一診視而洞悉源委投以斤劑沉痾立起遠近之向風慕義老無間言余舊居胥江與葉氏世屬通家其門牆桃李亦皆至戚舊交心神其術曰錄其方案成帙藏之有年方欲公諸天

一

下令錫山華君岫雲為之分別門類授之梓人余喜君之與余有同心也曰任校讐編輯之役書既成君囑余書其緣起夫良醫之功同良相人所稔知也然良醫不能使其身壽同金石而屢試其技於後人亦勢之無可如何者矣今得同心者彙錄其成案而使後人有所取

法觀摩其功顧不偉歟使後有能者得是編而神明變化之則先生之遺澤流被於千百世而無窮而先生不死矣今曰是書之成爰書其大畧如左
乾隆歲次丙戌季秋李國華大瞻識



二

天地之大德曰生醫者贊天地之生者也上古三皇闢下民之天扎廼垂卦象以明陰陽消長之機辨氣味以審五行生剋之理著靈素以立萬世醫學之原大哉至哉非懷胞與之仁慈稟天賈之聖智者其孰能之軒岐以後亦代有明哲之士窮理致知闡揚斯旨但理道淵深其奧難窺故雖懸壺之士如林而洞垣之技罕覩苟有能不盛盛虛虛而遺人天殃者則已幸矣近代以來古吳有世醫天士葉君者學本家傳道由心悟吾鄉與吳郡接壤猶憶曩時凡知交患證棘手瀕於危者一經調劑無不指下回春其聲譽之隆不特江左一隅抑且名標列省惟是應策多門刻無寧晷未遑有所著述以詔後世人皆爲之惋惜

臨證指南醫案

序

近有岫雲華君購其日診方案欲付之梓以公諸世請序於余余雖習醫有年愧未能深知醫理然觀其論證則援引羣書之精義擬法則選集列古之良方始知先生一生嗜古攻研蘊蓄於胸中者咸於臨證時吐露毫端此卽隨證發明之著作也其於陰陽虛實標本格致之功實足以上紹軒岐下開來哲以此行世凡醫林之士見之自必勤求古訓博採衆方迨將日造乎高明庶不致臨證有望洋之嘆則此帙實濟世之慈航也故爲之序

乾隆丙戌仲秋錫山邵新甫題



古人有三不朽之事爲立德立功立言也蓋名雖爲三而理實一貫要之惟求有濟於民生而已夫有濟於民生則人之所重莫大乎生死可以拯人之生死雖韋布之士亦力能爲者則莫若乎醫故良醫處世不矜名不計利此其立德也挽回造化立起沉痾此其立功也闡發蘊奧與世著方書此其立言也一藝而三善咸備醫道之有關於世豈不重且大耶故上古聖帝辨晰陰陽審察氣味創著內經垂不朽之仁慈開生民之壽域其大易本草靈素諸書炳若日星爲萬世不磨之典厥後亦代有名賢窮究其理各有著述開示後人以冀共濟仁壽無如後世習是業者其立志存心却有天理人欲之兩途如范文正公雖不

臨證指南醫案

序

業醫而其所言不爲良相卽作良醫者斯純以利濟爲心者也俗諺有云秀才行醫如葉作鑿者此淺視醫道僅爲衣食之計者也夫以利濟存心則其學業必能日造乎高明若僅爲衣食計則其知識自必終囿於庸俗此天理人欲公私之判也故每閱近代方書其中有精研義理發前人未發之旨者固多亦有徒務虛名之輩輒稱與貴顯某某交遊療治悉屬險證如何剋期奏效刊成醫案妄希行世不知此皆臨證偶爾倖功乃於事後誇張虛語欺誑後人以沽名譽則其書謬誤不足信也竟欲求遵嘉言喻氏遺法臨病先議證後立方其於未用藥之前所定方案無一字虛僞者乃能徵信於後人但執此以繩世誠不

易多得也惟近見吳蘭葉氏晚年日記醫案辭簡理明悟超象
外其審證則卓識絕倫處方則簡潔明淨案中評證方中氣味
於理昭合能運古法而仍周以中規化新奇而仍折以中矩察
其學識蓋先生固幼稟穎絕之才衆所素稔然徒恃資敏若不
具沉潛力學恐亦未易臻此神化也惜其醫案所得無多不過
二三年間之遺帙每細心參玩祇覺靈機滿紙其於軒岐之學
一如程朱之於孔孟深得夫道統之真傳者以此垂訓後人是
卽先生不朽之立言也故亟付剞劂以公諸世至其一生之遺
稿自有倍蓰於此箇中義理必更有不可思議者自必存在諸
及門處什襲珍藏尚未輕以示人也然吾知卞氏之玉豐城之

臨證指南醫案

序

二

劍其精英瑞氣斷不至於泯沒自必終顯於世只在先後之間
耳倘有見余是刻能悉將先生遺稿急續刻行世此豈非醫林
中之大快事抑亦病家之大幸事也諒亦必有同志者余將翹
企而望之因以爲序

乾隆三十一年歲次丙戌季冬錫山華岫雲題



夫用藥之道譬若用兵呼吸之間死生攸係固未易言也是以
軍有紀律方有法度時有進退事有成敗視風雲之變識草木
之情其機至神又安可以小道視之哉余不敏竊慕范文正公
之論因師事吳門亮於張先生先生乃葉氏門牆桃李也余因
得窺葉派之一斑觀其議病疏方動中窾綮所謂游夏之徒不
能贊一辭者也擬印葉師之妙譜以開後學之法門其有待於
他年乎由是歸而讀書不與塵事里有華君岫雲者好古之士
也過而與語甚洽遂出一編示余乃葉師之方案也問所從來
曰積數十年抄集而成其苦心濟世爲何如耶憶葉師之方案
至妙者不可勝數而散佚居多此其剩事耳然零珠碎玉歲久

臨證指南醫案

序

一

彌湮秘而不傳將終失也請授之梓以惠當世華君然之余嘉
其非業醫者而有是志於是乎書

書

乾隆丙戌季冬錫城高梅題於響山書屋



凡例

一此案出自數年採輯隨見隨錄證候錯雜若欲考一證難於彙閱余不揣固陋稍分門類但兼證甚多如虛勞咳嗽吐血本同一證今各分門是異而同也即如咳嗽有虛實標本六氣之別今合爲一門是同而異也如暑濕而兼瘧痢脾胃病而兼嘔吐腹脹凡若此者不可勝數欲求分晰至當不易余本不業醫且年已古稀自謝不敏而侯高明之輩翻刻改正一證之中有病源各異如虛勞有陰虛陽虛陰陽兩虛之不同若再分門恐有繁冗之嘆今將陰虛先列於前繼列陽虛繼陰陽兩虛使觀者無錯雜之憾餘門倣此

一 醫書有舊本

凡例

一此案分門類時已剔去十之二三今一門之中小異而大同者尚多本應再爲剔選但細閱之小異處却甚有深意故不敢妄爲去取且如建中湯麥門冬湯復脈等湯稍爲加減治證甚多若再爲刪削不足以見先生信手拈來頭頭是道其用力變化無窮之妙矣

一每閱前人醫案治貧賤者少蓋醫以濟人爲本視貧富應同一體故此案不載稱呼僅刻一姓與年歲如原案已失記者則以一某字代之至於婦女之病年高者但將一姬字中年者以一氏字年少用一女字別之然有本係婦女而案中未經註明者甚多不敢臆度強爲分別

一醫道在乎識證立法用方此爲三大關鍵一有草率不堪爲司命往後有證既識矣却立不出好法者或法既立矣却用不出至當不易好方者此謂學業不全然三者之中識證尤爲緊要若法與方只在平日看書多記如學者記誦之功至於識證須多參古聖先賢之精義由博反約臨證方能卓然定見若識證不明開口動手便錯矣今觀此案其識證如若洞垣所用法與方皆宗前賢而參以己意稍爲加減之故案中有並非杜撰之句余願業醫者於識證尤當究心如儒家參悟性理之功則臨證自有把握然後取此法與方用之必有左右逢源之妙矣倘閱是書者但擬拾其辭句勦襲其

一 醫書有舊本

凡例

二

友義難此行道爲寬利之計則與余刻是書之一片誠心大相悖矣幸後之覽者捫心自問切勿墮落此坑塹

一此案須知看法就一門而論當察其病情病狀脈象各異處則知病名雖同而源不同矣此案用何法彼案另用何法此法用何方彼法另用何方從其錯綜變化處細心參玩更將方中君臣佐使之藥合病源上細細體貼其古方加減一二味處尤宜理會其辨證立法處用硃筆圈出則瞭如指掌矣切勿草率看過若但得其皮毛而不得其神髓終無益也然看此案須文理清通之士具虛心活潑靈機曾將靈素及前賢諸書參究過一番者方能領會此中意趣吾知數人之中

僅有一二知音潛心默契若初學質魯之人未能踴躍而進

恐徒費心神耳

一此案惟關火證一門蓋火有七情六氣五志之不同證候不

一難於臆斷故竟不分門至於傷寒惟太陽初感風寒為甚

少寒既化熱之後種種傳變之證散見諸問者頗多觀者自

能會意勿謂先生長於治雜證短於治傷寒觀其用仲景諸

方活潑潑地即可以知其治傷寒之妙矣

一案治法如作文之有平濃奇淡諸法悉備其用藥有極輕

清極平淡者取效更捷或疑此法僅可治南方柔弱之質不

能治北方剛勁之體余謂不然苟能會悟其理則藥味分量

一論治法月言

凡例

三

或可權衡輕重至於治法則不可移易蓋先生立法之所在

即理之所在不遵其法則治不循理矣南北之人強弱雖殊

感病之由則一也其補瀉溫涼豈可廢繩墨而出範圍之外

乎況姑蘇商旅雲集案中豈乏北省之人哉不必因其輕淡

而疑之或又曰案雖佳但未知當時悉能效否余曰萬事不

外乎理今案中詳論方中議藥咸合於理理設施自必有

當至於效與不效安得人人而考覈之哉

一案中有未經載明難於格考處如藥味分量炮製丸方煎法

相混與所服劑數多寡若平補之方竟有連服百劑者更有

一人聯用幾方者其間相隔日月遠近併因季時令候未註

明惜皆無考全在觀者以意會之可也

一每門之後附論一篇者因治法頭緒頗繁故摯其綱領稍為

敘述之以便後人觀覽又恐業醫之輩文才有淺深遂約同

志措辭不必高古觀者幸勿因其俚鄙而忽之

一案中所用丹丸有一時不能猝辦者如紫雪丹至寶丹驚甲

煎丸玉壺丸等類若有豐裕好善之家依方虔誠合就售與

病人既可積德亦不至於虧本

一此案之刻不過一轡之味耳本欲再為購求廣刻行世奈無

覓處倘同志之士有所珍藏亦願公諸於世者恭俟再商續

刻此案雖非全璧實具種種良法已足啟發愚蒙嘉惠來

一證指南醫案

凡例

四

慈學者苟能默契其旨大可隨時醫庸俗膚淺呆板偏執好

奇猛浪膽怯諸弊其於醫學有功不小

一凡治諸證俱有初中末三法如傷寒初起邪在太陽則用麻

黃桂枝青龍等湯癰證初起則用小柴胡加減痢證初起先

用胃苓湯加減日疾初起則用柴薄荆防以升散之此皆初

治之大畧也今就所輯之案大凡治中治末者十居七八初

治者不過十之一二其故何歟蓋緣先生當年名重一時延

請即易故病家初起必先請他醫診視迨至罔效始再請先

生耳故初治之案甚少觀是書者其中先後淺深層次不可

紊亂須細心審察而行之

華岫雲識

頭風

肺痿

汗

腫脹

敬啟者

嚴

吟

1

熱

疫

儲

瀉

痰

癰疽

心臨

科

III

瘡瘍

胎前

11

疳

集方

1

1

1

[illegible]

子 53—355

臨證指南醫案目

卷一

中風

肝風

眩暈

頭風

虛勞

臨證指南醫案

臨證指南醫案卷一

古吳葉桂天士先生著 錫山華南刊 袖雲同校

邵銘新甫

中風

肝腎虛
內風動

錢 偏枯在左。血虛不榮。筋骨內風。絡脉左緩大。

製首烏 四兩

枸杞子 二兩 歸身 二兩 獨活 二兩

淮牛膝 三兩

明天麻 二兩 三胡 二兩 胡麻 二兩 打碎水

黃甘菊 三兩

川石斛 四兩 小黑豆 四兩 煎汁

臨證指南醫案 卷一 中風

用三汁膏加蜜九極細早服四錢滾水送

陳四十 肝血腎液內枯。陽機風旋乘。大忌風寒寒涼

炒杞子

桂圓肉 炒菊花 炙黑甘草

黃芪 六錢

牡蠣 此方偏補更當用血系

金 失血有年。陰氣久傷。復遭憂悲悵鬱。陽挾內風大冒

血。合自空。氣乘於左。口喎肢麻。舌暗無聲。足痿不耐行

走。明明肝腎虛。陰氣不主上承。重培其下。冀得風熄

議以河間法

熟地 四兩 牛膝 二兩 莢肉 二兩 遠志 一兩 牛

杞子 二兩

菊花 二兩 五味 一兩 川斛 二兩 四錢

夜虛風

扶神 二兩 淡菴乾 二錢 加蜜九服四錢

沈四十脈細而數細為陰之病數為營液之耗上年夏

秋病傷更因久失藏入春地氣升肝木風動遂令右

肢偏痿舌本絡強言謬然根帶有傷之症庸俗泄氣

降痰發散攻風再劫其陰漸神憤如寐倘加昏厥將

何療治議用仲景復脈法 復脈湯去姜桂

又 操持經營神耗精損遂令陰不上朝內風動躍為痹

中之象治痰攻劫溫補陰愈損傷枯槁日甚幸以育陰

熄風小安今夏熱益加發泄真氣更虛日創生津益氣

勿息大暑不加變動再商調理固本丸去熟地加北味

臨證指南醫案 卷一 中風 二 此症不宜破散

天冬 生地 人參 麥冬 五味

金六初起神呆遺溺老人厥中顯然數月來夜不得寐是

陽氣不交於陰勿謂痰火當以攻消乃下虛不納議與

潛陽

龜腹甲心 熟地炭 乾菴蓉 天冬

生虎脰骨 淮牛膝 炒杞子 黃柏

盧 噴怒動陽恰值春木司升厥陰內風乘陽明脈絡之

虛生凌咽喉環連耳後清空之地升騰太過脂液無以

營養四末而指節為之麻木是皆坎中根萌所謂下虛

上實多致顛頂之疾夫情志變蒸之熱閱方書無本連

苦降羌防辛散之理肝為剛臟非柔潤不能調和也

鮮生地 玄參心 桑葉 丹皮

羚羊角 連翹心 方甚法法可意

又 生地 阿膠 牡蠣 川斛 知母

汪五左肢麻木膝蓋中牽縱忽如針刺中年後精血內虛

虛風自動乃陰中之陽損傷

淡菴乾 二兩 歸身 二兩 生虎骨 二兩

沙苑 二兩 巴戟天 二兩 明天麻 二兩 桑寄生 四兩

精羊肉膠阿膠九早服四錢交冬加減用人參九服

錢五用力發揮精從溺管源出已經兩耳失聰腎數失司

臨證指南醫案 卷一 中風 三

顯然虛象凡腎液虛耗肝風鳴張身肢麻木內風暗襲

多有痺中之累滋液熄風溫柔葉涵養肝腎經言肝為

剛臟而腎臟惡燥若攻風劫痰捨本求末矣

熟地 當歸 沙苑 巴戟 遠志

當歸 沙苑 巴戟 遠志

張四中風以肢麻言塞足不能行是肝腎精血殘慙虛

風動絡下氣二便艱阻凡腎虛忌燥以辛潤溫藥

從蓉 枸杞 當歸 柏子仁

牛膝 巴戟 川斛 小茴

陳五中絡舌暗不言痛自足起漸上麻木膜脹已屬痼疾

參苓益氣兼養血絡僅堪保久	人參 茯苓 白朮 枸杞	當歸 白芍 天麻 桑葉	周 大寒土旺節候中年勞倦陽氣不藏內風動越令人麻痺肉瞤心悸汗泄煩躁乃裡虛欲暴中之象議用封固護陽為主無暇論及痰飲他岐	人參 黃芪 附子 熟朮	宋 陽明脈絡空虛內風暗動右肩胛及指麻木	玉屏風散加當歸天麻童桑	俞氏 寡居一十四載獨陰無陽平昔操持有勞無逸當夏臨證指南醫案卷一 中風 四	四月陽氣大泄主令忽然右肢麻木如墮不舉汗出麻冷心中卒痛而呵欠不已大便不通診脈小弱豈是外感病象似乎痺中其因在乎意傷憂愁則肢麻也攻風劫痰之治非其所宜大青以固衛陽為主而宣通脈絡佐之	桂枝 附子 生黃芪 炒遠志	片姜黃 羌活	唐 男子右屬氣虛麻木一年入春口眼歪邪乃虛風內動老年力衰當時令之發泄忌投風藥宜以固衛益氣	人參 黃芪 白朮 炙草 廣皮
--------------	-------------	-------------	--	-------------	---------------------	-------------	--------------------------------------	--	---------------	--------	---	----------------

歸身 天麻 煨薑 南棗	凡中風症有肢體緩緩不收者皆屬陽明氣虛當用人參為首藥而附子黃芪炙草之類佐之若短縮牽掣則以逐邪為急 凡他經之症俱各因症	五 陽明脈絡已空厥陰陽氣易逆風勝為腫熱久為燥面熱喉舌乾渴心中填塞無非陽化內風胃受衝侮不飢不納矣有年久延頗慮難中	羚羊角 連翹 丹皮 黑山梔	青菊葉 麥冬 花粉 天麻	五 張氏 痲中經年眩暈汗出陽氣存升無降內風無時不動臨證指南醫案卷一 中風 五	此竟夜不寐屬衛陽不肯交於營陰矣沉痾之症循理按法尚難速效今以風藥為望向安議用固陽明一法	桂枝木 生薑 川熟附 炒遠志	龍骨 牡蠣 薑 棗	劉氏 神傷思慮則肉脫意傷憂愁則肢麻皆痿象也緣高年陽明脈虛加以愁煩則厥陰風動木橫土衰培中而效若弱治風痰便是劫燥助謬	黃芪 於朮 桑寄生 天麻 白朮	當歸 枸杞 菊花汁 加蜜丸	包 老年隆冬暴中乃陰陽失交本病脈左大右濡內風
-------------	---	---	---------------	--------------	--	--	----------------	-----------	--	-----------------	---------------	------------------------

子 53—359

中有苦滯忌投攻風劫痰益腎疏肺治本為法

生地

玄參

麥冬

川斛

遠志

石菖蒲

蕪漿

此方補而不燥

會二脉弦動眩暈耳鳴行走氣促無力肛痔下垂此未老欲衰腎陰弱收納無權肝陽熾虛風蒙竅乃上實下虛之象質厚填陰甘味熄風節勞戒飲可免仆中

虎潛去銷陽知母加大肉從蓉煉蜜丸

張脉細小帶弦冬季藏納少固遂至瘵中百餘日來諸患稍和惟語言欲出忽變多言似少相續此皆腎脉不營舌絡以致機竅少宣乃虛象也早用地黃飲子煎法

諸症指南醫案

卷一

中風

八

以治下晚用星附六君子以益虛宣竅

某癰今年風木司天春夏陽升之候兼因平昔怒勞憂思以致五志氣火交併於上肝胆內風鼓動盤旋上盛則下虛故足膝無力肝木內風壯火乘襲胃土胃主肌肉脉絡應成遠出環口故唇舌麻木肢節如痿固為中厥之萌觀河間內火召風之論都以苦降辛泄少佐微酸最合經旨折其上騰之威使清空諸竅毋使濁痰壯火蒙蔽乃暫藥權衡也至於顧養工夫寒暄保攝尤當加意於藥餌之先 上午服

金石斛

三錢 化橘紅

五分 白茯苓

二錢 真北秦皮

草決明二錢 冬桑葉錢一 嫩鉤藤錢一 生白芍錢一

又前議苦辛酸降一法肝風胃陽已折其上引之威是諸症亦覺小愈雖日治標正合歲氣節候而設思夏至

一陰來復高年本病預宜持護自來中厥最防於暴寒驟加致身中陰陽兩不接續耳議得攝納肝腎真氣補

益下虛本病 九方二清潤不燥

九製熟地先用水煮半日徐加醇酒砂仁再煮一日

肉從蓉用大黑炮炙九次乾者炒存性八兩

生虎膝骨另搗碎 淮牛膝 鹽水蒸 製首烏 四兩

川草薢鹽水炒 川石斛 八兩 赤白茯苓 四兩

諸症指南醫案

卷一

中風

九

柳子霜二兩 右藥照方製末另用小黑糯豆皮八

兩煎濃汁法九每早百滾水服三錢

議晚上用健中運痰兼制亢陽火動肺坐從外臺茯

苓飲意

人參二兩 熟半夏二兩 茯苓四兩 廣皮肉二兩

川連一兩 枳實二兩 明天麻二兩 鈎藤三兩

白茯苓鹽水炒去核三兩 地栗粉二兩

右末用竹瀝一杯薑汁十匙法九食遠開水服三錢

又近交秋令燥氣加臨先傷於上是為肺燥之咳然下

焦久虛厥陰遠咽少陰循喉往常口燥舌糜是下虛陰

火泛越先治時病燥氣化火暫以清潤上焦其本漸再

白扁豆三錢 勿研 玉竹 三錢 白沙參 二錢 麥冬 三錢 去心

甜杏仁 二錢 去皮尖 象貝母 二錢 去心 冬桑葉 一錢

捲心竹葉 一錢 洗白糯米七合清湯煎

又 暫服煎方

北沙參 三錢 生白扁豆 二錢 麥冬 三錢 韓百合 一錢

白茯苓 一錢 甜杏仁 一錢 去皮尖

又 痰火上實清痰為家於寐夜兼進清上方法

芩冬 二錢 天冬 二錢 苡米 八兩 柿霜 四兩

臨證指南案 卷一 中風 十

長條白沙參 八兩 生白扁豆皮 八兩 甜梨汁 二兩

甘蔗漿 二兩 水熬膏蒸柿霜收每服五錢開水送下

又 夏熱秋燥陽津陰液更傷口齒咽喉受病都屬陰火

上乘氣蒸失降使然進手太陰清燥甘涼方法甚安其

深秋初冬調理大旨以清上實下則風熄液潤不致中

厥至冬至一陽初復再議此方甚為法非一言所能盡

燕窩菜 一兩 洗淨另熬 甜梨 二兩 去皮核細絞 人參 三兩 另熬收

九製熟地 四兩 水煎 天冬 二兩 去心 麥冬 四兩 去心 黃芪皮 四兩 生用

炙黑甘草 二兩 五味 蒸 雲茯苓 三兩

又 左關尺脈獨得動數多語則舌音不清麻木偏着右

肢心中熱難難以鳴此陽明脈中空乏而厥陰之陽
挾內風以糾擾真氣不主藏聚則下無力以行動虛假
之熱上泛為喉燥多咳即下虛者上必實意冬至後早
服方從丹溪虎潛法

九製熟地 照前法 肉從蓉 照前製 天冬 去心

當歸 二兩 炒焦 生白芍 三兩 川斛 八兩 黃柏 二兩

淮牛膝 三兩 鹽水蒸 右為末另用虎骨膠三兩溶入蜜

搗丸服五錢滾水送

又 太太諸恙向安今春三月陽氣正升肝木主乎氣

肝為風臟風亦屬陽卦變為巽兩陽相合其勢方張內

臨證指南案 卷一 中風 十

風挾陽動旋脂液暗耗而麻痺不已獨甚於四肢者風

淫末疾之謂也經云風淫於內治以甘寒夫痰壅無形

之火火灼有形之痰也寒水泄痰火風兼治矣

天冬 四兩 麥冬 八兩 長白沙參 八兩 明天麻 四兩

白藥蒸 照前製 甜梨汁 一兩 薑根汁 用八兩

神農漿 一兩 鮮竹瀝 八兩 柿霜 四兩 先將二冬沙

參天麻白藥加泉水煎汁濾過配入四汁同熬成膏

後加柿霜收每服五錢百滾水調服

又 下虛上實君相火亢水涸液虧多有暴怒跌仆之虞
此方滋液救焚使補力直下焦不助上熱謹錄要申

先生靈玉膏方

鮮生地水洗淨搗自然汁二觔綿紙濾清隨和入生
白沙蜜一觔另置一鉛罐或圓鉛罐盛煎藥封堅固
用鐵鍋滿盛清水中做井字木架放罐在上桑柴火
煮三晝夜頻添水不可住火至三日後連器浸冷水
中一日頃取出入後項藥

人參蒸烘研細 白茯苓蒸研粉 真秋石研一兩

三味拌入前膏如乾豆沙樣收貯小口磁瓶內扎好

勿令洩氣每早百滾水調服五六錢

又立冬後三日診得左脈小弦動數右手和平胃虛問

臨證指南案卷一 中風 主

得春夏平安交秋後有頭暈左目流淚足痿無力不能
行走舌生紅刺微咳有痰此皆今年天氣大熱已久熱
則真氣泄越虛則內風再旋經言癰生大熱熱耗津液
而舌刺咳嗽流淚者風陽升於上也上則下焦無氣矣
故補肝腎以攝納腎氣為要而清上安下其在甘菊不
為脾胃者宜也

製首烏四兩 杞子炒一兩 天冬去心二兩 茺蔚子二兩

黃甘菊一兩 黑糖豆皮二兩 茯苓二兩 川石斛八兩

虎骨膠二兩 右末以川斛膏同溶化虎骨膠搗丸

早上滾水服三四錢

又久熱風動津液日損舌刺咳嗽議以甘藥養其口陰

老年納穀為寶

生扁豆四兩 麥冬三兩 北沙參三兩 天花粉二兩

甘藷藥四兩 補腎二兩 白花百合四兩 熟地四兩

糖兩許每服時滾水調服三四錢晚上服

又液燥下虧陽挾內風上引陰不上承舌絡強則言蹇

氣不注脈則肢痿乏力步趨凡此皆肝腎臟陰本虛鎮

補之中微逗通陽為法以補液虛不受純溫藥下

水製熟地四兩 阿膠二兩 女貞實二兩 醋肉從蓉一兩 茯神二兩 旱蓮草二兩 川石斛二兩

臨證指南案卷一 中風 主

用精羯羊肉膠為丸早上滾水服四五錢

又腎服煎方

生地

沙參 茺蔚子 黑糖豆皮

川斛 牛膝

又晚服丸方

九蒸桑葉二兩 三角胡麻二兩 九製首烏三兩 白茯苓三兩

人參二兩 炙甘草一兩 酸棗仁二兩 苡仁二兩

右為末桂圓肉三兩煎湯法丸每服三錢百滾水下

又今年天符歲會上半年陽氣大泄見病都屬肝胃以

厥陰為風臟而陽明為盛陽耳陰陽不肯相依勢必暴

來厥中過大暑可免。以暑濕大熱更多開泄致元氣不為相接耳。然此本虛標實。氣火升騰所致。經言以苦寒醃潤酸泄。少佐微辛為治。議進補劑。則滋陰法。

人參一錢 生牡蠣五錢 生白芍二錢 烏梅肉四分

川黃連六分 熟半夏一錢 鹽水炒黃連五錢 上午服

九方 人參二兩 茯苓三兩 鹽水炒黃連五錢

半夏醋炒水洗 鹽水炒廣皮二兩 枳實醋炒一兩

白茯苓一兩半 雞子黃製 生白芍一兩 烏梅肉一兩

為末竹瀝法九早上服三錢百滾湯下

又夏月進酸苦泄熱和胃通降為陽明厥陰治甚安入

臨證指南書案卷一中風

秋涼爽天人漸有收肅下降之理。緣有年下虧木少水

涵相火自風旋轉。蒸灼胃脘。連冰為嘔。舌絡被蒸則絳

赤如火。消渴便阻。猶刺事耳。凡此仍屬中厥根前當加

慎靜養為宜。補中病而不使生。生白芍三錢 生地三錢

生雞子黃一枚 阿膠一錢 生白芍三錢 生地三錢

天冬一錢 川連一分 上午服

又心火亢上皆為營液內耗。先以補心湯理心之用。

人參一錢 川連六分 犀角二錢 麥冬二錢

鮮生地五錢 丹參一錢 捲心竹葉二錢

又苦味和陽脈左頰和但心悸少寐已見營氣衰微微

金匱酸棗仁湯方。仍兼和陽益心氣以通肝絡。

酸棗仁炒熟勿 茯神三錢 知母一錢 川芎一分

人參六分 天冬一錢 去心

陳脈左數右弦。有年形盛氣衰。冬春之交。真氣不相

維續。內風自熾。左肢麻木不仁。舌歪言蹇。此屬中絡。調

理百日戒酒肉可望向愈

羚羊角 陳胆星 丹皮 橘紅

連翹心 石菖蒲 鉤藤 川斛

又羚羊角 玄參 連翹 花粉

川貝母 橘紅 竹瀝

臨證指南書案卷一中風

又丹溪云。麻為氣虛。木是濕痰敗血。診左脈濡滑。有年

偏枯。是氣虛血虛。方書辨稱左屬血虛。右屬氣虛。未必

盡然。宜少通風氣

人參 牛夏 廣皮 茯苓

歸身 白芍 炙草 桑枝

又經絡為痰阻。大便不爽。昨日跌仆。氣喘。喉山甚艱轉

方以宣經隨

炒牛夏 石菖蒲 廣橘紅 茯苓

胆星 枳實 竹瀝 薑汁

葉初春肝風內動。眩暈跌仆。左肢偏癱。舌絡不和。呼吸

不爽。炭火上蒙。根本下衰。先宜清上。痰火

羚羊角 茯苓 橘紅 桂枝

半夏 鬱金 竹瀝 薑汁

又 風熱燥筋骨為痛。痰火氣阻。呼吸不利。

照前方去鬱金。竹瀝。薑汁。加白礬。蘇鈞藤。

又 炒半夏 茯苓 鈞藤 橘紅

金石斛 石膏 竹瀝 薑汁

又 人參 半夏 枳實 茯苓

橘紅 茯苓 竹瀝 薑汁

風為百病之長。故醫書咸以中風列於首門。其論症

臨證指南卷一 中風

則有真中類中。中經絡血脈臟腑之分。其論治。則有

攻風劫痰。養血潤燥。補氣培元之治。蓋真中雖風從

外來。亦由內虛。而邪得以乘虛而入。北方風氣剛勁。

南方風氣柔和。故真中之病。南少北多。其真中之方。

前人已大備。不必贅論。其類中之症。則河間立論云。

因煩勞則五志過極。動火而卒中。皆因熱甚生火。東

垣立論。因元氣不足。則邪湊之。令人忽仆。卒倒如風

狀。是因乎氣虛。而丹溪則又云。東南氣溫多濕。由濕

生痰。痰生熱。熱生風。故主乎濕。三者皆辨明類中之

由也。類者偽也。近代以來。醫者不分真偽。每用羌防

星半。烏附細辛。以祛風豁痰。虛症實治。不啻如朽鑿

之殊矣。今葉氏發明內風。乃身中陽氣之變動。肝為

風臟。因精血衰耗。水不涵木。木少滋榮。故肝陽偏亢。

內風時起。治以滋液熄風。濡養營絡。而陰陽如虎

潛回。本復脈之類是也。若陰陽虛損。無陽則陰無以

化。故以溫柔濡潤之通補。如地黃飲子。還少丹。之類

是也。更有風木過動。中土受戕。不能禦其所勝。如不

寐不食。衛陳汗泄。飲食變痰。治以六君玉屏風。茯苓

飲酸棗仁湯之屬。或風陽上僭。痰火阻竅。神識不清。

則有至寶丹。芳香宣竅。或辛溫清上。痰火法雖未備。

臨證指南卷一 中風

實足以補前人之未及。至於審症之法。有身體緩縱

不收。耳聾目昏。口開眼合。撒手遺尿。失音鼾睡。此本

實先機。陰陽相離。經不交。與暴脫無異。並非外中之風

乃經虛也。故先生急用大劑參附。以回陽。恐純剛

難受。必佐陰藥。以挽回陽。一若肢體拘攣。半身不遂

口眼喎邪。舌強言蹇。二便不爽。此本體先虛。風陽夾

痰火壅塞。以致營衛脈絡失和。治法急則先開關。繼

則益氣養血。佐以滋液。清火。宣通經絡之藥。氣充

血盈。脈絡通利。則病可痊愈。至於風非風。驚風。癲

癩。乃風門之兼症。理亦相同。案中種種治法。余未能

餘門倣此。華州雲

臨證指南醫案卷一
中風

大

不背其挂用人參不于其病勢凶且之治用以
養元氣而病甚之時必與照此之方用參苓兩不
不過幾分至一錢之不中度乃今之切時其門
端而盜取其便也
痛恨而以此邪說誣此翁以害人者對此書
雖身死手

卅陰虛

生地 阿膠 牡蠣

炙草

葉肉炭

王陽侯內風上巔目昏耳鳴不寐肝經主病

熟地炙 炙龜用

蕪肉

五

磁石
茯苓

旱蓮草

女貞子

曹
辛寒清上頭目已清則知火風由臟陰而起附藥必

不見效緩用之急以熄風滋腎之液以驅熱治法大直

如此

臨證指南醫案
卷一
肝風

卷一
肝風

丸

生
地

阿膠

天冬

玄參

川
解

小
黑
豆
皮

陸門操持煩勞五志陽氣挾內風上擾清空頭眩耳鳴目

珠痛但身中陽化內風非發散可解非沉寒可清與六

氣火風通與用辛甘化風方法仍是補肝用意

楊杞子

桂圓肉

歸身

灸草

日射炭

女貞子

此方並為他川之

陸四
肝風陽氣乘陽明之虛上冒牙肉腫痛議和陽熄風

生地

阿膠

生虫

天冬

茯苓

川斛

早蓮草

女貞子

<p>王 痛從腰肢筋骨上及腰間貫於心腹若平日經來帶下其症亦至此素稟陰虛者每感腰膝痠痛凡春交地中陽氣升舉虛人氣動則血氣失養而氣逆而赤如赭飢不欲食耳失聰無不感陽虛虛絡交空顯然先和陽氣</p>		<p>生虎骨 補腦根 煎藥送滋腎丸一錢</p>		<p>又 前用滋腎丸痛緩而涼再服血氣自和凡風寒濕經言風勝則熱濕勝則腫陰虛多熱之證雖先用虎骨丸每服四錢四服</p>		<p>臨證指南醫案 卷一 肝風 三</p>		<p>其五下元水虛風木內震肝腎虛多驚恐非實熱痰火可攻助者</p>		<p>生地 清阿膠 天冬 杞子</p>		<p>菊花炭 女貞實 當歸 延胡索</p>		<p>胡 久病耳聾微咳喉中不甚清爽是陰不上承陽挾內風得以上傷清空諸痰大凡肝腎虛潤宜滋陰則水滋生矣</p>		<p>人參 一錢 秋石 一分 化 鮑生地 三錢 阿膠 一錢</p>		<p>淡菜 三錢 白芍 一錢 茯神 一錢</p>		<p>又 陰虛液耗風動陽升雖諸恙皆減而旬外大便不通</p>	
---	--	-------------------------	--	--	--	-----------------------	--	----------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------	--

<p>斷勿欲速惟漸藥有法為宜照前方去白芍加柏子仁大便兩次頗逸全賴靜藥益陰之力第納食未旺議與胃藥</p>		<p>人參 茯神 炒麥冬 炙甘草</p>		<p>生穀牙 南棗 豆和入氣分之前</p>		<p>又 緩肝益胃</p>		<p>人參 茯神 生穀牙 炙甘草</p>		<p>木瓜 南棗</p>		<p>周 怒動肝風筋脈腸板喉痺</p>		<p>阿膠 天冬 柏子仁 牡蠣 小麥</p>		<p>臨證指南醫案 卷一 肝風 三</p>		<p>吳 脈弦小數形體日瘦口舌糜碎肩背掣痛肢節麻木</p>		<p>內風旋動痰涎阻液古謂壯火食氣皆陽氣之化先擬清而分中熱常食血熄其內風安靜勿勞不致痿厥</p>		<p>生地 沙參 天冬 丹參</p>		<p>犀角 羚羊角 連翹 竹葉心</p>		<p>何首烏 生白芍 黑芝藤 冬桑葉</p>		<p>天冬 女貞子 茯神 青蘆</p>		<p>某 脈右虛左數營液內耗肝陽內風震動心悸眩暈少寐</p>	
---	--	----------------------	--	-----------------------	--	---------------	--	----------------------	--	--------------	--	---------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--------------------	--	----------------------	--	------------------------	--	---------------------	--	--------------------------------	--

風陽	生地	阿膠	麥冬	白芍
風陽	小麥	茯神	炙草	
風陽	吉三 心悸蕩浮頭中鳴七八年中頻發不止起居飲食如常此肝內風自動宜鎮靜之品佐以辛泄之味如枳中丹			
風陽	王氏 驚悸微腫內風動也			
風陽	人參	龍骨	茯神	五味
風陽	煨薑	南棗		
風陽	百 肝內風氣按內風上騰不熄心中熱驚怖多恐進利服藥忌法			
風陽	臨證指南醫案 卷一 肝風			
風陽	龜甲	龍骨	牡蠣	茯神
風陽	石菖蒲	遠志	當歸	
風陽	又 神識昏安夜不得寐胸膈悶時時閃爍欲動乃內風不熄也通補心法			
風陽	生地	丹參	茯神	琥珀
風陽	葛蒲	天冬	麥冬	桔梗
風陽	王氏 神呆不語心熱煩躁因驚而後起水目下肉膝刺痛時微痞頭即搖肝風內動變瘰癧之象			
風陽	小川連	黃芩	阿膠	牡蠣
風陽	陳 虛風麻痺清痰阻寒 秦皮			

天麻	鈞藤	白蒺	甘菊
連翹	桑枝		
包 右太陽痛甚牙關緊閉環口牽動咽喉如有物阻乃湯升化風肝病上犯陽絡大便欲閉議用龍蒼丸每服二錢使是風痰最宜急治乃神速大便行也			
又 肝風內竅脈象縷細有外脫之危今牙關緊閉痺不納湯水雖有方藥難以通關當刮指甲末畧以溫湯調灌倘得開關再議他法另以蘇合香擦牙			
鄭 九脈右弦頭脹耳鳴火升此肝陽上鬱清痰失司細生地 夏枯草 石決明 川斛			
臨證指南醫案 卷一 肝風			
茯神	桑葉		
陳 夏季陽氣暴升煩勞擾動致內風上阻清痰口喘舌強呵欠機竅阻痺不靈脈數舌胎忌投溫散乃司氣所致非表邪為病也			
犀角	羚羊角	鬱金	菖蒲
鈞藤	連翹	橘紅	竹瀝
又 清絡得效火風無疑忌投剛燥			
犀角	羚羊	鬱金	菖蒲
生地	玄參	廣皮	竹瀝
又 脈數面赤肝風尚動宜和陽熄風			
		薑汁	

鮮生地 玄參 羚羊角 連翹 菖蒲枳		鮮銀花 麥冬		汪如淋舌暗而赤亮汗出未病前一日頓食麪頗多病來倉猝乃少陰腎臟陰陽不續厥陰肝風突起以致精神目眩今七八日來聲音不出乃機發不靈治法以固護正氣為主宜利上焦痰熱佐之若地冬養陰陰未燥生徒使邪滯在腕急則治標古有諸灸挨過十四十五日黃有轉機		人參 半夏 茯苓 石膏蒲		竹瀝 黃汁		臨證指南醫案 卷一 肝風 五		左脇中筋跳未平猶是肝風未熄胃津內乏無以擁護此清養陽明最要蓋胃屬脾腑強不受木火來侵病當自減與客邪速攻純虛重補迥異 酸棗仁湯去川芎加人參		又諸恙向安惟左脇中動躍多年時有氣升欲噫之狀肝陰不足陽震不息一時不能遽已今宜加乙癸同治始緩		人參 茯神 知母 炙草		砂砂桑麥冬 調入金箔 宜用氣芍		又鮮生地 麥冬 竹葉心 知母 冲冷參湯	
-------------------	--	--------	--	--	--	--------------	--	-------	--	----------------	--	--	--	--	--	-------------	--	-----------------	--	---------------------	--

席五脈來弦動而虛望六年歲陽明脈衰厥陰內風暗旋不熄遂致胃脈不主束筋骨以利機關肝陽直上巔頂汗從陽氣泄越春月病發勞力病甚此氣愈傷陽愈動矣法當甘溫益氣攻病驅風皆劫氣傷陽是為戒律		人參 黃芪 當歸 炙草		冬桑葉 麥冬 地骨皮 花粉		孫氏胃虛肝風內震嘔痰咳逆頭痛眩暈肢麻汗出寒熱二陳湯加天麻鉤藤		沈六色蒼形瘦木火體鍊身心過動皆火化去吐痰衝氣乃肝胆相火犯胃過膈納食自少陽明已虛解鬱和		臨證指南醫案 卷一 肝風 五		中兩調肝胃節勞戒怒使內風勿動為上		柳杞子 酸棗仁 炒柏子仁 金石斛		半夏麴 橘紅 茯苓 黃菊花膏丸		梁木火體質復加鬱勃肝陰愈耗厥陽升騰頭暈目眩心悸養肝熄風一定至理近日知飢少納漾漾欲嘔胃逆不降故也先當泄木安胃為主		桑葉一錢 鉤藤三錢 遠志三分 石膏蒲三分		牛夏麴錢 廣皮肉半錢 金斛一錢 茯苓三錢		又左脈弦氣撐至咽心中憤憤不知何由乃陰耗陽亢之象議養肝之體清肝之用	
--	--	-------------	--	---------------	--	--------------------------------	--	--	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------	--	---	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------------------	--

肝鬱 結滯	<p>九孔石決明<small>具一</small> 鈞藤<small>一</small> 橘紅<small>一</small> 抱木茯神<small>三</small></p> <p>鮮生地<small>三</small> 羚羊角<small>八</small> 桑葉<small>一</small> 黃甘菊<small>錢</small></p> <p>年歲壯盛。腕有氣痕。嘔噦。氣降乃平。流痰未愈。</p> <p>舉九腫硬。今入夜將寐。少腹氣衝至心。竟夕不寐。不寐。</p> <p>頭眩口花。耳內風雷。四肢麻痺。肌膜如刺。如虫行。此屬。</p> <p>保持怒。內損乎肝。致少陽上聚為癰。厥陰下結為疝。</p> <p>衝脉不靜。脉中氣逆。混擾。氣燥熱化。風陽交。營液日。</p> <p>耗。變亂種種。總是肝風之害。非攻消溫補能治。惟以靜。</p> <p>養。勿加怒。半年可望有成。</p>
肝鬱	<p>阿膠 細生地<small>五用北地消去</small> 天冬 茯神</p> <p>臨證指南醫案 卷一 肝風 天 美</p>
<p>陳小麥 南棗肉</p> <p>王五 驚悸。怒動肝。內風陽氣沸騰。腕痺阻。筋惕肌麻。</p> <p>皆風木過動。致陽明日衰。先以鎮陽熄風法。</p>	<p>阿膠 細生地 生牡蠣 川斛</p> <p>小麥 茯神</p>
肝風	<p>離愁。結。都係情志中自病。恰逢冬溫。陽氣不潛。初。</p> <p>交春。陽已勃然。變化內風。遊行擾絡。陽但上。陰不。</p> <p>下。清竅為蒙。狀如中厥。舌暗不言。劉河間謂將息失。</p> <p>宜。火盛水衰。風自內起。其實陰虛陽亢為病也。既不按。</p> <p>法論病設治。至驚雷。身即汗泄。春分氣暖。而晝夜。</p>

<p>寐不肯寐。甚至焦煩。迥異於平時。何一非陽氣獨熾。使。</p> <p>然耶。夫肝風內擾。陽明最當其衝。犯病中暴食。以內風。</p> <p>消熾。求助於食。今胃脈下。氣愈不振。不司束筋骨。以。</p> <p>利機開。致鼻準光亮。肌肉浮腫。考古人虛風。首推侯氏。</p> <p>黑散。務以填質。腸胃空。陰底幾內風可息。奈何醫者。不。</p> <p>曰清火豁痰。即曰膩補。或雜風藥。內因之。豈有形質。</p> <p>可攻。偏寒偏熱。皆非至理。</p>	<p>生牡蠣 生白芍 炒生地 菊花炭</p> <p>炙甘草 南棗肉</p>	<p>大凡攻病。驅邪藥。以偏勝。如內經。鹹勝苦。勝辛之。</p> <p>臨證指南醫案 卷一 肝風 天 美</p>	<p>類藉其剋制。以圖功耳。今則情志內因。致病。係乎陰。</p> <p>陽。臟腑不利。理偏就。和宜崇生氣。如天地間。四時陰。</p> <p>陽迭運。萬物自有生長之妙。案中曰。陽胃不潛。法當。</p> <p>和陽。以就陰。牡蠣。體沉味鹹。佐以白芍之酸。水生木。</p> <p>也。地黃微苦。菊微辛。從火炒變為苦味。木生火也。益。</p> <p>以甘草大棗之甘。充養陽明。火生土也。藥雖平衍。無。</p> <p>奇。實泰軒岐底蘊。世皆忽畧不究。但執其藥治何病。</p> <p>者多矣。</p> <p>經云。東方生風。風生木。木生酸。酸生肝。故用為風木。</p> <p>之臟。固有相火內寄。假陰用陽。其性剛主動。主升。全。</p>
--	---------------------------------------	--	--

賴腎水以涵之血液以濡之肺金清肅下降之令以平之中宮敦阜之土氣以培之則剛勁之質得為柔和之體遂其條達暢茂之性何病之有倘精液有虧肝陰不足血燥生熱則風陽上升發絡阻塞頭目不清眩暈跌仆甚則癱瘓痲厥矣先生治法所謂緩肝之急以熄風滋腎之液以驅熱如虎潛侯氏黑散地黃飲子滋腎丸復脈等方加減是介以潛之酸以收之厚味以填之或用清上實下之法若思慮煩勞身心過動風陽內擾則營熱心悸驚怖不寐脅中動躍治以酸棗仁湯補心丹枕中丹加減清營中之熱

臨證指南醫案 卷一 肝風 三

佐以飲攝神志若因動怒鬱勃火風交熾則有二陳龍春風木過動必犯中宮則嘔吐不食法用泄肝安胃或填補陽明其他如辛甘化風甘酸化陰清金平木種種治法未能備敘然肝風一症患者甚多因古人從未以此為病名故醫家每每忽畧余不辭杜撰之咎特為拈出另立一門以便後學考覈云

肝風即中風之一類而方長多却不必另立一門

眩暈

徐脈左浮弦數痰多皖中不爽煩則火升眩暈靜坐神識稍安議少陽陽明同治法

羚羊角 連翹 香豆豉 廣皮白

牛夏麴 黑山梔 宜用礞石之品

其痰火風在上舌乾頭眩

天麻 鈎藤 菊花 橘紅

牛夏麴 茯苓 山梔 花粉

某酒客中虛痰暈二陳加朮白蒺藜天麻

臨證指南醫案 卷一 眩暈 三

內風 江十脈弦動眩暈痰名胸痺室寒此清陽少旋內風日澹

當春地氣上升最慮風拂

明天麻 白蒺 桂枝木 牛夏

橘紅 茯苓 苡仁 炙草

又頭額悶脹痰多作眩外臺茯苓飲加羚羊角桂枝

竹瀝湯汁法九

吳四診脈孔弱痰多眩暈心神過勞陽升風動不可過飲

助升治痰須健中熄風可緩其宜加茯苓

九蒸白朮 炒杞子 白蒺 茯苓 菊花炭

周內風挾痰眩暈吐沫清水

肝風		牛夏	茯苓	廣皮	天麻
張		鉤藤	菊花		
肝風內沸劫燥津液頭暈喉舌乾渴		大生地	天冬	麥冬	更肉
阿膠		生白芍	宜加風藥		
陳		肝風動逆不熄頭暈			
九製首烏		四兩	甘菊炭	一兩	枸杞子
黑芝藤		二兩	巨勝子	一兩	牛膝
青葉汁法丸					茯神
洪		四兩	內風逆頭暈		
臨證指南醫案		卷一	眩暈		
經霜桑葉		一錢	炒黃甘菊花炭	一錢	生左牡蠣
黑稻豆皮		三錢	徽州黑芝藤	二錢	茯神
某		兩寸	脉浮大氣火上升頭眩甚則欲嘔吐厥陰上干		
久則陽明失降土被木剋脾胃俱傷先當鎮肝陽					
製首烏		稽豆皮	炒杞子	柏子仁	
紫石英		茯神	天冬	南棗	
某		操持驚恐相火肝風上竄目跳頭眩陰弱欲遺脉左			
弦勁右小平					
生地		白芍	丹皮	鉤藤	
天麻		白茯苓	黃菊花	橘紅	

王		三	辛甘寒腦暈已發此絡脈中熱陽氣變現內風上冒		
是根本虛在下熱化內風在上上實下虛先清標恙					
羚羊角		立參心	鮮生地	連翹心	
鬱金		石菖蒲			
某		四兩	前方去葛蒲鬱金加川貝花粉		
勞陽升病斯發矣據述幼年即然藥餌恐難杜絕					
熟地		四兩	龜版	三兩	牡蠣
五味		一兩	茯神	二兩	牛膝
五二煩勞陽氣大動變化內風直冒清空遂為眩暈能食					
臨證指南醫案		卷一	眩暈		
膚充病不在乎中上以介類沉滑真陽鹹酸之味為宜					
淡菜膠		龜版膠	阿膠	熟地	更肉
茯苓		川斛	建蓮	山藥漿丸	
某		四兩	營虛內風逆心悸頭暈		
炒杞子		柏子仁	三角胡麻	川斛	
生左牡蠣		冬桑葉			
本		七	高年頗得納穀安寢春夏以來頭暈目眩不能健步		
此上實下虛腎氣衰不主攝納肝風動清穀漸聚大凡					
腎宜溫肝宜涼溫納生涼乃補方之劑					
附都氣加車前淡天冬建蓮丸					

肝風中風頭風門合而論之

華輔雲

經云諸風掉眩皆屬於肝頭為六陽之首耳目口鼻皆係清室之發所患眩暈者非外來之邪乃肝膽之風陽上冒耳甚則有昏厥跌仆之虞其症有夾痰夾火中虛下虛治膽治胃治肝之分火盛者先生用羚羊山梔連翹花粉玄參鮮生地丹皮桑葉以清泄上焦痰絡之熱此先從膽治也痰多者必理陽明消痰如竹瀝薑汁葛蒲橘紅二陳湯之類中虛則兼用人參外臺茯苓飲是也下虛者必從肝治補腎滋肝有陰潛陽鎮攝之治是也至於天麻鉤藤菊花之屬皆係熄風之品可隨症加入此症之原本之肝風當與臨證指南醫案

頭風

暑熱上

趙

右偏頭痛鼻竅流涕仍不通爽咽喉癢痛寤醒肢冷汗出外邪頭風已留數月其邪混處精氣血成爲蒙閉豈是發散清寒可解頭顱藥餌欲求清揚當刺風池

方之無不切

西瓜衣 鮮薑根 苡仁 通草 黃芩 桑葉 炒丹皮 川斛 牛

木火土

何

右偏頭痛從牙齦起此乃陽明少陽金平之病方不

炒生地 錢 炒丹皮 錢 川斛 錢 牛

炒杞子 錢 桑葉 錢 炒丹皮 錢 川斛 錢 牛

臨證指南醫案

卷一 頭風

錢

王中 中年陰中之陽已虛內風偏頭痛冷淚出 還少丹

陽上

徐

頭風既愈復發痛甚嘔吐不已陽明胃虛肝陽化風

愈動恐有失明之憂此乃胃中虛之症當治之

炒半夏 茯苓 苦丁茶 菊花炭

炒杞子 柏子霜

五陽明脈弦大而堅厥陰脈小弦數促而赤頭痛連及

腦後驚惕肉瞤熱熱汗出早晨小安入暮偏劇此操持

佛體肝陽挾持內風直上竄頂木火虛胃爲嘔逆陽越

爲面赤汗淋內因之病加以司候春氣慮有風濕癰瘰

之奴夫肝爲剛臟胃屬陽土姑議柔緩之法冀有陽和

風燥之理 復脉去參黃桂加雞子黃白芍

王 始用茶調散得效今宜養血和血

川芎 歸身 白芍 酒炒 白朮 炒 桑枝

朱三頭風目痛昏赤火風上冒最多及詢病有三四年遇

風冷為甚其衛陽清氣久而損傷非徒清散可愈從治

風先治血意

杞子 歸身 炒白芍 沙苑

菊花 鉤藤

頭風一症有偏正之分偏者主乎少陽而風清火鬱

為多前人立法以柴胡為要藥其補瀉之間不離於

臨證指南醫案 卷一 頭風

手

此無如與之陰虛火浮氣升吸短者則厥脫之萌由

是而索矣先生則另出心裁以桑葉丹皮山梔荷葉

透熱清涼使少陽潛過之邪亦可倏然而解倘久

則傷及肝陰聚入厥陰柔鎮可也所云正者病情不

一有氣虛血虛痰厥腎厥陰傷陽浮火亢邪風之不

同按經設治自古分晰甚明茲不再述至於肝陰久

耗內風日旋厥陽無一息之寧病之勢已極此時

豈區區湯散可解計惟與復脈之純甘壯水膠黃之

柔婉以熄風和陽俾剛亢之威一時頓熄子用之屢

效如神決不以虛訣為助

虛勞

王二此少壯精氣未壯致奇脉網維失護經云形不足者

溫之以氣精不足者補之以味今納穀如昔當以血肉

充養補之以味其苦竟以何食調之

牛骨髓 羊骨髓 猪骨髓 炙神

枸杞 當歸 湖蓮 芡實

溫三陰虛骨振 六味加麋角膠秋石川石斛膏

嗽七癆勞在出幼之年形脉生氣內奪冬月可延入夏難

挽由真陰日消救除無速功故難治 兩儀煎

臨證指南醫案 卷一 虛勞

手

陰一春病至夏日漸壯已消奪是天地大氣發泄真氣先

傷不主內守為真氣之虛不加靜養損不肯復故治嗽

治熱無用交節病加尤屬虛象脉左數甚凡有漏夢取

離全效 此方不主治之症

熟地 炒山藥 建蓮 茯苓 猪脊筋

徐清金潤燥熱緩神象乃病衰成勞矣男子中年行走

無力寐中咳逆溫補剛燥難挽

天冬 生地 人參 茯苓 白蜜

黃六陰傷勞損

清阿膠 雞子黃 生地 麥冬

麻子仁	炙甘草	南棗
某	攝陰得效佐以益氣合補三陰之勝	
人參	熟地	炒杞子
牛膝炭	建蓮	炒山藥
		炙實
錢	陽外泄為汗陰下注則遺二氣造偏陰虛熱勝腦為	
	髓液腹是至陰皆陽乘於陰然陽氣有餘益見陰弱無	
	以交戀其陽因病致偏偏久致損坐功進氣陰陽未協	
	損不肯復頗為可慮今深秋入冬天令收肅身氣泄越	
	入暮灼熱總是陰精損傷而為消燥耳	
川石解	妙知母	女貞子
		茯神
臨證指南醫案	卷一	虛勞
		吳
糯稻根	小黑糯米皮	
又	暮夜熱熾陰虛何疑但從前表散致衛陽疏泄穿山	
	甲鑽筋流利後致經絡氣血劫撤內損不復衛陽藩籬	
	交空斯時亦可掙半壁矣失此機宜秋收冬藏主令其	
	在封固盤藏下張季明謂元無所歸則熱灼亦是	
人參	河車	熟地
		五味
		蓮肉
山藥	茯苓	食後逾時服六神湯
張	七	有年呼氣頻和吸氣則胸中暢是肝腎至陰臟絡
		之虛初投辛酸而效兩和用之體用耳大旨益腎當溫
		複入涼肝滋液忌投剛燥

大熟地	天冬	枸杞	柏子霜	茯苓
桂圓肉	女貞子	川斛	蜜丸	
徐	今年長夏久熱傷損真陰深秋天氣收肅奈身中泄			
	越已甚吸短精滑消渴眩暈見症却是肝腎脈由陰漸			
	損及陽明胃絡納穀減肢無力越人所云陰傷及陽最			
	難充復誠治病易治損難耳			
人參	天冬	生地	茯神	
女貞	遠志			
二	少年形色衰奪見症已屬勞怯生旺之氣已少藥難			
奏	攻求醫無益食物自適者即胃弱為神扶持後天冀			
臨證指南醫案	卷一	虛勞		
		吳		
其久延而已				
魚鱉	湖蓮	秋石	炙實	金櫻子
周	七	脉神形色是老年衰憊無攻病成法大意血氣有情		
		之屬栽培生氣而已每日不拘用人乳或牛乳約茶送		
		許燉入薑汁三分		
某	女	交夏潮熱口渴肌膚甲錯此屬骨蒸潮熱		
坐驚甲	銀柴胡	青蒿	黃芩	
丹皮	知母			
湯	女	天癸未至入暮寒熱此先天真陰不足為損怯延接		
		之病腹膨減食治在太陰厥陰尚當問有或否		

熟白朮二錢	生厚朴一錢	當歸二錢	丹皮一錢
淡黃芩一錢	生蟹甲一錢		
此一通一補之法。白朮補太陰。厚朴通陽明。當歸補厥陰。丹皮泄少陽。黃芩清氣分之熱。蟹甲滋血分之熱也。			
陳二科年陰虧陽亢。春陽化風。地升暮熱。晨汗肌榮。白朮數虛。非客邪清解。倣仲景復脈法。本方去薑桂加甘蔗汁。			
三十稔年純陽諸陽皆聚於骨。陰未充長。陽未和諧。凡過動煩怒等因。陽驟升。顛竊驚風。痛止陽潛入陰也。此臨證指南醫案卷一 虛勞 單			
非外邪。常用錢氏六味丸。加龜甲知母。鹹秋石。以滋養壯陰。			
曹三肌肉蒼赤。脈小數疾。童真陰未充長。囊下疳前已有漏。后陽獨升降。顛竊如蒙。常與壯水制火。猶慮變幻損性。生六味去萸肉。加生白芍。黃柏。知母。人中白。蜜丸。			
施三脈尺垂。少藏。睡痰灰黑。陰水內虧。陽火來乘。皆損性之萌。可冀胃旺加餐耳。年歲已過三旬。苟能靜養百天。可以充旺。			
熟地	天冬	川斛	茯神
山藥	建蓮	芡實	秋石
			猪脊髓九
			遠志

張勞煩。夏秋氣洩而病。交小雪不復元。咽中微痛。血無華色。求源內損。不藏。陰中之陽不伏。恐春深變病。	熟地炭	清阿膠	川斛	浸白	天冬	秋石分二
許三陰陽及陽。畏風外冷。午後潮熱。舌絳渴飲。剛峻難進。腰脊墜。音嘶。心嘈。始與柔陽滋液。	首烏	枸杞	天冬	黑糯米皮		
黃當純陽發泄之令。辛散亂進。火升咽乾。氣促病根在下焦。陰虛成勞。最難調治。	茯神	建蓮				
熱地	妙山藥	五味	芡實			
臨證指南醫案卷一 虛勞 單						
勞傷三年。肉消脂竭。吸氣喘促。欲咳不能。出聲必踞。按季脇方稍自。寒濕喉中乾澀。直至胸脇。此五液俱竭。法在不治。援引人身脂膏。為繼續之算。莫言治病。	鮮河車	人乳汁	真秋石	血餘灰		
吳八遺濁已久。上冬喉中哽噎。醫投寒解。入夏不痊。絲腎陰為遺。消燥龍雷不肯潛伏。於冬令收藏之候。反升清空之所。內經以少陰之脈。循喉嚨。挾舌本。陰質既虧。五液無以上承。徒有浮陽蒸灼。柔嫩肺日傷。為痺為宣。不外陰虛陽亢。楷模但養育陰氣。貴乎寧靜。夫思煩。嗔怒。						

誦讀吟咏皆是動陽助熱不求諸已工夫日曉草木藥
汁生氣暗傷豈曰善策然未嘗無藥也益水源之弱制
火炎之熾早用六味減升澤加阿膠秋石龜膠牡蠣湖
蓮肉之屬以入下介以滑陽滋填滿固却是至靜陰藥
即時量進補心丹寧神解熱俾上下得交經年可冀有
成

沈 脉細潛入尺澤下元精虧龍旺火熾是口齒酸腫皆
下焦之虛陽上越引火歸原未嘗不通應以形瘦液少
慮其劫陰致有場起起患當預慮也 虎潛去廣歸續
陽加山藥茯苓青鹽羊肉膠丸

如證指南醫案

虛勞

望

安 脉堅咽阻心熱得暖氣畧爽腰膝更弱精滑自遺必
因驚恐傷及肝腎下虛則厥陽衝逆而上法宜鎮逆和
陽常填下

生白芍

桂枝木

生牡蠣

龍骨

茯神

大棗

小黑稽豆皮

鄭 脉數垂入尺澤穴中此陰精未充早泄陽失潛藏汗
出吸短龍相內灼升騰面目肺受驚風此皆交作兼之
胃弱少熱精濁下注溺管疼痛肝陽吸其腎陰善怒多
鬱顯然腎虛如繪識有恃之居以並精微古滑瀉互施
法

牛骨髓四兩 羊骨髓四兩 猪骨髓四兩 鹿角膠四兩 熟地八兩
人參四兩 芡肉四兩 五味三兩 茯苓四兩 湖蓮四兩
山藥四兩 茯神四兩 金櫻粉三兩 膠髓丸
曹 精氣內奪冬乏收藏人夜氣衝嗆逆不得安寢皆勞
怯之末傳難治

人參

鮮紫河車

茯苓

茯神

五味

紫衣胡桃肉

姚 脉左細右空色奪神天聲嘶乃精傷於下氣不攝固
而為咳勞怯重病藥難奏功用大造丸友
程 脉左弦減者扶服則冷熱上承交子後乾咳此腎虛
臨證指南醫案

卷一

虛勞

望

陽不潛伏乃虛症也從攝固引導勿驟進溫熱燥藥

熟地炭

生白芍

山藥

茯苓

丹皮

澤瀉

車前

牛膝

胡桃肉

蔣 脉細促三五欲歇止頭垂欲倒者枕即氣衝不續此
腎臟無根腎脉不用虛損至此必無挽法

熟地

五味

茯苓

青鉛

猪骨髓

朱 真陰久傷不復陽氣自為升降行動即覺外感皆體
質失氣外倚不固矣治在少陰用同本丸之屬加入潛
陽介類 固本丸加滋陰秋石

金 二虛症五年真陰既損不復長夏陰不生成陽擾升越

<p>顛頂而為痛脹。目患不痊。病根亦在肝腎。與潛陽以益乙癸。磁石六味加龜甲。</p>		<p>胡厥陽上衝。心痛振振。消渴齒血。都是下焦精損。質重味厚。填補空際。可冀其效。</p>		<p>熟地 四兩 五味 二兩 茯神 二兩 建蓮 二兩</p>		<p>芡實 二兩 山藥 二兩 人乳粉 二兩 秋石 一兩</p>		<p>生精羊肉膠丸早服四錢</p>		<p>程今年厥陰司天。春分地氣上升。人身陽氣上舉。風乃陽之化氣。陰衰於下。無以制伏。上愈熱。下愈寒。總屬虛象。故龜膠人乳。皆血氣有情。服之小效者。非沉苦寒。</p>		<p>臨證指南醫案 卷一 虛勞 醫</p>		<p>咸也。定鹹味入陰。介類潛陽法。</p>		<p>炒熟地 龜膠 阿膠 炒遠志 炒山藥</p>		<p>湖蓮 六七日後仍進。玉膏。沉香。</p>		<p>蔣五肝脈用鹹味入陰。水生木體。是虛症治法。夏令大氣主泄。因煩勞病發。勢雖減於昔日。而脈症仍然。必靜養經年。陰陽自交。病可全去。議介類潛陽。佐酸味以飲之。</p>		<p>熟地 柏子霜 萸肉 五味 龜膠</p>		<p>淡菜膠 海參膠 真阿膠 龜版膠 茯苓</p>		<p>湖蓮 芡實 青蘆</p>		<p>金肝血腎精無藏。陽之依附。多夢紛紜。皆陽神浮越。當</p>	
--	--	---	--	--------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------	--	--	--	-----------------------	--	------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--	---	--	------------------------	--	---------------------------	--	-----------------	--	----------------------------------	--

<p>以介屬有情。填補下焦。</p>		<p>熟地 淡菜 阿膠 萸肉</p>		<p>小麥 龍骨 牡蠣</p>		<p>又腎虛氣攻於心。肝虛熱觸於心。都是精血內奪。神魂不主。任附。此重鎮以理其法。填補以實其下。血肉有情。皆充養身中形質。即治病法程矣。</p>		<p>熟地 牡蠣 淡菜 五味</p>		<p>萸肉 龍骨 杞子</p>		<p>吳十診脈細數。左垂尺澀。先天最素薄。真陰未充。當精補年歲。陰氣早泄。使體相刻。燃津液暗消。有虛怯根萌。</p>		<p>臨證指南醫案 卷一 虛勞 醫</p>		<p>宜至靜純陰。保養尤為要旨。知柏六味去丹澤加龜</p>		<p>甲天久指脊體丸</p>		<p>錢十據說。然自左升。直至耳前後脈。視面色油亮。足心灼熱。每午後入暮。皆然。上年用茶調散。宣通上焦鬱熱。不應。此肝腎陰火乘機。却因男子精虧。陽不下交。經言以滋填陰藥。必佐介屬重鎮。試以安寢。竟夜乃安。參陽動陰靜至理。</p>		<p>熟地 龜版 萸肉 五味 茯苓</p>		<p>磁石 黃柏 知母 猪脊髓丸</p>		<p>顧二陰精下損。虛火上炎。脊腰痠痠。痛。髓空。斯督帶諸脈</p>	
--------------------	--	--------------------	--	-----------------	--	--	--	--------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------------	--	-------------------------------	--	----------------	--	--	--	-----------------------	--	----------------------	--	------------------------------------	--

不用。法當填髓充液。莫以見熱投涼。

熟地水煮 杞子 魚膠 五味 茯神

山藥 湖蓮 芡實 金櫻膏爲丸

陳二喉痺。目珠痛。吸氣短促。曾咯血遺精。皆陰不內守。孤陽上越。諸竅當填下和陽。

熟地 枸杞炭 旱蓮草 菊花炭

女貞 茯苓

某二心煩不寧。目彩無光。少陰腎水枯槁。厥陽上越不潛。議用填陰潛陽。

人參一錢 熟地五錢 天冬一錢 麥冬三錢

臨證指南醫案 卷一 虛勞 吳

茯神三錢 龜版一兩

某女渴不欲飲。陰不上承。况寐醒神識不靜。易驚汗出。法當欬補。

人參 熟地炭 萸肉炭 茯神

五味 炒遠志

邵精血傷。氣不潛納。陽浮擾神。則魂魄不寧。臟陰不安。其位。

人參 炙草 建蓮 茯神

龍骨 金箔

盧有形血液。從破傷而損。神氣無以擁護。當此冬令。藏

陽。陽微畏寒。奇脈少津。乏氣貫布。行步欹斜。健忘若憤。何一非精氣內奪之徵。將交大雪。純陰無陽。冬至一陽來復。也見此離散之態。平素不受煖補。是氣元長旺。今乃精衰氣竭之象。又不拘乎此例也。

人參 鹿茸 歸身 炒杞子

茯苓 沙苑

馬陰精走泄於下。陽氣鬱胃於上。太衝脈衰。厥氣上衝。

陡然癰厥。陰陽既失交。偶內隨陽。厥從汗泄矣。宜

遠房韓。獨居靜室。醫治之法。從陰引陽。從陽引陰。大封

大固。以蟄藏爲要。百日可效。經年可以復元。

臨證指南醫案 卷一 虛勞 吳

淡從蓉 五味 遠志 茯神

芡實 建蓮 生羊腰子

孫四形軀豐溢。脈來微小。乃陽氣不足。體質理煩治劇。曲

運神機。都是傷陽之助。溫養有情。栽培生氣。即古聖春

夏養陽。不與逐邪攻病同例。用青囊班龍丸。

某二少壯。形神憔悴。身體前後牽掣。不舒。此奇經脈海乏

氣。少陰腎病何疑。

淡從蓉 甘枸杞 當歸 牛膝

沙苑 茯苓

某陰陽二氣不振。春初進八味減桂之辛。益以味芍之

酸從陽引陰兼以歸脾守補其營方得效驗茲當春升
夏令裏虛藏聚未固升泄主令必加煩倦古人謂寒則
傷形熱則傷氣是當以益氣為主通攝下焦兼之微內
經春夏養陽秋冬養陰為法非治病也乃論體耳
夏季早服青囊班龍丸方法
鹿茸 鹿角霜 鹿角膠 赤白茯苓
熟地 從蓉 補骨脂 五味子
晚服歸脾去木香加枸杞子
王氏凡女科書首篇必論調經既經必寔孕育結精十載
未能得胎病在至陰之虛延及奇經八脉述經遲晨泄
臨證指南醫案卷一 虛勞 吳
心若捕漾得食始緩肚脹久瀉都屬下損
人參 鹿茸 紫石英 茯苓
當歸 補腎脂 桑艾湯泛丸
汪氏女科首列調經今經不調和耳鳴心漾汗出畏恐神
痺兩足皆冷兼浮腫冬至節交病甚於前都因肝腎內
虛陽不交陰所至薛氏加減八味丸淡鹽湯送三錢
萬診脈數左畧大右脈率結足痿五更盜汗即醒有夢
情慾則遺自病半年脊椎六七節骨形凸出自述書齋
坐臥受濕若六淫致病新邪自解驗色脉推病是先天
稟賦原怯未經充旺用血腎精受戕致奇經八脉中乏

運用之力乃筋骨間病內應精血之損傷也
人參一錢 鹿茸二錢 杞子炒黑 當歸一錢
柏茴香炒黑 紫衣胡桃肉二錢 生雄羊內腎二錢
夫精血皆有形以草木無情之物為補益氣必不
相應也胎前氣血虧弱精血主臟臟體屬陰則即
愈劫胎矣至於丹溪虎潛法滑陽堅陰用知柏苦寒
沉着未通奇脉余以桑陽藥通奇脉不滯且血肉
有情栽培身內之精血但王道無近功多用自有益
宋六辛溫鹹潤乃桑陽通藥調腎照燥也服有小效是勞
傷腎真而八脉皆以廢弛失職議進升陽法
臨證指南醫案卷一 虛勞 吳
鹿茸 從蓉 歸身 杞子
柏子仁 杜仲 兔絲子 沙苑
范一父母弱症早衰稟賦不充旺年二十歲未娶見病
已是損怯此寒熱遲勞而發即內經陽維脉衰不司維
續衛衛包舉下部無力有形精血不得充瀉筋骨矣且
下元之損必累八脉此醫藥徒補無用
鹿茸 杞子 歸身 巴戟
沙苑 茯苓 柏茴香 羊肉膠丸
施 衝氣貫腸上咽形體日漸枯槁此勞傷肝腎而成損
怯由于精氣不生厥氣上逆耳議以通陽攝陰冀其漸

引漸收。非見病治病之方法矣。

茯苓 熟地 五味 枸杞 柏子霜

王十陽虛背寒肢冷陰虛火升煩驚宿病偏傷不復總在

虛損一門。銀攝之補宜商。

早用薛氏八味丸 晚歸脾去芪木香

某 肝腎損傷八脉無氣未老衰憊大著姑議通陽守陰一法俟明眼裁之。

淡從蓉 熟地炭 鹿角霜 五味子肉

柏子仁 茯苓

臨證指南醫案 卷一 虛勞 辛

王九搖搖驚恐肝腎臟陰大泄陽不附和陰中百脉之氣自足至巔起自湧泉以少陰之脉始此欲使陰陽翕圓管諸招集潰散卒伍所謂用藥如用兵

熟地 枸杞 當歸 五味

遠志 龜版 鹿鞭 羊肉

某 脉虛細夜熱晨寒煩倦口渴汗出臟液已虧當春氣外泄宗仲景凡元氣有傷當與甘藥之例陰虛者用復脉湯 此方之正方

炙甘草 人參 阿膠 火麻仁

生地 麥冬 桂枝 生白芍

某二陰傷及陽加以春夏大地陽氣主泄真無內聚形神

痿靡大凡熱必傷氣固氣正以迎夏至一陰來復

人參 熟地 五味 炒山藥

茯苓 建蓮

張四脈陰久虧八脉無力是久損不復況中脘微痛臍中動氣決非滋膩藥可服做大建中之製溫養元真壯其奇脉為通納方法

人參 生於朮 炙草 茯苓

熟地 淡從蓉 歸身 白芍

真薄桂 枸杞 五味 蜜丸服四錢

臨證指南醫案 卷一 虛勞 辛

許九善嘆食減無味大便溏瀉三年久病內傷何疑但清內熱潤肺理嗽總是妨碍脾胃思人身病損必先陰陽致偏是大陰脾臟日削自然少陽胆木來侮宗內經補臟通腑一法 四君子加桑葉炒丹皮

又 虛勞三年形神大衰食減無味大便溏瀉寒起背肢

熱從心熾每咳必百脉動掣間或脇肋攻觸種種見症都是病後傳過前議四君子湯以養脾胃中和加入桑葉丹皮和少陽木火使土少侵服已不應想人身中二

氣致偏則病今脉症乃損傷已極草木焉得振頭見病

治病諒無裨益益氣少靈理從營議食少滑泄非滋陰

所宜暫用景岳理陰煎法入鎮逆固攝若不胃難知
味實難擬法

又人參 秋石 山藥 茯苓 河車膠丸

張 汗多亡陽是醫人不知勞倦受寒病兼內傷但以風
寒外感發散致悞淹淹半年乃病傷不復能食者以氣
血兼補

人參 白朮 茯苓 沙苑

茯苓 歸身 枸杞

張九陰傷成勞因減食便溏寒熱姑從中治者以脾為營
胃主衛也 異功加五味子

邱證指南腎寒 卷一 虛勞 至

吳六虛損至食減腹痛便溏中宮後天為急不必泥乎痰
嗽緩治 異功散去朮加炒白芍煨益智仁

楊氏 背寒心熱胃弱少餐經期仍至此屬上損

生地 茯苓 炒麥冬 生扁豆 生甘草

仲 久嗽脾衰內消是因勞倦內傷醫不分自上自下損
傷但以苦寒沉降氣泄汗淋液耗夜熱胃口得苦傷殘
食物從此頓減老勞纏綿並能易安用建中法

黃芪建中湯去薑

又 照前方加五味子 用五味子但不得法

又 平補足三陰法

人參 炒山藥 熟地 五味

女貞子 炒黑杞子

下損及
時二脈細屬臟陰之損平素畏寒怯冷少年陽氣未得充
長夏令暴瀉是時令濕熱未必遽然虛損若此今穀減
形瘦步履頓加喘息勞怯顯然當理脾腎

早服加減八味丸 晚服異功散

某 由陰損及乎陽寒熱互起當調營衛 參芪建中湯

去薑

某 入夏發泄主令由下損以及中焦減穀形衰陰傷及

陽畏冷至下春季進河車羊肉溫養固髓方法積損難

臨證指南腎寒 卷一 虛勞 至

尤不禁時令之泄越耳古人減食久虛必須胃藥晚進

參朮膏早用封固佐升陽法長夏不復奈何

應生 鹿茸 鹿角霜 熟地 二兩 生鬼絲子 二兩

人參 一兩 茯苓 一兩 韭子 二兩 補骨脂 二兩

枸杞子 一兩 柏子霜 一兩 蜜丸早服四錢參湯送

參朮膏方 人參四兩另用泉水熬九蒸於木四兩另

用泉水熬各熬膏成以炭火厚掩乾灰將藥罐燉收

至極老為度每用膏二錢五分開水化服

李九勞怯形色奪肌肉消食減便滑兼痰吟喉痛知醫理
者再無清咽涼肺滋陰矣病人述心事操持病加顯然

內損關係臟真冬寒藏陽人身之陽升騰失交收致失
司豈見病治病膚淺之見識據說食進適時必有痛渴
經言食至小腸變化屈曲腸間有阻常有諸矣凡湯藥
氣升宜九刺疎補資生九食後服

服晨
人參 同功中奉
茯苓 黑殼建蓮

五味 芡實 山藥漿九

楊 髮墮於少壯之年能食不化噫氣小溲淋瀝便糞漸
細少年脾腎損傷宜煖下焦以醒中陽濟生九三錢四
水送下

陳 入陰損於下中焦運陽亦弱見症少年損怯先天不充
臨證指南醫案 卷一 虛勞 蓄

以後天繼續但食少難化膩滯勿用由陰損及陽用雙
補丸

某 久勞食減使淋不爽氣短促 異功加五味子

王 三脈如數潛入尺澤病起肝腎下損延及脾胃昔秦越
人云目下焦損傷過中焦則難治知有形精血難復急
培無形之氣為首食少便溏與錢氏異功散

蔡 久嗽氣浮至於減食泄瀉顯然元氣損傷若清降消
痰益損真氣大旨培脾胃以資運納煖腎臟以助冬藏
不失帶病延年之算異功散兼服

熟地炭 扶神 炒黑枸杞 五味

建蓮肉 炒黑遠志 山藥粉九 早上服

葉三病損不復八脈空虛不時寒熱間或便溏雖步履欹
食如常週身氣機尚未得雍和倘調攝失慎慮其反覆
前九藥仍進煎方宗脾腎雙補法

人參一錢 茯苓三錢 廣皮一錢 炒沙苑一錢

益智仁一錢 炒兔絲餅二錢 此方互作九者云云方子後

華二勞損加以煩勞肉消形脫潮熱不息胃倒泄瀉衝氣
上攻則嘔當此發泄主令難望久延

人參 訶子皮 赤石脂 蒸熟烏梅肉

新會皮 炒白粳米

臨證指南醫案 卷一 虛勞 蓄

呂 冲年久坐誦讀五志之陽多升咽乾內熱真陰未能
自旺於本宮診脈寸口動數怕有見紅之慮此甘寒緩
熱為穩不致胃枯耳

生地 天冬 女貞 扶神

炙草 糯稻根鬚

杜二陰精久損投以填納溫潤入夏至晚火升食物少減
仍屬陰虧但夏三月必佐胃藥

參鬚 麥冬 五味 扶神

建蓮 芡實

許 脈左堅上下直行精損熱自升降

細生地 玄參心 女貞 川斛 糯稻根	又 甜北沙參 天冬 炒麥冬 茯神	阿膠 秋石	又 人參 麥冬 生甘草 扁豆	胡三補三陰臟陰是迎夏至生陰而暈逆欲嘔吐痰全是厥陽犯胃上齋必靜養可制陽光之動久損重虛用甘緩方法 金匱麥門冬湯去半夏	王 春牛 寐則盜汗陰虛常春陽發泄胃口弱極六黃苦味未宜用甘酸化陰法 常同滋陰之藥不宜重補	人參 熟地 五味 炙草	臨證指南醫案 卷一 虛勞 癸	湖通 茯神	其二 誦讀身靜心動最易耗氣損營心脾偏多不時神煩心悸頭眩腕悶故有自來也調養澆灌營陰俾陽不升越恐擾動絡血耳	淮小麥 南棗肉 炒白芍 枳子仁	茯神 炙草 四分	某四 脉弦脇痛引及背部合減此屬肝損傳勞	桂枝木 生白芍 炙草 四分 歸身 一錢	茯神 三錢 生牡蠣 三錢 煨薑 一錢 南棗 三錢	某三 脉不嗜食腰痠無力咳煩勞營虛所致
-------------------	------------------	-------	----------------	--	---	-------------	----------------	-------	---	-----------------	----------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------

當歸 生白芍 桂枝木 茯苓	炙草 飴糖 煨薑 南棗	汪 脉左小右虛背微寒肢微冷痰多微嘔食減不甘此胃陽已弱衛氣不得擁護時作微寒微熱之狀小便短赤大便微溏非實邪矣當建立中氣以維營衛東垣云胃為衛之本營乃脾之源偏熱偏寒猶非正治	人參 歸身 米拌 桂枝木 白芍 炒焦 南棗	陸 勞傷陽氣不肯復元秋冬之交余宗東垣甘溫為法原得小效藥交味柴葛根是創二氣散越交經去固因氣疼痛中痞結皆清陽周喪無攻病成法唯以	臨證指南醫案 卷一 虛勞 丑	和補使營衛之行翼其少緩神甦而已	人參 當歸 炒白芍 桂心	炙草 茯神	又 右脉濡來去清平甘化陽用大建中湯	人參 桂心 歸身 川椒	茯苓 炙草 白芍 飴糖南棗	汪 脉心陽傷形寒骨熱脉來小弱非有停滯者與和營方	當歸 酒炒白芍 炙草 廣皮	煨薑 附片 大棗 同桂枝
---------------	-------------	--	-----------------------	---	----------------	-----------------	--------------	-------	-------------------	-------------	---------------	-------------------------	---------------	--------------

<p>程 脉左甚倍右病君相上亢莫制都因操持勞思所傷 若不山林靜養日藥不能却病</p>	<p>鮮生地 玄參心 天冬 丹參</p>	<p>扶神 鮮蓮肉</p>	<p>顏三操持思慮心營受病加以勞力泄氣痰帶血出脉形 虛小右部帶弦議用歸脾湯減桂圓木香白朮加炒白 芍妙麥冬</p>	<p>又 勞心營液既耗氣分之熱自灼手足心熱咽乾煩渴 多是精液之損非有餘客熱前議歸脾加減乃子母同 治法今以滋清制亢之劑理心之用以復五液</p>	<p>臨證指南醫案 卷一 虛勞 人參 天冬 麥冬 神傷精敗心腎不交上下交損當治其中 參朮膏米飲湯調送</p>	<p>華三春深地氣升陽氣動不奔馳飢飽即是勞傷內經勞 者溫之夫勞則形體震動陽氣先傷此溫者乃溫其力 義非溫熱藥也之謂勞傷久不復元為難治者有損者 益之之文益者補益也凡補藥氣皆溫味皆甘培生生 初陽是勞損主治法則春病入秋不愈議從中治據述 晨起未納水穀其效必甚胃藥坐鎮中宮為宜</p>
--	----------------------	---------------	--	--	--	--

<p>金匱麥門冬湯去半夏 徐七虛損四年肛癆成漏食物已減什三形瘦色黃當以 甘溫培中固下斷斷不可清熱理嗽</p>	<p>人參 茯苓 山藥 炙草</p>	<p>芡實 蓮肉 某 積勞神困食減五心熱汗出是元氣虛陰火盛宜補 中 生脈四君子湯</p>	<p>楊八內損陰及陽分即為勞怯胃弱少納當以建中湯加 人參</p>	<p>朱七既暮身熱汗出早涼仍任勞辦事食減牛色脉形肉 臨證指南醫案 卷一 虛勞 不足病屬內損勞怯 人參小建中湯 楊三知飢減食外寒忽熱久病行走喘促坐卧稍安此勞 傷不復議從中以益營補</p>	<p>九蒸冬朮 炙甘草 煨薑 南棗 汪九此勞力傷陽之勢非酒色傷陰之勞也胃自消憊生 氣日奪豈治勞藥可以奏功 黃芪建中湯去薑 仲八久勞內損初春已有汗出入夏食減皆身中不耐大 氣泄越右脉空大色痿黃衰極難復無邪病方法議封 固一法</p>	<p>人參 黃芪 熟於朮 五味</p>
--	--------------------	--	--------------------------------------	--	---	---------------------

嚴八脈小右弦久喘喘著左脈稍適二氣已偏即是損怯無逐邪方法清泄莫進當與甘緩黃芪建中去薑

又建中法頗安理必益氣以助其熱

人參 黃芪 焦木 炙草

歸身 廣皮白 劉升麻 燭柴胡

王二脈大而空亡血失精午食不運入暮反脹陰傷已及陽位纏綿反覆至矣 歸芍異功散

劉女年十六天癸不至預項癰痰入夏寒熱咳嗽乃先天稟薄生氣不來夏令發泄致病真氣不肯收藏病屬勞怯不治 戊巳湯去白朮

臨證指南醫案 卷一 虛勞 卒

某 陽傷背寒胃傷穀減 小建中湯

某 畏風面冷齒外陽微 參芪建中去薑加扶神

華二此勞怯損傷不復之病已經食減便溏欲嘔腹痛二氣交傷然後天為急拾仲景建中法都是百醫失

建中湯去糖加入參

尹九中年衰頹身動喘嗽脈細無神食減過半乃下元不主納氣五液蒸變枯槁未老先衰即是勞病

此方作九丸而人參五錢 紫太胡桃 炒鬼絲子 茯苓 五味 炒砂仁 山藥藥丸

金十竊則心悸步履如醉因于後傷氣上逆此皆高年

下焦空虛腎氣不納所致 八味丸三錢先服四日

淡菴蓉 河車膠 紫石英 小茴 杞子 三兩

胡桃肉 牛膝 五味 茯苓 沙苑 牛

補骨脂 桑椹子 紅棗肉丸

氣血滯 升陽 王 久客勞傷氣分痺阻則上焦清空諸竅不利初病在

氣久則入血身痛目黃食減形瘦由病患及乎元虛攻補未能除病思人身左升屬肝右降屬肺當雨和氣血使升降得宜若再延挨必癰滯日甚結為癰聚矣

旋覆花湯加桃仁歸身藥皮

肝腎虛 任督虛 郁 失血咳嗽喘而暮熱不止經水仍來六七年已不孕

臨證指南醫案 卷一 虛勞 卒

育乃肝腎衝任皆損二氣不交延為勞怯治以攝固包舉其泄越

鮮河車膠 黃柏 熟地 淡菴蓉

五味 扶神 蜜丸

屠二勞力傷陽延三年損傷延及中宮狀如反胃諸氣欬

斜交會失序遂有寒熱脫力損傷脾胃牛屬坤土當以

震天膏

乃經厚之氣不得貫串於四末有童損之憂

菴蓉 二兩 當歸 二兩 杞子 一兩 茯苓 二兩

川芎 五錢 沙苑 五錢 黃蘗 一條爲九

邢四 努力傷身痛無力 歸桂枝湯去芍加五加皮

虛損之症經義最詳其名不一考內經論五臟之損治各不同越人有上損從陽下損從陰之議其於鍼砭所莫治者調以甘藥金匱遵之而立建中湯急建其中氣伸飲食增而津血旺以致充血生精而復其真元之不足但用稼穡作甘之本味而酸辛鹹苦在所不用蓋舍此別無良法可醫然但能治上焦陽分之損不足以培下焦真陰之本也顧先生引伸三才固本天真大造桂枝龍骨牡蠣衍脈等湯以及固攝

臨證指南醫案 卷一 虛勞

奎

諸方平補足三陰法爲兼治五臟一切之虛而大開後人聲韻可爲損症之一助也大金匱又云男子脈大爲勞極虛亦爲勞夫脈大爲氣分泄越思慮鬱結心肺營損於上中而營分萎頓是歸脾建中養營四君五味異功等湯之所宜也脈極虛亦爲勞爲精血內奪肝腎陰不自立是六味八味天真大造三才固本復脈等湯以及平補足三陰固攝諸法所宜也然仲景以後英賢輩出豈無闡揚白隱之人而先生以上又豈無高明好學之輩然微令仲景先生之法而能治虛勞者不少概見卽如東垣丹溪輩素稱前代

名醫其於損不肯復者每以參朮爲主有用及數者其意謂有形精血難復急培無形之氣爲要旨亦卽仲景建中諸湯而擴充者也又厥後張景岳以命門陰分不足是爲陰中之陰虛以左歸飲左歸丸爲主命門陽分不足者爲陰中之陽虛以右歸飲右歸丸爲主亦不外先生所用三才固本天真大造等湯以及平補足三陰固攝諸法而又別無所見也故後人稱仲景先生善治虛勞者得其肯矣 柳滋九

久虛不復謂之損損於不復謂之勞此虛勞損三者相繼而成也然其致病之由原非一種所現之候難

臨證指南醫案 卷一 虛勞

奎

以鐵精大凡因煩勞傷氣者先生用治上治中所以有甘寒補肺胃之清津桑刺養心脾之營液或甘溫氣味建立中宮不使二焦日偏營衛得循行之義又曰氣慾傷精者常治下而兼治八脈又須知填補精血精氣之分益火滋陰之異或靜攝任陰溫理奇陽之妙處若因他症失調蔓延而致者當認明原委隨其機勢而調之揣先生之用意以分其體質之陰陽爲要領上中下見症爲着想傳變至先後天爲生死隨訣若逐節推求一一有根可考非泛泛然而湊用藥味補藥漫言爲治也 何新甫

欬嗽

吐血

失音

肺癆

臨證指南醫案 卷二 目

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同校

姪旦王堂

咳嗽

某^五寒傷衛陽咳嗽 此仲景正法

川桂枝^{五分} 杏仁^{三錢} 苡仁^{三錢} 炙草^{四分}

生薑^{一錢} 大棗^{二枚}

某^三勞傷陽氣形寒咳嗽 桂枝湯加杏仁

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

某^四寒熱咳嗽當以辛溫治之 桂枝湯去芍加杏仁

某^五形寒咳嗽頭痛口渴 桂枝湯去芍加杏仁花柳

某咳嗽寒熱

杏仁^{三錢} 嫩蘇梗^{一錢} 此宗人以後注升桂枝湯所

象貝母^{一錢} 生甘草^{三分}

王^三脉沉細形寒咳

桂枝^{一錢} 杏仁^{三錢} 苡仁^{三錢} 炙草^{五分}

生薑^{一錢} 大棗^{二枚}

吳^四咳嗽聲音漸窒診脉右寸獨堅此寒熱客氣包裹肺

俞鬱則熱先以麻杏石甘湯

風									
又 羣生湯									
徐四癰屬外邪。聲不揚。必是留邪。干於肺系。故咳嗽不已。納食起居如常。中下無礙。但以搜逐上焦。勿令邪結。可望病已。									
麻黃 宜用酒洗。生甘草 射干 杏仁									
某八風邪阻於肺。咳喘而浮。當辛散之。									
麻黃 五分 杏仁 三錢 生甘草 三分 生石膏 三錢									
某三風襲肺。咳喘鼻寒。當以辛涼解散。									
杏仁 嫩蘇梗 桑皮 象貝									
桔梗 杏仁									
臨證指南醫案 卷二 咳嗽 二									
某女風熱上沖。痰多咳嗽。									
杏仁 嫩蘇梗 橘紅 桑葉									
白沙參 通草									
夏五風邪咳不止。									
薄荷 前胡 杏仁 桔梗									
橘紅 桑皮 連翹 枳殼									
方 煩勞衛氣。風邪上受。痰氣交阻。清發失和。鼻塞音低。咳嗽。皆足肺病。辛以散邪。佐微苦以降氣。為治。									
杏仁 蘇梗 辛荑 牛蒡子									
杏仁 橘紅 枳殼 枳殼									

風溫									
項二風溫。脈虛。嗽。									
桑葉 薄荷 杏仁 象貝									
大沙參 連翹									
沈 脈右搏數。風溫。陰咳。									
桑葉 杏仁 象貝 苡仁									
瓜蒌皮 白沙參									
某女風溫發熱。咳。									
薄荷 連翹 杏仁 桑皮									
地骨皮 木通 黃芩 炒查									
某十頭脹。咳嗽。此風溫上侵所致。									
臨證指南醫案 卷二 咳嗽 三									
連翹 一錢 薄荷 七分 杏仁 一錢 桔梗 一錢									
生甘草 三分 象貝 一錢									
某十風溫上受。咳嗽。失音咽痛。									
杏仁 薄荷 連翹 桔梗 為宜									
生甘草 射干									
風溫化 邱 向來陽氣不充。得溫補。每每奏效。近因勞煩。令陽氣弛張。致風溫過肺。衛以擾心。營欲咳。心中先痒。痰中偶帶血點。不必過投。沉降清散。以辛甘涼理。上燥清絡熱。蔬食安閒。旬日可安。									
冬桑葉 玉竹 大沙參 甜杏仁									

生甘草 苡仁 糯米湯煎	宋二脉右浮數風溫干肺化燥喉間痒咳不爽用辛甘涼潤劑	桑葉 玉竹 大沙參 甜杏仁	生甘草 糯米湯煎	某積勞更受風溫咽乾熱咳形脉不充與甘緩柔友桑葉一錢 玉竹五錢 南沙參一錢 生甘草五分	甜水梨皮二兩	文風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽口乾喉痒先進清肺杏仁 花粉 蘇子 象貝	臨證指南醫案卷二咳嗽四	山梔 橘紅	薛三風熱咳經月不止	淨木薑根 桑葉 大沙參 生苡仁	地骨皮 象貝 滑石 橘紅	某風溫客邪化熱劫燥胃津喉間燥癢哈咳用清養胃陰是土旺生金意 金匱麥門冬湯 金匱麥門冬湯 金匱麥門冬湯	陸三陰虛體弱風溫咳嗽苦辛開泄肺氣加病今舌咽乾燥思得涼飲藥劫胃津無以上供先以甘涼令其胃喜	倣經義虛則補其母	桑葉 玉竹 生甘草 麥冬元米炒
-------------	--------------------------	---------------	----------	---	--------	---------------------------------	-------------	-------	-----------	-----------------	--------------	---	---	----------	-----------------

白沙參 蔗漿	某外受風溫鬱遏內因肝膽陽升莫制斯皆肺失清肅咳嗽不解經月來猶覺氣壅不降進食頗少大便不爽津液久已乏上供腑中之氣亦不宜暢議養胃陰以杜陽逆不得泛泛治咳	麥冬 沙參 玉竹 生白芍	扁豆 茯苓	某溫邪外襲咳嗽頭脹當清上焦	杏仁 桑皮 桔梗 象貝	通草 蘆根	臨證指南醫案卷二咳嗽五	某二咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳	桑葉 川貝母 白沙參 杏仁	兜鈴 鮮枇杷葉	某八陰虛挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥	桑葉 杏仁 川貝 白沙參	生甘草 甜水梨皮	某脉細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪	桑葉 杏仁 川貝 苡仁	兜鈴 鮮蘆根 又照前方加白沙參冬瓜子	某四脉右弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上伏之故
--------	---	--------------	-------	---------------	-------------	-------	-------------	-----------------------	---------------	---------	------------------	--------------	----------	----------------	-------------	--------------------	---------------------

<p>桑葉 杏仁 白沙參 南花粉</p>	<p>瓊鈴 甜水梨肉</p>	<p>王二脉小數能食乾咳暮甚冬藏失納水虧溫伏防其失</p>	<p>血用復脈法 復脈湯去參薑桂</p>	<p>張七冬溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚蟄節嗽減用</p>	<p>六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法為</p>	<p>調體治病兼友近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜</p>	<p>坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升</p>	<p>無降最有失血之虞况體豐肌柔氣易泄越當暫停誦</p>	<p>讀數日可愈</p>	<p>臨證指南醫案 卷二 咳嗽 六</p>	<p>桑葉 甜杏仁 大沙參 生甘草</p>	<p>玉竹 青蔗漿</p>	<p>陰虛感 楊二形瘦色蒼體質偏熱而五液不充冬月溫煖真氣少</p>	<p>藏其少陰腎臟先已習習風生乃陽動之化不以育陰</p>	<p>驅熱以却溫氣泛泛乎辛散為暴感風寒之治過辛泄</p>	<p>肺肺氣散斯咳不已苦味沉降胃口戕而腎關傷致食</p>	<p>減氣怯行動數武氣欲喘急封藏納固之司漸失內損</p>	<p>顯然非見病攻病矣靜養百日猶冀其安</p>	<p>麥冬 米拌 甜沙參 生甘草 南棗肉</p>	<p>冲入青蔗漿一杯</p>
----------------------	----------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

<p>氣分熱 王二氣分熱熾頭脹痰嗽</p>	<p>連翹 石膏 杏仁 鬱金</p>	<p>薄荷 山梔</p>	<p>又照前方去山梔加薄荷皮枯梗</p>	<p>范四脉左弱右寸獨搏久咳音嘶寐則成噎阻咽平昔嗜</p>	<p>飲胃熱遺肺酒客忌甜微苦微辛之屬能開上痺</p>	<p>山梔 香溪鼓 杏仁 括嬰皮</p>	<p>鬱金 石膏</p>	<p>林氏宿病營衛兩虛茲當燥氣上犯暴涼外侮氣餒衛怯</p>	<p>肺先受邪脉浮數咳喘欲嘔上熱下冷宜先清化上氣</p>	<p>臨證指南醫案 卷二 咳嗽 七</p>	<p>有取微辛微苦之屬</p>	<p>桑葉 杏仁 蘇梗 山梔</p>	<p>象貝 苡仁 糯米湯煎</p>	<p>王十歲嗽緩潮熱程年陰虛氣熱所致</p>	<p>地骨皮 青蒿 知母 生甘草</p>	<p>南沙參 川斛 三錢</p>	<p>某嗽已百日脉右數大從夏季伏暑內鬱治在氣分</p>	<p>桑葉 生甘草 石膏 苡仁</p>	<p>杏仁 蘇梗</p>	<p>熱鬱成 史十四濕鬱溫邪總是阻遏肺氣嘔咳脫痞即病形篇中諸</p>
-----------------------	--------------------	--------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------------	----------------------	------------------	-----------------------------	---------------------	--------------	------------------------------------

嘔喘滿皆屬於肺。不明口鼻受侵阻氣之理。清中疎導。乃過病所伐其無病之地矣。

鮮枇杷葉 杏仁

象貝

黑山梔

現鈴 馬勃

又 輕浮苦辛治肺。咳喘頗減。咽痛紅腫。皆邪室既久。壅而成毒。壅乾不喜飲。舌色淡不紅。仍清氣分佐以解毒。

雞子白 麥冬

大沙參

金銀花

桑豆皮 煎漿

陸 秋暑燥氣上受。先干於肺。令人咳熱。此為清邪中上。當以辛涼清潤。不可表汗以傷津液。

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

八

青竹葉 連翹

花粉

杏仁

象貝 六一散

又 脈右大。瘧熱無寒。暑鬱在肺。常清氣熱。佐以宣通營衛。桂枝白虎湯加麥冬。

又 熱止。脈右數。咳不已。

知母 生甘草

麥冬

沙參

炒川貝 竹葉

汪女 暑熱入肺為咳。

花粉 六一散

杏仁

橘紅

大沙參 黑山梔皮

某二 咳喘。頭脹口渴。此暑風襲於肺衛。

杏仁 三錢

香薷 五分

桔梗 一錢

桑皮 一錢

飛滑石 三錢

絲瓜葉 三錢

倪三 兩寸脈皆大。冷熱上受。咳嗽無痰。是為清邪中上。從暑風法。

竹葉

藁皮

橘紅

滑石

杏仁

沙參

潘氏 久咳不已。則三焦受之。是病不獨在肺矣。況乎咳甚。

嘔吐涎沫。喉癢咽痛。致咳之由。必衝脈之傷。犯胃擾肺。氣蒸薰灼。淒淒燥癢。咳不能忍。近日晝暖夜涼。秋暑風。

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

九

潮熱澀泄。客氣加臨。營衛不和。經阻有諸。但食薑氣味。

過辛致病。辛則泄肺氣。助肝之用。醫者知此理否耶。夫診脈右弦數。微寒熱。渴飲。擬從溫治上焦氣分。以表暑風之邪。用桂枝白虎湯。

王三 暑風入肺。喘熱咳嗽。防驚。

益元散

黃芩

竹葉

花粉

苡仁

地骨皮

張五 形瘦脈數。驟涼暮熱。肺失和為咳。小暑後得之。亦由時令暑濕之氣。輕則治上。大忌發散。

大竹葉

飛滑石

杏仁

花粉

桑葉 生甘草		某 咳嗽喉痛。湯瀉。		西瓜翠衣 三錢 杏仁 三錢 六一散 三錢 桔槔 一錢		通草 一錢 桑葉 一錢 川貝 一錢 連翹 一錢		曹 水穀不運。濕聚氣阻。先見喘咳。必延蔓腫脹。治在氣分。		杏仁 厚朴 苡仁 廣皮白		蘇梗 白通草		陸 二濕必化熱。蒸為嗽。氣隧未清。納穀不旺。必薄味靜養。壯盛不致延損。		臨證指南醫案 卷二 咳嗽 十		飛滑石 南花粉 象貝 苡仁		菴豆皮 通草		某 渴飲咳甚。大便不爽。		石膏 花粉 通草 紫苑		木防已 杏仁 苡仁		某 雨濕寒熱。汗出。痰多咳嗽。大小便不爽。胸脘不飢。臍左室寒。		杏仁 桑葚子 白芥子 蘇子		鬱金 薑皮 通草 橘紅		朱 十五 中虛少運。濕痰多阻。氣分咳嗽。舌白。	
--------	--	------------	--	----------------------------	--	-------------------------	--	------------------------------	--	--------------	--	--------	--	-------------------------------------	--	----------------	--	---------------	--	--------	--	--------------	--	-------------	--	-----------	--	---------------------------------	--	---------------	--	-------------	--	-------------------------	--

炒牛夏 茯苓 桂枝木 炙草 苡仁		馮 脉右弦大而緩。形瘦目黃。久嗽聲嘶而濁。水穀氣蘊之濕。再加時序之濕熱。壅阻氣分。咳不能已。久成老年痰火咳嗽。無性命之憂。有終年之累。終是清散。		蘆根 馬勃 苡仁 浙茯苓		川斛 通草		陳 秋燥。痰嗽氣促。終宜降納。		桑葉 玉竹 沙參 嘉定花粉		苡仁 甘草 蔗漿		又 用清燥法。		臨證指南醫案 卷二 咳嗽 十一		桑葉 玉竹 沙參 苡仁		甘草 石膏 杏仁		施 脉沉弦為飲。近加秋燥。上咳氣逆。中焦似痞。始以辛泄涼劑。暫解上燥。		摺薑皮 鬱金 香豉 杏仁		苡仁 橘紅 北沙參 山梔		胡 六 脉右弦。因疥瘡類以熱湯沐浴。衛疎易傷。冷熱皮毛內應乎肺。咳嗽氣塞痰多。久則食不甘。便燥結。胃津日耗。不司供肺。况秋冬天降。燥氣上加。漸至老年痰火之象。此清氣熱以潤燥。理勢宜然。倘畏虛日投。滯補益就。	
------------------	--	--	--	--------------	--	-------	--	-----------------	--	---------------	--	----------	--	---------	--	-----------------	--	-------------	--	----------	--	-------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--	---	--

枯燥矣		某三而外感之咳者多玉竹二可宜	
霜桑葉	甜杏仁	麥冬	玉竹
天花粉	甘蔗漿	甜梨汁	熬膏
某四脉弦胸膈痺痛咳嗽頭脹此燥氣上侵肺氣不宜使然當用輕藥以清上焦			
枇杷葉	桑葉	川貝	杏仁
冬瓜子	桔梗		
某九舌白咳嗽耳脹口乾此燥熱上鬱肺氣不宜使然當用辛涼宜薄滋味			
鮮荷葉	連翹殼	大杏仁	白沙參
臨證指南醫案		卷二 咳嗽	
飛滑石	冬桑葉		
某五邪燥肺陰咳嗽咽痛肺甚			
玉竹	南沙參	冬桑葉	川斛
玄參	青蘆漿		
某二鼻淵三載藥投辛散如水投石未能却除辛辣炙燥耳近復咳嗽音嘶燥氣上逼肺衛使然			
杏仁	連翹	象貝	白沙參
桑皮	兜鈴	方艸	石中病
僧三脉右寸獨大氣分咳有一月			
桑葉	杏仁	玉竹	苡仁

沙參	茯苓	糯米湯煎
某脉右大寤咳寐安病在氣分		
桑葉	川貝	知母
地骨皮		
梨汁	蔗漿	熬膏
朱女肝陰虛燥氣上薄咳嗽夜熱		
桑葉	白沙參	杏仁
橘紅		
花粉	地骨皮	糯米湯煎
陸女燥風外侵肺衛不宣咳嗽痰多不時身熱當用輕藥以清上焦		
桑葉	杏仁	花粉
大沙參		
臨證指南醫案	卷二	咳嗽
川貝	萊豆皮	
戎咽阻咳嗽兩月來聲音漸低按脉右堅是冷熱傷肺		
生雞子白	桑葉	玉竹
沙參		
麥冬	甜杏仁	
吳女燥氣上逼咳嗽以甘寒治氣分之燥		
大沙參	桑葉	玉竹
生甘草	甜梨皮	
某二燥熱內伏發熱咳嗽口渴		
桑葉	杏仁	白沙參
連翹		
國圖滑石	鮮蘆根	
費十久瘧傷陰冬季溫舒陽不潛藏春木升舉陽更泄越		

入暮寒熱晨汗始解而頭痛口渴咳嗽陰液損傷陽愈熾冬春溫邪最忌發散謂非暴感汗則重劫陰傷迫成虛勞一途況有汗不痊豈是表病診得色消肉燥脉獨氣口空搏與脉左大屬外感有別更有見咳不已膠爲肺熱徒取清寒消痰降氣之屬必致胃損變重嘗考聖訓仲景云凡元氣已傷而病不愈者當與甘藥則知理陽氣當推建中顧陰液須投復脉乃邪少虛多之治法但幼科未讀其書焉得心究是理然乎否乎

炙甘草 鮮生地 麥冬 火麻仁

阿膠 生白芍 青蔗漿

臨證指南醫案

卷二 咳嗽

十四

又由陰傷及胃痰黃食少餐法當補養胃陰虛則補母之治也見咳治肺生氣日億矣 金匱麥門冬湯

某脫痺咳嗽

鮮枇杷葉三錢 以壁杏仁三錢 梗一錢 川貝二錢

冬瓜子三錢 蜜炙橘紅一錢

周三秋燥從天而降腎液無以上承咳嗽吸不肯通大便

三四日一更衣脉見細小議治在藏陰

牛乳 紫衣胡桃 生白蜜 薑汁

吳久嗽因勞乏致傷絡血易瘀長夜熱灼議養胃陰

北沙參 黃芪皮 炒麥冬 生甘草

炒梗米 南棗 此方不至以苦胃陰

某喉痺咳嗽脉右大而長

生扁豆 麥冬 北沙參 川斛 青蔗漿

毛上年夏秋病傷冬季不得復元是春令地氣陽升寒熱咳嗽乃陰弱體質不耐升泄所致徒謂風傷是不知陰陽之義

北參 炒麥冬 炙甘草 白梗米 南棗

某二病後咳嗽當清養肺胃之陰

生扁豆 麥冬 玉竹 炒黃川貝

川斛 白梗米湯煎

臨證指南醫案

卷二 咳嗽

十五

徐七形寒畏風冷食減久嗽是衛外二氣已怯內應乎胃陽脉不用用藥莫偏治寒熱以甘藥調宗仲景麥門冬湯法

張七八夏嗽緩神倦食減渴飲此溫邪延久津液受傷夏令暴燥泄氣胃汁暗虧筋骨不束兩足痠痛法以甘緩益胃中之陰做金匱麥門冬湯製膏

麥冬二兩 北沙參一兩 生甘草五錢 生扁豆二兩

麥冬二兩 南棗二兩 熬膏

湯四脉左堅數促冬溫咳嗽是水虧熱升治不中數胃陰受傷穢濁氣味直上咽喉即清肺冀緩其嗽亦致氣泄

而嗽仍未罷。先議甘涼益胃。陰以制龍。相胃陰自立。可商填下。		生扁豆	米炒麥冬	北沙參	生甘草
冬桑葉		青蘼漿			
錢氏 脉右數。咳兩月。咽中乾。鼻氣熱。早暮甚。此右降不及。胃津虛。厥陽來擾。金匱麥門冬湯去半夏加北沙參。					
某四十咳。早甚。屬胃虛。					
生扁豆		炒麥冬	大沙參	苡仁	橘紅
陳 秋冬形體日損。咳嗽吐痰。診脉兩寸促數。大便通而不爽。此有年煩勞動。陽不得天地收藏之令。日就其消。					
臨證指南醫案 卷二 咳嗽 七					
乃虛症也。因少納胃衰。未可重進滋膩。議用甘味養胃。					
陰一法。金匱麥門冬湯。					
錢 久咳三年。痰多食少。身動必息。鳴如喘。診脉左搏數。右小數。自覺內火燔燥。乃五液內耗。陽少制伏。非實火也。常以瓊玉膏滋水益氣。暫用湯藥。總以勿損胃為上。					
治嗽肺藥。諒無益於體病。					
北沙參		白扁豆	炒麥冬	茯神	
川石斛		花粉			
范氏 兩寸脉大。咳甚。腕悶頭脹。耳鼻竅閉。此少陽鬱熱上逆犯肺。肺燥喉癢。先擬解木火之鬱。					

羚羊角		連翹	梔皮	薄荷梗
苦丁茶		杏仁	薏皮	菊花葉
<p>陸婦 脉小。久咳。背寒。骨熱。知飢不食。厭惡食物氣味。此憂思悵鬱。皆屬內損。閱方藥。都以清寒治肺不應。議益土泄木法。</p>				
炭甘草		茯神	冬桑葉	炒丹皮
炒白芍		南棗	桑經不去病。宜清理。皆衛	
<p>尤氏 寡居煩勞。脉右搏左澹。氣燥在上。血液暗虧。由思鬱致五志煩煎。固非溫熱補瀉之症。晨咳吐涎。姑從胃治。以血海亦缺。陽明耳。</p>				
<p>臨證指南醫案 卷二 咳嗽 七</p>				
生白扁豆		玉竹	大沙參	茯神
經霜桑葉		苡仁	用白糯米半升淘洗清入滾水泡一沸。取清湯煎藥。	
<p>又 木虛在下。情懷悵鬱。則五志之陽上薰為咳。固非實火。但久鬱必氣結血滯。延成乾血勞病。經候滴少。愆期已屬明徵。當培肝腎之陰。以治本。清養肺胃氣熱。以理標。剛熱之補。畏其劫陰。非法也。</p>				
生扁豆		北沙參	三錢	炙甘草 五分
九 熟地		砂仁	末拌	鹿角霜 另研
方 淮牛膝		鹽水炒	雲茯苓 二兩	紫石英 醋煨水

青鹽 五錢 另熬生羊肉膠和丸早服四錢開水送

章五 自服八味鹿角膠以溫補反咳嗽吐痰形瘦減食皆

一偏之害宜清營熱勿事苦寒

鮮生地 麥冬 玄參心 甘草

苦百合 竹葉心

某七 脉數衝氣咳嗽逆當用攝納腎陰滋養榮金爲金水同

治之法 用此方治咳嗽大非此老從不悟也

熟地 四錢 白扁豆 五錢 北沙參 三錢 麥冬 二錢

川斛 三錢 扶神 三錢

王八 脉左尺堅久嗽失音入夏見紅天明咳甚而納穀減

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 六

損此勞損之症急宜靜養者

麥冬 大沙參 玉竹 川斛

生白扁豆 雞子白

某久 嗽咽痛入暮形寒雖屬陰虧形痿脉爽未宜旁補

麥冬 南沙參 川斛 生甘草 瑞爾根鬚

某氣急咳頻欲嘔下午火升此上有燥熱下焦陰虧也

早都氣丸 晚威喜丸

今年春季時疫大半皆有咳嗽咽喉之患乃邪自上

干肺氣先傷耳近日身動氣喘聲音漸不揚着左眼臥

左脇上有牽掣之狀此肝腎陰虧衝氣上觸冬藏失司

漸有側眠音啞至矣勞傷致損非清邪治咳之病

六味丸加陽秋石阿膠麥冬蜜丸

顧真陰不旺先後天皆虧以填精實下爲主若清熱冀

圖治嗽必胃損減穀 此等藥爲丸之害但嗽症不可

熟地 萸肉 山藥 茯苓 湖蓮

芡實 五味 人乳粉 金櫻膏丸

湯三 脉左弱右搏久有虛損交春不復夜卧着枕氣衝咳

甚即行走亦氣短喘促此乃下元根蒂已薄冬藏不固

春升生氣淺少急當固納攝下世俗每以辛涼理嗽每

致不救矣 必宜上下分治

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 九

水製熟地 五味 湖蓮 芡實

茯苓 青鹽 羊內腎 爲丸則可

某七 氣衝咳逆行動頭脹下體自汗 都氣丸

樂九 熱病兩三反覆真陰必傷當成亥時厥昏汗出者乃

虛陽上冒肝腎根蒂不牢衝脈震動則諸脉俱逆陽泄

爲汗耳此咳嗽乃下焦陰不上承非肺病也急當收攝

固絀閱醫蘇子鈞藤皆泄氣鋒芒之藥施於陰陽兩損

之體最宜斟酌 都氣加青鉛

朱五 三吸氣息音行動氣喘此咳嗽是腎虛氣不收攝形寒

怯冷護衛陽微腎氣九頗通形氣不足加人參河車

王^五氣急嗽逆足冷當用攝納水中藏火法 薛氏加減

八味丸三錢淡鹽湯送下

郭^二形瘦脈垂尺澤久嗽嘔逆半年不愈是腎虛厥氣上

干醫藥清寒治肺者不少誤人匪淺

坎蒸 人乳粉 杞子 五味 胡桃肉

茯神 巴戟肉 萸肉 山藥漿丸

某^六久季咳嗽吐痰漸至卧則氣衝喘急起坐今三載矣

經以肺腎為俯仰之臟是肺主出氣腎主納氣老年患

此按脈右弦左沉為腎氣不收主治不必因痔患而畏

辛熱 腎氣丸去牛膝肉桂加沉香蜜丸

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 辛

張^三久季喘嗽似屬外因表散香進反致失音不得着枕

卧眠今戌亥時濁陰上下而喘急氣逆為甚仍議引導

納氣歸腎 六味加附子車前補骨脂胡桃沉香

朱 虛勞食減便溲已無清肺治嗽之法必使胃口旺冀

其久延此非藥餌可效之病

人參 秋石泡 山藥 建蓮 芡實

苡仁 訶子皮 川椒 稻根 鬚煎湯煎藥

沈^十勞嗽食減便溲汗出陰損已及陽腑中宜扶胃下固

腎陰為治大忌清肺寒涼希冀治嗽

熟地 熟冬木 五味 芡實

湖蓮 山藥 沒收是此法

某 氣弱久嗽痰多午前為甚

早服都氣丸三錢 午服異功散

某 久咳損及中州脾失輪化食減神倦肺無所資至咳

不已診得兩手脈弦細數精氣內損非泛常治咳消痰

所可投

熟地 阿膠 燕窩 海參

天冬 茯苓 步石英 紫衣胡桃肉

孫 脈搏太陽不下伏咳頻喘暮夜為甚先從上治

生雞子白 生扁豆皮 玉竹 白沙參

臨證指南醫案 卷二 咳嗽 辛

麥冬 地骨皮

周^四脈來虛乳形色衰奪久患漏瘍陰不固攝經營勞動

陽氣再傷冬月客邪致咳都是本體先虛春深入夏天

地氣泄身中無藏日加萎頓理固當然此豈治咳治血

者議補三陰臟陰大法

人參 秋石 熟地 麥冬 扁豆

茯神 白粳米 此藥系托于救急此宜作凡

施^氏脈細數乾咳咽燥脊痠痿弱此本病欲損

阿膠 雞子黃 北沙參 麥冬

茯神 小黑稻豆皮

某 左脈弦數遺泄久嗽痰黃當用填補

炒熟地 芡實 扁豆 女貞

茯神 糯稻根鬚

野陰胃

丁六秋令天氣下降上焦先受燥化其效症最多屢進肺

藥無功按經云久咳不已則三焦受之是不端於理肺可知矣六旬又三形體雖充而真氣漸衰古人於有年久嗽都從脾胃子母相生主治更有效久氣多發泄亦必益氣甘補款攝實至理也茲議攝納下俾於早服而純甘清燥暑造填實在下清肅在上凡藥味苦辛宜忌為傷胃泄氣預防也

臨證指南醫案

卷二 咳嗽

三

早服 水製熟地八兩

白雲苓

乳蒸

五味子

去核蒸

建蓮

去心衣

淮山藥

乳蒸

車前子

三兩

淮牛膝

鹽水拌蒸

紫衣胡桃肉霜

連紫皮

研三兩

右為末用蒸熟猪脊髓去膜搗丸服六七錢開水送

晚服益胃上以生金方法

真北沙參

有根有鬚

生黃芪

薄皮

三兩

麥冬

去心

二兩

生白扁豆

國圖連

生細甘草

一兩

南棗肉

四兩

淡水煎汁濾清收膏臨成加真柿霜二兩收晚上開

水化服五錢

中氣虛

徐八色萎脈濡心悸喘咳逆勞心經營氣餒陽虛中年

向衰病加治法中宮理胃下固腎真務以加穀為安

治非宜煎藥用大半夏湯早服附都氣丸

某 色白肌柔氣分不足風溫上受而咳病固輕淺無如

羌防辛溫膏知沉寒藥重已過病所陽傷背寒胃傷減

穀病恙仍若身體先倦問誰之過歟 小建中湯

又 苦辛泄肺損胃建建中得安宗內經辛走氣以甘緩

其急然風溫客氣皆從火化是清養胃陰使津液得以

上供斯燥痰咳除自緩土旺生金虛則補母古有然矣

金匱麥門冬湯

王 亂藥雜投胃口先傷已經減食便溏何暇紛紛治嗽

臨證指南醫案

卷二 咳嗽

三

急急照顧身體久病宜調寢食 異功去白朮加炒白

芍炒山藥

高 甘藥應驗非治嗽而嗽減病根不在上腹鳴便急瀉

陰中之陽損傷

人參 冬白朮 雲茯苓 炙甘草

炒白芍 南棗

徐二勞損咳嗽用建中法得效乃無形之氣受傷故益氣

之藥氣醇味甘中土寧金受益然必安穀加餐庶幾可

禦長夏濕熱蒸逼真氣致泄反覆 異功加歸芪五錢

某 內損虛症經年不復色消奪畏風怯冷營衛二氣已

乏納穀不肯充長肌肉法當建立中宮大忌清寒理肺希冀止嗽嗽不能止必致胃敗減食致劇

黃芪建中湯去薑

陳二脈細促久嗽寒熱身痛汗出由精傷及胃

黃芪建中湯去薑 咳嗽服并 能令人失音成之

許七久嗽不已則三焦受之一年來病咳而氣急脈得虛數不是外寒束肺內熱迫肺之喘急矣蓋餒弱無以自立短氣少氣皆氣機不相接續既曰虛症虛則補其母

黃芪建中湯

李三久嗽經年背寒足附常冷汗多色白嗽甚不得卧此

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

陽微衛薄外邪易觸而濁陰扶飲上犯議和營衛兼護其陽 黃芪建中湯去飴糖加附子茯苓

任五勞力傷陽自春至夏病加煩倦神羸不食豈是嗽藥可醫內經有勞者溫之之訓東垣有甘溫益氣之大堪為定法 歸芪建中湯

張九館課誦讀動心耗氣凡心營肺衛受傷上病延中必漸減食當世治咳無非散邪清熱皆非內損主治法

歸芪建中湯去薑

呂脈左細右空搏久欬吸短如喘肌熱日瘦為內損性症但食納已小大便亦澀寒涼滋潤未能治嗽徒令傷

脾妨胃昔越人謂上損過脾下損及胃皆屬難治之例自云背寒忽熱且理心營肺衛仲景所云元氣受損廿藥調之二十日議建中法 黃芪建中湯去薑

馬虛損脈弦久嗽食減 小建中去薑

鄭七脈來虛弱久嗽形瘦食減汗出吸短久虛不復謂之損宗內經形不足溫養其氣 黃芪建中湯去薑加入

參五味

某二脈弦右大久嗽背寒盜汗 小建中去薑加茯苓

朱九五年咳嗽遇風冷咳甚甚是其肌表衛陽疎豁議固劑緩其急 黃芪建中湯

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

吳三勞力神疲遇風則咳此乃衛陽受傷且和經脈之氣勿用逐瘀攻傷之藥 當歸桂枝湯合玉屏風散

某久咳神衰肉消是因勞內傷醫投苦寒沉降致氣泄汗淋液耗夜熱胃口傷飲食少進不喜飲水痰多咳嗽是土

某脾胃脉部獨大飲食少進不喜飲水痰多咳嗽是土

某衰不生金氣 建中去飴加茯苓 接服四君子湯

某風濕咳嗽多痰氣分不充戊巳湯

人參 茯苓 於朮 炙草

廣皮 炒白芍

某勞嗽喜得辛煖之物 異功加燭樹南茶

吳姬病去五六當調飲食於醫藥之先此平素體質不可

不論自來納穀恒少大便三日一行胃氣最薄而滋膩

味厚藥慎商從來久病後大脾胃為要咳嗽久非客症

治脾胃者土旺以生金不必窮究其嗽

人參 鮮蓮子 新會皮 扶神

炒麥冬 生穀芽

某 脉虛久咳食 四君子加南棗

汪 初咳不得卧今左眠咳甚並不口渴欲飲周身熱

汗出此積勞內傷水反乘金不飢不納滋膩難投惟以

培中土制木生金合乎內傷治法

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

川桂枝 茯苓 淡乾薑 五味子

生甘草 大棗

某 咳逆欲嘔是胃欬也當用甘藥

生扁豆 北沙參 麥冬 茯苓 三錢

南棗 糯稻根 此方不無以嘔

某 伏邪久咳胃虛嘔食殆內經所謂胃咳之狀耶

麻黃 杏仁 甘草 石膏

半夏 杏仁

王 脉沉短氣咳甚嘔吐飲食便泄泄乃寒濕鬱脾漬陽

明胃營衛不和胸痺如悶無非陽不旋運夜陰用事濁

泛嘔吐矣庸醫治痰順氣治肺論咳不思內經胃咳之

狀咳逆而嘔耶 小半夏湯加薑汁

石 氣左升腹脹嘔吐涎沫黃水吞酸暴咳不已是肝逆

乘胃射肺致坐不得臥 安胃丸三錢 此有苦飲一員治飲

范 咳逆涎沫欲嘔長夏反加寒熱不思食病起嗔怒氣

塞上衝不能着枕顯然肝逆犯胃冲肺此皆疎泄失司

為鬱勞之症故滋膩甘藥下咽欲嘔矣

小青龍去麻辛甘加石膏此宜仲景傷心湯法

顏 久有痛經氣血不甚流暢驟加暴怒肝陽逆行乘肺

則咳病家云小腹痛衝氣上干其咳乃作則知清潤肺藥

臨證指南醫案 卷二 咳嗽

非中竅之法今寒熱之餘咳不聲揚但脇中拘急不飢

不納乃左升右降不司旋轉而胃中遂失下行為順之

古人以肝病易於犯胃然則肝用宜泄胃腑宜通為

定例矣 桑葉 丹皮 鉤藤 茯苓

半夏 廣皮 威喜丸 三錢

某 脉弦不甚嗽午潮熱便溏畏風以大腸嗽治之

生於木 茯苓 三錢 赤石脂 錢 禹糧 石 錢

薑汁 四分 大棗 三枚

又 照前方加白芍炙甘草

又脈數右長左弦上咳下瀉

生於朮一錢 茯苓三錢 炙甘草五分 木瓜一錢

薑汁四分 大棗肉四錢

石四咳嗽十月醫從肺治無效而顛脹喉痺脫症顯是厥陽肝風議鎮補和陽熄風方不中病上着否

生牡蠣 阿膠 青黛 淡菊

某昨議上焦肺病百日未痊形則焦燥悉由熱化久熱無有不傷陰液擬鹹補如阿膠雞子黃複入苓連苦寒

自上清氣熱以補下雖為暫服之方原非峻尅之劑細思手經之病原無遽入足經之理但人身氣機合乎天

地自然肺氣從右而降肝氣由左而升肺病主降日遲

肝橫司升日速咳嗆未已乃肝膽木反刑金之兆試言及久寐驚醒左常似因燥嘈雜如飢及至進食未覺胃中安適此肝陽化風旋擾不息致嗆無平期即倏熱之來升至左顛其左升太過足為明驗倘升之不已入春

肝木司權防有失血之累故左右為陰陽之道路陰陽既逆其偏以致病所以清寒滋陰不能驟其速攻

附膠 雞子黃 生地 天冬

女貞實 糯稻根鬚

姚脈痛久嗽 旋覆花湯加桃仁柏子仁

某寒熱右脇痛咳嗽

蘆根一兩 杏仁三錢 冬瓜子三錢 苡仁三錢

枇杷葉三錢 白蔻仁三分

咳為氣逆嗽為有痰內傷外感之因甚多確不離乎肺臟為患也若因於風者辛平解之因於寒者辛溫散之因於暑者為藿香之氣清肅必傷當與微辛微

涼苦降淡滲俾上焦蒙昧之邪下移出腑而後已若因於濕者有兼風兼寒兼熱之不同大抵以理肺治

胃為主若因秋燥則嘉言喻氏之議最精若因於火者即溫熱之邪亦以甘寒為主但溫熱猶有用苦辛

之法非比秋燥而絕不用之也至於內因為病不可不逐一分之有剛亢之威木扣而金鳴者當清金制

木佐以柔肝入絡若土虛而不生金真氣無所稟攝者有甘涼甘溫二法合乎陰土陽土以配剛柔為用

也又因水虛而痰泛元海竭而諸氣上冲者則有金水雙收陰陽並補之治或大劑滋填鎮攝葆固先天

一炁元精至於飲邪觸發亦能致嗽另有喘門兼參可也以上諸法皆先生臨證權衡之治非具慧心手

眼能如是乎 邵新甫

吐血

寒邪

朱 形寒暮熱。咳嗽震動。頭中脘中脇骨皆痛。先經嗽紅。體氣先虛。此時序冷熱不勻。夾帶寒邪。致成脉得寸口獨大。當清解上焦。大忌溫散之劑。

桑葉

蘇梗

杏仁

象貝

玉竹

大沙參

某 風溫上受吐血。

桑葉

薄荷

杏仁

連翹

石膏

生甘草

臨證指南醫案

卷二 吐血

三十

徐 陰虛風溫。氣逆嗽血。

生扁豆

玉竹

白沙參

茯苓

桑葉

鬱金

頤四寸口脉。搏指而動。痰血能食。初因風溫咳嗽。震動絡血。以清心營肺衛之熱。

小生地

黑山梔

地骨皮

天花粉

丹參

連翹

竹葉心

注 右脉大咽喉痒。頭中微脹。此冬溫內侵。陽氣不伏。絡熱。血得外溢。當調其復邪。

桑葉

山梔皮

連翹

白沙參

象貝

牛蒡子

某 脉小而勁。少年體豐。真氣易泄。經月咳。自非外感。因冬溫失藏。咳頻震絡。痰帶血出。當薄味以和上焦。氣熱得清。病患可却。

桑葉

山梔

杏仁

鬱金

象貝

花粉

糯米湯代水

王五 脉右大。溫和震絡。咳痰帶血。

桑皮

杏仁

山梔皮

花粉

大沙參

石膏

高 溫邪上鬱清空。目赤頭脹。咳喘見血。此屬客病。不必

為內損法。

卷二 吐血

三十

連翹

黑山梔

草決明

桑葉

薄荷梗

荷葉邊

苦丁茶

花粉藥用急火煎

唐七 血後喉燥痒欲。喉脉左搏堅。

玉竹

南花粉

大沙參

川斛

桑葉

糯米飲煎

高一 脉小。欲涼飲熱阻。氣升血胃。仍議治上。

嫩竹葉

飛滑石

山梔皮

鬱金汁

杏仁汁

新荷葉汁

某 春溫嗽痰。固屬時邪。然氣質有厚薄。不可概以辛散。

<p>汪<small>七十</small>天明至午。嗽甚痰血。春暖陽浮。是腎虛不藏。聞咳音重濁不爽。先議輕清。治氣分之熱。</p>		桑葉	南花粉	黑梔皮	桔梗
<p>甘草</p>		橘紅			
<p>某脉搏數。舌心灰。咳痰有血。頻嘔絡傷。致血隨熱氣上出。仍理氣分。咳而嘔者。當降地胃氣。每專治肺。</p>		桑葉	花粉	苡仁	川貝
<p>黃芩</p>		茯苓			
<p>方夏熱泄氣。胃弱衝逆。失血。</p>		扁豆	茯苓	參三七	茜草
<p>臨證指南醫案 卷二 吐血 三</p>					
<p>施脉小數。舌絳。喉中痒。咳噴血。因暑熱旬日。熱入營絡。震動而溢。凡肺病為手太陰經。逆傳必及膈中。仍以手厥陰治。</p>		竹葉心	生地	銀花	連翹心
<p>玄參</p>		赤豆皮			
<p>高脉數。汗出身熱。吐血五日。胸腕不舒。舌色白。此陰虛木質。暑熱內侵營絡。漸有時瘧之狀。小溲莖中微痛。宜通腑經為宜。</p>		鮮生地	連翹	鬱金汁	滑石
<p>竹葉</p>		甘草稍			

<p>且正在知識發動之年。陰分自不足。以至咳嗽失血。當以甘寒潤降。以肅肺金。<small>此為正治</small></p>		鮮枇杷葉	甜杏仁	南沙參	川貝
<p>甜水梨</p>		甘蔗漿			
<p>郭熱傷元氣。血後咳逆。舌赤。脉寸大。 <small>此方止日云</small></p>		鮮生地	麥冬	玉竹	地骨皮
<p>川斛</p>		竹葉心			
<p>又心眩。不饑。熱灼氣升。</p>		鮮生地	玄參	丹參	鬱金汁
<p>銀花</p>		竹葉心	玃豆皮		
<p>臨證指南醫案 卷二 吐血 三</p>					
<p>某脉濡。咳嗽痰血。不時寒熱。此邪阻肺衛所致。</p>		葦草湯加杏仁通草			
<p>孫六用力。氣逆血亂。咳出腥痰濁血。用千金葦草湯。</p>		某和鬱熱。咳吐血。音啞。	麻杏甘膏湯加桔梗苡仁桃仁紫苑		
<p>倪二上焦熱分。七疔癆。潰膿。雖愈。陰氣已經走泄。當陽氣弛張發泄。今加嗽血痰多。胃納減於平昔。脉數促。喘逆腕悶。姑清肅上焦氣分。此是方性在。</p>		蘇子	杏仁	香豉	黑梔皮
<p>鬱金</p>		薑皮	降香	桔梗	

又氣阻不饑

黑梔皮 香豉 藁皮 鬱金

杏仁 橘紅

王氏入夏陰血乃氣泄陽升幸喜經水仍來大體猶可無妨近日頭脹腕中悶上午煩倦是秋暑上受防發寒熱

竹葉 飛滑石 杏仁 連翹

黃芩 荷葉汁

江積瘀在絡動絡血逆今年六月初時令暴熱熱氣吸入首先犯肺氣熱血湧強降其血血藥皆屬呆滯而清空熱氣仍蒙閉於頭髓空靈之所諸竅痺塞鼻窒瘰肉

臨證指南醫案 卷二 吐血

三言

出納之氣都從口出顯然肺氣鬱蒸致腦髓熱蒸脂液自下古稱燥物消物莫如火但清寒直泄中下清空之病仍然議以氣分輕揚無取外散品事內通醫工遇此法則每每忽而失察

連翹 牛蒡子 通草 桑葉

鮮荷葉汁 青菊花葉 臨服入生石膏末煎一沸

某二以毒藥燻肺火氣通射肺金遂令咳嗽痰血咽乾胸悶診脈尺浮下焦陰氣不藏最慮病延及下即有虛損之患姑以輕藥暫清上焦以解火氣

杏仁 三錢 萊豆皮 三錢 冬瓜子 三錢 苡仁 三錢

川貝 一錢 兜鈴 七分

生地 丹皮 澤蘭 茯苓

降香末 荷葉汁

張三耳目昏蒙甚於午前此屬少陽鬱勃之升嘔惡痰血多是絡熱治以開泄莫投滋膩

桑葉 丹皮 黑梔 連翹

菊葉 藁皮 川貝 橘紅

董七色蒼能食腕有積氣兩年秋冬曾有陰血此非虛損由于體稟木火噴怒拂逆肝胆相火擾動陽絡故也

臨證指南醫案 卷二 吐血

三言

金斛 山梔 鬱金 丹參

川貝 蘇子 鉤藤 茯苓

又接用清熱安血絡方

生地 麥冬 玄參 知母 花粉

百部 枳殼 川貝 蜜丸

嚴二脈數滿小結痰血經年屢發仍能納食應酬此非精血損怯由于五志過動相火內寄肝胆操持鬱勃皆令動灼致終血上滲混痰火必靜養數月方安否則木火劫燥胃傷減食病由是日加矣

丹皮 薄荷梗 菊花葉 黑梔

淡黃芩	生白芍	鬱金	川貝
入夏陽升。疾走驚惶。更令諸氣益升。飲酒多食櫻桃。皆辛熱甘辣。絡中血沸上出。議消酒毒和陽。	生地	阿膠	麥冬
川斛	小黑稽豆皮	嘉定花粉	
沈脉左堅上透。是肝腎病。血色紫。乃既離絡中之色。非久瘀也。勞役暑熱。內陰不生有諸。做瓊玉意。仍是陰寒之通劑。	鮮生地	人參	茯苓
張血止脉左大。	琥珀末		
臨證指南醫案	卷二 吐血	三	
天冬	生地	人參	茯苓
炙草	生白芍	女貞	早蓮草
顧二脉左堅。陰傷失血致咳。復脉去參桂姜加白芍。凡咳血之脉。右堅者。治在氣分。係震動胃絡所致。宜薄味調養胃陰。如生扁豆。茯苓。北沙參。苡仁等類。左堅者。乃肝腎陰傷所致。宜地黃。阿膠。枸杞。五味等類。脉弦脇痛者。宜蘇子。桃仁。降香。鬱金等類。成益盆碗者。葛可久。花蕊石。散。仲景大黃黃連瀉心湯。一症而條分縷晰。從此再加分別。則臨症有據矣。			
趙一虛不肯復謂之損。納食不充肌膚。即眠不能着左。遇			

節令痰必帶血。脉左細右勁數。是從肝腎精血之傷。延及氣分。倘能節勞安逸。僅堪帶病永年。損症五六年。無攻病之理。臟屬陰。議平補足三陰法。	人參	山藥	熟地	天冬
五味	女貞	此是凡方內藥		
張四失血五六年。脉虛氣喘。不運不饑。治在中下二焦。望其安穀精生。勿許攻病為上。	人參	炙草	白芍	茯苓
炒熟地	五味	亦宜九		
某七勞力血復來。衝氣咳逆。當用攝納為要。	臨證指南醫案	卷二 吐血	三	
熟地	四錢	參三七	錢一	大淡菜
川斛	三錢	茯苓	三錢	牛膝炭
某四脉左。脇痛已緩。血仍來。	大淡菜	一兩	牛膝炭	半錢
川斛	三錢	參三七	錢一	中膝炭
某四失血後咳嗽。咽痛音啞。少陰已虧耗。藥不易治。	川斛	三錢	小黑稽豆皮	錢三
糯稻根	一兩	生扁豆	錢五	麥冬
北沙參	一錢	茯苓	一錢	早服都氣丸
某三脉虛數。失血心悸頭眩。	大淡菜	錢五	牛膝炭	一錢
白扁豆	一兩	白茯苓	三錢	

藕節三枚 糯稻根錢五

某四血來稍緩。猶能撐持步履。乃稟賦強健者。且能納穀。

陽明未敗可驗。而脈象細清。陰傷奚疑。

北沙參一錢 扁豆一兩 麥三七一錢 炒麥冬一錢

扶神三錢 川斛三錢

施二陰血數發。是陽氣過動。診脈已非實熱。夏至一陰來。

復預宜靜養。迎其生。於分後再議。生脈六味去丹。

澤加阿膠秋石蜜丸。

張脈右弦數。左細清。陰損。失血後久咳。食減便溏。

熟地炭 扶神 建蓮 五味

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

芡實 炒山藥

某四失音咽痛。繼而嗽血。脈來清數。已成勞性。幸賴能食。

胃強。勿見咳治咳。庶幾帶病延年。

細生地三錢 玄參一錢 麥冬一錢 細川斛三錢

鮮蓮子肉一兩 糯稻根錢五

沙三陰虛。血熱。嗽必胃強。加穀者。陰藥可以效靈。形羸。

食少。滋膩久用。必更反胃。靜養望其漸復。

熟地炭 煎肉 五味 川斛

伏神 芡實 建蓮 山藥

馬六脈左堅右弱。木火易燃。營液久耗。中年春季失血嗽。

痰由情志鬱勃致傷。抑且少食。疴羸。古語謂瘦人之病。

慮虛其陰。

生地 阿膠 北沙參 麥冬

扶神 川斛

某女脈左數。側眠嗽血。

生地 阿膠 麥冬 淡菜

生白芍 炙草

金氏脈細。左小促。乾咳。有血。寒熱身痛。經水先期。漸漸色。

淡且少。此臟陰傷及腑陽。奇脈無氣。內損成勞。藥難驟。

效。

臨證指南醫案 卷二 吐血 三

生地 阿膠 牡蠣 炙草

麥冬 南棗

盧氏沉着濃厚。肝腎之血。

熟地炭 炒杞子 炒歸身 牛膝炭

扶神 青鉛 砂仁末

又照前方去牛膝。青鉛。加桂圓肉。天冬。

繆二勞傷。血後咳。夜熱食少。清骨散加生地。

耿七久損。交節血溢。青鉛六味去萸。加炒牛膝。川斛。沖。

熱童便服。

某脈細弦數。陰分不足。痰中帶紅。腸風。春溫之後。再劫。

津液以致上下失血風淫於內宜鹹寒。

生地炭 阿膠 龜膠 玄參

白芍 女貞 茯苓 稽豆皮

陶二下虛陽動失血 六味去丹澤加阿膠淡菜

陳日來寒暄不勻煩勞陽升咳嗽震動絡血上沸診脉左數五心熱知饑納穀議育陰和陽方法

生地 清阿膠 天冬 麥冬 茯神

川斛 炒牛膝 青鉛 童便

陳一形瘦脉促數吸氣如喘痰氣自下上升此屬腎虛氣不收攝失血後有此乃勞怯難愈大症用貞元飲

臨證指南醫案 卷二 吐血 甲

鄒二內傷驚恐肝腎臟陰日損陽浮引陰血以胃上發二

氣不交日加寒熱骨熱咽乾不寐陰分虛其熱甚於夜

阿膠雞子黃湯

沈勞動陽升血自左溢

阿膠 參三七 甜北沙參 茯神

生白扁豆 炒麥冬

江二少壯情志未堅陰火易動遺精淋瀝有諸腎水既失其固春木地氣上升遂痰中帶血入夏暨秋胃納不減後天生旺頗好不致勞怯之憂但酒色無病宜節有病宜絕經年之內屏絕必得却病

熟地 水製 萸肉 山藥 茯神 湖蓮

遠志 五味 黃柏 芡實 金櫻膏丸

陸六知識太早真陰未充龍火易動陰精自泄痰吐帶血

津液被樂幸胃納安穀保養少動宜靜固陰和陽可痊

熟地 水製 萸肉 山藥 茯苓 芡實

徐四心腎精血不安火風陽氣熾失血眩暈心悸溺精若過用心作勞不能復元矣

遠志 五味 煅牡蠣 白蓮鬚 蜜丸

熟地 萸肉 山藥 茯神 芡實

遠志 建蓮 五味 海參膠 烏梅

臨證指南醫案 卷二 吐血 至

彭七陰虛有遺痰嗽有血誦讀久坐陽升

桑葉 生扁豆 北沙參 麥冬

霍山石斛 生甘草 苡仁 茯苓

吳八失血在五年前咳頻嘔噦氣自上衝逆乃下元精血之虛非外邪寒熱之咳痰出腥氣亦從下出節慾勿勞

力胃壯可免勞怯 都氣丸 此方不切此胃

周七左脉弦數失血後咳嗽音嘶少寐陰虧陽升不潛之候當滋養為主

生地炭 生牡蠣 阿膠 麥冬 牛

扶神 三錢 川斛 三錢

周^三 屢屢失血。飲食如故。形瘦面赤。稟質木火。陰不配陽。

據說服桂枝治外感。即得此恙。凡辛溫氣味宜戒。可以無妨。六味加阿膠龜甲天冬麥冬。此四味。不或方注。

孫^二 形瘦脈數。寸口搏指。浮陽易動。上胃。都屬陰精不旺。幸胃納尚佳。數發不致困頓。然須戒酒。淡慾。怡情靜養。

水足火不妄動。絡血自必寧靜矣。六味加龜甲秋石。趙^二 屢遭客熱傷陰。逢夏氣泄。吐血。下午火升。咳嗽。液虧。

陰火自灼。胃口尚健。安閑絕慾。可安。

熟地 萸肉 龜甲 泡萊膠 五味

山藥 茯苓 建蓮 蜜丸

臨證指南醫案 卷二 吐血 聖

某 內經分上下失血。為陰絡陽絡。是腑絡取胃。臟絡論脾。今飲食甚少。柔感姑緩。上下交病。治在中焦。其午火升。煩嗽。亦因血去陰傷。以胃藥從中鎮補。使生氣自充也。

人參 茯苓 白朮 炙草

扁豆 白芍 山藥 仍用四血分藥

又 因觸腦氣。悶。絡血復上。過戌亥時自緩。早上診脈。細促無神。左目珠痛。假寐。喉息有音。足厥冰冷。皆血胃不已。孤陽上升。從肝腎引陽下納法。

人參 熟地炭 炒杞子 茯神

淡萊 炒牛膝 四服

又 每下午戌亥少陰厥陰龍相上越。絡中之血。隨氣火上升。考五行之中。無形有聲。莫如風火。此皆情志之變動。必須陽潛陰固。方免反覆也。咳中一服。咳止。如何。過去此方。每服必是。言不虛。

人參 河車膠 大熟地 五味

炒杞子 茯苓 炒牛膝

倘陰逆有聲。加青鉛。喉痒痛。加阿膠秋石。火升用秋石湯煎藥。加女貞子。便秘加鹹菴蓉。柏子仁。血止幾日。或涉思慮。惱怒。復有脇痛。減食不甘。乃少陽木火犯脾。當世胆益土。用四君加丹皮桑葉。和減。去。去。

臨證指南醫案 卷二 吐血 聖

徐^二 脈左垂右弦。陰精不足。胃納亦少。初冬痰中見紅。冬春寐有盜汗。難藏易泄。入夏當防病發。諸凡節勞安逸。經年可望安康。

熟地 阿膠 五味 萸肉 秋石

山藥 茯神 川斛 早蓮草膏丸

又 脈左細數。肉消肌燥。氣衝咳嗽。嘔吐失血。是肝腎內損。下元不主納氣。厥陽上冒所致。非肺咳矣。當交夏氣升血溢。姑以鎮納。望其血止。青鉛六味加牛膝白芍。又 脈兩手已和。惟煩動恍惚。欲暈。議靜藥益陰和陽。

三才湯加金箔

葉 講謂煩心。五志之陽皆燃。恰值芒種節陰未盡。

氣升騰。絡中血不寧靜。隨陽泄以外溢。至後土發煩熱。

陰不總陽之徵。致頭中微痛。主以和陽。

生地 阿膠 牛膝炭 生白芍

扶神 青鉛

杜二 脉小數入尺澤。夏季時令發泄。失血形倦。治宜攝固。

下焦

熟地 萸肉 山藥 扶神 建蓮

五味 芡實 線魚膠 金櫻膏丸

蘇三 脉左堅。冬令失血。能食而咳。脊痛腰痠。乃腎臟不固。

臨證指南醫案 卷二 吐血 罌

少納。腎脉虛。候五液不承。寐則口乾喉燥。宜固陰益氣。

固本丸加阿膠芡實蓮肉丸

洛二 形色充偉。脉長關搏。連冬季血痰。血交夏不病。蓋

夏月藏陰。月藏陽。陽不潛伏。升則血溢。降則遺精。乃

稟陽體而性情喜動之累耳。

生地 熟地 天冬 麥冬

魚腹中心 秋石 龍骨 遠志

梅二 性清過動。失血夫血貴寧。靜不宜躁動。躁動則有泛

溢之虞。瘦人陽有餘。陰不足。補陰潛陽法。補陰丸

某五 脉數咳血。曾咯腥痰。若作肺癰。體質木火。因煩勞陽

升逼肺。肺熱不能生水。陰愈虧而陽愈熾。故血由陽而

出也。當金水同治為主。 蘇作肺癰宜清肺之藥。

熟地 四兩 生地 二兩 天冬 二兩 麥冬 二兩 扶神 二兩

龜版 三兩 海參膠 二兩 淡菜膠 二兩 斛膏 四兩 女貞 一兩

北沙參 二兩 早蓮草 一兩 膠膏丸

鄒二 向有失血。是真陰不旺。夏至陰生。伏天陽越於表。陰

伏於裏。理宜然矣。無如心神易動。暗吸腎陰。絡脉聚血。

陽觸及溢。陰伏不固。隨陽奔騰。自述下有衝。逆氣血。

湧如泉。蓋任脉為擔任之職。失其擔任。衝陽上冲。莫制。

皆腎精肝血不主內守。陽翔為血溢。陽隆為陰遺。腰痛

臨證指南醫案 卷二 吐血 罌

足脛畏冷。何一非精奪下損現症。經言精不足者補之。

以味。藥味宜取質靜填補。重着歸下。莫見血以投涼。勿

因噎以理肺。若此治法。元海得以立基。衝陽不來犯上。

然損非旬日可復。須寒暑更遷。凝然不動。自日逐安適。

調攝未暇。縷悉也。

人參 三錢 熟地 炒製成炭四錢 鮮河車膏 一錢

茯苓 一錢 炒黑枸杞子 一錢 北五味 一錢

沙苑 一錢 紫石英 五錢 以此按法煉製。以藥

血脫益氣。用人參熟地兩儀煎方。謂人參同陰藥則

補陰。茯苓入陽明。能引陰藥入於至陰之鄉。河車血

肉溫養。同石英收鎮衝脉。兼以包固大氣之散越。五味酸收。領其五液。枸杞溫潤。同沙苑之鬆靈入肝絡。參方中之藥。應乎取味。况肝腎之病。同一治也。	
劉二脉左數八尺。是眞陰下虧。先有血症。畢姻後。血復來。下午火升。陰中陽浮。保扶胃口以填陰。	
阿膠	淡萊
炙草	扶神
妻二思慮太過。心陽擾動。吸傷腎陰。時時草舉。此失血皆矯陽獨升。夜不得寐。歸家談笑怡情可安。	
人參	龜腹甲
臨證指南醫案 卷二 吐血	
錢 交夏陽氣大升。陰根失涵。火升血溢。必在晡刻。冲年大忌身心少持。必使陽和陰守爲要。	
生地	阿膠
扶神	川斛
某 口氣腥臊。血色渾濁。下元無根。恐難接續還元事。已至急。與王先生同議。擬陰陽法。	
人參	川熟附
炙草	青鉛
某 脉動極無序。血湧如泉。汗出畏冷。少焉熱躁。此無根之陽上冒。血凝成塊。非涼藥可止。	
人參	熟地
炙草	五味

熟地炭		生龍骨	扶神	五味
海桂		生白芍	鹽水炒牛膝	
又 人參		生龍骨	熟地炭	扶神
炒杞子		五味	此二方其計窮矣	
華二 陽動失血。皆係陰虧。如心悸咽乾咳嗽。都是陽浮上亢。必久進填實。厥陰斯浮。越自和。面亮油光。皆下虛少納。都氣加龜版人乳粉蜜丸。				
徐 陰根愈薄。陽越失交。初夏發泄。血湧吸短。心腹皆熱。豈止瀉之藥可療。益氣攝陰。乃據理治法。				
人參	熟地	五味子	重方手理	
臨證指南醫案 卷二 吐血				
羅 上年脇痺。已屬絡傷。今夏四月。陽氣升發。絡中血沸。上溢。陰分熱蒸。下午乃甚。喉痒而喘。心中嘈雜。肝風內震。顛然。				
鮮生地	阿膠	丹參	鹽水炒牛膝	
女貞子	川斛	童便		
龔 咳嗽繼以失血。經言三焦皆傷。喉痛失音。乃陰液無以上承。厥陽燔燎不已。病深難於奏功。憑理而論。鎮胃制肝。乃和陽熄風之義。				
淮小麥	南棗	阿膠	茯苓	
北沙參	天冬			

陸脈數。血後咳甚。痰腥肢腫。陽升內風鼓動。最難治。

生地 阿膠 天冬 麥冬

生白芍 茯神

沈味進辛辣。助熱之用。致肺傷嗽甚。其血震動不息。陽少潛伏。而夜分爲甚。清氣熱而不妨胃口。甘寒是投。與內經辛苦急。急食甘以緩之。恰符。

生甘草 玉竹 麥冬 川貝

沙參 桑葉

又肝陽易逆。內風欲沸。不得着左臥。惡辛氣。喜甘潤。治肝體用。潤劑和陽。

臨證指南醫案 卷二 吐血 哭

生地 阿膠 天冬 茯神

牡蠣 小麥

羅九血去絡傷。陽氣上蒸。胸脇微痛。非有形滯濁。脈得左關前動躍如浮。頭中微量。陽氣化風。何疑。

鮮生地 玄參心 麥冬 地骨皮

知母 川斛

又左脉形畧欹。仍堅。微量。喉燥腕痛。熱蒸。陽明津衰。陰陽風自動。而胃氣欲逆。大便不爽。是其明徵。熄風和陽。必用柔緩。少佐宣暢。陽氣亦暫進之法。

鮮生地 麥冬 火麻仁 桑葉

鬱金 生香附汁

又復脉去參。姜桂加白芍。

血後衝某 血後氣衝形寒。法當溫納。

茯苓 三錢 粗桂枝 八分 炙草 五分 五味 七分

何 早晨未進飲食。咳逆自下。焦上冲。有欲嘔之象。虛里左脇。呼吸牽引震動。背部四肢寒冷。入暮心腹熱灼。而舌上乾辣。夫陽虛生外寒。陰虛生內熱。陽屬腑氣。主乎外衛。陰屬臟真。主乎內營。由絡血大去。新血未充。穀味精華。不得四布。知味容納。而健運未能自然。脇右少舒。全係胃絡。下焦陰精損傷。中焦胃陽不振。晨至初。陰不

臨證指南醫案 卷二 吐血 哭

主來復。交節絡血再動。總是既損難以驟復之徵。大意下焦陰陽宜潛宜固。中焦營衛宜守。宜行用藥大旨如此。至於潛心滌慮。勿擾情志。再於子午。素以靜功。俾水火交陰陽。是藥餌已外工夫。皆培植生氣之助。

養營湯去黃芪遠志

又自服養營湯。溫補足三陰。臟法半月來。諸症皆減。惟午餘心腹中熱未罷。凡精血久損。理必質重味厚填納。空隙祇因中焦運納不旺。況長夏時令。熱最耗氣。議早進通陽守陰。晚用益中消暑。冀其生旺。非攻病也。

午服生脉散

服早		人參	熟地	杞子	當歸
從蓉		肉桂	茯神	五味	
某婦操持佛懺五志中陽動極失血喘咳有年皆緣性情內起之病草木難以奏效今形色與脈日現衰憊係乎生氣剋削慮春半以後地氣升陽氣泄久病傷損裡真少聚冬春天冷主藏總以攝補足三陰臟扶持帶病延年就是人工克盡矣					
人參	炒白芍	熟地炭	五味		
炙草	建蓮				
馬四閱病原是腎虛嗽血年分已久腎病延傳脾胃遂食臨證指南醫案卷二吐血辛					
戒腹膨病是老勞難以速功行走喘促元海無納氣之權莫以清寒理嗽急急收納根蒂久進可得其益					
人參	人乳粉	坎炁	枸杞		
沙苑	五明	茯苓	胡桃		
宋臟脉附背督脉行身之背足少陰真氣不攝唾中有血吸氣少入而腰脊痠楚寐泄魄汗皆真氣內損若加噴怒再動肝陽木火劫燥脂液春木日旺調之非易水製熟地蜜炙五味女貞茯神					
川斛	炒山藥	芡實	湖蓮		
真六下虛當春升之令形爽無力嗽血復來以甘溫厚味					

養其陰中之陽		枸杞	沙苑	歸身炭	牛膝
巴戟		精羊肉			
錢一陽初萌血即發下焦真氣久已失固亡血後飲食漸減咳嗽則腕中引痛衝氣上逆乃下損及中。最難痊愈擬進攝納方法					
人參	熟地	五味	茯神		
川斛	紫衣胡桃	調入鮮河車膠			
王少年陰火宜升宜降上則失血咳逆下墜肛腸惡漏皆虛勞見端食減至半胃關最要非可見熱投涼以血臨證指南醫案卷二吐血至					
嗽泥治					
熟地炭	建蓮	霍石斛	茯神		
炒山藥	芡實				
某診脉數滑咳血氣逆晨起必嗽得食漸緩的是陰損及陽而非六氣客邪可通可泄法當養胃之陰必得多納穀食乃治此損之要着					
生扁豆	北沙參	麥冬	川斛		
生甘草	茯神	南棗肉	糯稻根		
鄭八虛損四五年肛漏未愈其咳嗽失血正如經旨陰精不主上奉陽氣獨自升降奈何見血投涼治嗽理肺病					

<p>加反覆胃困減食夫精生於穀中土運納則二氣常存久病以寢食爲要不必汲汲論病</p>		<p>生黃芪 黃精 訶子肉 白芨 苡仁</p>		<p>南棗 淡水熬膏不用蜜收畧飢用五錢參湯送</p>		<p>某五向衰之年夏四月時令陽氣發泄遇煩勞身中氣泄絡血外溢臟液少澀遂咳嗽不已俗醫見嗽愈投清肺滋陰必不效驗此非少年情慾陰火之比必當屏煩戒勞早進都氣晚進歸脾平補賦真再用嗽藥必然胃減</p>		<p>姜九自上年冬失血漸形減氣弱精血內損不肯再復延成勞怯填養精血務在有情庶幾不奪胃氣</p>		<p>臨證指南醫案 卷二 吐血</p>		<p>人參 鮮河車膠 水製熟地 五味 黑殼建蓮</p>		<p>茯神 山藥 芡實</p>		<p>顧二失血血形濃厚必自下先傷胃減無力氣分亦損此陰藥中必兼扶胃非沉滯清寒所宜</p>		<p>人參 熟地 建蓮 芡實</p>		<p>山藥 茯苓</p>		<p>邵八脈堅形瘦久咳失血有年食物厭惡夜寢不適固以培本爲要所服七味八味湯丸乃肝腎從陰引陽法服之不效此液虧不受桂附之剛當溫養攝納其下兼與益胃津以供肺</p>	
---	--	-------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	-----------------------------	--	-----------------	--	---	--	--------------------	--	--------------	--	---	--

<p>服晨 熟地 菴蓉 杞子 五味 胡桃肉</p>		<p>服晚 牛膝 栢子仁 茯苓 蜜丸</p>		<p>人參 麥冬 五味 炙草 茯苓</p>		<p>鮮蓮子 山藥</p>		<p>胡三冬季失藏吐血四月純陽升泄病不致發已屬萬幸其痰嗽未宜窮治用藥大旨迎夏至一陰來復兼以扶培胃氣爲要</p>		<p>人參 熟地 麥冬 五味</p>		<p>茯苓 山藥</p>		<p>王八十冲年形瘦腹脹食減便溏自上秋失血以來日加羸弱脈左堅右濡雖陰虛起見而中焦爲急此非小恙</p>		<p>臨證指南醫案 卷二 吐血</p>		<p>人參 茯苓 炙草 白芍</p>		<p>廣皮 厚朴</p>		<p>席 半月前恰春分陽氣正升因情志之動厥陽上燔致咳震動絡中遂令失血雖得血止診右脈長大透寸部食物不欲納寐中呻吟囁語由至陰損及陽明精氣神不相交合矣議欲攝神氣法</p>		<p>人參 茯苓 五味 棗仁</p>		<p>炙草 龍骨 金箔</p>		<p>又服一劑自覺重入少腹腹中微痛逾時自安此方欽</p>	
---------------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	---------------	--	---	--	--------------------	--	--------------	--	--	--	---------------------	--	--------------------	--	--------------	--	--	--	--------------------	--	-----------------	--	------------------------------	--

手少陰之散失。以和四臟。不為重墜。至於直下者。陽明胃虛也。脈緩大長肌膚甲錯。氣衰血虧如綸。姑建其中。參芪建中湯去姜。

又 照前方去糖加茯神

又 診脾胃脈。獨大為病。飲食少進。不喜飲水。痰多嗽頻。皆土衰不生金。氣金匱謂男子。脈大為勞。極虛者亦為勞。夫脈大為氣分泄越。思慮鬱結。心脾營損於上中。而陽分萎頓。極虛亦為勞。為精血下奪。肝腎陰不自立。若脈細欲寐。皆少陰見症。今寢食不安。上中為急。况厥陰風木主令。春三月。木火司權。脾胃受戕。一定至理。建中

臨證指南醫案 卷二 吐血

毒

理陽之餘。繼進四君子湯。大固氣分。多多益善。

徐 因積勞。久嗽見血。是在內損傷。先聖曰。勞者溫之。損者益之。溫非熱藥。乃溫養之。甘補藥者。氣溫煦。味甘甜也。今腎見血。投涼見嗽。治肺最多。予見此治法。胃口立即敗壞者不少。歸脾去木香黃芪加杞子。

杜 積勞思慮內損失血。久病秋季再發。乃夏暑氣泄。勞則氣愈泄不收。絡空動沸。此與陰虛有別。色脈胃減。涼降非法。人參建中湯。

龐 血大去。則絡脈皆空。其傷損已非一腑一臟之間矣。秋分寒露。天氣令降。身中氣反升越。明明裏不肯收攝。

虛象何疑。今診脈弱濡瀯。肢節微冷。氣傷上逆。若烟霧迷離。薰灼喉底。故作噎逆。大旨以上焦宜降。宜通。下焦宜封宜固。得安穀崇生。再商後法。

人參 炒黑杞子 炒黑牛膝 茯神

生苡仁 炒山藥

又 血止納穀甚少。不饑泄瀉。此脾胃大困。陰火上觸。面赤。嗜先理中宮。必得加餐為主。大忌寒涼治嗽。再伐脾胃生氣。

人參 茯神 新會皮 山藥

炙草 炒白芍

臨證指南醫案 卷二 吐血

毒

又 脈右濡左未斂。

人參 茯神 熟木 廣皮 南棗

又 左脈靜而虛。右如數。初進穀食。宜培中宮。霜降後五日。以九劑攝下。

人參 茯神 熟木 廣皮 南棗

炒白芍 炙草

陳 脈如數。痰嗽失血。百日來反覆不已。每咳喘而汗出。此屬氣傷失統。絡血上泛。凡寒涼止血理嗽。不但敗胃妨食。決無一效。從仲景元氣受損。當進甘藥。冀胃土日旺。柔金自寧。

黃芪 生白芍 五味 炙草

南棗 飴糖

某勞傷嗽血

生黃芪皮 三錢 茯苓 三錢 炙黑甘草 五分

黃精 三錢 南棗 三錢

錢一形神積勞氣泄失血食減喘促由氣分陽分之傷非酒色成勞之比黃芪建中湯去姜桂

陸脉細形瘦血後久咳不已復加喘促緣內損不肯充復所投藥餌肺藥理嗽居多當此入令收肅根蒂力怯無以攝納陰乏戀陽多升少降靜坐勉可支撐身動勃

臨證指南醫案 卷二 吐血 癸

勃氣泛所納食物僅得其悍氣未能充養精神矣是本身精氣暗損為病非草木攻滌可却山林寂靜兼用元功經年按法使陰陽漸交而生生自振徒求諸醫藥恐未必有當建中湯去姜加茯苓

董三此內損經久嗽不已大便不實夏三月大氣主泄血此後肌內麻木骨痠痠疼陽明脉絡不用治當益氣大忌補藥清潤寒涼

黃芪 炙草 苡仁 白芨

南棗 米糖

李三飲酒少穀中氣先虛酒力溫散助熱絡血隨熱氣以

上沸血止之後頓然食減腕痛顯是中氣已困敗靜坐稍舒煩言咳急當以調中為急若見血見咳即投寒涼清陽愈傷日就敗壞矣雖酒客忌甘然救其苦寒藥傷勿拘此例戊巳去木加南棗

王二脉栗形勞失血小建中加玉竹

顧二勞心神耗營損上下見血經年日衰今勉納穀不飢中焦因不至運滋陰清肺更令傷中無却病好藥欲冀其安須由居靜養寒暑無害方得堅固異功散

錢二形瘦脉左數是陰分精奪自述談笑或多或胃中飢虛必衝氣咳逆前年已失血盈碗此下損精血有形難

臨證指南醫案 卷二 吐血 至

復以畧精飲食氣返不趨急以甘藥益胃中流砥柱病至中不可緩矣

人參 茯苓 炙草 山藥

許四勞倦傷陽形寒失血咳逆中年不比少壯火亢之嗽血黃芪建中湯

徐二奔走五日即是勞力動傷陽氣血從右起夜有冷汗乃陽絡空隙而泄越矣凡治吐血之初多投涼血降氣以冀其止孰知陽愈滲泄益增病劇屢矣

黃精 黃芪 炙草 苡仁 茯苓

汪肝風鳴張胃氣必虛酒客不喜柔膩肌柔色嫩質體

氣弱清明春木大旺理必犯土急宜培養中宮中有砥柱風陽不得上越而血可止矣		人參	炒黃芪	炒山藥	茯苓
朱二秋暑失血初春再發診脉右大頗能納食金匱云男子脉大為勞極虛者亦為勞要之大者之勞是煩勞傷氣脉虛之勞為情慾致損大旨要病根驅盡安靜一年可愈		生黃芪	北沙參	苡仁	炙草
臨證指南醫案 卷二 吐血		白芨	南棗		
某勞力煩心失血早食則運暮食飽脹疎補調中方		人參	茯苓	炙草	生穀芽
廣皮		日芍			
馮四脉虛動按之空豁久嗽先有瀉血大便不實近又嗽血是積勞久損陰陽兩虧今食不欲餐先宜甘溫益氣但貧窮患此參苓未能常繼斯為難調		人參	黃芪	茯苓	炙草
許四頻頻傷風衛陽已疎而勞怒亦令陽傷此失血症當獨理陽明胃壯則肝犯自少脉右空大可証若三陰之		苡仁	白芨		

執蒸脉必參於左部此為脈虛		人參	黃芪	三錢	炙草	五分	煨姜	一錢	南棗	二錢
又甘溫益胃血止五日食腥噉怒血咳復來不獨衛陽踈豁絡脉空動若谷豈沉寒堵塞冀獲片時之效倘胃口拒納無法可投按脉微澁議治心營肺衛		人參	黃芪	炙草	南棗					
湯三脉細促右空大爪甲灰枯久嗽入春夏見紅食減身痛形容日瘠是內損難復與養營法		白芨	茯苓	棗仁						
臨證指南醫案 卷二 吐血		人參	炒白芍	歸身	炙草					
丁二夏季痰嗽入冬失血自述晝卧安逸微寒熱不來則知二氣已損傷身動操持皆與病相背脉大無神面無膏澤勞怯不復元大著溫養甘補使寢食兩安若以痰嗽為熱日餌滋陰潤肺胃傷變症調之無益		桂枝木	廣皮	煨姜	南棗					
陳二失血前後心痛歸建中去姜		某	形瘦色枯脉濡寒熱失血心悸是營傷歸建建中去姜							
某脉孔汗出失血背痛此為絡虛										

人參
炒歸身
炒白芍
炙草

棗仁
茯神

某氏失血半年。心悸仲。脇下動。絡脉空。隙。營液損傷。議廿

緩辛補

枸杞
栝子仁
棗仁
茯神

炙草 桂圓

又生地 阿膠 小麥 廣三七 烏賊骨

兔絲子 扶神 補豆 夜服三錢

徐^四館課之勞。心脾營傷。食酸助木。中土更虧。春陽主升。

血乃大吐。况茹素既久。當培土。營陰損極。熱自內熾。非

臨證指南醫案

實火也
歸脾湯去參

陳二先患失血復遭驚駭平素有遺泄獨處囁語是有形

精血無形神氣交傷漫言治痰治血真粗工卑陋矣補

精宜適安神宜靜。然無形真氣爲要。與心脾二經主治。

人參一錢半 當歸一錢半 茯神三錢 棗仁三錢 遠志七分

炙草三分 炮薑二錢 龍齒二錢 金箔五張
沖入

遇節血症反從脉弱廢食脇痛胃爽無治咳止血之

理、扶得胃口受納、可商調理。

人參 炙黃芪 當歸炭 棗仁

茯苓
炙草
桂圓肉

又歸脾去木香遠志加枸杞子

關三思鬱傷於心脾。二臟主乎營血。營出中焦。藏陰受損。

陰虛生熱。薰蒸絡脉。致血不寧靜。食少痰多。色澤少華。

皆虛象也。不宜久進涼潤藥。當以錢氏異功散間進。

歸脾湯減木香。

馬六上秋下血。今年湧血。飲橘餅湯甘辛。心中如針刺營。

枯液耗。不受辛藥。但以甘藥柔劑。與心脾有益。

人參
黃精
茯神
栢子仁

炙草
南棗

某老弱虛咳失血

臨證指南醫案

生黃芪皮 歸身 煨姜 大棗

勞心過
度陽升
馬
診脈左手平和。尺中微動。右手三部。關前動數。尺中

帶數夜間不寐。咳嗆有血。晝日咳嗆無血。但行走微微

喘促。夫陰陽互爲樞紐。隆冬天氣藏納。緣煩心勞神五

志背動陽不潛伏。當欲寐之時。氣機下潛。觸其陽氣之

升。衝脉升動絡中之血。未得寧靜。隨咳。陰溢於上。戴玄

於寒起。試亦助其動。搏氣火。此咳。陰喘。息失血。同具。

一原之恙當靜以制動投藥益水生金以制君相之火

然食味宜遠辛辣熱燥。凡上實者必下虛。薄味清肅上

焦正謂安下令其藏納也。愚見約方泰末俟裁

生扁豆 <small>一兩</small>	麥冬 <small>二錢</small>	川斛 <small>一錢</small>	土阿膠 <small>二錢</small>
小根生地 <small>二錢</small>	真北沙參 <small>一錢</small>		
又診脉同前。述心中怯冷。交四更咽中乾。咳嗽連聲。必血已盈口。論心營肺衛皆在上焦。更擬欬心液滋肺津一法。			
炒棗仁 <small>五錢</small>	鮮生地 <small>三錢</small>	天冬 <small>一錢</small>	炒麥冬 <small>一錢</small>
茯神 <small>一錢</small>	黑牛膝 <small>一錢</small>	茜草 <small>一錢</small>	參三七 <small>一錢</small>
又熟地 <small>四錢</small>	生地 <small>二錢</small>	天冬 <small>一錢</small>	麥冬 <small>一錢</small>
北沙參 <small>三錢</small>	茯神 <small>一錢</small>	卧時服天王補心丹	
查 <small>十二</small> 舌辣失血易錢。			
臨證指南醫案			
卷二 吐血			
室			
生地	玄參	連翹心	竹葉心
丹參	鬱金汁		
陳血止脉兩寸未和仍議心營肺衛方。			
生地	牛扁豆	麥冬	北沙參
丹參	茯苓		
陳夜熱孤恐血妄行議清營熱。			
犀角	鮮生地	丹皮	白芍
邵營熱失血			
生地	竹葉心	玄參	丹參
川斛	茯神		

胃陰虛		王十脉右大失血知饑胃陽上逆吐乾嘔		臨證指南醫案		卷二 吐血		室						
生地	一兩	扁豆	一錢	玄參	一錢	麥冬	一錢							
川斛	新荷葉汁													
某四脉右瀉初氣冲失血咳逆能食無味血來潮湧乃陽明胃絡空虛血隨陽升而然法當填中爲要着莫見血治咳而用肺藥斯症可圖正在此際。														
大淡黃	一兩	生扁豆	五錢	麥冬	三錢	川斛	三錢							
茯神	三錢	牛膝	一錢											
陶六色黃脉小數右空大咳嘔血溢飲食漸減用建中旬日頗安沐浴氣動血咳復至當以靜藥養胃陰方。														
臨證指南醫案														
金匱麥門冬湯去半夏														
郭脉右部不鼓擊應指惟左寸數疾昨晚失血之因因於僂僂拾物致陽明脉絡血升今視面色微黃爲血不之象不宜涼解妨胃做古血脫必先益氣理胃又宜滋肝。														
人參	秋石水	黃芪	阿膠		茯神									
炙甘草	生白芍	王用	續通											
王三腸紅愈後吐血一兩月必發此陽明胃絡氣血皆多故吐後寢食如昔久發陰虧仍有內損之憂宜養肺胃之陰以和陽。														

生黃芪 北沙參 麥冬 生甘草

扶神 元米蘆根 不切此之補陰血常用至利

程二吐血數發。肢震面熱汗出。寐中驚惕。蓋陽明脉絡已

虛。厥陰風陽上熾。飲食不為肌膚。皆消燄之徵也。

生黃芪 北沙參 生牡蠣 麥冬

小麥 南棗

程一脉左小數右弦。食減不飢。易於傷風。大便結燥。冬春

已見血症。夫胃陽外應衛氣。九竅不和。都屬胃病。由冬

失藏聚。發生氣少。遇長夏熱蒸。真氣漸困故也。急宜絕

慾靜養。至秋分再議。

臨證指南醫案 卷二 吐血 苦

參鬚 黃芪皮 鮮蓮子 扶神

炒麥冬 生甘草

某着右卧眠。喘咳更甚。遇勞動陽。痰必帶血。經年久嗽。

三焦皆病 麥門冬湯

華二勞怒用力。傷氣動肝。當春夏天地氣機皆動。病最易

發。食減過半。熱升冲咽。血去後。風陽皆熾。鎮養胃陰。勿

用清寒理嗽。

生扁豆 沙參 天冬 麥冬

川斛 扶神

又衝氣攻腹。遠嗝。乃肝胆厥陽肆橫。久久虛損。而嘔痰

減。食皆犯胃之象。若不靜養。經年必甚。

甜北沙參 生白扁豆 生黃芪皮 扶神

炙草 白糯米半升。泡清湯煎藥。

徐陰藏失守。陽乃騰越。咳甚血來。皆屬動象。靜藥頗合。

屢施不應。乃上下交征。陽明絡空。隨陽氣升降自由。先

以柔劑填其胃陰。所謂執中近之。金匱麥門冬湯去

半夏加黃芪。

某五失血後。咳嗽不飢。此屬胃虛。宜治陽明。

甜北沙參 生扁豆 麥冬 扶神 川斛

陸食酸助木。胃土受傷。腕中陽逆。絡血上溢。內經辛酸

臨證指南醫案 卷二 吐血 壅

太過。都從甘緩立法。穀少氣衰。沉苦勿進。

生扁豆 北沙參 炒麥冬 茯苓

川斛 甘蔗漿

又甘涼養胃中之陰。痰少血止。兩寸脉大。心煩脊熱。汗

出。營熱氣泄之徵。議用竹葉地黃湯。

鮮生地 竹葉心 炒麥冬 建蓮肉

川斛 扶神

陶一兩年前吐血。咳。嗽。夏四月起。大凡春盡入夏。氣機升

泄。而陽氣弛張極矣。陽既多動。陰乏內守之職。司絡血

由是外溢。今正交土旺發泄。欲病氣候。急養陽明胃陰。

夏至後兼進生脉之屬勿步趨於炎歎烈日之中可望其漸次日安 金匱麥門冬湯去半夏

王二見紅兩年冬月加嗽入春聲音漸嘶喉舌乾燥診脉

小堅厚味不納胃口有日減之虞此甘緩益胃陰主治

麥冬 雞子黃 生扁豆 北沙參

地骨皮 生甘草

盧四脉大色蒼冬月嗽血納穀減半迄今乾咳無痰春夏

間有吐血夫冬少藏聚陽升少制安閑靜養五志氣火

自平可望病愈形瘦殺減當養胃土之津以生金

甜北參 麥冬 玉竹 木瓜

臨證指南醫案 卷二 吐血 寒

生扁豆 生甘草

某二脉右大左虛夏四月陽氣正升煩勞過動其陽絡中

血溢上竅血去必陰傷生熱宜養胃陰大忌苦寒清火

北沙參 生扁豆 麥冬 生甘草

茯神 川斛

某九脉搏血湧飢易納食風陽過動而為消燦若不自保攝餌藥無益

生地 天冬 丹參 茯苓

生扁豆 川斛

倪三陽明脉弦空失血後咽痺即噎是納食雖強未得水

穀精華之游溢當益胃陰

北沙參 生扁豆 麥冬 杏仁

生甘草 糯米湯煎

徐一失血能食痰嗽色蒼脉數可與甘涼養胃中之陰胃

和生痔血便燥藥最宜

生扁豆 生地 天冬 麥冬

銀花 柿餅灰 側柏葉

某失血咽乾

稽豆皮三錢 丹參一錢 麥冬一錢 川斛一錢 藕汁一小

陳胃虛客氣上逆為呃噫痰帶血星咽中微痛姑擬鎮

臨證指南醫案 卷二 吐血 寒

攝法

人參 熟地炭 五味 茯神 青鉛

又照前方去青鉛加麥冬川斛遠志炭

孫五脉小弦血去食減服地黃柔脈反覺呆滯且不喜肥

甘議兩和肝胃

蘇子 茯苓 金石斛 降香

釣藤 黑山梔

蔡三新沐熱蒸氣泄絡血上溢出口平昔痰多又不渴飲

而大便頗艱此胃氣不得下行為順之旨兼以勞煩噴怒治在肝胃

金石斛 紫降香 炒桃仁 橘紅

苡仁 茯苓

萬 脉數左堅當夏四月陽氣方張陡然噴怒肝陽勃升絡血上湧雖得血止而咳逆欲嘔眠臥不得歛左此肝陽左升太過木失水源陰虧則生熱是皆本體陰陽迭偏非客和實火可清可降之比最宜恬澹無爲安靜幽閒經年不反可望轉偏就和但圖藥治胃減損怯矣經云胃欲之狀飲逆而嘔木犯胃土貫膈即至冲咽入肺肺衰木反刑金從內經甘緩以制其急

米炒麥冬 糯稻根 女貞子 茯神

臨證指南醫案 卷二 吐血 癸

生甘草 南棗肉

又 乙癸同治益胃養陰

人參 熟地 天冬

麥冬 以人參未收實

某 血去胃傷當從中治況五年前勞怒而得病肝木無不尅土醫者溫補競進氣壅爲脹至夜咽乾無寐食物不思查不知味爲嘔爲咳全是胃陽升逆經云胃不和則卧不安而陽不潛降似屬濁氣膠痰有形之物阻撓升降而然古人有二虛一實當先治實以開一面之文余從胃病爲主制肝救中理氣清膈乃不足中有餘

通之治此機勿得亂治

人參 枳實 半夏 杏仁

甘草 竹茹 生薑 大棗

李 暴怒肝陽大升胃絡血湧甚多已失氣下行爲順之青仲淳吐血三要云降氣不必降火目今不飢不納寒膩之藥所致

炒蘇子 降香汁 山梔 炒山查

鬱金 茯苓 川斛 丹參

某 左脉細堅搏指肝陽逆失血汗

熟地 五味 炙草 牛膝

臨證指南醫案 卷二 吐血 癸

白芍 桂心 童便冲

李氏 脉細小如無素多鬱怒經來即病冬月胃痛隱有咯血不止寒戰面赤驚惕頭搖顯是肝陽變風絡血沸起四肢逆冷真寒衰微內經有肝病暴變之文勢豈輕渺議用景岳鎮陰煎法制其陽逆仍是就下之義

熟地炭 牛膝炭 肉桂 茯神

生白芍 童便

又 經來血止肝病何疑此乃衝任之病非肝也蓋奇經

炒查肉 當歸 炒延胡 澤蘭

桃仁 茯苓

肝氣

沈氏 血後久咳。腕痛食減。經閉便澀。提進肝氣。

蘇子 炒丹皮 桃仁 鬱金

鉤藤 白芍

血絡痺

蔡三 水寒外加。驚恐內迫。陰癰三年。繼患嗽血。迄今七年。

未有愈期。詢及血來紫塊。仍能知味安穀。參其虛傷驚傷。必是肝絡凝滯。得怒勞必發。勿與酒色傷損。亂投滋陰膩濁之藥。恐胃氣日減。致病漸劇。

陰賦濁之藥。恐胃氣日減。致病漸劇。

桃仁 三錢 鱉甲 三錢 川桂枝 七分 歸鬚 一錢

大黃 五分 芫蔚子 二錢 又芫蔚子及補血藥。忌用破血藥。

柴二 勞傷寒煖不勻。脇痛嗽血。食物不減。宜降氣和絡。

臨證指南醫案 卷二 吐血 主

蘇子 茯苓 降香 橘紅

桔梗 苡仁 韭白汁

陸 交春分前五日。肝木升旺之候。涎血大吐。胸腕不爽。

此久鬱氣火灼熱。神志失守。遂多驚恐。絡中之血。隨火升氣逆而上。當先降其氣。不宜寒苦碍阻。

蘇子 降香 丹參 查肉

桃仁 鬱金 茯苓 黑梔皮

吳 脉滿能食咳血。

降香 桃仁 鬱金 蘇子

炒山查 苡仁 韭白汁 冲入

姚五 此勞傷身動失血。脇有癢聚。因咳甚而血來。先宜降氣。

蘇子 苡仁 茯苓 黑山梔 丹皮

降香 荆芥炭 牛膝炭 藕汁

吳四 形畏冷。寒熱左。脇有宿痞。失血咳嗽。曾驟勞力。經年。疴羸。藥不易效。

旋覆花 新絳 歸鬚 炒桃仁

栝子仁 茯神

何七 左乳傍脇中。常似針刺。注出心嘈能食。此少陽絡脉。陽氣燔灼。都因謀慮致傷。將有絡血上湧之事。議清絡。

臨證指南醫案 卷二 吐血 主

宜通。勿令瘀着。

生地 丹皮 澤蘭葉 桃仁

鬱金 琥珀末

又 服通絡方。瘀血得下。新血亦傷。嘈雜善飢。陽亢燔灼。鬱陰不得涵護也。仍以和陽熄風方法。

阿膠 雞子黃 生地 麥冬

生甘草 生白芍

王二 吐血後不飢。胸背痛。

蘇子 桔梗 鬱金 莖皮

山梔皮 降香

羅八因左脈堅搏兩投柔劑和陽益陰血未得止而右胸似病左脇中刺痛此少陽絡脈經山之所夫陽氣清淨之腑陰氣滋養未能宣通絡中是病咳未罷議以辛潤宣暢通劑

桃仁 丹皮 歸鬚 栝子仁

澤蘭 降香末

又照前方去降香末澤蘭加黑山梔皮

又辛潤痛喘皆畧進苦降脇右皆痛不但絡空氣分亦微古人以身半以上為陽原無取乎沉苦

桃仁 栝子仁 鮮生地 玄參 鮮銀花

臨證指南醫案

卷二 吐血

五

程一脈左弦右小濡據病原起於憂鬱鬱動久而化熱蒸迫絡脈血為上溢凝結成塊者離絡留而為瘀也血後納食如昔是胸絡所貯頗富况腑以通為用血逆氣亦上併漉漉有聲皆氣火旋動非有形質之物凡血病五臟六腑皆有是症當清陽明之絡為要至於病發當治其因又不必拘泥其常也

枇杷葉 苡仁 茯苓 蘇子

桑葉 丹皮 炒桃仁 降香末

某二努力咳血胸背悉痛常用仲淳法

蘇子 降香汁 炒丹皮 苡仁

冬瓜仁 炒桃仁 牛膝 川貝母
某冬令過溫人身之氣不得潛藏陰弱之質血隨氣逆診得陽明脈動吐出瘀黑絡中離位之血尚有未可以止瀉為事

生地 丹參 丹皮 降香

桃仁 牛膝 垂汁 童便 冲

某肝逆失血

蘇子 鬱金 降香汁 炒丹皮 鈎藤

赤芍 丹參 茯苓 白糯米湯煎

侯九胃脘當心肝經交絡所過上布於肺咳嗽胃旁作痠

臨證指南醫案

卷二 吐血

五

腹脹脈絡氣逆也當慮失血脉數能食宜和絡氣

生地 桃仁 桑葉 丹皮

麥冬 茯苓

陳七吐血八日腕悶脇痛肢冷絡傷氣窒先與降氣和血

蘇子 鬱金 杏仁 茯苓

桃仁 降香

翁二問前請靜坐痰血復發入冬不已胸脇痛引背部脈

小微滿非慾傷陰火夫痛為絡脈失和絡中氣逆血上

宗仲淳氣為血帥

蘇子 苡仁 茯苓 山查

桑葉	丹皮	降香水	苦其白
江	診脉數。流有血。嗽痰。冷熱外。因動肺。緣素患肝。痺左	脇不耐卧。着恐陽升。血溢。微用苦辛泄降。不宜過。	
黑山梔	桑葉	花粉	知母
瓜蒌皮	降香		
沈	左脇卒脹。攻觸作楚。咳痰。帶血。無非絡中不得寧靜。	姑進降氣通絡方。	
降香汁	蘇子	苡仁	茯苓
橘紅	白茯苓	白茯苓	白茯苓
又	脉右長。陰血仍宜降氣。		
臨證指南醫案	卷二 吐血		
蘇子	苡仁	茯苓	山梔
丹皮	鈎藤	鬱金	
金	氣逆。血瘀。胸膈。嘔吐。此液耗陽升。上逆不		
已	血無止。則宜降氣通調。莫與脈塞。		
蘇子	降香	桃仁	丹參
非白汁	山梔	茯苓	
某	脈失血。脇痛氣逆。		
枇杷葉	冬瓜子	蘇子	苡仁
炒丹皮	桃仁	降香汁	牛膝炭
方	憂思。怫鬱。五志氣火內燔。加以烟辛泄肺。酒熱戕胃。		

<p>精華營液爲熱蒸化敗濁。經云陽絡傷則血外溢。蓋胃絡受傷，陽明氣血頗富，猶勉強延磨歲月，至於陽明脉絡日衰，斯背先發冷，右脈痿，痿而咳吐不已，胃土愈虛，肝木益橫，厥陽愈逆，穢濁氣味，無有非自下泛上。大凡左升屬肝，右降屬肺，由中焦胃土既困，致有升無降，壅阻交迫，何以着左卧眠，遏其升逆之威，且煩蒸熱灼，並無口渴飲水之狀，病情全在血絡，清熱滋陰之治，力量不能入絡，茲定清養胃陰爲主，另進通絡之義，肝膽脈陽少和，冀其涎少，脇通積久沉痾，調之非易。</p>											
桑葉		丹皮		苡仁		蘇子					
臨證指南醫案				卷二 吐血		寒					
鈎藤		鬱金		降香		桃仁					
又 桑葉		枇杷葉		苡仁		大沙參					
蘇子		茯苓		鬱金		降香					
又 早服現玉膏											
<p>胡氏有年冬藏失司，似乎外感熱證，辛散苦寒，是有餘實症，治法自春入夏，大氣開泄，日見厭厭衰倦，呼吸嘆息，有聲，脇肋室板欲痛，咯紫血，絡脉不和，議以辛補通調，不致寒凝燥結，冀免關格上下交阻之累。</p>											
栝子仁		細生地		當歸鬚		桃仁					
降香		茯苓									

石三先有骨痛鼓候每至旬日必吐血礙許自冬入夏皆然近僅可仰臥着右則咳逆不已據說因怒勞致病都是陽氣過動而消渴舌翳仍納穀如昔姑以兩和厥陰陽明之陽非徒泛泛見血其咳為治

石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝

又石膏 生地 知母 丹皮 大黃

桃仁 牛膝

蔣六宿傷怒勞動肝血溢紫塊先以降氣導血

蘇子 降香末 桃仁 黑山梔

金斛 製大黃

臨證指南醫案

卷二 吐血

姜

又天地杞圓加棗仁茯神

某形盛脉弦目皆黃咳痰粘濁嘔血此胃有濕熱膠源

因怒勞動肝故左脇中痛血逆而上非虛損也當薄味

靜調戒嗔怒百日可却

蘇子 降香 廣皮白 生薑 桃仁

鬱金 金斛 六服後接服海粉九半助

某向有背痛尚在勞力氣逆咳血乃勞傷病也

歸建中去姜加茯苓

某二努力傷絡失血面黃口中味甜腕中煩悶衝氣病在

肝胃勿以失血治以滋賦

旋覆花 代赭石 半夏 淡乾姜

塊茯苓 南棗肉

呂二脉數上出右脇上疼則痰血上溢必因噴怒努力勞煩致絡中氣阻所致宜安閑靜攝戒怒慎勞一歲之中不致舉發可云病去

降香末 八分 炒焦桃仁 三錢 丹皮 一錢 野鬱金 一錢

茯苓 三錢 黑山梔 一錢 丹參 一錢 橘紅 一錢

吳氏氣寒失血咳嗽心熱室暮寒熱不思納穀此悒鬱內損二陽病發心脾若不情懷開爽服藥無益

阿膠 麥冬 茯神 白芍

臨證指南醫案 卷二 吐血 姜

北沙參 女貞子

李氏情志久鬱氣逆痰喘入夏咳血都因五志陽升况腕

李氏氣二年寡居隱曲不伸論理治在肝脾然非藥餌奏功

降香末 枇杷葉 蘇子 鬱金

瓜蒌皮 黑梔皮 茯苓 芒仁

吳氏鬱損咳血頻發當交節氣逆嘔吐肢冷厥逆所現俱是虛勞末路豈是佳景勉擬方

生白芍 烏梅 炙草 炒麥冬

扶神 橘紅

張氏失血。口碎。舌泡。乃情懷鬱勃。內因鬱火。不和寒濕。五
熾。病鬱延久。爲勞所喜。經水尚至。識手厥陰血分主治。

犀角

金銀花

鮮生地

玄參

連翹心

鬱金

失血一症。名目不一。茲就上行而吐者言之。三因之
來路宜。也。若夫外因起見。陽邪爲多。蓋犯是症者。
陰分先虛。易受天之風熱燥火也。至陰邪爲患。不過
甘中之一二耳。其治法總以手三陰爲要領。究其病
在心營肺衛如何。若夫內因起見。不出乎真怒鬱勃
之激傷肝臟。勞形苦志而耗損心脾。及恣情縱慾以

臨證指南醫案

卷二 吐血

夫

賊腎臟之其陰真陽也。又當以足三陰爲要領。再審
其乘侮制化如何。若夫不內不外因者。爲飲食之偏
好。努力及降障之傷。治分臟腑經絡之異。要知外因
而起者。必有感候爲先。裡因而起者。必有內症可據。
此三因根蒂用藥。切勿混亂。凡理肺衛者。用甘涼
肅降。如沙參麥冬桑葉花粉玉竹川斛等類。治心營
者。以輕清滋養。如生地玄參丹麥連翹竹葉骨皮等
類。以此兩法爲宗。隨其時令而加減。若風淫津涸。加
以甘寒。如蘆根蔗汁薄荷羚羊之品。若溫淫火壯。參
入苦寒。如山梔黃芩杏仁石膏之品。若暑遏氣分。佐

滑石鮮荷之開解。在營與銀花犀角之清芳。次令選

純甘以清燥。冬時益清補以助藏。凡此爲外因之大

畧。所云陰邪爲患者。難以並言也。舊有麻黃人參芍

藥湯。先生有桂枝加減法。至於內因傷損其法更繁。

若嗔怒而動及肝陽血隨氣逆者。用繆氏氣爲血帥

法。如蘇子鬱金桑葉丹皮降香川貝之類也。若鬱勃

日久而傷及肝陰。木火內燃陽絡者。用柔肝育陰法。

如阿膠鵝黃生地麥冬白芍甘草之類也。若勞煩不

息。而偏損心脾。氣不攝血者。用甘溫培固法。如保元

湯歸脾湯之類也。若縱慾而竭其腎真。或陽元陰騰。

臨證指南醫案

卷二 吐血

夫

或陰傷陽越者。有從陰從陽法。如青鉛六味。肉桂七
味。並加重便之類也。若精竭海空。氣泛血湧者。先生
用急固真元。大補精血法。如人參枸杞五味熟地河
車紫石英之類也。凡此爲內因之大畧。至於不內不
外因。亦非一種。如案中所謂烟辛泄肺。酒熱戕胃之
類。皆能助火動血。有治上治中之法。如葦莖湯。甘露
飲。茅根藕汁等劑。在人認定而用之可也。墜墮之傷。
由血瘀而泛。大抵先宜導下。後宜通補。若努力爲患。
屬勞傷之根。陽動則絡鬆血溢。法與虛損有間。滋陰
補氣。最忌凝滯。如當歸建中湯。旋覆花湯。虎潛丸。金

剛四斤九。取其有循經入絡之能也。凡此為不內外因之大畧。但血之主司者如心肝脾三臟。血之所生化者莫如陽明胃腑。可見胃為血源之要道。若胃有不和。當先治胃也。仁齋直指云。一切血症。經久不愈。每每以胃藥收功。想大黃黃連瀉心湯。犀角地黃湯。理中湯。異功散。雖補瀉寒溫不同。確不離此旨。所以先生發明治胃方法獨多。有薄味調養胃陰者。如金匱麥冬湯。及沙參扁豆茯苓神石斛之類。有甘溫建立中陽者。如人參建中湯。及四君子加減之類。有滋陰而不碍胃。甘守津還者。如復脈湯加減之類。其餘如

臨證指南醫案 卷二 吐血

補土生金法。鎮肝益胃法。補脾疏胃法。寧神理胃法。腎胃相關法。無分症之前後。一遇胃不加餐。不饑難運。諸候每從此義見長。源源生化不息。何患乎病之不易醫也。邵新甫

失音

寒熱客邪迫肺

吳六外冷內熱。久逼失音。用兩解法。麻杏甘膏湯。

宋三先失音。繼喉痺。是氣分窒塞。微寒而熱。水飲噎出。咯痰隨出。隨阻。此仍在上。連舌黃口渴。議與苦辛寒方。

射干 麻黃 杏仁 生甘草

石膏 苡仁

陸二秋涼燥氣咳。嗽。初病皮毛裏寒。冬月失音。至夏未愈。而納食頗安。想屢經暴冷暴煖之傷。未必是二氣之餘。微金實無聲。議治。

臨證指南醫案 卷二 失音

麻黃 杏仁 生甘草 石膏

射干 苡仁

又 蘆根汁 杏仁汁 萊菔汁 鮮竹瀝 熬膏
范三氣燥喉痺失音。少陽木火犯上。

生雞子白 冬桑葉 丹皮 麥冬

生白扁豆殼

氣分津液

某 喉乾失音。一月未復。津液不上。供肺失清肅。右寸脈

浮大

枇杷葉一錢 馬兜鈴八分 地骨皮一錢 桑皮八分

麥冬一錢 生甘草三分 桔梗六分 白粳米二錢

失血津液

某 血後音啞便溏

生扁豆 炒白芍 炙草 川斛

山藥 米糖 大棗

何 勞損氣喘失音全屬下元無力真氣不得上注紛紛

清熱治肺致食減便溏改投熱藥又是劫夜宜乎喉痛

神疲矣用補足三陰方法

熟地 五味 炒山藥 茯苓

芡實 建蓮肉

孫久咳失音喉痛

陳阿膠 同煎生雞子黃 一錢 炒麥冬 一錢 川斛 三錢

臨證指南醫案 卷二 失音 全

甜北沙參 一錢 炒生地 二錢 生甘草 三錢 茯神 一錢

夫宮商角徵羽歌哭呼笑呻此五臟所屬之音聲也

原其發聲之本在於腎其標則在乎肺病有虛實山

咳嗽而起者居多或肺有燥火外感寒邪火氣鬱遏

而痛者有肺金燥甚木火上炎咽乾喉痺而痛者有

風熱痰涎壅遏肺竅而痛者有噴怒叫號致傷會厭

者亦有龍相之火上炎凌燥肺金久咳不已而痛者

有內奪而厥則為瘖俳此腎虛也是即暴中之不能

言者也先生有金空則鳴金實則無聲金破碎亦無

聲此三言足以該之矣有邪者是肺家實也無邪者

是久咳損肺破碎無聲也其治法有寒者散寒有火

者清火有風痰則祛風豁痰若龍相上炎燥肺者宜

金水同治若暴中之瘖全屬少陰之虛宜峻補肝腎

或稍兼痰火而治之其用藥總宜甘潤而不宜苦燥

斯得之矣 華岫雲

臨證指南醫案 卷二 失音 全

肺痿

苦辛散
和傷肺
胃津液

洪二勞煩經營陽氣弛張。即冬溫外因。咳嗽亦是氣逆。而
侵辛以散邪。苦以降逆。希冀嗽止。而肺欲辛。過辛則正
氣散失。音不能揚。色消吐涎喉痺。是肺痿難治矣。做內
經氣味過辛。主以甘緩。

北沙參 炒麥冬 飴糖 南棗

查二脉細心熱。呼吸有音。夜寤不寐。過服發散。氣泄陽傷。
為肺痿之病。仲景法以雪梨汁。補母救子。崇生氣也。

金匱麥門冬湯

臨證指用醫案

金

徐四肺痿。頻吐涎沫。食物不下。並不渴飲。豈是實火。津液

蕩盡。二便日少。宗仲景甘麥理胃。乃產則補母。仍佐宣

通腕間之扞格。

人參 麥冬 熟半夏 生甘草

白梗米 南棗肉

沈積勞憂思。固是內傷。冬溫觸入。而為咳嗽。乃氣分先

虛。而邪得外奏。辛散斯氣分愈泄。滋陰非能安上。咽痛

音啞。虛中邪伏。恰值春暖陽和。脉中脉外氣機流行。所

以小效旬日者。生陽漸振之象。穀雨暴冷驟加。衛陽久

弱。不能擁護。致小愈病復。診得脉數而虛。偏大於右寸。

虛傷

口吐涎沫。不能多飲湯水。面色少華。五心多熱。兩足背
浮腫。古人謂金空則鳴。金實則無聲。金破碎亦無聲。是
為肺病顯然。然內傷虛證為多。虛則補母。胃土是也。肺
痿之病。議宗仲景麥門冬湯。

王三黃湯流膿經年。脉細色青。善噤食減。咳嗽。喉中梗痛。
皆漏損肺液。陰火內守。陽失外衛。肺痿之病。諒難全好。

人參 黃芪 苡仁 炙草

歸身 白芨

顧六久咳神衰。氣促汗出。此屬肺痿。

黃芪 生苡仁 白百合 炙甘草

臨證指用醫案

金

白芨 南棗 水熬骨末飲湯送

肺氣不降。咳嗽嘔逆。

鮮薑根 桃仁 絲瓜子 苡仁

肺痿一症。概屬津枯液燥。多由汗下傷正所致。夫痿

者。萎也。如草木之萎而不榮。為津干而氣竭也。然致

痿之因。非止一端。金匱云。或從汗出。或從嘔吐。或從

消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下之。重亡津液。

故令肺熱乾痿也。肺熱乾痿。則清肅之令不行。水精

四布失度。脾氣雖散津液上歸於肺。而肺不但不能

自滋其乾。亦不能內灑陳於六腑。外輸精於皮毛也。

其津液隔於胃中。得熱煎熬。變爲涎沫。侵肺作咳。唾之不已。故乾者自乾。唾者自唾。愈唾愈乾。痰病成矣。金匱治法。貴得其精意。大意生胃津。潤肺燥。補真氣。以通肺之小管。清火熱。以復肺之清肅。故外臺用灸甘草湯。在於益肺氣之虛。潤肺金之燥。千金用甘草湯。及生薑甘草湯。用參甘以生津化熱。姜棗以宣上焦之氣。使胃中之陽不滯。而陰火自熄也。及觀先生之治肺痿。每用甘緩理虛。或宗仲景甘藥理胃。虛則補母之義。可謂得仲景心法矣。鄒時乘

臨證指南醫案目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

許關李大瞻翰

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲同校

邵銘新甫

遺精

陳厥後吸短多遺議攝下焦

熟地 四錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 一錢

五味 一錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

茯神 三錢

山藥 二錢

某四夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

臨證指南醫案

卷三 遺精

易動無制故精不能固由煩動而泄當填補下焦俾精

充陽潛可以圖愈

熟地 八兩

麥冬 二兩

茯神 二兩

五味 二兩

線膠 四兩

川斛膏 四兩

沙苑 二兩

遠志 一兩

芡實 二兩

湖蓮 三兩

金櫻膏九

馬陰虛體質常有夢泄之疾養陰佐以清劑仍參入通

藥可效六味去丹澤加湖蓮芡實五味遠志秋石

金櫻膏九

張陰精走泄陽失依附上胃為熱坎水中陽不藏古人

必以厚味填之介類潛之乃從陰以引陽與今人見熱

投涼不同

熟地 龜甲

淡菜

青鹽

茯神

栢子仁 女貞子

山藥

旱蓮草

某二脉左弦右濡夢遺咳逆氣急

熟地 麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神 女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實 金櫻膏

加蜜丸每服四五錢淡鹽湯下

楊脉垂入尺有夢遺精議填陰攝固其下

熟地 萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子 遠志

線膠

湖蓮

芡實

臨證指南醫案

卷三 遺精

金櫻膏九鹽湯下

劉先患目疾流淚嘈雜不欲食內鬱動陽氣過動陰虛

不主攝納春半連次遺泄腰脊酸楚皆肝病矣

熟地 龍骨

萸肉

茯神

丹皮 湖蓮

芡實

遠志

某勞損漏夢大便時溇陰火上升下則遺滑

熟地 龜版

芡實

山藥

女貞 建連

炙草

稽豆皮

某少年頻頻遺精不寐心嘈乃屬腎中有火精得熱而

妄行日後恐有腎消之累

<p>焦黃栢 生地 天冬 茯苓</p>		<p>煅牡蠣 炒山藥</p>		<p>某 脉虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動精。搖下泄。加以夜坐不靜。寒再折其陽。身不發熱。時驚悸煩躁。從仲景亡陽肉瞤例。用救逆湯法。必得神氣凝靜。不致昏瘡瘵之變。救逆湯去芍。</p>		<p>費 色蒼脉數。煩心則遺。陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下注。此固瀉無功。</p>		<p>草解 黃栢 川連 遠志</p>		<p>茯苓 澤瀉 枳椇 苡仁</p>		<p>臨證指南醫案 卷三 遺精</p>		<p>吳 病形在腎肝。但得為中。痛微緩。少腹陰囊亦脹。想陰分固虛。而濕熱鬱着。致崩經之氣。無以承流宣化。理固有諸。先泄厥陰鬱熱。兼通胸氣。再議。</p>		<p>龍胆草 胡黃連 草解 丹皮</p>		<p>茯苓 澤瀉</p>		<p>又 聞病原。是臟陰陰精之虧。致陽浮頭痛。兼有遺精。月數發。下虛上實。純以補滿。決不愈。病性不耐丸劑。與通攝兩用。</p>		<p>龜版 秋石 熟地 女貞 遠志</p>		<p>芡實 湖蓮 茯苓 熬膏</p>	
---------------------	--	----------------	--	---	--	---	--	--------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	--	--	----------------------	--	--------------	--	---	--	-----------------------	--	--------------------	--

<p>錢 十脉右弦左垂。陰虛遺精。精虧。</p>		<p>黃栢 知母 熟地 草解</p>		<p>茯苓 遠志 蜜丸</p>		<p>某 夢遺病。乃是陰氣走泄。而濕熱二氣乘虛下陷。墜自腰中。至囊環跳膝蓋諸處。可見久遺八脉皆傷。議用通藥。兼理陰氣。猪苓湯。</p>		<p>又 熟地 五味 芡實 茯苓</p>		<p>湖蓮 山藥</p>		<p>宋 二無夢頻遺。精乃稱。痰已滑。古人謂有夢治心。無夢治腎。腎陰久損。陽升無制。喉中貯痰不清。皆五液所化。</p>		<p>臨證指南醫案 卷三 遺精</p>		<p>胃納少而運遲。因下必佐健中。</p>		<p>人參 桑螵蛸 生龍骨 鎮陽 芡實</p>		<p>熟地 茯苓 遠志 金櫻膏丸</p>		<p>華 九神傷於上。精敗於下。心腎不交。久傷精氣。不復調之。損內經治五臟之損。治各不同。越人有上損從陽下損從陰之議。然必納穀資生。脾胃後天得振。始望精氣生於穀食。自上秋至今。日甚。乃裏真無藏。當春合泄。越生氣不至。漸欲離散。從來精血有形。藥餌焉能驟然充長。攻病方法。都主客和。以偏治偏。聞古東垣丹溪輩。於損不肯復者。首宜大進。參不多至數劑。謂有形精血難生。</p>	
--------------------------	--	--------------------	--	-----------------	--	---	--	----------------------	--	--------------	--	---	--	---------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	----------------------	--	---	--

無形元氣須急固耳。況上下交損。當治其中。若得中連。加穀。繼泰入攝。納境。精飲。神之屬。方今春木大泄。萬花盡放。人身應之。此一月中。急挽勿懈矣。

參水膏水飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精。收攝散亡。乃瀉以治脫之法。

又半月來。服桑螵蛸散以固下。參水膏以益中。遺滑得止。其下關頗有收攝之機。獨是晝夜將寢。心中諸事紛紛來擾。神傷散越。最難欲聚。且思慮積勞。心脾營血暗損。血不內涵。神乃孤獨。議用嚴氏濟生歸脾方。使血氣

臨證指南醫案 卷三 遺精

五

真氣咸歸於脾。今夏前上旺司令。把握後天。於理最合。歸脾湯

又立夏四日。診左脉自至。餘頗有欲聚之意。右關及尺。乳動若革。按臍下過寸。動氣似若穿梭。此關元內空。衝脉失養。而震躍不息。此女子胞胎。男子聚精之會也。大凡內損精血。形氣具胃。壯納食者。務在滋填。今食減不納。假寐片响。必煩驚悸。而汗自述。五心焦熾。四肢骨節熱痿如墮。明是陰精內枯。致陽不交陰。轉枯轉潤。自下及中至上。前投桑螵蛸散。固精精氣。遺滑經月不來。奈寢食不加。後天生氣不固。厚培補於理難進。即參

木甘溫益氣。恐其枯燥。宜參生原以滋三焦。晨進人乳一杯。使氣血陰陽引之。導之。迎夏至一陰來復。早用人乳一盞。隔湯燉熱服。午後暑候。用生豚四君子湯。

又一月來。雖經反覆。察脉症形色。生陽頗有根蒂。近食蚕豆滯氣。腹中微膨。食後口味酸澀。是久卧重着。脾陽運動之機尚少。而火升心煩。動氣汗出。遺精雖減。於昔未得平復。總是內損已深。若調治合宜。只要精氣復得一分。便減一分。病象。長夏脾胃主令。培土助納為要。而精氣散越。仍兼攝固之法。刻下味酸微膨。補脾少佐陳胃宜晚進。其早上另製補攝丸。劑益臍真以招納散失

臨證指南醫案 卷三 遺精

六

之氣

晚服 人參 茯苓 白朮 炙草 廣皮

麥冬 五味 神麴 麥芽 炒黃柏

早上 人參 桑螵蛸 白龍骨 淡從蓉 五味

芡實 茯神 棗仁 金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

又形色有漸復之象。較之夏至。病去三四。但診右脉弦大。尚少冲和。左脉細促未靜。穀進遲遲。有石酸腹脹。寐中仍欲遺精。此中焦之陽宜動則運。下焦之陰固則能守。乃一定成法。午後服異功散加炒穀芽

晨服 遺症固滴下焦乃通套治法想精關已滑滋劑不

能取效必用滑劑引導同氣相求古法有諸

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麋角膠 白龍骨

生牡蠣 熟地 芡肉 茯神 五味

山藥 芡實 湖蓮 遠志 砂仁

膠髓代蜜丸晨服四錢秋石二分化水下

毛二長夏暑濕熱鬱都令脾胃受傷色黃神倦氣分自餒

因有遺泄一症在盛年陰虛為多及詢納食未為強旺

遺發必勞煩而來脉象非數搏議以養脾立法

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨

臨證指南醫案 卷三 遺精 七

項 脉左弱右弦色黃食少腹脹低微常有夢遺洩此非

陰柔瀉賦可服用煦陽以涵陰

生鬼絲子 覆盆子 蛇床子 五味子 韭子

益智仁 補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

丁 陰精走泄陽不內依欲寐即醒心動震悸所謂氣因

精奪當養精以固氣從前媛藥不對但不分剛柔為偏

陽是以見血莫見血投涼

龜版 去霜前 桑螵蛸 錢三 人參 一錢 當歸 一錢

青花龍骨 飛 抱木茯神 三錢

姚二始於念萌不遂其慾陽下墜而精洩先夢者心陽注

腎久則精血日損不充養筋骨為痛下損及中食不運

化此非更地賦屬以及清精可效 妙香散

許八陰氣走泄遺精務宜滋填塞固今納穀少而不甘胃

氣既弱滋賦先妨胃口議用桑螵蛸散蜜丸服三四錢

戈 遺精數年不但腎關不固陽明脉絡亦已空乏欲得

病愈宜戒慾寧心一年寒暑更遷陰陽漸交用桑螵蛸

散治之

顧九滑精用陰藥頗然食減藥先傷胃據述夢寐驚狂

走無以養神當因無形矣 人參 生龍骨 桑螵蛸 益智仁

臨證指南醫案 卷三 遺精 八

扶神 茯苓 遠志 木香

呂三有夢乃遺是心有所觸而致經營操持皆擾神動心

說商賈客於外非關酒色矣 妙香散

俞七壯年形質偉然脉來孔虛述心悸怔多畏懼夜寐不

甚寧靜此陽不易交於陰過用勞心使然用妙香散

張四形壯脉小自述心力勞瘁食減遺精做景岳精因氣

而奪當養氣以充精理其無形以固有形 妙香散

支二痰多鼻塞能食有夢遺精醫投疎泄肺氣消痰六十

劑不効問謂晝夜坐陽氣必升充塞上竅上盛下衰寐

黃一真陰損傷。而五志中陽上燔喉痛下墜為遺精。耗精痿無力。必延枯槁而後已。藥餌何足久恃。

早服補心丹 晚服桑螵蛸散

胡遺精四年。精關久潰。不固。陰久傷。陽氣不入陽蹻穴。夜寤不寐。前以鎮攝小效。獨心中怔忡不已。以桑螵蛸散從心腎治。

畢六有夢遺精。是心腎病。清心固腎。是為成法。得以水火交合。病當漸減。內傷病。從內起。豈得與外來六氣混。

熟地 龍骨 遠志 五味 茯神

芡實 建蓮 金櫻膏丸

臨證指南醫案 卷三 遺精 九

程左脉剛堅火升。神氣欲昏。片刻平復。宛若無病。此皆勞心五志之陽動。龍相無制。常有遺泄之狀。先用滋腎丸三錢。淡鹽湯送。

又早服補陰丸 晚服三才加炒黃柏砂仁

又交霜降。絡中陡然熱蒸。肢節皆麻。火風震動。多因脾腎液枯。議用一至百補丸。意則龍二至百補丸加黃柏。林八診脉細滑。寐則遺精。心熱口渴。不暗寒熱。此腎陰內損。心陽暗熾。補心丹三錢。開胃。

某冬令煩倦。嗽加。是屬不藏。陽少潛伏。兩足心常冷。平時先夢而遺。由神馳致精散。必鎮心以安神。猶喜胃強。

納穀若能保養可望漸愈。

桑螵蛸 金櫻子 覆盆子 芡實

遠志 茯神 茯苓 龍骨

湖蓮 煎骨煉蜜收饑時服七八錢

楊十冲年遺精。知識太早。難成易虧。真陰不得充長。及壯盛未有生育。而久遺滑漏。褚氏謂難狀之疾者。蓋病傷可復。精損難復也。診脉上動尺芤。心動神馳。神馳精散。草木性偏。焉得見長。務宜斷慾百日。以妙香散桑螵蛸散方。理心脾以交腎。固腎氣以寧心。早晚並進百日以驗之。

臨證指南醫案 卷三 遺精 十

呂四成始太早。精而未滿久洩。必關鍵不攝。初則精腐變濁。久則元精滑溢。精濁之病。巢氏分晰彰著。經言腎虛氣漫為脹。鹹為腎味。上溢口舌。皆下失攝納之權。

生鬼絲子粉 蛇床子 覆盆子 陝沙苑子

家韭子 五味子 鯉魚膠丸

許十脉虛孔。應乎失血遺精。先天既薄。更易泄少。藏正褚氏所云難狀之疾。冲年須潛心靜慮。真水火自交。可以精固。莫但圖藥餌。須堅守矚刻強制之功。

鮮河車膏 九蒸熟地 五味 苁肉

山藥 湖蓮 砂仁 芡實 金櫻膏丸

李五 脉小色白失血遺精屢發。猶其遺精安。遺精。

使其藏聚。若再苦寒瀉火。胃傷廢食。坐以待困矣。

熟地 荳肉 五味 覆盆子

河車膏 生兔絲粉 山藥 湖蓮

茯苓 芡實 金櫻膏丸

某 脉左部數。有鋒芒。初夏見紅。久遺。入夜殘升。為痛。

肝陽上冒。腎弱不攝。固攝助納。必佐涼肝。

熟地 湖蓮 芡實 生白龍骨

茯苓 川石斛

章 脉數虛。氣衝心熱。陰咳失血。屢用噴怒。肝陽升則血。

臨證指南醫案 卷三 遺精 士

湧降。則精遺。春末土旺。入夏正當發泄。主令。暮熱晨汗。

陰陽相離失固。議進攝真。其清寒肺藥須忌。

魚鱉膠 生龍骨 桑螵蛸 芡實

茯苓 五味 秋石 調入

陸二 肌肉鬆柔。脉小如數。常有夢遺。陰精不固。上年冬令。

過溫。溫則膝理反疎。陽動不藏。諸氣皆升。絡血隨氣上。

溢見。疔如頭面熱。目下肉瞤。心悸怔忡。四末汗出。兩足。

跗腫。常冷不溫。走動數武。即吸短欲喘。何一非少陰腎。

氣失納。陽浮不肯潛伏之徵。况多夢紛擾。由精傷及神。

氣法當味厚填精。質重鎮神。佐酸以收之。甘以緩之。勿。

因血以投涼。莫見下寒。輒進燥熱。恪守禁忌以安之。經。

年冀有成功。所慮中年志慮未純。貽憂反覆。

水製熟地 人參 炒白龍骨 炒杞子

五味 炒山藥 茯苓 牛膝炭

遺精一症。前賢各有明辨。其義各載本門。茲不復贅。

大抵此症。變幻雖多。不越乎有夢無夢。濕熱三者之。

範圍而已。古人以有夢為心病。無夢為腎病。濕熱為。

小腸膀胱病。夫精之藏制雖在腎。而精之主宰則在。

心。其精血下注。濕熱混搖而遺滑者。責在小腸膀胱。

故先生於遺精一症。亦不外乎寧心益腎。填精固。

臨證指南醫案 卷三 遺精 士

清熱利濕諸法。如腎精虧乏。相火易動。陰虛陽。而。

為遺精者。用厚味填精。介類潛陽。養陰固。諸法。如。

無夢遺精。腎關不同。精緩滑脫而成者。用桑螵蛸。

填陰固攝。及滑精互施方法。如有夢而遺。煩勞過度。

及脾胃受傷。心腎不交。上下交損而成者。用歸脾湯。

妙香散。參朮膏。補心丹等方。心脾腎兼治之法。如陰。

虛不攝。濕熱下注而遺滑者。用黃柏蘆薈。黃連蒼澤。

等。苦泄厥陰鬱熱。兼通腑氣為主。如下虛上實。火風。

震動。脾腎液枯而為遺滑者。用二至百補丸。及通打。

下焦之法。如龍相交。陰精走泄而成者。用三才封。

飜丹滋腎丸大補陰丸峻補真陰承制相火以瀉陰
 中伏熱為主又有房勞過度精竭陽虛寐則陽陷而
 精道不禁隨觸隨泄不夢而遺者當用固精丸升固
 八脉之氣又有膏粱酒肉飲醇厚味之人久之脾胃
 釀成濕熱而伏陰中而為夢泄者當用劉松石猪肚
 丸清脾胃蘊蓄之濕熱立法雖為大備然臨症之生
 心化裁存乎其人耳 鄭滋九

淋濁

某三濕熱下注淋濁當分利

草薢 淡竹葉 瞿麥 赤苓

細木通 扁蓄

某二濕熱下注溺痛淋濁先用分利法

草薢 淡竹葉 木通 赤苓

茵陳 海金沙

魏脈數垂淋濁愈後再發肛脹便不爽餘瀝更盛

草薢 猪苓 澤瀉 白芷草

臨證指南醫案卷三淋濁

十四

海金沙 晚蚕沙 丹皮 黃芩

又滯濁下行痛緩議養陰通腑

阿膠 生地 猪苓 澤瀉

山梔 丹皮

毛三壯盛體豐當夏令濕熱蒸迫水穀氣降而有淋濁服
 寒涼腹脹得固瀉無效皆非腑病治法 子和桂苓飲

又前用甘露飲淋濁已止而頭暈左肢麻木胃脘腹中
 饑則欲痛咽中似有物粘着咳咯咽飲不解診脉左

勁右濡據証是水弱不失滋涵肝陽化風過膈達咽達
 顛未乘胃土陽明脉衰不司束筋骨以利機關腕腹中

痛得食則緩者胃虛求助也今壯年有此已屬脾中根
苗養肝腎之液以熄虛風補胃土以充絡脉務在守常
勿同速效可望全好

製首烏 茯苓 天冬 杞子

栝子霜 茯神 菊花炭 青鹽

紅棗肉丸服四錢 晚服猪肚丸方

某膏淋濁膩濕熱居多然亦有勞傷腎傷下虛不攝者
今以酒客腹中氣墜便積苦辛寒分消治

黃柏 茯苓 單薤 海金沙

川棟子 青皮 防已 赤石

臨證指南醫案 卷三 淋濁 主

江 脉左堅入尺濕熱下墜淋濁痛 滋腎丸

周 便濁莖痛 滋腎丸三錢

吳 久瀉不愈已有濕熱知識太早陰未生成早泄致陽

光易升易降牙宣衄血為濁為遺欲固其陰先和其陽

做丹溪大補陰丸合水陸二仙丹加牡蠣金櫻膏丸

黃 舌白氣短胸中痛日暗微淋乃陰虛於下氣阻於上

暫停參劑早上服都氣丸三錢晚服感喜丸二錢

葉 脉數形瘦素存失血自覺氣從左升痰嗽隨之此皆

積勞陽氣鼓動陰弱少制六味壯水和陽極是近日便

濁雖宜清熱亦必顧其陰體為要

生地 丹皮 甘草梢 澤瀉

山梔 黑豆皮

某 陰虛濕熱在膈為濁 六味去更加車前牛膝黃柏

草薢

某 遺山精製淋在溺竅異出同門最宜分別久遺不攝

是精關不攝為虛但熱滴莖中痛痒久腹堅滿此屬淋

閉乃隧道不通未可便認為虛况夏令足趾濕腐其下

焦先蘊濕熱熱阻氣不流行將膀胱撐滿故令脹堅

理足太陽經 五苓散

下焦不流 某五淋濁溺知為痛先通陽氣

臨證指南醫案 卷三 淋濁 主

草薢三錢 烏藥一錢 益智五分 赤芍二錢

遠志四分 琥珀末五分

蕭 脉沉淋濁 分清飲加山梔丹皮茯苓猪苓

某 淋濁小便不利當清利火腑 導赤散生地用細者

加赤苓瞿麥

黃 心熱下遺於小腸則為淋濁用藥以苦寒入心而小

腸火脈非苦不通也既已得效宗而議定法

人參 黃柏 川連 生地 茯苓

茯神 丹參 桔梗 石菖蒲

王 淋尿脉脹濁屬心腎心火下陷陰失上承故溺濁不

氣第		禁	人參	川連	生地	茯神
勝就熱		某氏氣閉成淋	栝子仁	遠志		
血淋		紫苑	枇杷葉	杏仁	降香末	
		瓜蒌皮	鬱金	黑山施		
		又食入痞悶小便淋痛	照前方去紫苑黑梔加苡仁			
		某三小溲短赤帶血	導赤散加琥珀末五分赤茯苓			
		胡五熱入膀胱小便血淋	中猶痛非止血所宜議用錢氏導赤散加知栝以清龍雷			
臨證指南醫案		卷三	淋濁	七		
		許八血淋尿管溺出而痛脈沉實	形色蒼黑治從腑熱			
		蘆薈	山梔	郁李仁	紅花	
		當歸	酒大黃	龍胆草	丹皮	
		又血淋未已用寧陰清熱				
		小生地	粉丹皮	黃柏	知母	
		淡竹葉	山梔	非血淋方		
		視五中年已後瘦人陰虧有熱飲酒濕熱下墜精濁痔血				
		皆熱入陰則陰不固攝前方宗丹溪補陰丸取其介				
		屬潛陽引脉堅陰若用固澀必致病加				
		水製熟地	龜版膠	鹹秋石	天冬	

氣第		茯苓	黃柏	知母	猪苓	助揚丸
五		范二精走濁淋脊骨生熱屬陰虛胃弱勿用膩滯				
		龜腹甲心	覆盆子	五味	歸身	
		鹿角膠	秋石	芡實	金櫻膏丸	
		又四脉左細動腰痠溺有遺瀝近日減穀難化此下焦臟				
		陰虛餒漸及中焦脾陽收納肝腎勿損胃氣				
		熟地	杞子	栝子仁	當歸身	紫衣胡桃
		補骨脂	杜仲	茯苓	青鹽	蜜丸
		某五六旬有下焦空虛二便不爽溺管痺痛姑與腎氣				
		湯主治	腎氣湯細絹濾清服			
臨證指南醫案		卷三	淋濁	八		
		朱三血淋管痛溺熱為多經月來每溺或大便其墜下更				
		甚想陰精既損腎氣不收故也				
		鹹從蓉	栝子仁	杞子	大茴	
		牛膝	茯苓	非血淋方		
		某淋濁絕全陽損腰痛畏冷				
		熟地	杞子	鹿角膠	巴戟	
		杜仲	栝子仁	湖蓮	芡實	
		葉二淋屬肝胆濁屬心腎據述病溺出渾濁如膿病甚則				
		多或因遺泄後濁痛皆平或遺後痛濁轉甚想精鬱之				
		間必有有形敗精凝阻其竅故藥中清濕熱通腑乃同				

清補陰久餌不效先議通淋腐一法考方通淋通痰
用虎杖湯今世無識此藥每以杜牛膝代之

用鮮杜牛膝根水洗淨搗爛絞汁大半茶杯調入真
麝香一分諳隔湯燉溫空心服只可服三四服淋通
即止倘日後病發再服

又淋病主治而用八正分清導赤等方因熱與濕俱屬
無形腑氣爲壅取淡滲苦寒濕去熱解腑通病解若房
勞強忍精血之傷乃有形敗濁阻於尿道故每溺而痛
徒進清濕熱利小便無用者以濁與精同門異路耳故
虎杖散小效以麝香入絡通血杜牛膝亦開通血中敗

臨證指南醫案卷三淋濁

五

濁也此治血爲淋之方

我白汁九製大黃一 生白牽牛子一 歸鬚五錢

桂枝木三錢 炒桃仁二兩 小茴三錢 韭白汁法丸

李敗精凝陰通痰痺宣竅已效

生桃仁 杜牛膝 人中白 生黃柏 麝香二分

徐四五旬又四勞心陽動陰液日損壯年已有痔瘡腸中

久有濕熱酒性辛溫亦助濕熱熱下注爲痔爲漏故初
病投八正五苓疎氣之壅也牛年不愈氣病漸入於血
絡考古方惟虎杖散最宜 虎杖散

張丹溪謂五淋症濕熱阻竅是矣三年前曾有是病月

前舉發竟有血塊室塞尿管大痛不能溺出想房勞強
忍敗精離位變成汚濁於腐且少腹堅滿大便秘澀藏
氣無權腑氣不用考瀕湖發明篇中有外甥柳喬之病
與此適符今做其義參入朱南陽法治法血爲淋

兩頭尖 川棟子 韭白 小茴

桂枝 歸尾 沖入杜牛膝根汁

又痛脹皆減商歷成淋前投通濁已效只要疑塊全無

便不反覆陰藥呆鈍桂附劫後通陽柔劑爲宜

莖蓉 歸尾 栢子仁 炒遠志

杞子 茯苓 小茴 若加八茶長血藥

臨證指南醫案卷三淋濁

五

馬淋屬肝胆居多桂附劫陰與剛燥不合診脈沉瀄
無力非五苓八正可投議用朱南陽法仍是厥陰本方

耳 老韭根白一兩兩頭尖一百 小茴香五分 川棟子肉一錢

歸鬚二錢 穿山甲末一錢

徐由淋痛漸變赤白濁少年患此多有熱心暗動精離

本宮腐敗凝阻溺竅而成乃有形精血之壅三年久病
形消肉減其損傷已非一臟一腑然補精必佐宣
通爲是自能潛心安着尚堪帶病延年

熟地 生麝角 莖蓉 炒遠志

赤苓

牛膝

某每溺尿管窒痛。溺後渾濁敗精阻。厥熱內蒸。古方虎杖散宜。厥期腐甚妙。若去麝香必不靈。效較諸湯藥更上一籌矣。

酒燉大黃

炒龍胆草

炒焦黃柏

牽牛子

川棟子

黑山梔

小茴

沉香汁

某陰精上蒸者。壽陽火下陷者。危血淋久而成形。室痛煩心。心火直升。老人陰精已憊。五液化成敗濁。阻礙不通。欲溺必痛。得泄痛減。即痛則不通。痛隨利緩之。謂故知栝六味及歸脾逍遙之屬。愈治愈劇。其守補升補滋。

臨證指南醫案

卷三 淋濁

三

淋濁。決不中。用琥珀痛。乃通血利。發之意。然非久進之方。以不傷陰陽之通潤立方。

生地

益母草

女貞子

阿膠

琥珀

稽豆皮

顧二敗精。伯於精關。伯腐因溺。強出新者。又癰在裏。經年累月。精與血並。皆枯槁。勢必竭絕。成勞不治。醫藥當以任督衝帶調理。亦如女人之崩漏。帶下。醫者但知入正分清以濕熱治。亦有地黃湯益陰瀉陽。總不能走入奇。

鹿茸

龜甲

當歸

杞子

茯苓

小茴

鮑魚

夏三案。遺神耗。過動入君。陽燄直升。重陰水火不交。陰精變為腐濁。精濁與便濁異路。故宜利清解。無功數月。久延其病。傷已在任督。凡八脉奇經。醫每棄置。不論考孫真人九法。端究其事。欲瀉陰精。不顧意在升陽。入脉之氣。錄法參末。方不甚清。楚。

鹿茸

人參

生鬼絲粉

補骨脂

韭子

舶茴香

覆盆子

茯苓

胡桃肉

栝子霜

燕餅為丸

劉三脈緩。瀉後。有血或間成塊。晨傾。必。有。屬。精。臨證指南醫案 卷三 淋濁 三

臟之物。四肢寒。寒。納食如昔。病。傷。筋。脈。

生鹿茸

當歸

杞子

栝子仁

沙苑子

小茴 此方治血淋之方

王五悲憂驚恐。內傷情志。沐浴薰蒸。外泄陽氣。絡中不寧。血從漏出。蓋衝脈動。而諸脉皆動。任脉遂失擔任之司。下元真氣。何以固納。述小便欲出。有痰。楚如淋之狀。診脉微小。滿。最宜理陽通補。用青囊。斑龍丸。

淋有五淋之名。濁有精濁便濁之別。數者當察氣分與血分。精道及水道。確從何來。大凡秘結宜通。消服當補。若因心陽亢而下注者。利其火。膿。濕熱甚而不。

宣者微其泉源。氣陷用升陽之湯。血脈進消化結之方。此數端人所易曉也。獨不知脈陰內患其症最急。少腹達前陰如刺。小便頻數難通。環陰之脈絡皆痺。氣化機關已息。先生引朱南陽方法。兼泰老瀉湖意。用滑利通陽。辛鹹泄急。以循經入絡之品。豈非發前人所未發耶。若夫便溺之恙。只在氣虛與濕熱推求。實者宜通水道。虛者調養中州。若虛實兩無。又有益臟通脈之法。精濁者蓋因損傷肝腎而致。有精熱精滑之分。精熱當先理其離宮腐濁。與腎之治精滑者用固補斂攝。倘如不應。當從其無調之。景岳謂理其無形以固有形也。然此病但知治肝治腎而不知有治入脈之妙。先生引孫真人九法升。許陽固精絡使督任有權漏。尿白已可見平日若不多讀古書而臨症焉知此理。昔不經先生講明。予今日亦不知此方妙處。又尿血。症虛者居多。若有火亦能作痛。當與血淋同治。儲清之不愈。則端究乎虛。上則主於心脾。下則從乎肝腎。久則必至於入脈。大約與前症相同。要在認真。新書。

臨證指南醫案 卷三 淋濁

陽痿

徐三脉小數滑。上熱火升。喜食辛酸。稟山上年因精滑陽痿。用二至百補通填未效。此乃焦勞思慮。傷腎傷胃。從少陽以條暢氣血。

柴胡 薄荷 丹皮 鬱金 山梔

神翹 廣皮 茯苓 生薑

仲八三旬以內而陽事不舉。此先天稟弱。心氣不主下交於腎。非如老年陽衰。倒進溫熱之品。填充髓海。交合心腎宜之。

臨證指南醫案 卷三 陽痿

熟地	雄羊腎	杞子	補骨脂	黃節
遠志	茯苓	胡桃	青鹽	鹿筋膠

王五述未育子。向衰萎縮。凡男子下焦先虧。客館辦事。曲運神思。心陽久吸。陰用斑龍聚精。珠合。

男子以八為數。年逾六旬而陽事痿者。理所當然也。若過此猶能生育者。此先天稟厚。所謂陽常有餘也。若夫少壯及中年患此。則有他色慾傷及肝腎而致者。先生立法。非峻補真元不可。蓋因陽氣既傷。真陰必損。若純乎剛熱燥滿之補。必有偏勝之害。每兼血肉溫潤之品。緩調之。亦有因恐懼而得者。蓋恐則傷腎。

臨證指南醫案

卷二

陽痿

美

[illegible]

汗

黃芪二錢

熟附子七分 熟於木半 錢 炙草五分

煨姜一錢

南躡 錢氏現汗症必去汗液此散能治陽痿汗者為要汗則反有害

朱六脉微汗潮右脇高突而栗色痿足冷不食易飢食入

卽飽此陽氣大傷衛不擁護法當封固

人參 黃芪 製川附子 熟於朮

孫五
肉瞶筋傷心悸汗出頭痛愈畏風怕冷陽虛失護用

真武湯 苓附片為生薑

臨證指南醫案

某
勞傷陽虛汗泄
此方不名房室之干

黃芪 二錢
白朮 一錢
防風 六分
炙草 五分

願氏勞力佛怒心背皆熱汗出往時每以和陽治厥陰肝

臟得效○今年春夏○經行病發○且食納頓減○褚氏謂獨陰

無陽須推異治通補既臻小效不必見熱投涼用鎮其

陽以理虛。

人參 半夏 茯苓 炙草

牝蠟 小麥 陶聚

張六脉弦大身熱時作汗出良由勞傷營衛所致。經云勞

者溫之

<p>嫩黃芪<small>三錢</small> 當歸<small>一錢</small> 桂枝<small>木</small> 白芍<small>一錢</small></p>	<p>炙甘草<small>五分</small> 南棗<small>三錢</small></p>	<p>某二脉細弱自汗體冷形神疲憊知微少納肢節痠楚病在營衛當以甘溫</p>	<p>生黃芪 桂枝<small>木</small> 白芍 炙甘草</p>	<p>煨姜 南棗</p>	<p>某汗出寒裏真氣發泄痰動風生用辛甘化風法</p>	<p>生黃芪 桂枝 炙甘草 茯苓</p>	<p>防風根 煨姜 南棗</p>	<p>梅四案積勞神困食減五心汗出非因實熱乃火與元</p>	<p>臨證指南醫案<small>卷三</small> 汗</p>	<p>氣勢不固立氣泄為熱為汗當治在無形以實火宜清</p>	<p>方 茹素惡服陽明胃弱致厥陰來乘當丑時澹然汗出</p>	<p>少寐多夢</p> <p>人參 龍骨 茯苓 棗仁 炒白芍</p> <p>炙甘草 藥吞送蒸熟五味子三十粒</p> <p>又鎮攝汗止火升咳嗽仍屬陰虛難得充復育陰滋液為治</p> <p>熟地炭 人參 炒麥冬 五味 炒薏肉</p> <p>川斛 茯神 女貞子 接服理玉膏方</p>	
--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	----------------------------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---	--

經云陽之汗以天地之而名之又云陽加於陰謂之汗由是推之是陽熱加於陰津散於外而為汗也夫心為主陽之臟凡五臟六腑表裏之陽皆心主之以行其變化故隨其陽氣所在之處而氣化為津亦隨其火擾所在之處而津泄為汗然有自汗盜汗之別焉夫汗本乎陰乃人身之津液所化也經云汗者心之液又云腎主五液故凡汗症未有不由心腎虛而得之者心之陽虛不能衛外而為固則外傷而自汗不分寤寐不因勞動不因發散溼溼然自出由陰蒸於陽分也腎之陰虛不能內營而退藏則內傷而盜汗盜汗者即內經所謂寢汗也睡熟則出醒則漸收由陽蒸於陰分也故陽虛自汗治宜補氣以衛外陰虛盜汗治宜補陰以營內如氣虛表弱自汗不止者仲景有黃芪建中湯先賢有玉屏風散如陰虛有火盜汗發熱者先賢有當歸六黃湯栢子仁丸如勞傷心神氣熱汗泄者先生用生脉四君子湯如營衛虛而汗出者宗仲景黃芪建中湯及辛甘化風法如衛陽虛而汗出者用玉屏風散芪附湯真武湯及甘麥大棗湯鎮陽理陰方按症施治一絲不亂胡之明醫也夫復奚愧 錄源九

臨證指南醫案卷三 汗

脫

陽脫

陳遺尿目瞤口開面亮汗出陽飛欲脫無藥力挽擬參

附湯法加入童便圖元真接續耳

又子丑為陰陽交界之時更逢霜降正不相續後現脫

象進兩攝陰陽方參附湯加五味子

又陽回汗止神甦無如陰液欲涸心熱渴飲姑救胃汁

人參 麥冬 五味 茯苓 建蓮

又腎真未全收納便溺自遺無如咽燥喉痛陽雖初回

陰氣欲盡難進溫熱之補大意收攝真陰為治

臨證指南醫案 卷三 脫 元

人參 麥冬 五味 熟地炭

茯苓 遠志炭 葛蒲根

又胃虛客氣上逆為呃噎痰帶血服咽中微痛用鎮攝

法

人參 熟地 北味 茯苓 青鉛

周脉革無根左尺如無大汗後寒

此屬亡陽平昔飲酒少穀回陽辛甘未得必達有乾嘔

格拒之狀真危如朝露矣勉議仲景救逆湯收攝潰散

之陽冀有小安再議治病救逆湯加參附

徐 恰交第七日脈聲呵欠目瞤煩躁診脉微細而促此

皆二氣不相接續現脫之徵最速是清神熄風方法難

以進商急固根熱微河地黃飲

熟地 附子 茯苓 莖肉

杞子 遠志 菖蒲 川斛

黃腎脉不得上繫肝風突起掀旋呵欠鼾聲口噤汗出

陰陽不續危期至速地黃飲子極是

熟地炭 萸肉炭 川斛 天冬 淡菖蒲

牛膝炭 五味 遠志 茯苓 飲子煎法

凌脉大不斂神迷噤氣陰陽不相交合為欲脫之象救

陰無速功急急鎮固陰陽冀其甦息

臨證指南醫案 卷三 脫 辛

人參 茯苓 阿膠 淮小麥

龍骨 牡蠣

又陰液枯槁陽氣獨升心熱驚惕熱汗泄議用復脉

湯甘以緩熱充養五液復脉去姜桂加牡蠣

又胃弱微嘔暫與養陽明胃津方此非龍骨

人參 炒麥冬 炒白梗米 茯苓

鮮蓮子肉 川斛

又人參 秋石水 熟地炭 天冬 麥冬

茯苓 鮮生地

又秋燥上薄嗽甚微嘔宜調本兼以清燥

人參	秋百水 麥冬	玉竹	生甘草
南棗	白梗米	非脫症	
又 安胃丸	二錢 秋石拌人參湯送		
某氏	脈如雀啄色枯氣促身重如山不思納穀乃氣血大		
虛厥其暴脫	不識之症		
人參	生地	阿膠	麥冬
炙草	左牡蠣		
又 補攝正三陰			
人參	熟地炭	棗仁	茯神
五味	鮮蓮子肉		
臨證指南醫案	卷三 脫		
朱氏	久損不復真氣失職交大寒節初之氣厥陰風木主		
錢氏	肝風乘虛上擾氣升則嘔吐氣降則大便寒則脊內		
更甚熱則神煩不寧是中下之真氣杳然恐交春前後			
有厥脫變幻擬進鎮逆法	此防脫之方		
人參	生牡蠣	龍骨	附子
桂枝木	生白芍	炙草	
又 自半月前寒熱兩日色脈愈弱食減寢少神不自持			
皆虛脫之象讓固之湯之不及理	因渴而服滋陰病		
人參	生龍骨	牡蠣	桂枝
炙草	南棗肉	恒不補之方	

又 脈神稍安議足三陰補方			
人參	砂仁末炒熟地	炒黑杞子	
茯神	五味	牛膝炭	
脫即死也	諸病之死皆謂之脫蓋人病則陰陽偏勝		
偏勝至極即死矣人之生也負陰抱陽又曰陰在內			
陽之守也陽在外陰之使也是故陰中有陽陽中有			
陰其陰陽樞紐自有生以至老死頃刻不離離則死			
矣故古聖先賢創著醫籍百病千方無非為補偏救			
弊和協陰陽使人壽盡其天年而已夫脫有陰脫陽			
脫之殊內經論之最詳難經又言脫陽者見鬼脫陰			
者目盲此不過言其脫時之情狀也明理者須預為			
挽救則可若至見鬼目盲而治之已無及矣今觀先			
生之治法回陽之中必佐陰藥攝陰之內必兼顧陽			
氣務使陽潛陰固庶不致有偏勝之患至於所脫之			
症不一如中風眩暈嘔吐喘促汗多亡陽之類是陽			
脫也瀉痢崩漏胎產下多亡陰之類是陰脫也痧脹			
乾霍亂病眼痙厥厥厥室塞之類是內閉外脫也陽			
脫於上陰脫於下即人死而魂升魄降之謂也總之			
陰陽樞紐不脫病雖重不死然則陰陽樞紐何在其			
在於命門歟			
華陽集			
臨證指南醫案	卷三 脫		

脾胃

此篇以治脾胃真傳

錢 胃虛少納。土不生金。音低氣餒。當與清補。

麥冬 生扁豆 王竹 生甘草

桑葉 大沙參

王 數年病傷不復。不飢不納。九竅不和。都屬胃病。陽土

喜氣偏惡剛燥。若四君異功等。竟是治脾之藥。肺宜通

即是補甘涼濡潤。胃氣下行。則有收斂。

麥冬一錢 生白芍二錢 臨服入青甘煎漿一杯

臨證指南醫案 卷三 脾胃

某 痢後胃氣不健。不飢少納。始與清養。

鮮省頭草 白大參 新會皮 陳半夏 烏梅

川斛 二錢 烏梅 五錢 陳半夏 夏翅 錢

某 脈滿體實。陰虧偏熱。近日不飢口苦。此胃陰有傷。邪

熱內熾。古稱邪火不殺穀是也。

金石斛 陳半夏 生穀芽 廣皮白

陳香鼓 塊茯苓

理肺養胃。進以甘寒。

甜杏仁 玉竹 花粉 枇杷葉

川貝 甜水煎汁

某 脈數口渴。有痰。乃胃陰未旺。

炒麥冬 生白扁豆 生甘草 白粳米

北沙參 川斛

陳 十知飢少納。胃陰傷也。

麥冬 川斛 桑葉 茯神 煎漿

某 胃陽受傷。腑病以通為補。與守中必致壅遏。

人參 梗米 益智仁 茯苓

廣皮 炒荷葉

某 食穀不化。胃無火也。

生白朮 厚樸 新會皮 益智仁

臨證指南醫案 卷三 脾胃

茯苓 砂仁

計三 陽微痰黑。食入不化。

人參 生益智 桂心 茯苓

廣皮 煨姜

高 八脈與小帶弦。知飢不欲食。晨起吐痰。是胃陽不足。宜

用外臺茯苓飲。

又 人參 白朮 茯苓 廣皮

半夏 枳實皮 白蒺藜 地栗粉

席三 脈右濡。上過寸。有聚氣橫束。幾年來食難用飽。每

三四日一更衣。夫九竅失和。都屬胃病。上脘部位為氣

分清陽失司微仲景微通陽氣爲法		蘼白	瓜蒌汁	半夏	姜汁
川桂枝		鮮薑蒲			
某三脈濡目汗口淡無味胃陽微矣		人參	淡附子	淡乾姜	茯苓
王脈小右弦病屬勞倦飲食不和醫投柴葛維入消導					
升表攻裏致汗泄三日脫中不饑全是胃陽大傷防有		破宛厥逆之變	一方下用冬木		
生益智仁		姜汁	半夏	茯苓	
丁香		炒黃米			
臨證指南醫案 卷三 脾胃					
孫長夏熱傷爲瘧爲痢都是脾胃受傷老年氣衰不肯					
自後清腸不肯轉旋脫中不得容納口味淡而不清除					
強右濡瀉下焦便不通調九竅不和都胃病也此剛補					
不安陽土不耐辛熱矣議宜通補方如大半夏湯之類					
大半夏湯加川連姜汁					
又小溫中丸					
錢壯年肌柔色黯脈小濡瀉每食過不肯運化食冷物					
脘上即痛色脈參合病象是胃陽不旺濁陰易聚醫知					
胸陽即通自有效驗					
良姜	草果	紅荳蔻	厚樸		

生香附		烏藥			
汪舌灰黃脘痺不饑形寒怯冷胸陽式微不能運布氣					
機非溫通焉能宣達		半夏	茯苓	廣皮	乾姜
厚樸		薤白			
周已脈象望塞能食少運便溏當溫通胸陽					
生白朮一錢		茯苓三錢	益智仁一錢	淡附子一錢	
乾姜一錢		薤白一錢			
又溫通胸陽煩適脈象仍然望塞照前方再服一劑					
九方當以脾胃同治着想					
臨證指南醫案 卷三 脾胃					
吳酒多穀少濕勝中虛腹瀉便溏太陰脾陽少健					
平胃合四苓加穀芽					
王十五素有痰飲陽氣已微再加悒鬱傷脾脾胃運納之陽					
愈愈致食下不化食已欲瀉夫脾胃爲病最詳東垣當					
升降法中求之					
人參	白朮	羌活	防風		
生益智	廣皮	炙草	木瓜		
吳九食加便溏即胸陽不運也方藥當以太陰陽明是調					
異功散加甘枳益智					
周四脈發弱脫中痛脹腹瀉清澀是脾胃陽微得之積勞					

午後病甚陽不用事也。大凡脾陽宜動則運溫補極是而守中及厥陽皆非其通脾陽間佐用之。

人參

半夏

茯苓

生益智

生薑汁

淡乾姜

大便不真間用半疏丸

朱五陽後食後吞服

茯苓

四兩

炒半夏

二兩

廣皮

二兩

生於朮

二兩

淡乾姜

一兩

厚樸

一兩

吳茱萸

一兩

公丁香

五錢

水法九

某八脈茲食下腹脹大領下寒水穀之濕內着脾陽不主

默運

胃腑不能宣達

脾陽降胃令其升降為要

金石斛

三錢

厚樸

一錢

枳實皮

一錢

廣皮白

苦參

一錢

神龜

半錢

茯苓皮

三錢

麥芽

半錢

陳三脈陰三癰生年夏至節交春木退舍大寒熱而後解

病傷未旺雨濕蒸過外內受水穀不運洞泄之後而

神倦食減濕傷脾胃清氣用東垣清暑益氣主之

清暑益氣法

洪姬脈虛清弱而乏溼澤鼻冷肢冷肌腠麻木時如寒凜

微熱欲渴大便有不化之形穀食不消此陽氣大衰理

進溫補用附子理中湯

趙三氣分本虛衛少外護畏風怯冷冬大氣主藏夏季

氣泄外越此天熱煩倦一因也是氣分屬陽故桂附理

陽頗投致八味古稱腎氣有通攝下焦之功能使水液

不致泛溢其中陰藥味厚為君乃陰中之陽藥施於氣

虛未為中氣歷舉益氣法無出東垣範圍俾清陽旋轉

脾胃自強偏寒偏熱總有太過不及之弊補中益氣加

麥冬北味又間服四君子湯

宣三痛而納食稍安病在脾絡因饑餓而得當養中焦之

營甘以緩之是其治法歸建中湯

戈小便短澀渾濁大便頻澀不欲納穀此傷食惡食也

當分消土

生益智

廣皮

茯苓

澤瀉

歸建中湯

卷三脾胃

三

炒白芍

炒山查

脾胃之論莫詳於東垣其所著補中益氣調中益氣

升陽益胃等湯誠補前人之未備察其立方之意因

以內傷勞倦為主又以脾乃太陰濕土且世人胃陽

衰者居多故用參芪以補中二木以溫燥升柴升下

陷之清陽陳皮木香理中宮之氣滯脾胃合治若用

之得宜誠效如桴鼓蓋東垣之法不過詳於治脾而

畧於治胃耳乃後人宗其意者凡著書立說竟將脾

胃總論即以治脾之藥籠統治胃舉世皆然今觀葉

氏之書始知脾胃當分標而論蓋胃屬戊土脾屬己

土戊陽已陰。陰陽之性有別也。脾主藏。脾宜通。臟腑之體用各殊也。若脾陽不足。胃有寒濕。一臟一腑皆宜於溫燥升運者。日常格遵東垣之法。若脾陽不虧。胃有燥火。則當遵葉氏養脾陰之法。觀其立論云。納食主胃。運化主脾。脾宜升則健。胃宜降則和。又云。太陰濕土。得陽始運。陽明燥土。得陰自安。以脾喜剛燥。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在脾。東垣大升陽氣。其治在脾。此種議論。實超出千古。故凡遇稟質木火之體。患燥熱之症。或病後熱傷脾胃津液。以致虛痞不食。古絡咽乾。煩渴不寐。肌燥。煩熱。便不通爽。此九竅不和。都屬胃病也。豈可以芪朮升柴治之乎。故先生必用降胃之法。所謂胃宜降則和者。非用辛開苦降。亦非苦寒下奪。以損胃氣。不過甘平或甘寒濡潤。以養脾陰。則津液來復。使之通降而已矣。此義即宗內經所謂六腑者。轉化物而不藏。以通為用之理也。今案中所分胃陰虛。脾陽虛。脾胃陽虛。中虛。饑傷食傷。其種種治法。最易明悉。余不參贅。總之脾胃之病。虛實寒熱。宜燥宜潤。同當詳辨。其於升降二字。尤為緊要。蓋脾氣下陷。因病即使不陷。而但不健運已病矣。胃氣上逆。因病即不上逆。但不通降亦病矣。故

脾胃之治法。與各門相兼者甚多。如嘔吐。腫脹。泄瀉。便閉。不食。胃痛。腹脹。木乘土。諸門尤宜並參。互相討論。以明其理可也。
華嶠雲
茲明亦切當

木乘土

肝厥犯胃入膈

半夏

姜汁

杏仁

瓜蒌皮

金鈴子

延胡

香豆豉

白蔻

鮑三情懷不適陽氣鬱勃於中變化內風振旋轉動心悸

流涎麻木悉歸左肢蓋肝為起病之源胃為傳病之所

飲酒中虛便易滯滑讓兩和肝胃

桑葉

炒丹皮

天麻

金斛

川貝

地骨皮

臨證指南醫案

卷三 木乘土

望

吳脈左數右濡氣塞心痛養胃平肝

半夏

茯苓

炒麥冬

栝子仁

川棟子

青橘葉

顧一脈弦胃脘痠痛子後清水泛溢由少腹湧起顯是肝

厥胃痛之症此是肝氣鬱結

吳萸

五分

川棟子

錢

延胡

錢

茯苓

三錢

桂枝木

五分

高良姜

錢

某九脈左弦右濡中脘痛及少腹病在肝胃

川棟子

青皮

生香附

小茴

茯苓

南棗

某三舌白惡心液沫泛溢病在肝胃當是陽虛

吳萸七分 乾姜一錢 姜汁三分 茯苓三錢 南棗一錢

任三此情志不遂肝木之氣逆行犯胃氣逆腹脹胃脘談

笑可解凝滯血藥乃病之對頭也

延胡

川棟子

蘇梗

烏藥

香附

紅豆蔻

王四胃脘痛高突而堅嘔清涎血沫滴水不能下咽四肢

冷肌膚麻木搥背脊病勢緩北屬肝厥犯胃

開口吳萸

金鈴子

炒延胡

生香附

高良姜

南山楂

臨證指南醫案

卷三 木乘土

望

某脈左弦少寐氣從左升泄肝和胃

生左牡蠣

五錢

川棟子肉一錢

化州橘紅一錢

茯苓三錢

澤瀉一錢

某脈緩左弦晨倦食減在土旺之候急調脾胃

戊巳湯去甘草加穀芽

程六曲運神機心多擾動必形之夢寐診脈時手指微震

食納痰多蓋君相動主消燦安穀不充形骸首宜理陽

明以制厥陰勿多岐也

人參

枳實

半夏

茯苓

石菖蒲

某通補陽明和厥陰

人參	茯苓	半夏	高良姜
吳萸	生白芍		
某四	肝逆犯胃。脘腹脹鳴。氣搏至咽。		
川棟子	桂枝木	淡乾姜	川椒
生白芍	吳萸	烏梅	茯苓
程五	操家。煩動噴怒。都令肝氣易逆。乾嘔味酸。木犯胃土。		
風木動。乃晨泄。食少形瘦。脈虛。先議安胃和肝。			
人參	半夏	茯苓	木瓜
生益智	饅姜		
華三	據說氣攻脇脹。春起秋愈。此內應肝木。飽食不和。肝		
臨證指南醫案	卷三	木乘土	醫
傳胃矣。			
焦白朮	半夏	柴胡	枳實
生香附	廣皮	乾荷葉湯	泛九
毛	目微黃。舌黃。煩渴。脇肋板實。呼吸周身牽掣。起於煩		
吐食物。痰飲。即胸皖脹。此肝木犯胃。諸氣痺阻。雖平			
昔宜於溫補。今治病宜宣通氣分。			
半夏	廣皮	大杏仁	白蔻仁
川棟子	炒延胡	生薑	土瓜蒞皮
又	心中懊惱。噎痛。氣分熱痰未平。用溫胆法。		
竹茹	炒半夏	茯苓	枳實

王三	癰積是重着有質。今痛升有形。痛解無跡。發於暮夜。	桔梗	橘紅	生薑
衝逆欲嘔不吐。明是厥氣攻胃。由惱怒強食。氣滯紊亂。				三分
而成病。發時用河間金鈴子散。兼以宣通陽明。凝遏可愈。		金鈴子	延胡	半夏
		山梔	橘紅	瓜蒞皮
秦七	面長身瘦。稟乎木火之形。氣阻脇中。食少噯痛。胃口			
為逆。乃氣火獨熾之象。忌用燥熱劫津。治以平肝和胃。		降香	鬱金	山梔
				橘紅
臨證指南醫案	卷三	木乘土	醫	
批把葉	蘇子	川貝母	姜皮	
朱十	半百已衰。多因神傷思慮。夏四月大氣發泄。遂加便			
溲。長夏暑熱。無有不耗氣分。寒熱之來。乃本氣先怯。				
而六氣得以乘虛。今不思納穀之因。皆寒熱二氣擾逆。				
胃脘清真受戕。所以致困莫甦。不煩不渴。胃陽虛也。凡				
醒胃必先制肝。而治胃與脾迥別。古稱胃氣以下行為				
順。區區木甘之守。非柴之升。竟足脾藥。所以鮮克奏效。				
人參	茯苓	炒麥冬	大麥仁	
木瓜	烏梅			
董	病久。正氣已衰。喜熱惡寒。為虛診得左脈尚弦。病在			

肝但高年非伐肝平肝爲事。議通補胃陽。

人參

茯苓

煨姜

新會皮

炒粳米

炒荷葉蒂

陸三咽屬胃。胃陰不升。但有陽氣薰蒸。致咽燥不成寐。衝逆心悸震動如驚。厥陰內風乘胃虛以上僭。胃脉日虛。膜肌麻木。當用十味溫胆。合秫米湯。通攝兼進。俾肝胃陽和。可以痊安。

人參

茯苓

棗仁

知母

竹茹

半夏

黃色秫米

又用泄少陽補太陰法。六君去甘草加丹皮桑葉金

臨證指南醫案卷三 木乘土

望

解湯法九

郭 脉弦心中熱。欲嘔不思食。大便不爽。乃厥陰肝陽順乘胃口。陽明脉絡不宜。身體掣痛。當雨和其陽。酸苦泄熱少休。微辛。

川連

桂枝木

坐牡蠣

烏梅

生白芍

川楝子

丙 前議肝病入胃。上下格拒。考內經諸痛皆主寒客。但經年累月久痛。寒必化熱。故六氣都從火化。河間特補病機一十九條亦然。其初病在氣。久必入血。以經脉主氣。絡脉主血也。此臟腑經絡氣血。須分晰辨明。投劑自

可入穀。更詢初病因驚。夫驚則氣逆。初病肝氣之逆。久則諸氣均逆。而三焦皆受。不特胃當其衝。久謹陳緩急先後進藥方法。厥陰篇云。氣上撞心。飢不能食。欲嘔。口吐涎沫。夫木既犯胃。胃受尅爲虛。仲景謂制木必先安土。恐防久尅難復。議用安胃一法。

川連

川楝子

川椒

生白芍

烏梅

淡姜渣

歸鬚

橘紅

內經以攻病尅制曰勝方。補虛益體。須氣味相生曰生方。今胃被肝乘。法當補胃。但胃屬脾陽。凡六腑以通爲補。黃連味苦能降。戴元禮云。諸寒藥皆凝滯。惟

臨證指南醫案

卷三 木乘土

吳

有黃連不凝滯。有姜椒歸須氣味之辛。得黃連川楝之苦。倣內經苦與辛合。能降能通。芍藥酸寒。能泄土中木乘。又能和陰止痛。當歸血中氣藥。辛溫上升。用鬚力薄。其氣不升。梅占先春花發最早。得少陽生氣。非酸飲之收藥。得連棟苦寒。內經所謂酸苦泄熱也。以氣與熱俱無形無質。其通逐之法迥異。故辨及之。又春分前七日。診右脉虛弦帶瀉。左脉入弦。而數。胃痛已緩。但常有畏寒鼓慄。俄頃發熱。此肝病先厥後熱也。今歲厥陰司天。春季風木主氣。肝病既久。脾胃必虛。風木鬱於土官。營衛二氣未能流暢於經脉。爲營

養護衛此偏熱偏寒所由來矣夫木鬱土位古人制肝 補脾升陽散鬱皆理偏就和為治勿徒攻補寒熱為調 今春半天令漸溫提兩和氣血佐以宣暢少陽太陰至 小滿氣緩泄越必大培脾胃後天方合歲氣體質調理 定春黍煎丸二方 人參 茯苓 廣皮 炙草 當歸 白芍 丹皮 桑葉 姜棗湯法丸 間用人參 廣皮 穀芽 炙草 白芍 煎方 黃芩 丹皮 柴胡 卜 有年冬藏不固春木萌動人身內應乎肝水弱木失 臨證指南醫案 卷三 木乘土 聖	滋榮陽氣緣俗內風乘胃為嘔攻腸為痛仲景以消渴 心熱屬厥陰內經以吐涎沫為肝病肝居左而病熾偏 右木犯上位之徵經言謂肝為剛臟非柔不和閱醫藥 沉桂莫逆難以破泄氣分皆辛辣苦燥有剛以治剛之 藥倘忽厥逆癰癰奈何議鎮陽熄風法 生牡蠣 阿膠 細生地 丹參 淮小麥 南棗	又 內風陽氣鼓動變幻皆有形無質為用太過前議鹹 苦入陰和陽佐麥棗以和胃制肝獲効蓋肝木肆橫胃 土必傷醫治既僻津血必枯唇赤舌絳咽乾穀味即變
---	--	--

酸厥顯是胃汁受劫胃陰不復夫胃為陽明之土非陰 柔不肯協和與脾土有別故也 生牡蠣 阿膠 細生地 小麥 炒麻仁 炒麥冬 炙草 張七 脉小弦納穀腹中嘔噎自述因乎他醫燥飲則知木 火犯土胃氣不得下行所致議苦辛泄降法 黃連 爵金 香淡豆豉 竹茹 半夏 丹皮 山梔 生薑 又 前方泄厥陰通陽明為衝氣吐涎肺痿不納穀而設 且便難艱阻胸脹悶上下交阻有年最慮關格與進退 臨證指南醫案 卷三 木乘土 聖 黃連湯 江 晨起腹痛食穀微滿是清濁之阻按脉右虛左弦不 思飲食脾胃困頓都屬虛象古人培土必先制木倣以 為法 此法百病瘳不可不補 人參 淡吳萸 淡乾姜 炒白芍 茯苓 周 酒熱濕痰常有年正虛清氣少旋遂致結秘不能容 納食少自述多鬱易嘔議從肝胃主治 半夏 川連 人參 枳實 茯苓 姜汁 此皆用潤利 王 五 喘逆舉發湯食皆吐病在胃之上脘但不知起病之
--

子 53-456

<p>沫乃鬱勃噴怒肝胆內寄之相火風木內震不息犯胃則嘔逆吞酸乘虛侵咽必脹悶喉痺漸漸昏迷欲厥久延不已為鬱分之病此治嗽清肺重鎮消痰越醫越凶考內經肝病主治三法無非治用治體又曰治肝不應當取陽明蓋陽明胃土獨當木火之侵侮所以制其衝逆之威也是病原治法大畧安胃九椒梅湯送</p>		鮑	風泄已止胃逆不納食	人參	川連	烏梅	木瓜	川斛	橘紅	朱氏	噴怒動肝氣逆惡心胸脇悶動氣下墜欲便是中下臨證指南醫案卷三木乘土至	二焦損傷不復約束之司失職擬進培土泄木法亦暫時之計	烏梅	乾姜	川連	川椒	人參	茯苓	川棟	生白芍	王氏	寡居多鬱宿病在肝邇日暑邪深入肝病必來犯胃吐衄下利得止不思穀食心中疼熱仍是肝胃本症况暑濕多傷氣分人參輔胃開痞扶胃有益幸無忽致疲可也	人參	川連	半夏	姜汁	枳實	牡蠣
--	--	---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----------------------------------	--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	--	----	----	----	----	----	----

<p>又胃開思食仍以制肝和胃</p>		人參	金石斛	半夏	枳實	茯苓	橘紅	呂氏	季勝之傍是虛里穴今跳躍如梭乃陽明絡空也况衝脉即血海亦屬陽明所管經行後而病忽變前案申說已著茲不復贅大凡絡虛通補最宜身前衝氣欲脹衝脉所主病內經所謂男子內結七疝女子帶下凝聚今也痛無形象諒無結聚祇以冷汗跣寒食入惡心鼻準明環口色青肝胃相對一勝必一負今日議理陽明之陽佐以宣通奇脉仲其於動氣一篇都從陽微起見臨證指南醫案卷三木乘土至	做以為法	人參	茯苓	淡熟附子	生薑艾	桂枝木	炒黑大茴	紫石英	生杜仲	朱氏	上冬用溫通奇經帶止經轉兩月間納穀神安今二月旬二日偶涉噴怒即麻痺乾嘔耳聾隨即昏迷如厥診脈寸強尺弱食減少口味淡微汗此厥陰之陽化風乘陽明上犯蒙昧清空法當和陽益胃治之	人參	錢	茯苓	三錢	炒半夏	錢	生白芍	錢	砂梅	七分	小川連	二分	淡生薑	二分	廣皮	白	錢	此厥陰陽明藥也胃腑以通為肅故主之以大半夏
--------------------	--	----	-----	----	----	----	----	----	--	------	----	----	------	-----	-----	------	-----	-----	----	---	----	---	----	----	-----	---	-----	---	----	----	-----	----	-----	----	----	---	---	----------------------

湯熱凝於上。故少佐姜連以瀉心。肝爲剛臟。寒入白芍烏梅以柔之也。	
又三月初五日。經水不至。腹中微痛。右脇蠕蠕而動。皆陽明脈絡空虛。衝任無貯。當亟通補入絡。	人參一錢 當歸二錢 荒蔚子二錢 香附一錢 醋炒
又照方去荒蔚杜仲加白芍官桂	茯苓三錢 小茴一錢 生杜仲二錢
某氏久有痛經。氣血不甚流暢。驟加暴怒。傷肝。少腹衝動。上犯逆行於肺。爲欬。寒熱聲啞。脇中拘急。不飽不納。乃左升右降。不司轉旋。致失胃氣。下行爲嘔之責。故肝用	臨證指南醫案 卷三 木乘土 薑
宜泄胃腑。宜通爲定例矣。	鈎藤 丹皮 桑葉 半夏泡
茯苓 廣皮白 又威喜丸	
唐積勞內傷。腕悶脇脹。嘔吐格拒。眩暈不得臥。陽挾內風暴張。恐其忽然痰厥。議通胃平肝法。	小川連 姜汁 半夏 牡蠣
江拒按爲實。患目病來屬肝。瀉必多嘔。大便秘滯。肝病及胃。當苦辛泄降。少佐酸味。	川棟子 生白芍
小川連 生淡乾姜 半夏 枳實	

黃芩 生白芍	顧五陽明脈衰。形寒。痞飢不食。心痛。洞泄兼嘔。
人參 吳萸 茯苓 半夏	
生薑 炒黃連 此嘔吐之聖藥	某勞怒傷陽。氣逆血滯。致痛。痞脹便溏。風木侮土。前方既效。與通補陽明厥陰。大半夏湯去蜜加桃仁栝子仁當歸姜棗湯法九
某脈微小弱。是陽氣已衰。今年太陰司天。長夏熱泄氣分。不食不運。味變酸苦。脾胃先受困也。稍涉嗔怒。木乘土中。益加不安。從東垣培土制木法。	臨證指南醫案 卷三 木乘土 薑
人參 廣皮 茯苓 益智	
木瓜 淡姜渣	
夏通補陽明。開泄厥陰。	
人參 半夏 茯苓 橘紅	
吳萸 白芍	
汪氏氣滯脾弱。逍遙散加鬱金砂仁末	
席大便未結。腹中猶痛。食入有欲便之意。胃陽未復。肝木因時令尚橫。用泄木安土法。	
人參 木瓜 厚朴 茯苓	
益智仁 青皮	

江鎮衛任溫養下焦頗效所議治嗽肺藥寒涼清火背		謬顯然		炒黑杞子 淡荊蓉 小茴香拌炒當歸		沙苑 石穀建蓮 茯神 紫石英煎湯		又動怒腕下痛不飲食是肝厥犯脾胃病外生枝最非		善調之理理氣皆破泄難用議進制肝木益胃土一法		人參一錢 炒焦白芍一錢 真伽南香汁中五		炒焦烏梅三分 酸肝陽茯苓五錢切小塊 化橘紅五分宜		又人參 嫩鈎藤 明天麻 化橘紅		炒烏梅肉 茯苓 伽南香		臨證指南醫案 卷三 木乘土 薑		朱胃弱多補虛宜通肝陽易升左頰赤佐泄少陽		人參 炒牛夏 茯苓 鈎藤		經霜桑葉 煙炭 南棗		范七脾衰開舌苔出流涎為脾病尅脾者少陽胆木以養		脾泄胆治		人參 於朮 天麻 姜黃		桑葉 丹皮		某補太陰泄少陽		人參 茯苓 焦朮 炙草		廣皮 白芍 炒丹皮 桑葉	
-----------------------	--	-----	--	------------------	--	------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	-----------------	--	-------------	--	-----------------	--	---------------------	--	--------------	--	------------	--	------------------------	--	------	--	-------------	--	-------	--	---------	--	-------------	--	--------------	--

又照方去甘草桑葉加木瓜		李十五少陽木火犯太陰之土持齋淡薄中虛熱灼以補脾		和肝為久長調理 四君子加芍芍桑葉丹皮		金能食連遲舌紋裂左頤肉腫不喜飲水太陰脾陽鬱		法當補土泄木此症可治者以有痰不得用燥藥		於朮 茯苓 新會皮 炙草		煨益智 柴胡 丹皮 白芍		張九脈小弱是陽虛體質由鬱勃內動少陽木火木犯太		陰脾土遂致變食不適法當補土泄木		人參一錢 白朮一錢 半夏一錢 茯苓二錢 甘草五分		臨證指南醫案 卷三 木乘土 姜		廣皮 丹皮 桑葉 姜一錢 礞二錢		肝為風木之臟又為將軍之官其性急而動故肝腹		之病較之他臟為多而於婦女尤甚肝病必犯土是		侮其所勝也本臟現症仲景云厥陰之為病消渴氣		上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐衄下之利不		止又內經所載肝病難以盡述大凡其脈必弦脇或		脹或疼偏寒偏熱先厥後熱若一犯胃則惡心乾嘔		腕痞不食吐酸水涎沫尅脾則腹脹便或瀉或不瀉		肢冷肌麻案中治法有陰陽虛實之殊畧舉而敘述		之若肝陰胃陰未虧肝陽亢逆犯胃先生立法用藥	
-------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	--------------	--	--------------	--	------------------------	--	-----------------	--	--------------------------	--	-----------------	--	------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--

則遠桑用剛。泄肝如吳黃椒桂。通胃如半夏汁姜附。加益智枳朴等。則兼運脾陽。中虛必用人參。故大半夏湯。附子粳米湯。進退黃連湯。瀉心法。治中法。溫胆等湯是也。若肝陰胃汁已虛。木火熾盛。風陽擾胃。用藥忌剛用柔。養肝則阿膠生地白芍。麻仁木瓜。養胃則人參麥冬。知母粳米秫米等是也。至於平治之法。則剛柔寒熱兼用。烏梅丸安胃丸。逍遙散若四君六君異功皮已。則必加泄肝之品。用桑葉丹皮者。先生云。桑葉輕清。清泄少陽之氣。熱丹皮苦辛。清泄肝胆之血。熱用金鈴子散者。川棟苦寒。直泄肝陽。延胡

端理氣滯血滯之痛。此皆案中。之綱領也。余另分此一門者。因嘔吐不食。脇脹腕痛等恙。恐醫者但認爲脾胃之病。不知實由肝邪所致。故特爲揭出。以醒後人之目耳。且世人但知風勞。數脈爲四大重症。不知土敗木賊。肝氣日橫。脾胃日敗。延至不救者多矣。可不究心於此哉。
華岫雲

腫脹

某五 食穀不運。臍脹嘔惡。太僕不與。脈弦色黃。此胃陽式微。升降失司。使然。法當溫通陽氣。

吳道 八分 半夏 三錢 草撥 一錢 淡乾姜 一錢

生薑汁 五分 廣皮白 一錢 此方文選

陳八 診脈右大而緩。左如小數促。冬季寒熱身痛。汗出即解。自勞役飢飽。嗔怒之後。病勢日加。面浮足腫。呼吸皆喘。日浸鼻臥。即着氣衝。欲起食納。隔中不運。時序交夏。脾胃主候。靛色脈。情形中滿。脹病。日來矣。蓋此症屬勞

倦致損。初病即在脾胃。東垣云。胃爲衛之本。脾乃營之源。臟腑受病。營衛二氣。晝夜循環失度。爲寒爲熱。原非癰疽。半表半裏之症。斯時若有明眼。必投建中而愈。經言勞者溫之。損者益之。建中甘溫。令脾胃清陽自立。中原既定。無事更遷。仲景亦謂男子脈大爲勞。則知內經仲景東垣垂訓。真規矩準繩至法。且汗泄積勞。都是陽傷。醫藥辛走劫陽。苦寒敗胃。病人自述飲蔗。卽中脫不舒。頃之少腹急痛。便稀。其胃陽爲苦辛大傷。明甚。又述咳頻。衝氣必自下上逆。夫衝脈隸於陽明。胃陽傷極。中乏坐鎮之真氣。衝脈動。則諸脈交動。濁陰散漫。上布此

卧着欲起矣。是并非通云云。正合內經濁氣在上則生
臌脹。太陰所至為臌脹相符也。昔有見痰休治痰。見血
休治血。當以病因傳變推求。故辨論若此。

厚朴 杏仁 人參 茯苓

密煨姜 南棗

厚朴杏仁。取其能降氣。參苓姜棗。取其建立胃中之
清陽。而和營衛也。

吳二 臌脹。少溫通。頗適。常用大鍼沙九一錢二分。八服

某 食下臌脹。舌黃。常治脾陽。

生白朮 一錢 廣皮 一錢 茯苓 三錢 厚朴 一錢

臨證指南醫案 卷三 臌脹 弄

木瓜 五分 淡附子 七分

徐九 攻痞癰。成臌脹。脾陽傷極。難治之症。

生白朮 一錢 枳實 一錢 厚朴 一錢 生乾姜 一錢

錢 食入臌脹。已五十日。且痛必有形。攻動。頭中微痛。夫

痛滿。屬氣痛。因氣滯。便既通。其滯未必在乎腸胃。從

太陰脾陽傷。以辛溫開泄主之。

桂枝 生白芍 淡乾姜 厚樸

又 照方去白芍。加生益智仁。茯苓。

楊五 飲酒聚濕。太陰脾陽受傷。臌脹。是濁陰。氣壅

結。不宜通。二便不爽。治以健陽運濕。

生白朮 草葉 附子 廣皮

厚朴 茯苓 枳實 猪苓

吳三 食下臌脹。便澀不爽。肢木不仁。此脾陽困頓。不能默
運使然。通中陽為主。

厚朴 三錢 附子 一錢 炮姜 一錢 桂枝 木 一錢

茯苓 三錢 草撥 一錢

僧四 俗語云。膏梁無厭。發癰疽。淡泊不堪。生臌脹。今素有

臌脹。氣逆嘔吐。漸起臌脹。乃太陰脾臟之陽受傷。不司

鼓動。運行陰土宜溫。佐以制水治。

生白朮 茯苓 廣皮 椒目

臨證指南醫案 卷三 臌脹 弄

厚朴 益智仁 良姜

某六 左臌脹。滿不運。便澀不爽。當溫通脾陽。

厚朴 一錢 枳實 一錢 大腹皮 一錢 廣皮 一錢

青皮 一錢 厚朴 一錢 木猪苓 一錢 椒目 五分

吳 寒熱傷中。腹微滿。舌白。用治中法。

芍藥 益智 廣皮 茯苓

澤瀉 金斛 木瓜

周五 久嗽四年。後失血。乃久積勞傷。酒肉不忌。濕鬱脾陽。

為臌。問小溲僅通。大便仍澀。濁陰乘陽。午後夜分尤劇。

生於朮 熟附子 二味五病治之

陳五積勞脾陽傷食下脹足腫

生白木 茯苓 熟附子 草菓仁

厚朴 廣皮

某躬耕南畝。驟於烈日。漬於水土。暑濕內蒸。為濕癰邪。去正傷脾。晚臥。腹脹。乃脾陽已困。清氣不司運行。濁陰漸爾竊據。內經病機。諸濕腫滿皆屬於脾。

生白木 草薢 茯苓 厚朴

附子 澤瀉

鄒九深秋霍亂轉筋。必有暴冷傷及脾胃。病機一十九條。河間皆謂熱。亦偶偏見。愈瀉愈脹。豈是實症。夫酒客之

臨證指南醫案 卷三 腫脹 空

濕。皆脾胃陽微不運。致濕和凝聚。氣壅成脹。見脹滿微投攻下。不究致病之因。故曰難調之症。

生白木 草菓 熟附子 厚朴

廣皮 茯苓

陳四苦寒多用。胃陽久傷。右脇痛。嘔酸濁。皆濁陰上干。用辛甘溫中補虛。痛減病人述。早上腹寬。暮夜氣緊微硬。大便不爽。有虫腹脹之憂。

人參 生白木 茯苓 肉桂

歸身 益智 廣皮 煨姜

趙五的腹脹清久病痰多

生白木二兩 茯苓二兩 厚朴一兩 肉桂五錢 姜汁九

本草云。厚朴與白朮能治虛脹。倣潔古枳朮之意也。

佐茯苓通胃陽。肉桂入血絡。則病邪可却矣。

楊 脾泄小弦。中年已後。陽氣不足。痰飲水寒。皆令逆趨。致運納失和。漸有脹滿浮腫。法以辛溫宣通。以本病屬脾胃耳。

人參一錢 茯苓三錢 白芍一錢 淡附子一錢 姜汁三分

倪二腹裏膨。便不爽。腑陽不行。

生益智 茯苓 生穀芽 廣皮

砂仁殼 厚朴

臨證指南醫案 卷三 腫脹 空

又六腑不通。凡濁味食物宜忌。

廣皮 麥芽 山查 砂仁 陳香櫟

又脾沉小緩。早食難化。晚食夜脹。大便不爽。此腑陽久傷。不可流行。必以溫藥疎通。忌食閉氣粘滯。

生白木 附子 厚朴 草菓

茯苓 廣皮白 枳櫟汁

浦四九腎氣湯五苓散。一抵少陰。一通太陽。濁泄瀉通。腹滿。以減不為錯誤。但虛寒。則用溫補。問古人調劑。必是通法。蓋通陽則濁陰不聚。守和惡中焦易鈍。喻氏謂能變胃。而不受胃變。苟非純剛之藥。曷勝其任。議於暮

夜服玉壺丹五分晨進

人參 半夏 姜汁 茯苓

枳實 乾姜

陳二老人脾腎陽衰。午後暮夜。陰氣用事。食納不適。腸鳴。服時泄。治法初宜剛劑。俾陰濁不僭。陽乃復辟。

人參一錢 淡附子一錢 淡乾姜八分 茯苓三錢

炒鬼絲三錢 胡蘆巴一錢

此治陽明之陽也。若參入白木甘草則兼走太陰矣。

某七腫脹由足入腹。全無細軟。不能運穀。當治少陰太陰。

生白木 厚朴 茯苓 淡附子

臨證指南醫案卷三 腫脹 奎

淡乾姜 草撥

馬六暮食不化。黎明瀉。乃內傷卑脹之症。脾腎之陽弱。

弱據理當用腎氣丸。

顧三脈微而遲。色衰萎黃。蠶為介屬。鹹寒沉降。凡陽氣不

足者。食之損陽。其致病之由。自試二次矣。久利久泄。古

云無不傷腎。今浮腫漸起。自下。是水失火而敗。若非煖

下。徒見泄瀉有紅。為脾胃濕熱。必致中滿敗壞。

生薑 熟地炭 熟附子 淡乾姜

茯苓 車前

某脾腎虛寒多瀉。由秋冬不愈。春木已動。勢必尅土。服

滿小便不利。乃腫病之根。若不益火生土。之藥。不能却病。

人參 白木 附子 生益耑

兔絲子 茯苓

姚八據說情懷不適。因嗔怒痰嗽有血。視中年形瘁肉消。

漸漸腹脹跗腫。下午漸甚。陽氣日奪。早服腎氣丸三錢。

晝服五苓散。

殷氏行動氣墜於下。卧着氣擁於上。此跗腫甚。頭脹夜

其總是中年陽微。最有腹大喘急之事。濟生丸。

某陽後陰結。腫脹。

臨證指南醫案卷三 腫脹 奎

附子 苡仁 白木 木防已

澤瀉 細辛

和肝胃不 朱陽明胃逆。厥陰來犯。丹溪謂上升之氣。自肝而出。清

金開氣。亦有制木之功能。而痛脹稍緩。議以溫胆加黃

連方。

半夏 茯苓 橘紅 枳實

竹茹 川連 生白芍

某二舌微黃。腹逆。脫胸悉脹。當和肝胃。

桂枝木 乾姜 青皮 吳萸

川棟子 炒半夏

秦 兩年初秋發湯脉絡氣血不為流行而腹滿重墜

則頗安。臍左動氣。則尤甚。吐冷沫。常覺冷氣。身麻語

塞。肝風日熾。踈泄失職。經以肝病吐涎沫。木侮土位。自

多腹脹。丹溪云。自覺冷者非真冷也。兩次潰瘍之後。剛

燥熱藥。似難進商。議以宣通肝胃為治。有年久恙。貴乎

平淡矣。

雲茯苓 錢 三角胡麻 搗碎滾水洗 厚橘紅 錢

嫩鈞藤 錢 熟半夏 錢 白旋覆花 錢

濃清服一杯 四帖

又 接服大牛夏湯

臨證指南醫案 卷三 腫脹 奎

熟半夏 錢 雲苓 錢 姜汁 調服 人參 錢

方五 九診脉百至右緩滿左弦動始而腸鳴泄氣出漸腹滿

腹脹納食幾廢便難溺少此皆情懷少曠清氣不轉肝

木侵侮胃土。臍陽室寒。脹滿日甚。據云先因胃脘心下

痛症。氣鬱顯然。非旦晚圖功之象。議河間分消法。

杏仁 厚朴 海金沙 陳香櫞

鬱金 聚腋子 木通 雞肫皮

王三 食入不運。臍中脹。病由他管。經年不愈。視色黃形

瘦。按脉小而清。喜涼飲。欲惡熱。大便未經通調。九竅不

和。皆胃病矣。

川連 雞肫皮 枳實 廣皮

桔梗 瓜蒌實 半夏 萊菔子

鬱金 杏仁 姜汁竹瀝丸

楊四 肝鬱乘胃為脹。經年內結有形。用緩消一法。

生茅木 雞肫皮 川連 生厚朴

淡姜渣 針砂製 椒目湯法丸

畢 濕熱。由臍滯及腸中。大便不爽。食入不適。平昔肝木

易動。厥陰不主踈泄。少腹形脹。無非滯氣之壅。久則凝

瘀日踞。小溫中丸三錢。十服

程三 脉右弦。面黃。腹滿。按之漉漉有聲。每大便先腹痛。便

臨證指南醫案 卷三 腫脹 奎

不能乾爽。此胃氣不降。陽氣自滯。由于嗔怒不息。肝木

橫逆。踈泄失司。腹脹之來。皆由于此。議泄肝通腑。濁宣

脹減之義。

杏仁 紫厚朴 猪苓 鬱金

椒目 檳榔汁 接服小溫中丸

某五 不飢不運。少腹胃脘悉滿。診脉左弦。乃肝木犯胃。二

腑不主流行。濁陰漸次瀰漫。他日卑脹之作。竟有難以

杜患者。速速戒惱怒。安閑自在。誠治斯疾之良圖

小溫中丸一錢五分開水送下

夏 夏四月。脾胃主氣。嗔怒怫鬱。無不動肝。肝木侮土而

脾胃受傷，鬱久氣不轉，而為熱，乃壯火害氣，但平
減食，腹脹矣。當作木土之鬱調治。桂助熱，莫地滋滯，
鬱熱益深，是速增其熱矣。

釣藤 丹皮 黑山梔 川連 青皮子

紫厚朴 萊菔子 廣皮白 薄荷梗

又 腹勢已緩，脈來弦實，此濕熱猶未盡去，必淡泊食物，
清肅胃口，以清滲利水之劑，服五六日再議。

猪苓 澤瀉 通草 海金沙

金銀花 茯苓皮 黑穠豆皮

又 診脈浮中沉末去，不為流利，氣阻濕鬱，腰痠內着，護

臨證指南醫案 卷三 腫脹 至

用桂枝湯六分緩良

又 腹按滯，大便通而不爽，診右脈弦實，目黃舌燥中

焦濕熱不行，日久病神倦，不敢過攻，議用丹溪小溫中

丸，每服三錢，乃泄肝通胃，以緩治其脹。

謝 形神勞煩，陽傷腑氣不通，痼陰濁，從厥陰乘犯陽

明胃，為陰濁蒙閉腸中，氣窒日甚，年前邪勢頗緩，宜絡

可致，今閉錮全是濁陰，石非辛雄剛劑，何以直發重圍，

脹滿日增，人力難施矣。

此大上中下皆實，其性

生炮川烏頭

生淡川附子

淡乾姜

淡吳萸

川棟子

小茴香

豬胆汁

唐氏 紫苑 杏仁 通草 轉金 黑山梔

又 三焦不通，脘痺腹脹，二便皆秘，前方用芎平太陰脾

苦辛溫降，小溲得利，兼進小溫中丸，泄肝平胃，張勢什

減有五，但聞日寒熱復來，必是內鬱之氣，陽不發達，多

寒戰，標議用四逆散和解其小溫中丸仍用。

生白芍

枳實

柴胡

黃芩

半夏

杏仁

竹茹

生姜

張 腹脹，腹大，便不爽，得煖氣稍快，乃陽氣不主流行，

蓋六腑屬陽，以通為補，春木地氣來升，土中最畏木乘，

勢易熾，治當泄木安土，用丹溪小溫中丸，每服三錢。

臨證指南醫案 卷三 腫脹 至

肝胃

張 用鐵肝通理胃虛方法，脈形小弱，吐涎沫甚多，仍不

納穀，周身寒，四肢微冷，皆胃中無陽，濁上僭，歸而為

腹脹，所謂食不得入，是無火也。

人參

吳萸

乾姜

附子

川連

茯苓

木鬱

丁 三噴，怒氣血逆亂，右脇不和，夜食噯噯腹脹，乃肝胃病，

治以解鬱宣通氣血。

鉤藤

丹皮

桑葉

生香附

茯苓

神麴

降香末

炒黑查肉

徐 平素肝氣不和，脇肋少腹脹，氣血不調，痰飲新聚。

厥陰陽明同治

桃仁

延胡

歸尾

小茴

香附

半夏

茯苓

橘紅

神麴

馬三脈實久病脈熱在血胸不爽小應隆能食不渴二便

滿少兩進苦辛宣肺病未能却此屬血病用通幽法

桃仁

郁李仁

歸尾

小茴

紅花

製大黃

桂枝

川棟子

又晝日氣墜少腹夜卧不覺其則頭昏胸悶今年五月

初用疎瀉繼通三焦續進通幽其臨服仍若諸辛香

氣法

臨證指南醫案

卷三

腫脹

充

川棟子

延胡

小茴

黑山梔

青木香

橘核

生香附磨汁法九

董

初因下血轉弱繼而大便便秘艱白左脇下有形漸致

脹大堅滿小便自利病在血分久病兩年形瘦氣短不

敢峻攻若五積成例議用古禹餘糧九每日一錢

鄭氏

得食腹痛上及心胸下攻少腹甚至筋脈擾於周身

經絡之間大便欲解不通暢此乃腸胃氣滯隨利

減神保九一錢

張

脈左弦右浮滿始因脫精胃腸繼則腹大高占納食

減少難運二便艱澀不爽此乃有年操持勞慮太甚肝

木拂勝脾土自困清濁混淆脹勢乃成蓋藏真日滿

陽不運考古治脹名家必以通陽為務若滋陰桑藥微

加桂附凝陰洄濁豈是良法議用局方禹糧九煖其水

臟攻其穢濁俟有小效兼進通陽剛補是為虛症內傷

脹滿治法至於攻瀉劫奪都為有形而設與無形氣傷

之症不同也局方禹餘糧九

肝犯脾

陳久爵傷及脾胃之陽面無華色納粥欲嘔大便瘡泄

氣陷則跗腫氣呆則脫悶有中滿之憂用治中法

人參

生益智

煖姜

茯苓

木瓜

炒廣皮

臨證指南醫案

卷三

腫脹

辛

炒半夏

廣皮

黃連一分

茯苓

鬱金

又

暑傷脾胃則肝木犯土左腹脹泄瀉

人參

厚朴

廣皮

炒澤瀉

茯苓

木瓜

炙草

炒杏仁

又

炒柴胡

炒白芍

炒黃芩

茯苓

炙草

生薑

大棗

宋

食入脘脹此屬胃病視色蒼形瘦自述飲酒嘔吐而

得又述耳鳴肉瞤是木火犯中鬱勃病甚議用逍遙散

白木合左金方		朱三癰癰馬刀。都是肝胆為病。病久延及脾胃。腹滿便瀉。舌黃微渴。非溫補可服。泄木火以疎之。和脾胃以調之。費其服勞弱減。		吳更升川連 生於朮 川棟子 砂山查		黑山樅 厚朴 青皮 椒目		唐女氣腹三年。近日跌仆嘔吐。因驚氣火更逆。胸臆填塞。脹滿二便皆通。自非質滯喜涼飲。面起癰瘰。從病能篇。驟腹風熱。		川連 淡黃芩 半夏 枳實		臨證指南醫案 卷三 腫脹 主		乾姜 生白芍 鐵錘汁		兩對皆腫大便滯滯。治在腑陽。用分清湯方。		生於朮 茯苓 澤瀉 猪苓		厚朴 椒目 海金沙湯煎		吳金歲厥陰司天加臨。驚蟄節。病腹滿喘促。肢腫面浮。寒熱汗出。苦木乘土位。清陽不得舒展。濁氣痞塞。僭踞。故泄氣少寬。姑擬通腑以泄濁。		生於朮 茯苓 椒目 紫厚朴		澤瀉 淡薑渣	
--------	--	--	--	-------------------	--	--------------	--	--	--	--------------	--	----------------	--	------------	--	----------------------	--	--------------	--	-------------	--	---	--	---------------	--	--------	--

朱九醇効久至。中焦不運。寒熱小溲不通。腹脹。腹小。而瀉。全是脾陽失司。與泄木通腑分清法。		四苓加椒目厚朴大腹皮青皮		陳壯盛年歲。形消色奪。診脈右小促左小弦勁。病起上。年秋。季。腹中卒痛。有形梗。發病後。陡遇驚。驚。次。食。不。適。食。入。不。運。停。留。上。脘。腹。形。脹。滿。甚。則。脇。肋。皆。脹。四。肢。不。煖。暮。夜。漸。溫。大。便。旬。日。始。通。便。後。之。甚。自。清。早。未。食。自。按。臍。上。氣。海。有。瘕。形。甚。小。按。之。微。痛。身。動。飲。水。寂。然。無。踪。天。氣。稍。冷。爪。甲。色。紫。細。推。病。屬。肝。脾。氣。血。不。通。則。為。瘕。過。久。則。陽。微。痺。結。上。下。不。行。有。若。否。卦。之。義。		臨證指南醫案 卷三 腫脹 主		開胃藥或消或補。總不見效者。未知通陽之與耳。		生白 桂枝 瓜蒌仁 生姜		半夏 茯苓		又 生白汁 桂枝木 瓜蒌實 川棟子皮		半夏 茯苓 歸鬚 桃仁		延胡 姜汁 二汁湯丸		某 腹滿對腫。小溲短澀不利。便泄。不。爽。當開太陽為主。		五苓散加椒目		某 少腹串脹。二便通利。稍舒。顯是腑陽。室。痺。濁。陰。凝。結。所致。前法專治脾陽。宜乎不應。當開太陽為要。	
--	--	--------------	--	---	--	----------------	--	------------------------	--	--------------	--	-------	--	--------------------	--	-------------	--	------------	--	------------------------------	--	--------	--	--	--

五苓散加椒目

鄭 兩投通裏竅法。痛脹頗減。無如陰陽不分。舌絳煩渴。不欲納穀。想太陽膀胱不開。陽明胃不司闔。法當仍與通陽腑為要。但五苓桂朮。斷不適用。議用甘露飲意。

猪苓

茯苓

澤瀉

寒水石

椒目

炒橘核

程 今年長夏久熱。熱勝陽氣外泄。水穀遲遲。濕自內起。漸漸浮腫。從下及上。至於喘咳不能臥息。都是濁水凝痰。阻遏肺氣下降之司。但小溲不利。太陽氣亦不通。此雖陽虛症。若腎氣湯中更地之酸膩。力難下行矣。

臨證指南醫案

卷三 腫脹

五

茯苓

桂枝木

杏仁

生白芍

乾姜

五味

生牡蠣

澤瀉

馬 五 初起胸膈嘔吐。入夏跗腫小腹悉腫。食穀不運。漫短不利。此陽氣式微。水穀之濕內蘊。致升降之機失司。當

開太陽。姑走濕邪。

猪苓

三錢

茯苓皮

澤瀉

防已

厚朴

四帖

耶 六 歲 六齡稚年。夏至濕熱外薄。所食水穀之氣。蒸為濕滯。阻遏氣機。脾不轉運。水道不通。腹竈滿脹。幼科但知消導。不曉通腑泄濕。致脾氣大困。泄瀉不分陰陽。參苓之

稍僅救消滯之害。不能却除濕滯。故雖受氣於病。病

根都在中宮。泄肝以安胃。分利以通腑。必得小溲頻利。

真有中氣之機。方可三焦以治之。

猪苓

澤瀉

海金沙

通草

椒目

吳 平昔濕痰阻氣為喘。茲因過食停滯。陰陽之陽不運。陽腑之氣不通。二便不爽。跗腫腹滿。診脈沉弦。猶是水

寒痰滯。阻遏氣分。上下皆不通調。當從三焦分治。頃見

案頭一方。用兔絲子升少陰。吳朱萸泄厥陰。不知作何

解釋。不敢附和。仍用河間分消定議。

大杏仁 桑白皮 廣皮 細木通

厚朴

桑白皮

廣皮

細木通

臨證指南醫案

卷三 腫脹

五

厚朴

桑白皮

廣皮

細木通

又 三焦分消。泄肺通腑。二便不爽。如昔。診脈浮小。帶促。聞聲呼吸不利。是氣分在上結阻。以致中下不通。喘脹

要旨。開鬼門以取汗。潔淨腑以利水。無非宣通表裡。務

在治病源頭。據脈症參詳。急急開上為法。合金匱風水

反登義矣。

麻黃

杏仁

石膏

甘草

苡仁

朱 初因面腫。邪干陽位。氣壅不運。二便皆少。相閉不應。即與導滯。滯屬有質。濕熱無形。入腑為喘。手脈為脹。六

腑開合皆廢。便不通爽。溺短渾濁。時或點滴。其舌絳

口渴。腑病背脹。臍病腹滿。更兼倚倒左右。腫脹隨着處。爲其其濕熱布散三焦。明眼難以決勝矣。經云從上之下者治其上。又云從上之下。而甚於下者。必先治其上。而後治其下。此症通亂紛更。全無頭緒。皆不辨有形無形之誤。姑以清肅上焦爲先。

飛滑石一錢 大杏仁去皮尖 生苡仁三錢

白通草一錢 鮮枇杷葉刷淨毛去筋手 茯苓皮三錢

淡豆豉一錢 黑山梗殼一錢 急火煎五分服

此手太陰肺經藥也。肺氣室塞。當降不降。杏仁微苦則能降。滑石甘涼。滲濕解熱。苡仁通草。淡而滲氣。分

臨證指南醫案 卷三 腫脹 五

枇杷葉辛涼。能開肺氣。茯苓用皮。謂諸皮皆涼。梔豉宣其陳腐鬱結。凡此氣味俱薄。爲上焦藥。微齊之才。輕可去實之義。

某暴腫氣急。小波滴少。此外邪熱。氣分不通。治當從風水皮水。宜其經隧以能食能寢爲佳。勿得誅伐無過之地。

前胡 密炙麻黃 牛蒡子 姜皮

紫苑 杏仁 茯苓皮 廣皮

王 脾尻微腫。小腿下膝腫甚。乃腑陽不行。病甚於暮。宜辛香通其經腑之鬱。

生於朮 炮川烏 北細辛 茯苓

又 中清用餘糧丸獲效。得緩下泄瀉之力。腹脹已去。而

脾尻足跗肌肉腫浮。夫臟寒生滿病。緩水勝之陽。培火

生土是法。究竟陽未全復。四末流行未布。前議幽香通

其下焦經脈。果得腫減。議用加味活絡丹。

炮川烏 乾地龍 乳香 沒藥 北細辛

桂枝木 用油松節三兩酒水各半煎汁法九

注 腫自下起。服及心胸。遍身肌膚赤燥。渴無便滑。濕熱蓄水橫漬經隧。氣機閉塞。呻吟喘急。濕本陰邪。下焦先

臨證指南醫案 卷三 腫脹 五

受醫用桂附朮。和蘊化熱。充斥三焦。以致日加凶危也。此症也。其法

川通草一錢 海金沙五錢 黃柏皮一錢 木猪苓三錢

生赤豆皮半錢 真北細辛一分

又 前法腫消三四。仍以分消。

川白通草 猪苓 海金沙 生赤豆皮

葶藶子 茯苓皮 晚蚕沙

又 間日寒戰發熱渴飲。此爲癰乃病上加病。飲水結聚。以下痛脹不敢用湧吐之法。暫與開肺氣壅遏一法。

大杏仁 密炙麻黃 石膏 此方無神

<p>又濕邪留飲發紅腫腹聚濁痰消渴未已用木防已湯</p>	<p>木防已一錢 石膏三錢 杏仁三錢 苡仁二錢</p>	<p>飛滑石一錢 寒水石一錢 通草煎湯代水</p>	<p>陳進神芎導水丸二日所下皆粘膩黃濁形色余前議 肺氣窒塞水濕粘滯濁攻犯肺為痰嗽水漬肺髓為浮 腫大凡經脈六腑之病總以宣通為是內經云六腑以 通為補今醫不分臟腑經絡必曰參和是補豈為明理 然肢節足跗之濕出路無由必鍼刺以決其流此內外 冀可皆安戊巳丸三錢用二日後再進前藥一服 薛九腹滿下至少腹三陰都已受傷而周身疥瘡數年不 愈證皆南醫案卷三腫脹</p>	<p>斷脈絡中必有濕熱就腹痛泄瀉腑陽不通不獨偏熱 偏寒之治常用四苓散</p>	<p>倪濕熱胸氣上攻心胸皖中滿脹嘔逆乃濕上甚為熱 化與苦辛先平在上之滿脹用瀉心法</p>	<p>川連 黃芩 枳實 半夏</p>	<p>湯 薑汁 杏仁 再加枳實汁為丸 腹腫脹此屬肺病 伏苓皮 澤瀉 白通草 大腹皮 豬苓 澤瀉</p>
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	---	---	--------------------	---

<p>某六性躁氣有餘便是火肝胆中木火入終成形為濕</p>	<p>難治 小瀉中丸三錢</p>	<p>吳五氣逆腹脹沿沿右聲已屬絡病難除病根</p>	<p>老蘇梗 生香附 厚朴 白蔻仁</p>	<p>土瓜蒔 桔梗 枳殼 黑山梔</p>	<p>汪脈石瀉左弱面黃瘦露筋乃積勞憂思傷陽濁陰起 於少腹漸至盤踞中宮甚則妨食嘔吐昔卑鼓脹之象 大者調治最難欲驅陰濁急急通陽</p>	<p>乾姜 附子 豬苓 澤瀉 椒目</p>	<p>臨證指南醫案卷三腫脹</p>	<p>又通太陽之裏驅其濁陰已得脹減嘔緩知身中真陽 向為羣藥大傷議以護陽兼以泄濁法</p>	<p>人參 塊茯苓 生乾姜 淡附子 澤瀉</p>	<p>又陰濕熱中土清陽家閉腹滿腹脹氣逆腹痛皆陽 氣不得宣通濁陰不能下走擬進白通法</p>	<p>生乾姜 生炮附子 中豬胆汁</p>	<p>黃八停滯單腹重不渴飲盡則便利不爽夜則小溲畧通 此由氣分鬱滯致中焦不運先川大針砂丸每服一錢 五分候其水臟以泄濁</p>	<p>某向有宿疾夏至節一陰來復連次夢遺遂腹形堅大</p>
------------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	---	-----------------------	-------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---	------------------------------

<p>二便或通或閉。是時右膝腫痛潰瘍。未必非濕熱壅阻經絡所致。診脈左小弱。右緩大。面色青黃。鼻準明亮。納食必腹脹愈加。四肢惡冷。熱自裏升。甚則衄血牙宣。全是身中氣血交結。固非積聚停水之脹。考古人於脹症。以分清氣血為主。止痛務在宣通。要知攻下皆為通腑。溫補乃護陽以宣通。今者單單腹脹。當以脾胃為病。數太陰不運。陽明愈鈍。議以緩攻一法。其法在後。</p>	
<p>川桂枝一錢 熱大黃一錢 生白芍一錢 厚朴一錢</p>	<p>枳實一錢 淡生乾姜一錢 三帖</p>
<p>又診脈細小。右微促。畏寒甚。右脇中氣觸入小腹。晝臥臥。形墜着。議用局方禹餘糧丸。煖水臍以通陽氣。早晚各服一錢。流水送。八服。</p>	
<p>又脈入尺。弦勝於數。元海陽虛是病之本。肝失疎泄。以致臍脹。是病之標。當朝用玉壺丹。午用疎肝實脾利水分消太陽太陰之邪。</p>	
<p>紫厚朴一錢 炒半一錢 縮砂仁一錢 生於術二錢 猪苓一錢</p>	<p>茯苓三錢 澤瀉一錢</p>
<p>又脈弦數。手足畏冷。心中兀兀。中氣已虛。且服小鍼砂九每服八十粒。開水送。二服。以後藥壓之。</p>	
<p>生於術 雲茯苓 廣皮 煎湯一小杯後服</p>	

<p>又脈如瀉。凡陽氣動則遺。右脇汨汨有聲。墜入少腹。可知腫脹非陽道不利。是陰道實。水穀之濕熱不化也。議用牡蠣澤瀉散。</p>	
<p>左牡蠣一錢 澤瀉半錢 花粉一錢 川桂枝大五分</p>	<p>茯苓三錢 化氣 紫厚朴一錢 午服</p>
<p>又脈數實惡水。午後手足畏冷。陽明中虛。水氣聚而為飲也。以苓桂朮甘湯。劫飲。牡蠣澤瀉散止遺逐水。</p>	
<p>照前方去花粉加生於術三錢。</p>	
<p>又手足畏冷。不喜飲水。右脇汨汨有聲。下墜少腹。脈雖數而右大左弦。信是陽明中虛。當用人參熟附生薑湯。經補虛之法。但因欲回府調理數日。方中未便加減。且用前方調治太陽太陰。</p>	
<p>生於術一錢 左牡蠣一錢 澤瀉一錢 雲苓三錢</p>	<p>生益智四錢 桂枝木四分 炒厚朴一錢 午後食遠服</p>
<p>朝服小溫中丸五十粒。開水送。仍用三味煎湯壓之。楊六味過辛酸。脾胃氣傷結聚。食入則脹滿。曾服礞石大黃丸。滯濁既下不愈。病不在乎腸中。前賢治脹治滿。必曰分消。攻有形不效。自屬氣聚為癥。疎胃宜清。調脾胃當暖。此宗前賢立法。</p>	
<p>生茅朮 廣皮 丁香皮 黃栢 草豆蔻</p>	

川黃連 厚朴 茯苓 澤瀉 水法九

腫脹證大約腫本乎水。腫由乎氣。腫分陽水陰水。其有因風因濕因氣因熱外來者為有餘。即為陽水。因於大病後。因脾肺虛弱。不能通調水道。因心火克金。肺不能生腎水。以致小便不利。因腎經陰虛。虛火燥肺。金而溺少。誤用行氣分利之劑。漸至喘急痰盛。小水短赤。釀成腫證。內發者為不足。即為陰水。若脹病之因更多。所脹之位各異。或因濕因鬱因寒因熱。因氣因血。因痰因積。因重。皆可為脹。或在臟在腑。在脉絡。在皮膚。在身之上下。表裡皆能作脹。更或因於臨證指南醫案 卷三 腫脹 全

寒久鬱為熱。或始為熱中。末傳寒中。且也脹不必兼腫。而腫則必兼脹。亦有腫脹同時並至者。其病形變幻不一。其病機之參伍錯綜。更難敘述。故案中諸症。有濕在下者。用分利。有濕在上中下者。用分消。有濕而着裏者。用五苓散。通達膀胱。有濕鬱熱兼者。用半夏瀉心法。苦辛通降。有濕熱氣鬱積者。用雞金散加減。消利並行。有氣血鬱積。夾濕熱之邪。久留而不散者。用小溫中丸。清理相火。健運中州。有濕熱與水寒之氣交橫。氣喘溺少。通身腫脹者。用禹餘糧丸。崇土制水。緩下泄濁。有寒濕在乎氣分。則用姜附。有寒濕

入於血分。則用桂附。有濕上甚為熱。則用麻杏膏。苳等味。清肅上焦之氣。有濕下著為痺。則用加味活絡等劑。宣通下焦之鬱。有藉乎薤白瓜薑者。滑潤氣機之痺。結於腹脇也。有藉乎玉壺控涎神保神芎者。視其凝滯於經隧也。有藉乎玉壺控涎神保神芎者。視其或輕或重之痰飲水積而驅之也。此皆未揭夫脹氣而第在腑之上下。膜之表裏者也。若有胃陽虛者。參苓必進。脾陽衰者。木附必投。更有傷及乎腎者。則又需加減八味濟生等丸矣。其他如養陽明之大半夏湯。疎厥陰之道遙散。蓋由證之牽連而及。是又案中臨證指南醫案 卷三 腫脹 全

法外之法也已。姚亦陶

積聚

痞

噎膈

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺

臨證指南醫案

卷四 目

便閉

肺痺


胸痺

喘

呃

疝

疝



薛蘭李太瞻錄

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦昫滋九全較

華旦玉堂

積聚

木犯土
虛中夾

噯怒強食肝木犯土腹痛突如有形緩則民然無跡
氣下鳴響皆木火餘威乃癰疽之屬攻伐消導必變腹
滿以虛中挾滯最難速功近口痛瀉惡延秋痢

丁香 厚朴 茯苓 炒白芍

臨證指南醫案 卷四 積聚

廣皮 煨益智仁

又 下午倦甚暮夜痛發陽微陰濁乃踞用溫通陽明法

人參 吳茱 半夏 姜汁

茯苓 炒白芍

又 照前方去白芍加川棟牡蠣

脾胃
氣分結

白十痛邪久留結聚血分成形仲景有緩攻通絡方法可
宗但瘕母必在脇下以少陽厥陰表裡為病今脈弦大

面色黃滯腹大青筋皆露頸脈震動純是脾胃受傷積

聚內起氣分受病痞滿勢成與瘕母利結血分又屬兩

途經年病久正氣已怯觀東垣五積必疎補兩施蓋緩

厚朴

水法丸

馬 病後食物失和腸中變化傳導失職氣滯釀濕鬱而

成熱六腑滯濁爲之聚昔潔古東垣輩於腸胃宿病每

取九劑緩攻當飯之

新瓦上炙脆

南山查

蒸餅爲小丸

陳八濕勝脾胃食物不化向有聚積腸腑不通熱氣固鬱

臨證指南醫案

當進和申忌日勿勞不致變病

白芍

水花

右脇有形高突按之無痛此屬癰瘡非若氣聚癰瘕

難以推求然病久停阻在脉須佐針刺宣通正在伏天

全

平林

妻

專 着而不刊，夫爲醫者，其於言，服，強，紮，藥，以，五，和，所，氣。

工部局下地工程局

韭白

王^三騎射馳驟寒暑勞形皆令陽氣受傷三年來右胸脇

形高微突初病脹痛無形久則形堅似梗是初爲氣結

在經久則血傷不結蓋經絡系於臟腑外廓猶堪勉強

支撐但氣鈍血滯日漸痠痺而延癥瘕怒勞努力氣血

交亂病必旋發故寒溫消剋理氣逐血總之未能盡窮

絡病工夫考仲景於勞傷血痺諸注其通絡方法每取

至臻迅速飛走諸靈佛疑者升走者降血無凝着氣可

宣通與珍種陳堅從入肺腑者有聞欽法備衆未諱

川

臨證指南

川芎 生香附 煨木香 生牡蠣 夏枯草

用力酒麴末二兩加水屑料并無灰酒送三錢

人是其能

今

承教堅大聚丙上各且氣血分

實 七

152

白陽氣壯

所成。後巢氏病源。另立廢寢之名。以不動者爲

動者爲寢究之亦卽難經積聚之意也。前賢有云。積聚者。就其有膜結聚之處。以經脈所過部分屬臟者爲陰。陰主靜。靜則堅而不移。屬腑者爲陽。陽主動。動則移而不定。故是案中又從而悟出云。着而不移是爲陰。邪聚絡大旨以辛溫入血絡治之。蓋陰主靜不移卽主靜之根。所以爲陰也。可容不移之陰邪者。自必無陽動之氣以旋運之。而必有陰靜之血以倚伏之。所以必藉體陰用陽之品。方能入陰出陽。以施其辛散溫通之力也。又云。初爲氣結在經。久則血傷入絡。較使蠕動之物。鬆透病根。是又先生化裁之妙。於

臨證指南醫案

卷四 積聚

四

古人書引伸觸類而得。若夫管胞之去熱滯。芥鈴之豁痰。就不過爲先生用古處也。案中積症。第見伏梁。不能盡備。然宋時諸賢。於五積九積治法。載在書籍者。原多未畧。消補兼施。并以所惡者攻。所喜者誘。爾業醫者。自當知之稔也。姚亦陶

痞

痰熱內閉

宋 前議辛潤下氣以治肺痹。謂上焦不行。則下脘不通。古稱痞悶。都屬氣分之鬱也。兩番大便秘。胸次稍舒。而未爲全爽。此豈有形之滯。乃氣鬱必熱。陳腐粘凝膠聚。故腕腹熱氣下注。隱然微痛。法當用仲景梔子豉湯解其陳腐鬱熱。暮卧另進白金丸一錢。蓋熱必生痰。氣阻痰滯。一湯一丸。以有形無形之各異也。

黑山梔 香豉 鬱金 杏仁 桃仁

瓜蒌皮 降香 另付白金丸五錢

臨證指南醫案 卷四 痞

五

孫 寒熱由四末以擾胃。非藥從口入以擾胃。邪熱津液互膠成痰。氣不展舒。阻痺腕中。治法不但攻病。前議停藥。欲藥氣盡病自退。越三舍耳。

人參 川連 枳實 半夏

鬱金 石菖蒲

某 脈不清。神煩倦。中痞惡心。乃熱邪裡結。進瀉心法。

炒半夏 黃芩 黃連 乾姜

枳實 杏仁

劉 熱氣痞結。非因食滯。胃汁消燼。舌乾便難。苦辛開氣。酸苦泄熱。是治法矣。

熱閉化				熱邪入厥陰			
川連	人參	枳實	橘紅	烏梅	生白芍	又	氣室熱。仍治上可以通痺。
氣閉久。則氣結。不飢不食不大便。	川貝母	白菴仁	金銀花	萊豆殼	杏仁	鮮省頭草	川斛
又	氣結必化熱。乃無形之病。故徒補無益。	鮮省頭草	川斛	甜杏仁	川貝母	麻仁	何七
煩勞之人。衛氣少固。露雨濕。傷其流行清肅。瘧瘵。外潤。脫脇反痺。乃經脈為病。無關腑臟。	鈎藤	生白蒺	藜金	白菴仁	桑葉	橘紅	臨證指南醫案
卷四 痛	六	又	氣室熱。仍治上可以通痺。	杏仁	藜金	香附	瓜蒌皮
黑山梔	蘇梗	周	寒熱嘔吐。吐利。自利。是暑濕熱外因。因噴怒動肝。邪氣入於厥陰。胸滿腹脹消渴。議以開痞方法。	瀉心湯去參甘加枳實白芍	伊	因驚而得。邪遂入肝。故厥後熱。神識昏狂。視得面青。舌白。微嘔湯飲。胸次按之而痛。此屬痞結。乃在裏之症。宗仲景以瀉心湯為法。	

暑邪阻氣				暑濕伏			
川連	半夏	乾姜	黃芩	人參	枳實	尤	面垢油亮。目昏黃。頭脹如束。胸脘痞悶。此暑濕熱氣。
內伏。因勞倦。正氣泄越。而發。既非暴受風寒。發散取汗。徒傷陽氣。按脈形濡滿。是表症。凡傷寒必究六經。伏氣須明三焦。論症參脈。壯年已非有餘之質。當以勞倦。傷伏和例診治。	滑石	黃芩	厚朴	醋炒半夏	杏仁	菴仁	竹葉
又	胸痞自利。狀如結胸。夫食滯在胃。而胸中清氣悉為。	臨證指南醫案	卷四 痛	七	濕濁阻遏。飲食滯兩途。此清解三焦却邪湯藥。兼進保和丸消導。	淡黃芩	川連
淡乾姜	厚朴	醋炒半夏	藜金	白菴仁	滑石	送保和丸三錢	談氏
胸痞不饑。熱不止。舌白而渴。此暑邪未盡。仍清氣分。	鮮竹茹	淡黃芩	知母	橘紅	鹽水	滑石	枳實
枳實	枳殼	枳殼汁	藜金汁	某四	惡寒泄瀉。悉減。胸脘仍悶。餘暑未盡。胃氣未甦。故耳。	大麥仁	佩蘭葉
新會皮	半夏	麵炒	金斛	扶苓	錢	錢	錢

胃熱化		劉 濕熱非苦辛寒不解。濕熱陽氣不足。論體攻病爲是。	胸中痞悶不食。或治在胃。	川連 炒半夏 人參 枳實	姜汁 茯苓 橘紅	耶 脈滿而後。不食。時令之濕。與水穀相併。氣阻不行。欲作痞結。但體質陽微。開泄宜輕。	炒半夏 茯苓 杏仁 鬱金	橘紅 白蔻仁	某 舌白腕痛。嘔惡腹鳴。此濕阻氣分。胃痺成痛。是不通之象。	臨證指南醫案 卷四 痞 八	炒半夏 高良姜 廣藿香 橘紅 一錢	烏藥 香附 一錢	沈 精氣內損。皆微病。地甘酸。未爲背謬。緣清陽先傷於上。乘陰之藥。反礙陽氣之旋運。食裁中痞。顯然明白。病人食姜稍舒。者得辛以助陽之用也。至於黃芪麥冬。廉仁。更蒙上焦。斯爲背謬。極議辛甘理陽可效。	桂枝湯六分。加茯苓	汪 脈沉中脘不寒。腹冷。	人參 七分 淡乾姜 一錢 炒半夏 一錢 川熟附片 七分	茯苓 三錢 草果仁 八分
-----	--	---------------------------	--------------	--------------	----------	--	--------------	--------	-------------------------------	---------------	-------------------	----------	---	-----------	--------------	-----------------------------	--------------

胃寒		朱 嘔目垂氣短。腕痞不食。太陰脾陽不運。氣滯痰阻。擬用大半夏湯。日重氣短。此時。而人參。原不藥。因從陰。而食。必再內外之邪。同。平。及。同。三。則。不。中。二。而。吳。	人參 炒半夏 茯苓 伽楠香汁	又 脈微有歇。無神。倦欲寐。服大半夏湯。腕痞不安。不耐辛通。營液大虛。春節在週。恐防衰脫。	人參 炒麥冬 北五味	某 舌白腕悶。中焦陽氣不宣。	半夏 草果 厚朴 廣皮	茯苓 藿香梗	張 胃寒湧流中痞。	臨證指南醫案 卷四 痞 九	泡淡吳萸 乾姜 茯苓 半夏	橘紅 川棟子	胸次清平 酒客脾胃陽微。下午陰氣漸漫。腕中微痛。不饑。服苦降重降。辛燥。愈加不適者。清陽再受傷。觸也。宗仲景聖訓。以轉旋胸次之陽爲法。苓桂木甘湯。	肺氣不降。胸膈不某 氣阻腕痺。飲下作痛。當開上焦。	枇杷葉 大杏仁 蘇子 降香汁	白蔻仁 橘紅	張 脈滿腕痞不饑。口乾不痰。當清理上焦。	枇杷葉 杏仁 山梔 香豆豉
----	--	--	----------------	---	------------	----------------	-------------	--------	-----------	---------------	---------------	--------	---	---------------------------	----------------	--------	----------------------	---------------

荷金

瓜蒌皮

加姜汁炒竹茹

陳三食進頗逸而胸中未覺清曠宜辛潤以理氣分久以燥藥傷陰

枇杷葉

大杏仁

橘紅

黑山梔

香豉

荷金

瓜蒌皮

晨服五劑後接服桑葉丸

楊

癰母用針是泄肝胆結邪瘦人熱傷陰夢遺五心

煩熱亦近理有諸繼思脫膈痞悶不饑食減大便不爽

乃氣滯於上與前病兩岐焉得用滋陰凝滯之藥思必

病後飲食無忌中焦清濁不和所致

杏仁

土括藹

桔梗

半夏

臨證指南醫案

卷四

十

黑山梔

枳實

香附汁

俞腕痺身熱當開氣分

杏仁

瓜蒌皮

枇杷葉

廣皮

枳殼汁

桔梗

寒熱邪互結

王四陰傷胃痛明是陽傷錯認前風釣藥救貼更服丸藥

心下堅實按之痛舌白煩渴二便清少喘急不得進食

從痞結論治

生薑汁

生淡乾姜

泡淡黃芩

枳實

姜汁炒川連

半夏

案中六淫外侵用仲景瀉心湯脾胃內傷用仲景苓

姜桂甘法即遵古賢治痞之以苦為泄辛甘為散二

法其於和傷津液者用苦辛開泄而必資酸味以助

之於上焦不舒者既有枳桔杏藹開降而又用梔豉

除熱化腐疎暢清陽之氣是又從古人有形至無形

論內化出妙用若所用保和化食曰金匱痰飲姜藹

中參苓養胃生脈散液總在臨症視其陰陽虛實靈

機應變耳

臨證指南醫案

卷四

十一

噎膈反胃

陽結於上陰結於下

吳 脉小滿腕中隱痛嘔惡吞酸舌絳不多飲此高年陽

氣結於上陰液衰於下為關格之漸當開痞通陽議治

川連 人參 姜汁 半夏

枳實汁 竹瀝

盧 陰陽逆亂已成關格議用附子瀉心湯為上熱下寒

主治

徐 老人食入漚湧吐痰畧能嚥粥二便艱少是陽不轉

旋上結陰枯於下便難極難調治勿用腥油藉味脉弦

臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 三

大而搏議妙香丸

又 妙香丸仍服每五日服大半夏湯

毛 老年形消不食不便氣衝湧涎乃關格之症議用進

退黃連湯

川連 淡乾姜 半夏 姜汁

人參 茯苓 附子 生白芍

濮 十七旬有年納食脫脹大便乾澀並不渴飲痰氣凝遏

阻陽久延關格最怕

川連 枇杷葉 半夏 姜汁

杏仁 枳殼

杜 老人積勞久虛因渴飲冷再傷胃脾泄後如嘔吐

不受湯飲食物上不得入下不得出此為關格難治

人參 半夏 川連 淡乾姜

枳實 川連 半夏 姜汁

杏仁 茯苓 此症大忌燥藥

畢 四夏間診視曾說難愈之病然此病乃積勞傷陽年歲

未老精神已竭古稱噎膈反胃都因陰枯而陽結也秋

分後復診兩脉生氣日索交早咽燥晝日溺少五液告

涸難任剛燥陽藥是病諒非醫藥能愈

臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 三

大半夏湯加黃連姜汁

果 脉寸口搏大按之則澀形瘦氣逆上不納食下不通

便老年積勞內傷陽結不行致脫閉陰枯肺乏津營必

二便交阻病名關格為難治

人參 枳實 川連 生乾姜

半夏 茯苓

蘇 向來翻胃原可撐持秋季驟加驚憂陽陡升莫制

遂廢食不便消渴不已如心熱嘔吐涎沫五味中喜食

酸甘肝陰胃汁枯槁殆盡難任燥藥通關胃屬陽土宜

涼宜潤肝為剛臟宜柔則和酸甘兩濟其陰

烏梅肉 人參 鮮生地 阿膠		麥冬汁 生白芍		某 陽明汁乾成脯		梨汁 柿霜 玉竹 天冬 麥冬		甜杏仁 川貝 生白芍 三角胡麻		王三老年血氣漸衰必得數日大便通爽然後脫中納食無阻此胃汁漸枯已少胃氣下行之旨噎症萌矣病乃操持太過身中三陽燔燥燥津所致故藥餌未能全功議用丹溪法此法若真陰陽二五致也		麥冬汁 鮮生地汁 柏子仁汁 甜杏仁汁		臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 十四		黑芝蘇汁 柏蘇子汁 松子仁漿		水浸布紙絞汁濾清服自然膏		馬六勞心勞力經營向老自衰平日服餌佳附生薑三十		年病食噎不下膈吐此在上焦之氣不化津液不注於下初病大便秘瀉按經云味過辛熱肝陽有餘肺津胃液皆奪為上燥做嘉言清燥法不以此云		麥冬 麻仁 鮮生地 甜水梨		桑葉 石膏 生甘草		某 脈滿左大食入為噎是屬液虧先宜理氣後用潤劑		半夏 雲茯苓 枇杷葉 枳實 竹瀝	
---------------	--	---------	--	----------	--	----------------	--	-----------------	--	---	--	--------------------	--	-------------------	--	----------------	--	--------------	--	------------------------	--	--	--	---------------	--	-----------	--	------------------------	--	------------------	--

程 舌黃微渴痰多咳逆食下欲噎病在肺胃高年姑以輕劑清降		鮮枇杷葉 杏仁 鬱金 瓜蒌皮		山梔 淡香豉		沈 格拒食物逆沫逆氣自左上升此老年悒鬱所致必使腑通濁泄僅可延年議兩通陽明厥陰之法		半夏 苦杏仁 茯苓 橘紅		竹瀝 姜汁		俞 酒熱鬱傷脫中食阻而痛治以苦辛寒		小川連 半夏 香豉 枳實		臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 十五		茯苓 姜汁		又 苦辛化燥噎阻不舒而大便不爽治手太陰		鮮枇杷葉 紫苑 蘇子 杏仁		桃仁 鬱金		某 憂思鬱結凝痰阻礙已屬噎塞之象當怡情善調		炒半夏一錢 茯苓五錢 秫米三錢 枳實一錢		姜汁 小匙		楊四 脈弦而小滴食入脫痛格拒必吐清涎然後再納視色蒼眼筋紅黃昔肥今瘦云是鬱怒之傷少火皆變壯火氣滯痰聚日癰清陽莫展脫管宿陰不能食物噎膈	
----------------------------	--	----------------	--	--------	--	--	--	--------------	--	-------	--	-------------------	--	--------------	--	-------------------	--	-------	--	---------------------	--	---------------	--	-------	--	-----------------------	--	----------------------	--	-------	--	---	--

漸至矣。法當苦以降之。辛以通之。佐以利痰清膈。莫以豆蔻沉香劫津可也。不_以

川黃連 杏仁 桔梗 土瓜蒌皮

半夏 橘紅 竹瀝 姜汁

朱_五 未老形衰。納穀最少。久有心下忽痛。畧進湯飲不安。近來常吐清水。是胃陽日薄。噎膈須防。議用大半夏湯。補腑爲宜。

人參 半夏 茯苓 白香梗米

姜汁 河水煎

白_五 少食頗安。過飽食不肯下。間有冷脈。涎沫湧吐而出。

臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 共

此有年胃陽久餒。最多噎膈。翻胃之慮。飲以熱酒。腕中似乎冰凍。顯然陽微欲結。所幸二便仍通。濁尚下泄。猶可寧安。

熟半夏_{二兩} 茯苓_{二兩} 生益智仁_{一兩} 丁香_{五錢}

新會皮_{二兩} 淡乾姜_{一兩} 右藥淨末。分量用香。淡豆豉

一兩。洗淨煎汁。法九淡姜湯服三錢。

呂_六 勞倦饑飽。皆傷胃陽。年及花甲。最慮噎膈。翻胃。此麪飯酒肉重濁之物。與病不合。

半夏 姜汁 香豉 土瓜蒌皮

杏仁 橘紅

馮_七 有年陽微。酒濕厚味。釀痰阻氣。遂令胃失下行爲順之旨。胸膈不能納物。二便如昔。病在上中。議以苦降辛通。佐以養胃。用大半夏湯。不_以

半夏 人參 茯苓 姜汁

川連 枳實

又 胃屬腑陽。以通爲補。見症腕中窒塞。納食不易過膈。膚淺見識。以白荳蔻木香沉香麝。冀獲速功。不知老人日衰。愈投泄氣。斯冲和再無復振之理。故雲岐子九法後賢立辨。其非夏季宜用外臺茯苓飲加菖蒲。佐以竹瀝姜汁。辛滑可矣。

臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 七

顧_四 脉濡緩無力。中年胸脇時痛。繼以早食晚吐。此屬反胃。乃胃中無陽。濁陰腐壅。議做仲景陽明辛熱宣通例。

吳萸 半夏 藜蘆 淡乾姜 茯苓

又 辛熱開濁。吐減行走勞力。即吐痰水。食物陽氣傷也。用吳萸理中湯。

尤 脉緩右關弦。知饑惡食。食入即吐。肢浮便溏。溺少。不渴飲。此胃陽衰微。開合之機已廢。老年噎膈反胃。乃大症也。不_以

人參 茯苓 熟地其膏何也

炒梗米 姜汁 潤附子 潤乾姜

又通胃陽法服。肺病原無所補。祇以老年積勞傷陽之質所服之劑。開肺即是泄氣。甚連苦寒劫陽。姜汁與乾姜附子並用。三焦之陽皆通耳。若杵朴仍是泄氣。與前義停矣。						
人參	此叔陰方也。大謬。	茯苓	淡附子	淡乾姜		
劉 <small>五</small> 脈左小弦右濡滑五句。又四陰陽日衰。勞煩奔走。陽愈傷。致清氣欲結。食入腕痛。痰涎湧逆。皆噎膈反胃見症。其飲酒愈甚。由正氣先餒。非酒能致病。						
川連	枳實汁	茯苓	半夏	竹瀝		
廣皮白	黑山梔	姜汁				
臨證指南醫案 卷四 噎膈反胃 六						
包 <small>六</small> 胃脘痞悶。噯逆三四日必嘔吐。肚臍或黃綠水液。此屬反胃。六旬有年。是亦重病。						
川連	半夏	枳實	鬱金			
竹茹	姜汁					
陽虛陰瀉 陸脈沉微。陽氣大傷。陰濁僭踞。且食不能暮食。周身掣痛。背脹。病狀著難愈之症。						
人參	附子	乾姜	茯苓	澤瀉		
姚 <small>六</small> 肺陽不通。降濁難為。反胃。通利反。老年難以恢復。自能潛心安養。望其悠久而已。莫不能愈是病矣。						
人參	附子	乾姜	公丁香	姜汁和丸		

某		陽虛陰瀉				
便塞之症。		桃仁	紅花	延胡	川棟子	李
半夏		橘紅	鬱金汁	瓜蒌皮	兩關脈緩。滯食入氣阻。吐涎稍通。前已吐過。痰濁膠枯。此皆久積勞倦。陽氣不主旋運。為噎膈反胃之症。此病最多反覆。必須身心安逸。方可却病。徒藥無益耳。	
半夏		姜汁	桃仁	垂白汁	某	
香豉		瓜蒌皮	鬱金	胃痛得痰。血去而減。兩三年宿病復起。食進痞悶。怕臨證指南醫案		卷四
臨證指南醫案		卷四	噎膈反胃	九	其清陽結而成。膈大。意益氣佐通。仍兼血絡為治。	
人參		半夏	茯苓	新會皮	木香	生益智
當歸		桃仁	水法丸服三錢	張三		早食暮吐。大便不爽。病在中下。初因勞傷。胃痛。痰瘀有形之阻。
半夏		枳實	製大黃	桃仁	韭白汁	經云
三陽結謂之膈。又云一陽發病。其傳為膈。仲景云。朝食暮吐。暮食朝吐。宿食不化。名曰胃反。丹溪謂噎膈反胃。名雖不同。病出一體。多因氣血兩虛而成。然歷觀噎膈反胃之因。實有不同。大抵飲食之際。氣		子 53-482				

忽阻塞飲食原可下咽如有物梗塞之狀者名曰噎。心下格拒。饑不能食。或食到喉間不能下咽者。名曰膈。食下良久復出。或隔宿吐出者。名曰反胃。夫噎膈一症。多因喜怒悲哀恐五志過極。或縱情嗜欲。或恣意酒食。以致陽氣內結。陰血內枯而成。治宜調養心脾。以舒結氣。填精益血。以滋枯燥。大反胃乃胃中無陽。不能容受食物。命門火衰。不能薰蒸脾土。以致飲食入胃。不能運化。而為朝食暮吐。暮食朝吐。治宜益火之源。以消陰翳。補土通陽。以溫脾胃。故先生於噎膈反胃。各為立法以治之。其陽結於上。陰虧於下。而為噎膈者。用通陽開痞通補胃脾。以及進退黃連附子瀉心諸法。上熱下寒為治。其肝陰胃汁枯槁。及煙勞陽亢。肺胃津液枯而成噎膈者。用酸甘濟陰及潤燥清燥為主。其液虧氣滯。及陽衰血瘀而成噎膈者。用理氣逐瘀兼通血絡為主。其胃陽虛而為噎膈反胃及憂鬱痰阻而成者。用通補胃脾。辛熱開濁。以及苦降辛通。佐以利痰清膈為主。其肝鬱氣逆而為噎膈者。兩通厥陰。陽明為治。其酒熱鬱傷肺胃。氣不降而為噎膈者。用輕劑清降。及苦辛寒開肺為主。而先生於噎膈反胃治法。可謂無遺。張景岳云。治噎

膈大法。當以脾腎為主。其理甚通。當宗之。又有飲膈熱膈。及憂氣寒食寒之膈。其主治各載本門。茲不復贅。細滋九。是證。每因血枯氣衰致此。凡香燥消滯之藥。久在禁內。案中雖有一二。倣用辛熱。而亦必諦審其為陽微濁踞者。其餘或苦辛泄滯而兼潤養。或酸甘化液而直滋清。或鬱悶於氣分。而推揚穀氣。或勞傷於血分。而宣通瘀濁。總以調化機關。和潤血脉為主。陽氣結於上。陰液衰於下。二語。實為證之確切論也。姚亦園

噫噎

胃虛客

王二初用辛通見效。多服不應。想雨濕泛潮。都是濁陰上。加致胃陽更困。做仲景胃中虛客氣上逆。噫氣不除例。

人參

旋覆花

代赭石

半夏

茯苓

乾姜

此方也。但仲景以治噫逆。云噫則

某

味淡。嘔惡噎氣。胃虛濁逆。

白旋覆花

釘頭代赭

炒黃半夏

姜汁

人參

茯苓

汪三壯年飲酒聚濕。脾陽受傷已久。積勞饑飽亦令傷陽。

臨證指南醫案

卷四 噫噎

三

遂食入反出。噫氣不爽。隔拒在乎中焦。總以溫通鎮逆為例。

白旋覆花

釘頭代赭

茯苓

半夏

淡附子

淡乾姜

徐

噫氣不爽。食後甚。

杏仁

半夏麴

橘紅

厚朴

枳實

枳殼

陳

多噎胸膈不爽。胃陽弱宜蒲味。

生白朮

茯苓

新會皮

半夏麴

益智仁

厚朴

生薑

和胃不

噎氣。腹微痛。脾胃不和。

人參

焦白芍

茯苓

炙甘草

內經止有噫字。而無噎字。故經云。五氣所病。心為噫。又云。寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故為噫。夫噫噎一症。或傷寒病後。及大病後。多有此症。蓋以汗吐下後。大邪雖解。胃氣弱而不和。三焦因之失職。故清無所歸。而不升濁無所納。而不降。是以邪氣留連。噎噎作。飽胸膈不爽。而為心下痞鞭。噫氣不除。乃胃陽虛而為陰所格。阻陽足則充周流動。不足則膠固格阻矣。仲景立旋覆代赭湯。用人參甘草養正補虛。證指南醫案。卷四。噫噎。三。

慮姜藥以和脾養胃。所以安定中州者至矣。更以旋覆花之力。旋轉於上。使陰中格阻之陽升而上達。又用代赭石之重鎮降於下。使戀陽留滯之陰降而下達。然後參甘大棗。可補其補虛之功。而生姜半夏。可奏其開痞之效。而前賢治噫噎一症。無出仲景右矣。故先生於胃虛客氣上逆及胃陽虛。脾胃不和。肺氣不降。而為噫噎者。每宗仲景法。加我出入。或加杏仁。桔梗以開肺。智仁朴朮以散滿。甘草白芍以和胃。磨不應手取愈。可謂得仲景心法矣。謝時舉。

嘔吐

肝犯胃 高四 嘔阻吞酸痞脹食入嘔吐此肝陽犯胃用苦辛泄降

吳萸 川連 川棟子 杏仁

茯苓 半夏 厚朴

錢七 脉細右堅大向有氣衝長夏土旺嘔吐不納食頭脹腕痺無非厥陽上胃議用苦辛降逆酸苦泄熱不加噴怒胃和可愈

川連 半夏 姜汁 川棟子皮

烏梅 廣皮白

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 舌

金四 脉細小而弦風木乘土當春勢張食入不變嘔吐得小便通少緩治以通陽

人參 半夏 吳萸

淡姜 茯苓

又 脉右弦滿陽微陰凝食入則吐胃痛脹甚半月前用藥得效後反大便秘解不通腑陽不利濁乃上攻先用

玉壺丹七分 四服

蔣三 脉沉食入嘔吐忌冷滯食物

吳萸 半夏 姜汁 茯苓

公丁香柄 廣皮白

顧 脉濡弱左脇下久有聚氣納食釀積於胃完之三

三日嘔噎吞酸積物上湧吐出此皆傷怒動肝肝木犯

胃胃中陽傷不能傳及小腸遂變化失司每七八日始

一更衣為胃氣不主下行故也法當溫胃陽制肝逆宿

病糾纏恐多反覆此將成反胃之症何可施用辛熱

淡附子 淡乾姜 姜汁 生白芍

淡吳萸 白粳米

朱 胃中不和食入嘔吐怒動而病必先制肝溫胆合左

金為宜去甘草茯苓加姜汁

某 氣自左升腹中膨滿嘔吐涎沫黃水暴咳不已是肝

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 舌

氣逆乘過胃犯肺當制肝和胃 安蛇丸

某 嘔黑綠苦水顯屬下焦濁邪犯胃

人參 川椒 烏梅 茯苓

紫石英 桑螵蛸

沈 食過逾時漾漾湧涎欲吐診脉濡濇以胃虛肝乘宗

仲景旋覆代赭法

旋覆花 代赭石 人參 半夏

茯苓 廣皮

王四 肝病犯胃嘔逆口吐清涎頭暈乳房痛肢麻痺

人參 二兩 茯苓 二兩 桂枝 木 七錢 川棟子 一兩 蒸

<p>川連<small>鹽水炒</small> 烏梅<small>一兩</small> 當歸<small>一兩</small> 生白芍<small>一兩</small></p> <p>某 冷傷傷胃 肝木上衝 衝氣欲嘔 腹痛</p>	<p>淡吳萸 厚朴 草蔻 藿香梗</p>	<p>木瓜 茯苓</p> <p>毛<small>因驚</small> 肝氣上犯 衝逆 嘔吐 陽升 至顛 爲頭痛 脉右</p> <p>弱左弦 當從厥陰陽明治</p>	<p>人參 川連 茯苓 川棟</p> <p>川椒 烏梅 乾姜 生白芍</p>	<p>某 脉虛 食已 漾漾欲吐 咽阻 中痞 有痰</p> <p>人參 吳萸 茯苓 半夏</p>	<p>臨證指南醫案 卷四 嘔吐</p> <p>廣皮 姜汁</p>	<p>陸 鼻明湯水下咽 嘔吐 右脉小 欲飲 明是勞傷 肝乘胃</p> <p>反 小半夏湯加檀香泥炒白粳米</p>	<p>顏氏 乾嘔 腹痛 因惱怒而痛 是厥陰侵侮陽明 脉虛不食</p> <p>當與通補 大半夏湯加姜汁桂枝南棗</p>	<p>某 肥膩滯胃 肝木始得再乘土位 致氣逆上 嘔出 久</p> <p>病至筋反劇 最屬不宜 總是調攝未善 奈何暫與降</p> <p>逆平肝安胃一法</p>	<p>降香 蘇子 旋覆花 茯苓</p>	<p>半夏 廣皮 韭汁</p>
---	----------------------	---	--	---	----------------------------------	--	--	--	---------------------	-----------------

<p>某 肝風犯胃 嘔逆眩暈 善降酸泄和陽 佐微辛以通胃</p> <p>川連 黃芩 烏梅 白芍</p>	<p>唐氏 動氣肝逆 痰性凝寒 滯胃 卒然大痛 嘔涎 乃逆滯上</p> <p>攻也 治肝厥以通例</p>	<p>炒黑川椒 烏梅肉 生乾姜 川桂枝木</p>	<p>人參 白芍</p>	<p>某 積勞傷陽 先已脫痛引背 昨頻吐微眩 脉弱汗出 胃</p> <p>臨證指南醫案 卷四 嘔吐</p>	<p>中已虛 肝木來乘 防有呃忒吐蛔 倣仲景食入則嘔者</p> <p>吳茱萸湯土之</p>	<p>吳萸 半夏 茯苓 姜汁 粳米</p>	<p>王四 早上水飲米粥至晚吐出 不化 知濁陰酉戌升逆 痰</p> <p>形痛而漸大 九藥吐出不化 胃陽乏極矣 兩進平肝理</p> <p>氣不效 法當重辛熱開濁</p>	<p>吳萸 熟附子 良姜 川棟子</p>	<p>茯苓 草果</p>
---	--	--------------------------	--------------	---	---	-----------------------	--	----------------------	--------------

半夏 姜汁

李 厥吐 厥氣衝 安胃丸

王 胃虛少穀肝來乘尅嘔吐不能受納蓋厥厥象也

人參 川連 附子 黃芩

乾姜 枳實

張氏 勉強攻胎氣血受傷而爲寒熱經脈乏氣而爲身痛
乃奇經衝任受病而陽維脈不用事也內經以陽維爲
病苦寒熱維者一身之剛維也既非外感羌蘇柴葛三
陽互發世無是病又寒極似仲之屬辛散繼以苦寒未
能中病胃口屢傷致湯飲皆嘔出無餘大便不通已經

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 天

半月其吐出形色青綠涎沫顯然肝風大動將胃口翻
空而腸中污水得風翔如浪決東西蕩漾矣炮風鎮胃
固是定理但危篤若此明理以邀天眷耳

淮小麥 火麻仁 阿膠 生地

秋石 梓人 錢 南棗肉 錢 一方乃和病重者吐

陳氏 未病先有耳鳴眩暈恰值二之氣交是冬藏根蒂未
固春升之氣泄越無以制伏更屬產後精氣未復又自
乳耗血而去液虧其陰日損陽氣不交於陰變化內風
上竄犯厥衝逆肆橫胃掀吐食攻腸爲瀉裝走脈絡肌
肉皆厥譬如諸門戶盡撤遂致暴風驟漾之狀醫者辛

散苦降重墜不但病未曾理致陽更泄陰愈涸煩則震

動即厥由二氣不能自主之義閱王先生安胃一法最

爲卓識所參拙見按以兩脈右手瀕弱虛象昭然左脈

空大按之不實亦非肝氣肝火有餘皆因氣味過辛散

越致二氣造偏茲以病因大旨兼以經義酌方

人參 茯苓 半夏 白芍

煨姜 炒梗米

周 痛從少腹上衝爲嘔爲脹是厥陰穢濁致患

非白根 淡吳萸 小茴香 桂枝木

兩頭尖 茯苓

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 无

又 炒橘核 炙山甲末 韭白 歸尾

川楝子 延胡 小茴香

徐六氣衝偏左厥逆欲嘔嘔盡方適伏飲在於肝絡辛以

通之

吳萸 半夏 茯苓塊 淡乾姜

代赭石 旋覆花

某 脈搏肢冷嘔逆下痢白積生冷水寒鬱生陽氣上擡

心大痛乃厥陰濁邪上攻

吳萸 丁香 藿香 川楝子

木香 廣皮 茯苓

胃陽虛
陽陰上
逆

清涎上湧食物吐出乃飢飽傷及胃中之陽禁鮮輩
冷滑經年可安。

半夏 厚朴 生益智 姜汁

生白朮 茯苓

宋三陽微不運水穀悍氣聚濕致食入即嘔周身牽掣不
和乃陽明之脈不用事也久延恐致腫脹答姜朮桂湯

加厚朴椒目

陸七十食已即吐病在胃也用辛以通陽苦以清降

半夏 川連 厚朴 茯苓 姜汁

曹四早食頗受腹食必嘔嘔吐陽氣日微濁陰聚則有
臨證指南醫案卷四嘔吐 辛

形夜痛至曉陰邪用事乃劇

半夏 姜汁 淡乾姜 秦椒

厚朴 茯苓

王診脈右濡左弦舌白不飢痰血上吐下瀉胃陽大傷
藥餌下咽則湧前醫用大半夏湯不應詢知所吐皆係
酸水痰沫議以理陽方法此主乾症

人參 茯苓 川椒 乾姜

潘十食後吐出水液及不化米粒二便自通並不渴飲五
年不愈宜理胃陽用仲景法

熟附子 半夏 姜汁 白粳米

又泄瀉陰劫水飲以安胃陽服四日腹脹吐水已減知

陽腑之陽非通不問再宗仲景法真武湯加人參

范脈虛無神聞穀乾嘔汗出振寒此胃陽大虛不必因

寒熱而攻邪

人參 茯苓 炒半夏 姜汁

烏梅 陳皮

又脈微細小胃陽大衰以理中兼攝其下

人參 淡熟附子 茯苓 炒白粳米

炒黃淡乾姜

又人參 茯苓 乾姜 煨益智仁

臨證指南醫案卷四嘔吐 辛

廣皮 生白芍

金參藥不受皆濁陰在上阻塞氣機幾無法矣勉與白

通湯加入人尿猪胆汁急進以通陽泄濁

附子 生淡姜 蔥白 五寸 人尿 猪胆汁

沈九吹笛震動元海病治宜填實下焦但陰食吐出又便

溲不實中無砥柱陰藥下未受益中再受傷矣微補益

中宮仍佐鎮逆一法

人參 焦朮 炒焦半夏 茯苓

旋覆花 代赭石

吳寒熱邪氣擾中胃陽大傷酸濁上湧吐出脘痛如刺

無非陽衰。陰竭上僭。致胃氣不得下行。高年下元衰。得釜底煖。中宮得以流通。擬用仲景附子瀉心湯。通陽之中。原可泄熱開導。煎藥按法用之。

人參 一錢 熟附子 一錢 淡乾姜 一錢 三味 五錢 汁

川連 六分 炒半夏 一錢 枳實 一錢 茯苓 三錢

後四味用水一盞。滾水一杯。煎三十沸。和入前三味。

藥汁服

江 脈弦遲。湯水不下。嘔吐涎沫。此陽結。飲邪阻氣。議以辛熱通陽。反佐苦寒利膈。用瀉心法。

人參 附子 乾姜 先煎一杯。入姜汁四分

臨證指南醫案 卷四 嘔吐

五

川連 黃芩 半夏 枳實 滾水煎和入前藥服

孫四 食物隨入。即吐。並不渴飲。當年以苦辛得效。三載不

發。今心下常滿如棘。大便六七日始通。議通膈上用生

姜瀉心湯

生姜汁 四分 川連 六分 黃芩 二錢 炮 熟半夏 三錢

枳實 一錢 人參 五分 同煎

又 問或不吐食物。腹中腰脅似乎氣墜。自長夏起。心痛頭重。至今未減。思夏熱必兼濕。在裏水穀之濕。與外來之熱。相洽結聚。飲邪矣。當緩攻之。議用枳瀉丹五分。間

日一用

某 診脈左弦右弱。食粥腹中有聲。氣衝湧吐。此肝木乘胃。生陽已薄。皆情懷不適所致。大半夏湯。

中焦火衰。食下不運。作酸嘔出。

炒黃乾姜 一錢 川椒 三分 半夏 一錢 茯苓 三錢

黃氏 靈樞經云。中氣不足。溲便為變。是崩淋泄瀉。皆脾胃

欲敗之現症。今湯水下。嘔。少頃。傾囊湧出。豈非胃陽無

有失司。納物乎。奈何業醫者。中懷疑惑。但圖疲藥。待其

自安。怕遭毀謗耳。此症一投。桑葉。濁升填塞。必致脹滿。

仲景於陽明滿實。致慎攻下者。恐以太陰之脹誤治耳。

臨證指南醫案 卷四 嘔吐

五

今言微紅微渴。皆是津液不肯升揚。脾弱不主散精。四

布。豈有面色如白。紙尚不以陽氣為首重也耶。

人參 熟附子 炙甘草 炮姜

茯苓 南棗

張 嘔吐。腹悶。虛中氣滯。

人參 茯苓 砂仁

某 脈微。腹冷。嘔吐清水。食不下化。帶下。脊腰痠。陽氣

素虛。產後奇脈不固。急扶其陽。用附子理中湯。

又 緩胃陽以劫水濕。帶下自後。照前方加胡蘆巴

又 脉象稍和。已得理中之效。議用養營法。		養營去遠志黃芪五味 卽作丸方		蔡 凡論病。先論體質。形色脉象。以病乃外加於身也。夫		肌肉柔白。屬氣虛。外似豐滿。裏實大怯。蓋陽虛之體。爲		多濕多痰。肌跡汗泄。唇舌俱白。乾嘔。胸痞。煩渴。引飲。由		乎脾胃之陽傷。觸邪得信。踞於中。蓄不解。正衰和藏。		試以脉之短澹。無神論之。陽衰和次顯然。况寒涼不能		攻熱清和。似是傷及胃陽之藥。全不納穀。大便漸稀。		若不急和胃氣。無成法可遵。所謂虛人之病。虛虛其陽。		參 擬一方。仍候明眼採擇。		臨證指南醫案 卷四 嘔吐		人參 半夏 生於木 枳實		茯苓 生姜		吳 壯年形偉。脉小濡。惡聞穢氣。食入嘔。噦。緣陽氣微弱。		濁陰類聚。口鼻受汚濁臭氣。先入募原。募原是胃絡分		布上逆而爲嘔吐。此病理標者。用芳香辟穢。扶正氣治		本以溫土通陽		藿香 草果 公丁香 茯苓		厚朴 砂仁殼 廣皮 藜蘆		又 人參 茯苓 生益智 胡蘆巴		煨木香 煨姜	
----------------------	--	----------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	---------------------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------	--	-------	--	------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	--------	--	--------------	--	--------------	--	-----------------	--	--------	--

孫 寒胃化熱。營衛氣窒。致瘧疾。食入卽吐。胃中熱。灼		當忌進腥油。先用加味溫胆湯。		鮮竹茹 一錢 半夏 一錢 金石斛 三錢 茯苓 一錢		廣皮白 半錢 枳實 一錢 姜汁 一匙		吳 兩番探吐。脫病立止。氣固宣暢。胃津未能無損。風木		來乘。外舍畏熱。診脉右大。並不搏指。當少少進穀以養		胃多噫。多下泄氣。調和中焦爲宜。		炒竹茹 半夏 川斛 橘紅		黑山梔 香豉		肝腎虛 胃四 少腹屬肝。肝厥必犯陽明胃腑。故作痛嘔。二年來病		臨證指南醫案 卷四 嘔吐		上通		熱和內		何 寒熱嘔吐。胸中格拒。喜飲。怕涼。平昔胃陽最虛。熱		邪內結。體虛和實。最防瘧厥。		人參 黃芩 炒半夏 姜汁		川連 枳實		某 舌赤。濁嘔。不寐不饑。陽邪上擾。治以苦辛。進瀉心法。	
----------------------------	--	----------------	--	---------------------------	--	--------------------	--	----------------------------	--	---------------------------	--	------------------	--	--------------	--	--------	--	--------------------------------	--	--------------	--	----	--	-----	--	----------------------------	--	----------------	--	--------------	--	-------	--	------------------------------	--

<p>暑積內 毛氏 舊有胃痛腹脹嘔吐之病秋前舉發已得小安近痛嘔復來身熱煩熱宿病未罷而暑熱穢氣上發侵入三焦混淆恐內閉變現痙厥</p>		<p>淡黃芩 川連 炒半夏 枳實 姜汁</p>
<p>某 胃熱阻飲癰嘔有年最虛噎膈</p>		<p>半夏 金斛 姜汁 茯苓</p>
<p>杏仁 廣皮白</p>		
<p>川連 淡黃芩 半夏 姜汁</p>		
<p>黑山梔 枳實汁</p>		
<p>某 舌黃不渴飲久嗽欲嘔吐前用金匱麥門冬湯養胃</p>		
<p>臨證指南醫案 卷四 嘔吐</p>		
<p>小效自述昔寒口吐清痰暑濕客邪未盡虛體當輔正醒脾却暑</p>		
<p>人參 茯苓 廣皮 半夏 姜汁</p>		
<p>郭氏 知傷能納忽有氣衝涎沫上湧脫中格拒不堪容物內經調肝病吐涎沫丹溪云上升之氣自肝而出木火上凌乘金受剋咳喘日加治以養金制木使土宮無賊賊之害滋水制火令金臟得清化之權此皆老年積勞致傷胃攻病可效</p>		
<p>蘇子 麥冬 枇杷葉 杏仁 北沙參</p>		
<p>桑葉 丹皮 降香 竹瀝</p>		

<p>曹氏 勞倦嗔怒嘔吐身熱得汗熱解而氣急不寐不似仍是氣分未清先以上焦主治以肺主一身氣化也</p>		<p>杏仁 鬱金 山梔 香豉</p>
<p>橘紅 瓜蒌皮</p>		
<p>嘔吐症內經與金匱論之詳矣乃後人但以胃火胃寒痰食氣滯立論不思胃司納食主乎通降其所以不降而上逆嘔吐者皆由於肝氣冲逆阻胃之降而然也故靈樞經脈篇云足厥陰肝所生病者胸滿嘔逆况五行之生尅木動則必犯土胃病治肝不過隔一之治此理淺近易明人乃不能察而好奇之輩反</p>		
<p>臨證指南醫案 卷四 嘔吐</p>		
<p>誇隔二隔三之治豈不見笑於大方也哉試觀安胃丸理中安就丸所用椒梅及胃虛客氣上逆之旋覆代赭此皆胃藥乎抑肝藥乎於此可省悟矣今觀先生之治法以泄肝安胃為綱領用藥以苦辛為主以酸佐之如肝犯胃而胃陽不衰有火者泄肝則用苓連棟之苦寒如胃陽衰者稍減苦寒用苦辛酸熱此其大旨也若肝陰胃汁皆虛肝風擾胃嘔吐者則以柔劑滋液養胃熄風鎮逆若胃陽虛濁陰上逆者用辛熱通之微佐苦降若但中陽虛而肝木不甚亢者端理胃陽或稍佐椒梅若因嘔傷寒鬱化熱劫灼胃</p>		

津則用溫胆湯加減若久嘔延入肝腎皆虛便氣上逆者用溫通柔潤之補下焦主治若熱邪內結則用瀉心法若肝火冲逆傷脾則用苦寒利水滋水制火總之治胃之法全在溫通虛則必用入參藥味皆屬和平至於治肝之法藥味錯雜或寒熱互用或苦辛酸甘並投蓋因厥陰有相火內寄治法不得不然耳但觀仲景烏梅丸法槩可知矣案嘔六十有餘大半皆由肝和為患非先生之卓識安能暢發此理乎哉

華岫雲

高登良有諸書卷一 嘔吐

吳

吐衄

王 厥陰吐衄寒熱乾嘔心胸格拒舌黑渴不欲飲極重之症

烏梅肉一錢 桂枝六錢 炒黑川椒四分 白芍一錢

小川連三分 黃芩一錢 牛蒡乾姜一錢

脈右歇舌白渴飲腕中痞熱多嘔逆利痰曾吐蛔虫此伏暑濕皆傷氣分邪自裡發神欲昏胃濕邪不運自利粘痰議進瀉心法 半夏瀉心湯

又凡蛇虫上下出者皆屬厥陰乘犯陽明內風入胃嘔

臨證指南醫案 卷四 嘔吐 吳

吐痰涎渴沫如仲景厥陰篇中先厥後熱同例試論寒熱後全無汗解謂至陰伏邪既深焉能隔越諸經以達陽分閱醫藥方初用治肺胃後用溫胆茯苓飲但和胃治痰與深伏厥陰之邪未達前進瀉心湯苦可去濕辛以通痞仍在上中服後胸中稍舒逾時稍寐寐醒嘔吐濁痰有黃黑之形大凡色帶青黑必係胃底腹中逆瀉而出老年衛脈既衰所謂衛脈動則諸脈皆逆自述嘔吐之時周身牽引直至足心其陽蹻維不得自固時斷然矣仲景於半表半裏之邪必用柴苓今上下格拒當以桂枝黃連湯為法泰以厥陰引經為通裡之使

衝得緩，繼進通補陽明。此為治厥陰章旨。

淡乾姜 桂枝 川椒 烏梅

川連 細辛 茯苓 小病宜因時止注

又肝鬱不舒，理進苦辛，佐以酸味者，其過剛也。飯食穀則嘔側。

人參 茯苓 吳萸 半夏

川連 烏梅

又瘧來得汗，陰分之邪已透陽經，第痰嘔雖未減，青綠色形亦不至，最屬可喜。舌心白苔未淨，舌邊漸紅而神倦困倦清和，佐以輔正一定成法。

臨證指南醫案 卷四 吐衄

早

人參 半夏 茯苓 枳實汁

乾姜 川連

又食入欲嘔，心中溫溫液液，痰沫味鹹，脊背上下引痛，腎虛水液上泛為涎，督脈不司約束，議用真武撤其水寒之逆，二服後接服。

人參 半夏 茯苓 桂枝

煨姜 南棗

又別後寒熱三次，較之前發減半，但身動言語氣衝，湧痰吐逆，四肢常冷，寒熱汗出，時四肢反熱，此陽衰胃虛陰濁上乘，以致清氣無以轉舒，議以胃中虛客氣上逆。

為噫氣嘔吐者，可與旋覆代赭湯，仍佐通陽以制飲逆，加白芍附子。

又鎮逆方雖小效，究是強制之法，比痰飲都是潤陰所化，陽氣不振，勢必再熾。仲景謂飲邪當以溫藥和之，前方劫胃水以甦陽，亦是此意，議用理中湯，撤甘草之守，仍加姜附以通陽，并入荳蔻以醒脾，二服後接用。

人參 乾姜 半夏 生白朮

附子 生白芍

王脈沉弦，腹痛嘔吐，鼻燥舌絳，面帶青晦色，夏秋伏暑發熱，非冬月乃誤表禁食，胃氣受傷，致肝木上干胃土。

臨證指南醫案 卷四 吐衄

早

蛇虫上出，遂成重病，常有厥逆之慮，擬進泄肝和胃，得痛止嘔緩，冀有轉機。

川椒 川連 烏梅 乾姜

人參 茯苓 生白芍 川棟子

程大病後胃氣極傷，肝木乘土，蛔欲透膈，脫腸陣痛，是土衰木剋，古人以狐惑虫厥，都以胃虛少穀為訓。

土衰木剋 古人以狐惑虫厥，都以胃虛少穀為訓。

安胃丸 人參川椒烏梅湯化送二錢

周三兩脇痛，尤其於左，嘔吐蛔虫，年前好食生米，此飢飽加以怒勞，胃土不和，肝木來犯，試觀幼穉有食米麥泥炭者，皆裡滯久聚，初從濕熱鬱蒸而得宜和，陽宜斷辛。

竊通絡濕主熱走時絡自和

川連 乾姜 桂枝 金鈴子 延胡

蘆薈 白芍 枳實 烏梅丸服三錢

季 身不壯熱。便煩通。已非風寒停滯之病。因驚動肝。

厥氣下泛。蛔玉上攻。觸痛。嘔吐清涎。仲景云。蛔重厥都。

從驚氣得之。人參安眠法。

又 古人云。上升吐就下。降狐惑皆胃虛少穀。肝臟厥氣。

上于耳。既知胃中虛。客氣上出。是斯藥速安胃方。是。

遵古治法。

人參 代諸石 烏梅肉 川椒

臨證指南醫案 卷四 吐衄

川棟子 茯苓

又 人參 茯苓 沙當歸 炒白芍

桂心 炙草 嬰葵 南棗

又 忽然痛再發。診脈微細。恰值立夏之交。正氣不相接。

續有復厥之慮。

人參 桂枝木 川棟子 炒川椒

生白芍 烏梅肉 川連 細辛

熱氣上閉。耳聾身熱。神識不清。當清心營肺衛。

竹葉心 飛滑石 連翹 川貝

石菖蒲根 生萊豆皮

又 暑濕熱內蒸。吐衄以渴耳聾。

川連 水炒 半夏 一錢 枳實 一錢 廣皮 白三錢

葛蒲 一錢 杏仁 三錢

又 身熱。三候不解。胃痞。入暮譫語。耳聾吐衄。此熱結厥。

陰。症勢最險。

川連 黃芩 枳實

半夏 姜汁 茯苓 葛蒲

吐衄本屬肝胃症。因厥陰之和上逆。蛔不能安。故從。

上而出也。今所輯方案。皆因客邪病而致吐衄者。雖。

有瀉心湯。桂枝黃連湯。安胃丸等。然皆不離于仲景。

臨證指南醫案 卷四 吐衄

之烏梅丸法。以苦辛酸寒熱並用為治。當與嘔吐門。

同參。至於幼穉有吐衄。及諸虫之病。治標則有。

殺虫之方。治本則溫補脾胃。或佐清疳熱。前人各有。

成法。不必重贅。華王堂

不食

不食亦是病後病者不食之惟何必另三一門

張脈虛緩不食不飢形寒浮腫

人參 生益智 廣皮 半夏麴

茯苓 生白芍 煨姜

楊氏胃傷惡食絡虛風動浮腫先與荷米煎

人參 新會皮 檀香泥 炒粳米 炒荷葉蒂

潘不飢不食似寐驚跳心營熱入胃汁全虧調攝十日

可愈 此症當以驚悸三不食

鮮生地 麥冬 知母 竹葉心

臨證指南醫案卷四 不食

火麻仁 銀花

王熱損胃林不欲食穀

麥冬 蜜炒知母 地骨皮 川貝母

竹葉心 嘉定花粉 生甘草 甜梨皮

陸時病後脈弦而勁知飢不納胃氣未和當靜處調養

鮮省頭草 鮮蓮子 茯神 大麥仁

川斛 炒知母

鄭三脈濡無力唇赤舌乾後眩不飢不飽此天暖氣泄而

煩勞再傷陽氣夫衛外之陽內應乎胃胃既逆則不納

不飢矣

焦濕某

炒麥冬 木瓜 烏梅肉 川斛 大麥仁

風濕氣痺不飢

杏仁 滑石 土薏皮 連翹

橘紅 鬱金

翁一夏季溫熱上受首先入肺河間主三焦極是今世醫

者初用非發散即消食散則耗氣消則劫胃究竟熱蘊

未除而胃汁與肺氣皆索故不飢不食不便上脘似格

似阻酸濁之氣皆是熱化病延多日苦寒難以驟進先

擬開提上焦氣分

蘇子 杏仁 土瓜瓠皮 枇杷葉

臨證指南醫案卷四 不食

黃芩 降香

有胃氣則生無胃氣則死此百病之大綱也故諸病

若能食者勢雖重而尚可挽救不能食者勢雖輕而

必致延劇此理亦人所易曉也然有當禁食與不當

禁食之兩途如傷寒之邪傳入陽明之腑胃有燥熱

昏鬱者有乾霍亂之上下不通或正值吐瀉之際或

痼疾未達於表或瘟疫之邪客於募原或瘴邪交戰

之時或初感六淫之邪發熱腔悶邪氣充塞瀾漫嘔

惡痞脹不飢或傷食惡食等症此雖禁其穀食可也

其餘一切諸症不食者當責之胃陽虛胃陰虛或濕

熱阻氣或命門火衰其他散見諸門者甚多要知此症淡飲淡粥人皆惡之或辛或酸人所喜也或其人素好之物亦可酌而投之以醒胃氣惟酸膩甜濁不可進至於案中治法一覽可盡茲不重贅華玉堂

臨證指南醫案 卷四 不食 吳

腸痺

肺氣不降

張食進脘中難下大便氣塞不爽腸中收痛此為腸痺

大杏仁 枇杷葉 川鬱金 土瓜蒞皮

山梔 香豉

夏十食下腹脹旬日得一更衣腸胃皆腑以通為用汗溪每治腸痺必開肺氣謂表裡相應治法

杏仁 紫苑 冬葵子 桑葉 土瓜蒞皮

又腸痺開肺不效用吳衣丸三錢

吳身重不能轉移尻輭板者必得撫摩少安大便不通

臨證指南醫案 卷四 腸痺 宅

小洩短少不饑少飲此時序濕邪蒸鬱化熱阻於氣分

經胸氣隨皆阻病名濕痺 既呈濕痺又何以此

木防已 錢 杏仁 二錢 川桂枝 錢 石膏 三錢 研

桑葉 一錢 丹皮 一錢

又舌白不渴不饑大便經旬不解皮膚麻痺腹中鳴動

皆風濕化熱阻遏氣分諸經脈絡皆閉昔丹溪謂腸痺

宜開肺氣以宣通以氣通則濕熱自走倣此論治

杏仁 瓜蒞皮 鬱金 枳殼汁

山梔 香豉 紫苑

沈五濕結在氣二陽之痺丹溪每治在肺肺氣化則便自

通

紫苑 杏仁 枇杷葉 土瓜萹皮

鬱金 山梔皮 枳殼汁 桔梗汁

蔣三肺痺鼻淵胸滿目痛便阻用辛潤自上宣下法

紫苑 杏仁 瓜萹皮 山梔

香豉 白菴仁

董 高年癯後內傷食物膈氣阻痺瀉攻腹痛二便至今

不通診脈右部弦搏渴思飲昔丹溪大小腸氣閉於

下每每開提肺竅內經謂肺主一身氣化天氣降斯雲

霧清而諸竅皆為通利若必以消食辛溫恐胃口再傷

臨證指南醫案 卷四 腸痺 哭

滋授癯症聖人以重氣不可破泄老年常遵守

紫苑 杏仁 瓜萹皮 鬱金

山梔 香豉 痰食停滯不消要法

又舌赤咽乾陽明津衰但痰多不饑不食小溲不爽大

便尚秘倣古人以九竅不利咸推胃中不和論治

炒半夏 竹茹 枳實 花粉

橘紅 姜汁 不切病

葉女 二便不通此腸痺常治在肺大便秘結至此遠路

紫苑 杏仁 萹皮 鬱金

黑山梔 桔梗 又威喜丸

某 痺癯肺病未經清理致熱邪透入管中迷有瘀血暴

下今診舌白不渴不能納食大便秘九日不通乃氣痺為

結宗丹溪上竅閉則下竅不出矣此在患者前迎

杏仁 枇杷葉 瓜萹皮 川鬱金

香豉 荳仁

又用手太陰藥即思納穀陽明氣痺無疑

紫苑 杏仁 枇杷葉 瓜萹皮

鬱金 黑山梔

腸痺本與便閉同類今另分一門者欲人知肺病治

臟下病治上之法也蓋腸痺之便閉較之燥屎堅結

臨證指南醫案 卷四 腸痺 哭

欲便不通者稍緩故先生但開降上焦肺氣上竅開

泄下竅自通矣若燥屎堅閉則有則三承氣潤腸充

通而湯及溫脾湯之類主之然余謂便閉之症傷寒

門中當急下之條無幾餘皆感六淫之邪病後而成

者為多斯時胃氣未復元氣已虛若遽用下藥於理

難進莫若外治之法為穩用蜜煎導法設不通虛虛

者間二三日再導余見有漸導漸去燥屎五六枚或

七八枚直至二旬以外第七次導去六十餘枚而愈

者此所謂下不嫌遲也學者不可忽諸 華玉堂

便閉

此症与有腸瘕一症不必另立三門

大便秘結

葉仁陽氣鬱勃，腑失傳導，納食中痞，大便秘結，調理少進

酒肉堅凝，以宣通腸胃中鬱熱可效

川連

蘆薈

萊菔子

炒山查

廣皮

川楝子

山梔

厚朴

姜汁

青皮

又熱鬱氣阻，三焦通法

杏仁

鬱金

厚朴

廣皮白

蘆薈

川楝子

李四診脈如前，服藥苦入陰，大便秘結，針刺一次，病無

臨證指南醫案卷四

五

增城可謂沉痾之疾，夫病着深遠，平素飲酒厚味，釀濕

聚熱，漬筋燥骨，既已經年不投，區區湯液，焉能通逐，議

以大苦寒堅陰燥濕方法，參入酒醴引導，亦同氣相求

之至理

黃柏

茅朮

生大黃

乾地龍

金毛狗脊

川連

草薢

晚蚕沙

川山甲

漢防已

仙露脾

海金沙

川獨活

北細辛

油松節

白茄根

黃酒燒酒各半浸七日

吳娘脈右如昨，左畧小動，肝風震動，裏氣大燥，更議鎮重

苦滑以通火腑，逾六時便通濁行，亦肝喜躁泄之一助

更衣丸一錢五分

濕熱少

江

脾宜升則健，胃宜降則和，蓋太陰之土得陽始運，陽

明陽土得陰自安，以脾喜剛燥，胃喜柔潤，仲景急下存

津，治在胃也，東垣大升陽氣，治在脾也，今能食不運，醫

家悉指脾弱是病，但診脈較諸冬春盛大兼弦，據經論

病，獨大獨小，斯為病脈，脾臟屬陰，胃腑屬陽，脈見弦大

非臟陰見病之象，久病少強，猶勉強支撐，兼以大便窒

塞，泄氣不爽，坐談片刻，噯氣頻頻，干素瘕瘕腸紅，未向

安適，此脈症全是胃氣不降，脾氣不通，腑失傳導，變化

之司，古人云，九竅不和，都屬胃病，六腑為病，以通為補

臨證指南醫案卷四

至

經年調攝不越參朮桂附而毫乏應效，不必再進湯藥

議，微丹溪小溫中丸，服至七日，俾三陰三陽一週，再議

治之義，小溫中丸二兩一錢

腎經

朱足麻痺廢大熱陰傷，內鬱大便不通，由懷抱不舒病

加先用滋腎丸四錢，鹽湯下四服

虛風

某莖朮守中瀉火瀉腹，小便少大便窒，腸氣亦滯，病久

延虛，補湯難進，議以每日開水送半錢丸一錢五分，以

通經腑之陽

吳有年二氣自虛，長夏大氣發泄，肝風鳴張，見症類中

投劑以來，諸恙皆減，所嫌旬日猶未更衣，仍是老人風

秘閱古人書以牛硫丸爲首方今當採取用之

半硫丸一錢開水送 三服

陳八用苦藥反十四日不大便腸中陽氣窒閉氣結聚成形非硝黃攻堅半硫丸一錢二分

又陽氣窒閉濁陰凝滯成氏稱爲陰結口甜支脹清濁未分每日用來復丹一錢五分

甘三脉左微弱右弦前議入夜反胃脘痛是濁陰上攻據說食粥不化早食至晚吐出仍是不變之形火土不生

不司腐熟溫藥一定至理第氣攻膈中究瀉不得其必腸間屈曲隱處無以旋轉機關風動則鳴議用牛硫丸

臨證指南醫案 卷四 便閉

周三減食過半發聲若彈丸脾胃病從勞傷治

當歸 麻仁 栝子仁 肉苁蓉 松子肉

某液耗胃弱火升便難三才加麥冬茯神川斛

天冬 地黃 人參 麥冬

茯神 川斛

潘肝血腎液久傷陽不潛伏頻年不愈傷延胃腑由陰

干及乎陽越人且畏凡肝體剛腎志燥問大便五六日

更衣小溲時間淋瀝尤非呆滯補瀉所宜

炒杞子 沙苑 天冬 桂酒拌白芍

茯苓 猪脊筋

又精血損傷五液必燥問六七日更衣以潤下用

後有遺精而陽乘巔頂法當潛陽固陰

龜甲心 生地 阿膠 鎖陽 川石斛

顧陽明脉大環跳尻骨筋掣而痛痛甚足筋皆縮大便秘

燥艱常秘此老年血枯內燥風生由春升上營下失落

養音喻氏上燥治肺下燥治肝蓋肝風木橫胃土必衰

陽明諸脉不主束筋骨流利機關也用微鹹微苦以入

陰方法

鮮生地八錢 阿膠三錢 天冬一錢 人中白一錢

川斛二錢 寒水石一錢

臨證指南醫案 卷四 便閉

又鹹苦治下入陰病樣已減當暮春萬花開放陽氣全

升於上內風亦屬陽化其下焦脂液悉受陽風引吸燥

病之來實基乎此高年生既少和陽必用陰藥與直

攻其病者有間矣

生地三錢 阿膠二錢 天冬一錢 麥冬一錢

栝子霜二錢 松子仁二錢

方九 虎潛丸去瑣陽加鹹從蓉猪脊筋丸

包 陽升風秘

栝子仁 當歸 紅花 桃仁

郁李仁 牛膝

吳液耗便艱進辛甘法		某飢飽勞碌中州受傷中脘痛兩脇脹噯泄氣寬靜則安大便艱		某高年下焦陰弱六腑之氣不利多痛不得大便乃幽門之病面白脉小不可峻攻擬五仁潤燥以代通幽是王道之治		臨證指南醫案 卷四 便閉 五	
杞子	栢子仁	歸身	茯神	沙苑	炒山查	五靈脂	桃仁
栢子仁	歸鬚	潤萊	韭菜	丹皮	丹皮	火麻仁	郁李仁
桃仁	白芍	牛膝	松子仁	當歸	白芍	桃仁	當歸
當歸	桃仁	紅花	郁李仁	冬葵子	當歸	火麻仁	郁李仁
栢子霜	蘇合	松子肉	水熬膏服五錢	金二湯飲下咽噯噯不已不飢不食大便乾結吞彈丸大	凡受納飲食全在胃口已經胃逆為病加以噯怒其肝木之氣貫膈犯胃斯病加劇况平昔常似有形骨梗脉得左部弦實血鬱血結甚肖進商辛潤方法	李六脉小弱形瘦腸風已久年來食少便難得噯噯泄氣自覺爽釋夫六府通即為補做東垣通幽意	當歸

桃仁		冬葵子		皂莢核		郁李仁	
大黃		降香		鬱金		李據云兩次服辛溫藥瘀濁隨溢出口此必熱瘀在肝	
連翹		滑石		通草		胃絡間故成臌脹大便阻塞不通蘆薈苦寒連其陰	
杏仁		滑石		通草		僅備更衣究竟未能却痰攻病有年久恙自當緩攻湯	
連翹		滑石		通草		藥盡添理難於用議以桃仁承氣湯為尤	
連翹		滑石		通草		某三左脉弦數濕短而痛導赤散加丹皮赤苓	
連翹		滑石		通草		某舌白身熱溺不利	
連翹		滑石		通草		臨證指南醫案 卷一 更閉 五	
連翹		滑石		通草		汪秋暑橫瀾由吸而入寒熱如瘧上咳痰下洞泄三焦	
連翹		滑石		通草		皆熱氣不化則小便不通擬為香薷散分秒滲熱必要	
連翹		滑石		通草		小洩通為主	
連翹		滑石		通草		藿香梗	
連翹		滑石		通草		厚朴	
連翹		滑石		通草		檀香汁	
連翹		滑石		通草		廣皮	
連翹		滑石		通草		木瓜	
連翹		滑石		通草		又昨進分消方熱勢畧減小便畧通所有濕熱穢濁混	
連翹		滑石		通草		處三焦非臆說矣其陰囊腫脹是濕熱甚而下墜入腑	
連翹		滑石		通草		與方書莖腫數症有間議河間法	
連翹		滑石		通草		飛滑石	
連翹		滑石		通草		石膏	
連翹		滑石		通草		寒水石	
連翹		滑石		通草		大杏仁	
連翹		滑石		通草		厚朴	
連翹		滑石		通草		猪苓	
連翹		滑石		通草		澤瀉	
連翹		滑石		通草		絲瓜草	

又 川連 淡黃芩 生白芍 枳實	六一散 廣皮白 生穀芽 暑熱不得解散。壅臃痞閉。宜通六腑。已現痙厥。非輕	小症 防已 茯苓皮 猪苓 通草	海金沙 苡仁 又 經腑壅熱不通。治在氣分。三焦之病何疑。	滑石 石膏 寒水石 猪苓 澤瀉 蚕沙湯煎藥	又 定三焦分消 臨證指南醫案 卷四 便閉 美	葶藶 杏仁 厚朴 大腹皮 猪苓 澤瀉 海金沙煎湯	陳六 昨用五苓通膀胱見效。治從氣分。繼而亂治。洩瀉不 通。急當通陽。	生乾姜 爆黑川附子 調入猪胆汁 孔六 膏梁形體充盛。壯年不覺。釀積既久。濕熱壅滯。致小	腸火腑失其變化傳導之司。二便閉阻。日盛。右脇壅阻 作疼。當以苦藥通調。必臻小效。	當歸鬚 紅花 夜服小溫中丸二錢 蘆薈 川棟子 郁李仁 炒桃仁
-----------------	---	--------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------------------

濕熱小 多鬱多怒。諸氣皆滯。腸胃不司流通。攻觸有形。乃肝	胆厥逆之氣。木必犯土。嘔咳惡心。致納食日減。飽進水 穀。小腸屈曲。不司變化。為二便不爽。所謂不足之中而	兼有餘。醫勿妄視。丹溪小溫中丸。每服二錢五分 邵三 氣攻腹脇。咽膈。得洩瀉洩氣乃安。此病由飢飽失和。 小腸屈曲之處。不為轉旋運行。二便皆致不爽。當用丹	溪小溫中丸 金 濕熱在經。腎不對症。遂令一身氣阻。邪勢散漫。壅腫 赤塊。初因濕熱為泄瀉。今則痙閉。致二便不通。但理肺	氣和可宣通。葦莖湯去瓜瓣加滑石通草西瓜翠衣 臨證指南醫案 卷四 便閉 丑	許 暑濕熱皆氣分先病。肺先受傷。氣少司降。致二便癃 閉。此滋血之燥無效。今雖小安。宜生津清養胃陰。	麥冬 知母 甜杏仁 白沙參 三角胡麻 顧四 腹滿堅實。足跗腫脹。二便皆不通利。因濕熱壅其	腑氣也。此非中虛。當以宣通為法。 黃芩 黃連 厚朴 枳實	青皮 藳子 丹皮 山梔皮 某 少腹脹痛。二便皆秘。玉壺丹	李三 能食知味。食已逾時。及服。小便不利。氣墜愈不肯出。 大便四日一通。治在小腸火腑。先用滋腎丸。每早服
---------------------------------	--	---	--	---	--	---	---------------------------------	---------------------------------	---

三錢淡鹽湯送

某腹中脹滿當通火腑更衣丸一錢六分

某脉動數舌乾白不飲飲水交夏臍下左右攻痛服米

飲痛緩逾時復痛六七日大便秘不通小溲甚少部位在

小腸屈曲有阻乃痛未便驟認重病凡六腑宜通通則

不痛以更衣丸二錢湯通火腑之壅結一服

王日來便難溺滿是下焦幽門氣鈍血燥議東垣通幽

意

臧莖蓉一兩 細生地一錢 當歸半 郁李仁二錢

栢子霜半 牛膝一錢

席詮指南醫案卷四 便閉

張九少腹微脹小便通利方安大便三四日一通而燥堅

殊其下焦諸病須推肝腎肺絡必究幽門二腸閱所服

藥是香砂六君以治脾不思腎惡燥耶

常歸 莖蓉 郁李仁 冬葵子 牛膝

小荷 茯苓 車前 蜜丸

張六脉左弦如刀六旬又六重陰衰五液涸小溲血水點

滴不寒少腹右脇聚瘕此屬腸閉非若少壯瀉火通利

可效 此湯藥也

栢子霜 小荷 鹿角霜 茯苓

常歸 莖蓉

氣血結

馬六脉實病久熱在血胸不寒小腹墜能食不渴二便

清少兩進苦辛宜臍病未能却此屬血病用通幽法

桃仁 紅花 郁李仁 製大黃

歸橫 小荷 桂枝木 肉桂子

薛燧大小便不爽古人每以通絡兼入奇經六旬有年又

屬久病進疎氣開臍無效議兩通下焦氣血方

川芎 醋炒 當歸 醋炒 生大黃 肉桂 三錢

川棟子 醋炒 青皮 醋炒 蓬朮 炭 三棱 炭 五

五靈脂 醋炒 炒黑杏仁 小香附 醋炒

右為末用青蔥白去根搗爛畧加清水淋瀝清汁泛

為丸每日進食時服三錢用紅棗五枚生艾葉三分

煎湯一杯服藥

王遠行勞動肝腎氣乏不司約束肛門痛墜若是腸症

初起必然寒熱排毒藥味苦辛寒燥下焦陰陽再傷二

便皆滿此為癰閉背寒煩渴少腹滿脹議通脈陰

老韭根 穿山甲 兩頭尖 川棟子

歸橫 小荷 橘紅 乳香

又驅濁泄肝僅僅泄氣二便似不得通倣東垣治王善

夫癰閉意滋腎丸三錢三服

又氣鬱腸中二便交阻清理腸胃壅熱

川連 黃柏 川棟子 吳萸 黑山梔
青皮 通草五錢海金沙五錢煎湯代水
又 苦辛已效當約其製

川連 黑山梔 丹皮 川棟子 吳萸
海金沙 飛滑石

按便閉症當與腸痺淋瀝門兼參其大便不通有血
液枯燥者則用養血潤燥若血燥風生則用辛甘炮
風或鹹苦入陰故三才五仁通幽虎潛等法所必用
者也若血液燥則氣亦滯致氣血結痺又當於養陰
潤燥中加行氣活血之品若火腑秘結宜苦滑重鎮

臨證指南醫案卷四便閉

辛

者用更衣丸以通之若老人陽衰風閉用半硫丸溫
潤以通之腑陽不行則用玉壺丹陽室陰凝清濁混
淆痞脹用來復丹若鬱熱阻氣則用苦寒泄熱辛以
開鬱或用三焦通法若濕熱傷氣阻遏經腑則理肺
氣以開降之此治大便秘之閉也小便秘者若小腸火
結則用導赤濕壅三焦則用河間分消膀胱氣化失
司則用五苓若濕鬱熱伏致小腸痺滯用小溫中丸
清熱燥濕若腎與膀胱陰分蓄積無陰則陽無
以化故用滋腎丸通下焦陰之滯以上諸法前
人雖皆論及然經案中還一分斷醫則不啻如耳提

臨證指南醫案卷四便閉

辛

面命使人得有所遵循矣至若膏粱飽暖釀成濕火
漬筋燥骨用大苦寒堅陰燥濕仍用酒醴引導又厥
陰熱閉為癰少腹脹滿用穢濁氣味之品直泄厥陰
之閉此皆發前人未發之秘學者尤當究心焉大凡
小便閉而大便通調者或係膀胱熱結或水源不清
濕症居多若大便閉而小便通調者或二腸氣滯或
津液不流燥症居多若二便俱閉當先通大便小溲
自利此其大畧也至若胃腑邪熱化燥便堅太陽熱
邪傳入膀胱之腑癰秘又當於仲景傷寒門下法中
承氣五苓等方酌而用之斯無遺義矣華岫雲

大便秘結本有承氣湯更衣等九下之外用猪胆蜜
煎潤之可謂無遺蘊矣然竟有收效不效者蓋因燥
糞未嘗不至肛門奈肛門如錢大燥糞如拳大縱使
竭力努掙而終不肯出下既不得出則上不能食而
告危矣余友教人先以胆汁或蜜煎導之俟糞既至
肛門令病者親手以中指染油探入肛門內將燥糞
漸漸挖碎而出中指須要有指甲者為妙竟有大便
一次燥糞挖作百餘塊而出者云此法輾轉授人
已救四五十人矣若患此證者切勿嫌穢而棄之

肺癰

上焦氣分癰熱

某 肺氣痺阻。面浮胸痞。寒熱。葦莖湯

某 肺痺。臥則喘急。痛映兩脇。舌色白。二便少。葦莖湯

曹 清邪在上。必用輕清。藥如苦寒治中下。上結更閉。

兜鈴 牛蒡子 梔榔 生甘草

杏仁 射干 麻黃

某 經熱津消。欬痰癰疽。

桂枝 桑葉 木防已 生石膏

杏仁 苡仁 花粉

臨證指南醫案 卷四 肺癰 室

又 渴飲欬甚。大便不調。餘熱纏於氣分。

紫苑 通草 石膏 花粉

木防已 苡仁 杏仁

陸 偏冷偏熱。肺氣不和。則上焦不肅。用微苦辛以宣通。

薄荷梗 桑葉 象貝 杏仁

沙參 黑山梔

某 溫邪形寒。腕痺。肺氣不通。治以苦辛。

杏仁 瓜蒌皮 鬱金 山梔

蘇梗 香豉

曹氏 肺痺。右肢麻。脇痛。咳逆喘急。不得卧。二便不利。脫中

痞脹得之憂愁思慮。所以肺臟受病。宜開手太陰為治。

紫苑 瓜蒌皮 杏仁 山梔

鬱金汁 枳殼汁

某 溫邪傳。肺氣痺。咳嗽。寒熱頭痛。開上焦為主。

活水蘆根 兩 大杏仁 三錢 連翹 半錢 通草 半錢

桑皮 一錢 梔榔 一錢

某 脫中稍爽。痰粘氣逆。腹脹。開肺理氣為主。

枇杷葉 厚朴 杏仁 滑石

茯苓皮 通草 白蔻仁 苡仁

王 脉搏勁。舌乾赤。噤氣。不展。狀如呃忒。緣頻吐胃傷諸

臨證指南醫案 卷四 肺癰 室

經之氣上逆。填胸聚脫。出入幾逆。周行脉痺。肌肉着席。

而痛轉加。平昔辛香燥藥不受。先議治肺經。以肺主一

身之氣化耳。

枇杷葉汁 杏仁 共煎湯冲枳殼枳實汁

某 天氣下降。則清明。地氣上升。則晦塞。上焦不行。下脫

不通。周身氣機皆阻。肺藥頗投。謂肺主一身之氣化也。

氣舒則開胃進食。不必見病治病。印定眼口。

枇杷葉 杏仁 紫苑 苡仁

桔梗 通草

風濕不解。邪結在肺。鼻竅乾焦。喘急腹滿。聲音不出。

此屬上痺急病之險篤者急急開其閉塞

葶藶大聚合葶藶湯

又風溫喘急是肺痺險症未及周歲戰勝痰熱故溫即內陷易結前用葶藶湯兩通太陰氣喘除其以輕藥入肺晝夜堅抱勿令懷胃為要用法

桑白皮 地骨皮 苡仁 冬瓜仁

蘆根汁 竹瀝

某風溫化熱上鬱肺氣咽喉阻塞風脫不通致呻吟呼吸不爽上下交阻逆而為厥乃閉塞之症病在上焦劫利消食發散苦降但表裏之治上氣仍阻久延慢驚莫

臨證指南醫案卷四 肺痺 室

可救療

蘆根 桑葉 滑石 梨皮

苡仁 通草

李肺象空懸氣窒聲音不出舌乃心苗熱灼則舌本不展以辟口肺微之病乃辛熱酒毒之痺主以輕揚為治乃無質之病

羚羊角 連翹心 竹葉心 野赤豆皮

川貝母 金銀花 又蘇服威喜丸二錢

唐脈小滿失血嘔逆之後腕中痞悶納穀腹脹小便短赤大傾七八日不遇此怒勞致氣分逆亂從肺痺主治

鮮枇杷葉 土瓜瓠皮 黑梔皮 鬱金

杏仁 杜蘇子 紫降香 鈞藤

又更衣丸

肺為呼吸之橐籥位居最高受職時上朝之清氣稟清肅之體性主乎降又為嬌臟不耐仰仗凡六淫之氣一有所著即能致病其性惡寒惡熱惡燥惡濕最畏火風邪著則失其清肅降令逐痺塞不通爽矣今先生立法因於風者則用薄荷桑葉牛蒡之屬兼寒則用麻黃杏仁之類若溫熱之邪壅遏而痺者則有羚羊射干連翹山梔兜鈴竹葉沙參象貝因濕則用

臨證指南醫案卷四 肺痺 室

通草滑石桑皮苡仁威喜丸因燥則梨皮蘆根枇杷葉紫苑開氣則薤皮香薷蘇子桔梗薏仁其葶藶湯葶藶大聚湯一切藥品總皆主乎輕浮不用重濁氣味是所謂微辛以開之微苦以降之適有合乎輕清嬌臟之治也肺主百脈為病最多就其配合之職肺而言肺與大腸為表裏又與膀胱通氣化故二便之通閉肺實有關係焉其他如肺痿肺癰咳嗽喘去音各自分門茲不重贅

胸痺

胸脇滿
不運

中陽困頓。濁陰凝滯。胃弱微背。午後為甚。即不嗜飲食。亦是陽傷。溫通陽氣。在所必施。

薤白 三錢 半夏 三錢 茯苓 五錢 乾姜 一錢 桂枝 五分

華四因勞。胸痺。陽傷。清氣不運。仲景每以辛滑微通其陽。

薤白 瓜蒌皮 茯苓 桂枝 生薑

王胃前附。骨板痛。甚至呼吸不通。必搥背稱緩。病來迅速。莫曉其因。議從仲景胸痺症。乃清陽失展。主以辛滑。

薤白 川桂枝 半夏 生薑

臨證指南醫案 卷四 胸痺

加白酒一杯同煎

謝衝氣至腕則痛。散漫高突。氣聚如瘕。由于過勞傷陽。

薤白 枳殼 茯苓 甘草

臨服沖入白酒一小杯

某五脉弦。胸脇。痺痛欲嘔。便結。此清陽失曠。氣機不降。久

延。伯成。時。格。

薤白 三錢 杏仁 三錢 半夏 三錢 姜汁 七分

厚朴 一錢 枳實 五分

徐六胸痺。因怒而致。痰氣凝結。

土瓜萸 半夏 薤白 桂枝

茯苓 生薑

王七氣逆自左升。胸脇阻痺。僅飲米湯。形質不得下咽。此屬胸痺。宗仲景法。瓜蒌薤白湯。

又脉沉如伏。痞脹格拒在腕脘上部。病人逆氣壅。自左覺熱。凡木鬱達之火。鬱發之。思在上宜吐之。

巴豆霜 一分 川貝母 三分 桔梗 二分 為細末服吐

後服涼水即止之

某六肺衛窒痺。胸膈痺痛。咳嗽痰粘。苦辛開鬱為主。當戒腥膻。

瓜蒌皮 炒桃仁 冬瓜子 苦桔梗

臨證指南醫案 卷四 胸痺

紫苑 川貝母

華暢氣微弱。胸痺。苔桂木甘湯。

某二脉弦。色鮮明。不酸。胸痺。大便不寒。此痰飲凝滯。清陽失曠。氣機不利。法當溫通。陽氣為主。

薤白 杏仁 茯苓 半夏

厚朴 姜汁

某八氣阻胸痛。

鮮枇杷葉 半夏 杏仁 桔梗

橘紅 姜汁

某脉沉短。氣咳甚。嘔吐飲食。便溏瀉。乃寒濕鬱滯。胸痺。

如悶無非清陽少旋 小半夏湯

王三始於胸痺六七年來發必嘔吐酸水黃濁七八日後

漸安自述病發秋月意謂新涼天降鬱折生陽甘味色

黃都因中焦脾胃主病倣內經辛以勝甘論

半夏 淡乾姜 杏仁 茯苓

厚朴 草薢 姜汁法九

某 痛久入血絡胸痺引痛

炒桃仁 延胡 川棟子 木防已

川桂枝 青葱管

胸痺與胸痞不同胸痞有暴寒鬱結於胸者有火鬱

臨證指南醫案 卷四 胸痺

突

於中者有寒熱互鬱者有氣實填胸而痞者有氣衰

而於虛痞者亦有肺胃津液枯涸日燥而痞者亦有

上焦濕濁瀰漫而痞者若夫胸痺則但因胸中陽虛

不運久而成痺內經未曾詳言惟金匱立方俱用辛

滑溫通所云寸口脈沉而遲陽微陰弦是知但有寒

症而無熱症矣先生宗之加減而治亦惟流連上焦

清陽為主莫與胸痞結胸噎膈痰食等症混治斯得

之矣 華玉堂

哮

王 受寒哮喘痰阻氣不能着枕

川桂枝 茯苓 淡乾姜 五味 錢同

杏仁 炙草 白芍 製麻黃 分

下九哮喘當暴涼而發診脈左大右平此新邪引動宿邪

議逐伏和飲氣 小青龍法

徐四宿哮喘廿年沉痾之病無奏效之藥起病由於驚憂受

寒大凡憂必傷肺寒入背俞內合肺系宿邪阻氣阻痰

病發喘不得卧譬之背小潛伏里間若不行動犯竊難

臨證指南醫案 卷四 哮

充

以強執雖治當於病發投以搜逐而病去必當養正今

中年諒無大害精神日衰病加劇矣 腎氣去桂枝

病發時尋麻大棗湯或皂莢丸

陳四哮喘不卧失血後胸中嬰爽 葶藶湯加葶藶大棗

某三哮喘久咳

桂枝木 杏仁 橘紅 厚朴

炒半夏 炒白芥子

哮喘

馬三宿哮喘頻發 真武丸 桂枝湯

朱一宿哮喘遇勞發 小青龍去麻辛加糖炒石膏

鄒七宿哮喘病久則氣泄汗出脾胃陽微痰飲留著有食

入泛嘔之狀夏三月熱傷正氣宜常進四君子湯以益氣不必攻逐痰飲

人參

茯苓

白朮

炙草

哮喘喘微有不同其症之輕重緩急亦微各有異蓋哮喘多有兼喘而喘有不兼哮喘者要知喘症之因若由外邪壅遏而致者邪散則喘亦止後不復發此喘症之實者也若因根本有虧腎虛氣逆濁陰上衝而喘者此不過一二日之間勢必危篤用藥亦難奏功此喘症之屬虛者也若夫哮喘亦由初感外邪失於表散邪伏於裏留於肺俞故頻發頻止淹纏歲月更臨證指南醫案

卷四 哮喘

主

有痰哮喘哮喘過食生冷及幼穉天哮諸症案雖未備閱先生之治法大概以溫通肺臟下攝腎真為主久發中虛又必補益中氣其辛散苦寒豁痰破氣之劑在所不用此可謂治病必求其本者矣此症若得明理鍼灸之醫按穴灸治尤易除根噫然則難遇其人

華玉堂

喘

肺鬱水
氣不降

伊 先寒後熱不餓不食細浮腫喘喘不能仰臥卧不安古人以先喘後脹治肺先脹後喘治脾今由氣分臍鬱以致水道阻塞大便滯泄仍不爽利其肺氣不降二腸交阻水穀蒸腐之濕橫趨脉絡腫由漸加豈亂醫可效粗述大畧與高明論證

肺位最高主氣為手太陰臟其臟體惡寒惡熱宜辛則通微苦則降若藥氣味重濁直入中下非宣肺方法矣故手經與足經大異當世不分手足經混淆者

臨證指南醫案

卷四 喘

主

特表及之

麻黃 苒仁 茯苓 杏仁 甘草

某 氣逆咳嗽喘促 小青龍去桂枝芍草加杏仁人參 某 氣逆咳嗽喘促

淡乾姜 人參 半夏 五味

茯苓 細辛

單 痰壅內攻所進水穀不化蒸變濕邪漬於經隧之間不能由腸而下膀胱不利渴上壅起肺氣不降喘滿不堪着枕三焦閉塞漸不可治議用中滿分消之法必得小便通利可以援救

<p>肝升飲 肝上逆</p> <p>通草 大腹皮 茯苓皮 澤瀉</p> <p>肝氣堅。動怒氣衝。喘急不得臥息。此肝升太過。肺降失職。兩足逆冷。入暮爲劇。議用仲景越婢法。</p> <p>又 痰之左胸。衝氣便喘。背上一線寒冷。宜貫兩足。明是肝逆挾支飲所致。議用金匱旋覆花湯法。</p>	<p>中氣虛</p> <p>旋覆花 青葱管 新絳 炒半夏</p> <p>勞煩咳嗽。是爲氣虛。蓋肺主氣。爲出氣之職。氣出太過。但泄不收。則散越多喘。是喘症之屬虛。故益肺氣藥。皆甘補土母以生子。若上氣散越已久。耳日諸般之阻。</p>	<p>諸症指南醫案 卷四 喘</p> <p>皆清陽不司轉旋之機。不必遽治。人參建中湯去姜。</p> <p>一長是寒食喘急多痰。此竟夜不食。胃中虛餒。陽氣交升中無彈壓。下焦陰傷。已延及胃。難以驟期霍然。</p>	<p>中氣虛</p> <p>淡熟附子 生淡乾姜 茯苓塊</p> <p>諸症 澤瀉</p> <p>色痿膝踈。陽虛體質。平昔喜進膏粱。上焦易壅。中宮少運。厚味凝聚。蒸痰。頻年咳嗽。但內傷失和。薄味自可。</p>	<p>諸症</p> <p>淡熟附子 生淡乾姜 茯苓塊</p> <p>諸症 澤瀉</p> <p>色痿膝踈。陽虛體質。平昔喜進膏粱。上焦易壅。中宮少運。厚味凝聚。蒸痰。頻年咳嗽。但內傷失和。薄味自可。</p>
--	--	--	---	--

<p>清肅。醫用皂莢搜攢。肺傷氣泄。噴涕不已。而沉痾膠濁。仍處胸背。募俞之間。玉屏風散之固衛。六君子湯之健脾理痰。多是守劑。不令宣通。獨小青龍湯。微飲以就太陽。初服喘緩。得宣通之意。夫太陽但開。所欠逆補陽明一段工夫。不得其闔。暫開復痺矣。且喘病之因。在肺爲實。在腎爲虛。此病細診色脈。是上實下虛。以致耳聾鳴响。治下之法。壯水源以熄內風。爲主。而酌次清陽少旋。濁痰阻氣妨食。於卧時。繼以清肅上中二焦。小劑守常。調理百日圖功。至於接應世務。自宜節省。勿在藥理中。</p>	<p>臨證指南醫案 卷四 喘</p>	<p>熟地 砂仁 麝肉 龜甲心 阿膠 牛膝</p>	<p>茯苓 遠志 五味 磁石 秋石</p>	<p>蜜丸早服 卧時另服威喜丸竹瀝姜汁泛丸</p>	<p>張三幼年哮喘已愈。上年夏令。勞倦內傷。致喘。候外感亂治。其氣泄越。哮喘首嘔。勞倦不復。遂致損怯。夫外感之喘治肺。內傷之喘治腎。以腎主納氣耳。</p> <p>加減八味丸每服二錢五分鹽湯下 六服</p> <p>胡六脈沉。短氣以息。身動即喘。此下元已虛。腎氣不爲收攝。痰飲隨地氣而升。有年陡然中斷。最慮</p> <p>熟地 淡附子 茯苓 車前</p>
---	--------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	---

遠志 補骨脂

吳氣不歸元喘急汗流足寒面赤中焦痞結先議通陽

熟附子 茯苓 生姜汁 生白芍

王九陰虛喘急用鎮固固納

熟地 萸肉 阿膠 滋養膠

山藥 茯神 湖蓮 芡實

翁四脈細尺垂形瘦食少身動即氣促喘急大凡出氣不
爽而喘為肺病客感居多今動則陽化由于陰弱失納
乃吸氣入而為喘腎病何解治法惟以收攝固真上病

臨證指南醫案 卷四 喘 吉

當實下焦宗腎氣方法意

熟地 萸肉 五味 補骨脂 胡桃肉

平膝 茯苓 山藥 車前子 蜜丸

沈二陰虛陽升氣不攝納為喘

熟地 萸肉 五味 海參膠 淡萊膠

茯神 山藥 芡實 湖蓮肉 紫胡桃

楊六老年久嗽身動即喘晨起喉舌乾燥夜則浸溺如淋
此腎液已枯氣散失納非病也衰也故治喘鮮效便難

乾涸宗腎惡燥以辛潤之

熟地 杞子 牛膝 巴戟肉

紫衣胡桃 青鹽 補骨脂

陳氏咳嗽則暴身熱汗出乃陰陽樞紐不固惟有收攝固
元一法

人參 炙草 五味 紫衣胡桃

熟地 萸肉炭 茯神 妙山藥

又攝固類應

人參 附子 五味 芡實 白朮

某瘡癰疥疾致氣喘咳出血痰固是肺癰熱氣今飲食
二便如常行動喘急與前喘更有分別緣高年下虛
少攝納元海不固氣逆上泛是腫脹之萌宜未雨綢繆

臨證指南醫案 卷四 喘 吉

六味丸加牛膝車前胡桃

孫聖八大年因冬溫內侵遂致痰嗽甚甚診脈大而動
搏紫色形枯汗泄吸音頗促似屬痰阻此乃元海根微
小司藏納神衰嚙語陽從汗出最有昏脫之變古人老
年痰嗽喘症都從脾腎主治今溫和擾攘上中二焦留
熱雖無溫之理然攝固下焦以治根本所謂陽根於陰
豈可不為講究 雜

熟地炭 胡桃肉 牛膝炭 車前子

雲茯苓 青鉛

某熟地在心上下不接中道陡發遍身麻木喘促尋胃

腎真不固肝風妄動久病湯藥無功。誓以玉真丸主之。喘症之因在肺為實。在腎為虛。先生揭此二語為提綱。其分別有四。大凡實之寒者必挾凝痰宿飲。上干阻氣。如小青龍。桂枝加朴杏之屬也。實而熱者不外乎蘊伏之邪。蒸痰化火。有麻杏甘膏。千金葶藶之治也。虛者有精傷氣脫之分。填精以濃厚之劑。必兼鎮攝。腎氣加沉香。都氣入青鉛。從陰從陽之異也。氣脫則根浮。吸傷元海。危亡可立而待。思草木之無情。剛柔所難濟。則又有人參河車五味石英之屬。急續元真。挽回頃刻補天之治。古所未及。更有中氣虛餒。土不生金。則用人參建中。案集三十法。比十九。其層次輕重之間。絲絲入寇。學者宜深玩而得焉。邵新甫

臨證指南醫案 卷四 喘 五

呃

肺氣鬱

某面冷頻呃。總在咽中不爽。此屬肺氣鬱。當開上焦之痹。蓋心胸背部須藉三焦陽氣展。乃能通達耳。

枇杷葉 炒川貝 鬱金 射干

白通草 香豉

陽虛

王脈微弱。面亮戴陽。呃逆腦痛。自利。先當建陽。下利。加以勞煩傷陽。高年宜反覆。乃欲脫之象。三焦俱有見症。議從中治。此症不治。

人參 附子 丁香皮 柿蒂

臨證指南醫案 卷四 呃 五

茯苓 生薑

陳食傷脾胃復病。呃逆發呃。下利。診兩脈微滑。是陽氣欲盡。渴陰衛逆。關方雖有姜附之理。陽反雜入芪歸。米

鈍牽制。後方代赭重墜。又混表藥。總屬不解。今事危至急。含理陽驅陰無別法。

人參 茯苓 丁香 柿蒂

炮附子 乾姜 吳萸

某脈歇止。汗出呃逆。大便溲。此勞倦積傷。胃中虛冷。胃

濁上干。此亦難治。

人參 茯苓 生淡乾姜 炒川椒

炒烏梅肉 釘頭代赭石

黃 豚小舌白氣逆呃忒畏寒微戰胃陽虛肝木上犯議
用鎮肝安胃理陽

人參 代赭石 丁香皮 茯苓

炒半夏 淡乾姜

又 舌白胎厚胃陽未醒厥逆渴陰上干爲呃仍用通法

人參 淡附子 丁香皮 淡乾姜 茯苓

又 照方加姜汁柿蒂

又 人參 炒川椒 附子 茯苓

淡乾姜 炒粳米

臨證指南醫案 卷四 呃 夫

呃逆一症古無是名其在內經本謂之噦因其呃呃連聲故今人以呃逆名之觀內經治噦之法以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已然歷考呃逆之症其因不一有胃中虛冷陰凝陽滯而爲呃者當用仲景橘皮湯生姜半夏湯有胃虛虛陽上逆病深聲噦者宜用仲景橘皮竹茹湯有中焦脾胃虛寒氣逆爲呃者宜理中湯加丁香或溫胃飲加丁香有下焦虛寒陽氣竭而爲呃者正以元陽無力易爲抑遏不能暢達而然宜用景岳歸氣飲或理陰煎加丁香有食滯而呃者宜加減二陳加山查烏

藥之屬或大和中飲如乾薑木香凡此諸法不足盡述其端其中有宜有不宜各宜隨症施治不可以此爲不易之法故先生謂肺氣鬱痺及陽虛渴陰上逆亦能爲呃每以開上焦之痺及理陽驅陰從中調治爲法可謂補前人之不逮丹溪謂呃逆屬于肝腎之陰虛者其氣必從臍下並衝上出于口斷續作聲必由相火炎上挾其衝氣乃能逆上爲呃用大補陰丸峻補真陰承制相火東垣謂陰火上衝而吸氣不得入胃脉反逆陰中代陽即爲呃用滋腎丸以瀉陰中伏熱二法均爲至當審證參用高明裁酌可也

臨證指南醫案 卷四 呃 肝乘 左

疸

沈九能食煩倦手足汗出目微黃常鼻衄大熱則消穀水

穀留濕濕甚生熱精微不主四布故作煩倦久則癰黃

穀疸當與猪肚丸蒼朮煨白朮重用苦參

張三述初病似瘧乃夏暑先伏秋涼繼發因不食食胃

腕氣滯生熱內蒸變現黃疸乃五疸中之穀疸也溺黃

便秘當宜腑濕熱但不宜下恐犯太陰變脹

綿茵陳 茯苓皮 白薏仁 枳實皮

杏仁 枳殼 花粉

臨證指南醫案卷四疸

汪三飲酒發黃目屬濕熱脈虛滿腹鳴不和病後形體瘦

減起居行動皆不久耐全是陽氣漸薄兼之思慮勞煩

致損議兩和脾胃之方戊己加當歸柴胡煨薑南棗

王右脇高突刺痛身而發黃不食不便瘀熱久聚恐結

癰瘍此症非大寒不可

大豆黃卷 木防己 金銀花 生牡蠣

飛滑石 苡仁

張脈沉濕熱在裏鬱蒸發黃中痞惡心便結溺赤三焦

病也苦辛寒主之

杏仁 石膏 牛夏 薑汁

山梔 黃柏 枳實汁

黃一身面目發黃不飢渴赤積素勞倦再感溫濕之氣

悞以風寒發散消導濕甚生熱所以致黃

連翹 山梔 通草 赤小豆

花粉 香豉 煎送保和丸三錢

劉三心下痛年餘屢發痛緩能食漸漸目黃溺赤此絡脈

中氣瘀滯熱與水穀之氣交蒸所致若攻之過急必變

脹滿此溫燥須忌議用河間金鈴子散合無擇穀芽枳

實小柴胡湯法

金鈴子 延胡 枳實 柴胡

臨證指南醫案卷四疸

半夏 黃芩 黑山梔 穀芽

蔣由黃芩為腹脹溫熱何疑法亦不為謬據述些少

小丸諒非河間子和方法溫下僅攻冷積不能驅除濕

熱仍謬若辛滲利每三日兼進潘川丸六七十粒

雞肫皮 海金沙 厚朴 大腹皮

猪苓 通草

張三夏秋疸病濕熱氣蒸而成治法必用氣分宜通自效

蓋濕中生熱外干時令內蘊水穀不化黃乃脾胃之色

失治則為臃脹今調治日減使通利主腑已通薄味自

可全功平昔攻苦思必傷心鬱必傷脾久坐必升太過

降不及不與痘症同例 歸脾丸

楊十夏

夏熱泄氣脾液外越為黃非濕熱之痘繼而不欲食

便澀用大牛夏湯通胃開飲已得寢食露降痰血乃氣

洩不收肅令淺不必以少壯熱症治順天之氣是老年

調理法

人參

炙草

生扁豆

山藥

茯神

苡仁

黃疸身黃目黃湯黃之謂也病以濕得之有陰有陽

在腑在臟陽黃之作濕從火化瘀熱在裏膽熱液泄

與胃之濁氣其併上不得越下不得泄黃蒸遇濕侵

臨證指南醫案

卷四 疸

全

於肺則身目俱黃熱流膀胱溺色為之變赤黃如橘

子色陽主明治在胃陰黃之作濕從寒水脾陽不能

化熱膽液為濕所阻漬於脾浸淫肌肉溢於皮膚色

如薑黃陰主晦治在脾傷寒發黃全圓黃疸立名雖

異治法多同有辨證三十五條出治一十二方先審

黃之必發不發在於小便之利與不利疸之易治難

治在於口之渴與不渴再察癰熱入胃之因或因外

併或因內發或因食穀或因酣酒或因勞色有隨經

蓄血入水黃汗上盛者一身盡熱下鬱者小便為難

又有表虛裏虛熱除作嘔火劫致黃知病有不一之

因故治有不索之法於是脈弦脇痛少陽未罷仍主

以和渴飲水漿陽明化燥急當瀉熱濕在上以辛散

以風勝濕在下以苦泄以淡滲如狂蓄血勢所必攻

汗後弱白自宜投補酒客多蘊熱先用清中加之分

利後必顧其脾陽女勞有微濁始以解毒繼之消癥

終當峻補腎陰表虛者實衛裏虛者建中入水火劫

以及治逆變證各立方論以為後學津梁若云寒濕

在裏之治陽明篇中惟見一則不出方論指人以寒

濕中求蓋脾本畏木而喜風燥制水而惡寒濕今陰

黃一證外不因於六淫內不傷於嗜慾惟寒性濕性

臨證指南醫案

卷四 疸

全

以卑臨之土須暴風日之陽純陰之病療以辛熱無

疑矣方雖不出法已顯然故不用多岐恐滋人惑耳

今考諸家之說丹溪云不必分五疸總是如蠶蟬相

似以為得治黃之扼要殊不知是言也以之混治陽

黃雖不中窾不致增劇以之治陰黃下咽則變何異

操刀一言之易遺誤後人惟謙甫羅氏具有卓識力

辨陰陽遵傷寒寒濕之指出黃陳四逆湯之治繼往

開來活人有術醫雖小道功亦茂焉喻嘉言陰黃一

證竟謂仲景方論亡失恍若無所循從不意其註傷

寒註金匱辨論數千言而獨於關鍵處明文反為之

蒙昧雖云智者一失亦未免會心之不達也總之羅
 氏可稱勤求士曰訓失氏失於小成目拙蓋言喻氏病
 在好發議論而已今觀葉氏黃疸之案寥寥數則而
 於案中所謂云夏秋疸濕熱氣蒸而成其陽黃之治
 了然於胸中案中又有治黃也而有非黃之論揣其
 是病必求虛實於是知其是病必辨陰陽如遇陰黃
 求治於先生者決不以治陽之法治陰而妖人長命
 也苟非師仲景而藐丹溪博覽羣賢之論而不陷於
 一偏之說者烏能及此名不浮於實理之得以久行
 也固宜

嘉式王

八

臨證指南醫案目

卷五

風

寒

風溫

溫熱

暑

濕

燥

疫


臨證指南醫案

卷五 目

癰痧疹癰

痰

痰飲



古異葉

桂天士

蘇子

錫山

鄧銘新甫

滋九全

風

某二風

蘇梗一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

厚朴一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

某二風

某二風

淡豆豉一錢

蘇梗一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

連翹一錢

通草一錢

杏仁三錢

桔梗一錢

連翹一錢

通草一錢

滑石三錢

能兼暑與火暑亦不兼寒濕不兼燥燥不兼濕火不

兼寒由此觀之病之因乎風而起者自多也然風能

兼寒寒不兼風何以辨之如隆冬嚴寒之時即密室

重帷之中人若裸體而臥必犯傷寒之病此本無風

氣侵入乃但傷於寒而不兼風者也風能兼寒者因

風中本有寒氣蓋與為風風之性本寒即與卦之初

爻屬陰是也因風能流動鼓盪其用屬陽是合乎巽

之二爻三爻皆陽爻也如炎歔溽暑之時若使數人

擲一人其人必致汗孔閉頭痛惡寒骨節疼痛等傷寒

之病作矣斯時天地間固毫無一些寒氣實因所擲

之風風中却有寒氣故令人受之寒疾頗作此乃因

傷風而兼傷寒者也故有但傷寒而不傷風之症亦

有因傷風而致兼傷寒之症又有但傷風而不傷寒

之症有因傷風而或兼風溫風濕風燥風火等症更

有暑溼燥火四氣各自致傷而絕不兼風之症故柯

韻伯所註傷寒云傷風之重者即屬傷寒亦有無汗

脈緊骨節疼痛諸症此柯氏之書所以能獨開仲景生

面也至仲景所著傷寒書本以寒為主因風能兼寒

故以風陪說互相發明耳學者看書不可不知此理

若夫臟腑一切內外諸風各有現症具載內經尤當

許老華訓

臨證指南醫案

卷五 風

寒

某客邪外侵頭脹當用辛散

蘇梗 杏仁 桔梗 桑皮

橘紅 連翹

某寒熱頭痛胸悶

淡豆豉 嫩蘇梗 杏仁 枳殼

厚朴 枳殼

某五復受寒邪背寒頭痛鼻塞桂枝湯加杏仁

某九時邪外襲衛痺發熱頭痛先散表邪

臨證指南醫案

卷五 寒

淡豆豉 蘇梗 杏仁 厚朴

木防已 茯苓皮

楊四太陽脉行由背抵腰外來風寒先傷陽經雲霧目下

及上經氣逆而病發致嘔痰涎頭痛小渡數行病解勝

脫氣通斯逆者轉順矣當通太陽之裡用五苓散倘外

感病發再議

某二勞傷陽氣形寒身熱頭疼胸悶身痛

杏仁 三錢 川桂枝 八分 生薑 錢一 厚朴 一錢

廣皮 一錢 茯苓皮 三錢

傷寒症仲景立法於前諸賢註釋於後先生雖大資

顯敏若擬其治法恐亦不能出仲景範圍其所以異
 於庸醫者在乎能辨症耳不以冬溫春溫風溫溫熱
 濕溫伏暑內傷勞倦瘟疫等症誤認為傷寒其治溫
 熱暑濕諸症專辨邪之在衛在營或傷氣分或傷血
 分更專究三焦故能述前人溫邪忌汗濕家忌汗當
 用手經之方不必用足經之藥等明訓垂示後人此
 乃先生獨擅見長之處也若夫傷寒之書自成無已
 註解以後凡註疏者不啻數百家其尤著者如嘉言
 三書景岳書傷寒三註四註等篇近有柯韻伯來蘇
 集傷寒論翼方翼王晉三古方選註中所解一百十
 三方諸家析疑辨義處雖稍有異同然皆或登仲景
 之堂或造仲景之室者業醫者當日置案頭潛心參
 究庶乎臨症可無誤矣華岫雲
 傷寒一症內經云熱病者皆傷寒之類也又曰凡病
 傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為
 病暑又曰冬傷於寒春必病溫其症有六經相傳併
 病合病兩感直中難經又言傷寒有五有中風有傷
 寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同再加以六
 淫之邪有隨時互相兼感而發之病且其一切現症
 則又皆有頭痛發熱或有汗無汗或惡風惡寒不食

倦臥煩渴等則又大略相同故其症愈多其理愈晦
 母怪乎醫者臨症時不能灼然分辨即其所讀之書
 前人亦竝無至當不易之論將靈素難經之言及一
 切外感之症遂一分晰辨明使人有所遵循故千百
 年來欲求一鑒垣之士察六淫之邪毫不紊亂者竟
 未見其人幸賴有仲景之書以六經分病治以汗吐
 下和寒溫諸法故古人云仲景之法不但治傷寒苟
 能悉明其理即治一切六氣之病與諸雜症皆可融
 會貫通無所不宜此誠屬高論固深知仲景者也然
 余謂六淫之邪頭緒甚繁其理甚奧即彙集河間東
 垣丹溪及前賢諸法而治之猶慮未能兼括盡善
 若沾沾焉必欲但拘仲景之法而施治此乃見聞不
 廣膠柱鼓瑟不知變通者矣今觀葉氏之書傷寒之
 法固屬無多然其辨明冬溫春溫風溫溫熱濕溫之
 治實超越前人以此羽翼仲景差可嘉惠後學觀者
 幸毋忽諸華玉堂

風溫

風溫傷

僧二 近日風溫上受。寸口脈獨大。肺受熱灼。聲出不揚。先

與辛涼清上。當薄味調養旬日。

牛蒡子 薄荷 象貝母 杏仁

冬桑葉 大沙參 南花粉 黑山梔皮

楊 脈左實大。頭目如蒙。清痰不爽。此風溫仍在上焦。擬
升降法。

乾荷葉 薄荷 象貝 連翹

鈎藤 生石膏末

臨證指南醫案

卷五 風溫

七

某 風溫從上而入。風屬陽。溫化熱。上焦近肺。肺氣不得
舒轉。周行氣阻。致身痛腕悶。不飢。宜微苦以清降。微辛
以宣通。醫謂六經。輒投羌防。泄陽氣。劫胃汁。溫邪忌冷。
何違忘之。

杏仁 香豉 鬱金 山梔

瓜蒌皮 蜜炒橘紅

葉 風溫入肺。肺氣不通。熱漸內鬱。如舌苔。頭脹咳嗽。發
疹。心中懊惱。腕中痞滿。猶是氣不舒展。邪欲結痺。宿有
痰飲。不欲飲水。議梔豉合涼膈方法。

山梔皮 豆豉 杏仁 黃芩

瓜蒌皮 枳實汁

郭 風溫入肺。氣不肯降。形寒內熱。胸痞皆膈鬱之象。辛

涼佐以微苦。手太陰主治。

黑山梔 香豉 杏仁 桑葉

瓜蒌皮 鬱金

秦 六 體質血虛。風溫上受。滋清不應。氣分燥也。議清其上。

石膏 生甘草 薄荷 桑葉

杏仁 連翹

又 照前方去連翹薄荷。加陳萸皮。鬱金。梔皮。

某 風火上鬱。耳後結核。目眶痛。

臨證指南醫案

卷五 風溫

八

薄荷 牛蒡子 前胡 象貝
連翹 黑梔皮 赤芍 生甘草
某 風溫熱伏。更劫其陰。日輕夜重。煩擾不寧。

生地 阿膠 麥冬 白芍

炙草 蕤藥

馬 三 風溫熱灼之後。津液未復。陽明脈絡不旺。骨酸背楚。

治以和補。

生黃芪 鮮生地 北沙參 玉竹

麥冬 歸身 蜜丸

某 陰虛風溫。氣從左升。桂枝湯加花粉杏仁。

風爲天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩陽薰灼。先傷上焦。種種變幻情狀。不外乎三陰爲病。數頭脹。汗出。身熱。咳嗽。必然並見。當與辛涼輕劑。清解爲先。大忌辛溫。消散。劫燥清津。太陰無肅化之權。救逆則有蔗汁。蘆根。玉竹。門冬之類也。若寒沉降。損傷胃口。陽明頓失。循序之司。救逆則有復脈建中之類。大凡此症。驟變則爲痙厥。緩變則爲虛勞。其主治之方。總以甘藥爲要。或兼寒或兼溫。在人適變可也。鄒新甫

溫熱

溫邪入肺

某十一脈數暮熱。頭痛。腰疼。口渴。此屬溫邪。

連翹

淡豆豉

炒黃芩

黑山梔

杏仁

枳殼

某溫邪化熱。肺癰喘急。消渴。胸滿。便溺不爽。肺與大腸

見症

淡黃芩

知母

鮮生地

阿膠

天冬

花粉

謝積勞傷陽。衛疎。溫邪上受。內入乎肺。肺主周身之氣。

臨證指南醫案

卷五 溫熱

十一

氣窒不化。外寒似戰慄。其溫邪內鬱。必從熱化。今氣短

胸滿。病邪在上。大便秘結。出稀水。肺與大腸表裏相應。亦

由熱迫下泄耳。用辛涼輕劑爲穩。

杏仁

桔梗

香豉

橘紅

枳殼

薄荷

連翹

茯苓

龔櫻微吸入溫邪。釀爲肺脹危症。

蘆根

桃仁

苡仁

冬瓜子

施久患虛損。原寢食安舒。自服陰柔麻補。不但減食不

寐。腕中常悶。渴欲飲涼。此口鼻吸入溫邪。先下於肺。機

補助邪愈熾。氣機阻滯。弱質不敢開泄。援引輕揚肅上。

津傷		溫邪劫	
兼以威喜丸淡以和氣。上焦得行。可進養胃法。		王 溫邪發熱。津傷。以糜氣穢。	
白沙參 苡仁 天花粉 桑葉		鬱金 兼服威喜丸	
捲心竹葉 嘉定花粉 知母 麥冬		金石斛 連翹 宜加氣分藥	
某 春溫身熱。六日不解。邪陷劫津。舌絳。骨節痛。以甘寒熄邪。		竹葉心 知母 花粉 滑石	
生甘草 梨皮		臨證指南醫案 卷五 溫熱 十一	
丁 口鼻吸入熱穢。肺先受邪。氣痺不主宣通。其邪熱由中及於募原。布散營衛。遂為寒熱。既為邪踞。自然痞悶。不飢。雖邪輕未為深害。留連不已。執蒸形消。所謂病傷漸至於損而後已。 桂枝白虎湯		又 氣分之熱稍平。日久胃津消乏。不飢不欲納食。大忌香燥破氣之藥。以景岳玉女煎多進可效。忌食辛辣肥膩自安。 竹葉石膏湯加鮮枸杞根皮	
楊 伏邪發熱。煩渴。知飢無寐。乃胃津受傷所致。擬進竹葉石膏湯加花粉		葉 熱傷氣分。用甘寒方。 白虎湯加竹葉	

營熱入心		溫邪	
某 右脈未和。熱多口渴。若再劫胃汁。怕有脫痞不飢之事。當清熱生津。仍佐理痰。俟邪減便可再商。		麥冬 人參 石膏 知母	
梗米 竹葉 半夏		葉 仲景云。陰氣先傷。陽氣獨發。不寒痺熱。令人消燦。肌肉條例下不註方。但以飲食消息之。後賢謂甘寒生津。解煩熱是矣。今脈數舌紫渴飲。氣分熱邪未去。漸次轉入血分。斯甘寒清氣熱中。必佐存陰。為法中之法。	
生地 石膏 生甘草 知母		梗米 白芍 竹葉心	
臨證指南醫案 卷五 溫熱 十二		毛 十六溫邪熱入營中。心熱悶。脇肋痛。平素痰火。與邪膠結。致米飲下咽皆脹。老年五液已涸。忌汗忌下。	
生地 麥冬 杏仁 鬱金汁		炒川貝 橘紅	
馬 少陰伏邪。津液不騰。喉燥舌黑。不喜飲水。法當清解血中伏氣。莫使液涸。		犀角 生地 丹皮 竹葉	
玄參 連翹		陳 婦熱入膈中。夜煩無寐。心悸怔忡。舌絳而乾。不嗜湯飲。乃營中之熱治在手經。	

犀角		鮮生地	黑玄參	連翹
石菖蒲		炒遠志		
又 鮮生地		玄參	天冬	麥冬
竹葉		茯神	金箔	
又 陽升風動治以鹹寒				
生地		阿膠	天冬	人參
川斛		茯神	麥冬	
張 營絡熱心震動復脈湯去薑桂參加白芍				
陸九高年熱病入九日舌燥煩渴謔語邪入心胞絡中深				
怕液洞神昏當滋清去邪兼進牛黃丸驅熱利竅				
臨證指南醫案 卷五 溫熱				
竹葉心		鮮生地	連翹心	玄參
犀角		石菖蒲		
胡 脈數舌赤耳聾胸悶素有痰火近日冬溫引動宿病				
加以勞復小溲不利議治胞絡之熱				
鮮生地		竹葉心	丹參	玄參
石菖蒲根		陳胆星		
顧 溫邪悞表劫津邪入胞絡內閉至寶丹				
王 吸入溫邪鼻通肺絡逆傳心胞絡中震動君主神明				
欲迷瀰漫之邪攻之不解清竅既蒙絡內亦痺幼科不				
解投以豁痰降火理氣毫無一効憶平脈篇清邪中上				

肺位最高既入胞絡氣血交阻逐穢利竅須藉芳香議		用局方至寶丹
施 溫邪如瘧陰氣先傷苦辛再傷陽及胃內風肆橫肢		
掣癱瘓邪閉心胞絡中痰潮神昏乃熱氣蒸灼無形無		
質此消痰消食清火竟走腸胃與病情隔靴搔癢速速		
與至寶丹三分冷開水調服若得神清再商治法		
顧 飲酒又能納穀是內風主乎消燦當春盡夏初陽氣		
弛張遂致偏中於右診脈左弦且堅肌腠隱約斑點面		
色光亮而赤舌胎灰黃其中必夾伏溫邪所怕內閉神		
昏治法以清絡宣竅勿以攻風劫痰扶助溫邪平定廓		
臨證指南醫案 卷五 溫熱		
清冀其帶病久延而已		
犀角		生地
鬱金		小青葉
又 目瞽舌縮神昏如醉邪入心胞絡中心神為蒙謂之		
內閉前案已經論及溫邪鬱蒸乃無形質而醫藥都是		
形質氣味正如隔靴搔癢近代喻嘉言議謂芳香透		
宣竅頗為合理絕症難挽天機用意耶盡人工		
至寶丹		四九勻四服涼開水調化
包 老年下虛卷溫上受痰潮昏謔舌絳黃苔面赤微瘧		
先清上焦		

天竺黃 金銀花 竹葉心 連翹 竹瀝

張 溫邪自裡而發。喉腫口渴。舌心灰滯。上焦熱蒙。最怕
竅閉昏煙。苦寒直降。攻其腸胃。與溫邪上替無涉。

連翹 黑梔皮 牛蒡子 杏仁 花粉

馬勃 瓜蔓皮 夏枯草 金汁 銀花露

張 遇歲內未得穀味精華。溫邪吸入。上焦先受。頭面頤
頰腫浮。邪與氣血混處。刀針破傷。經絡溫邪內閉。熱壅
蔓延三焦。昏寐痰瀾。舌刺卷縮。小溲點滴渾濁。熱氣結
錮在裏。但膏連茶梔之屬。藥性直降。竟由胃達腸。而熱
氣如烟如霧。原非形質可蕩可掃。故牛黃產自牛腹。原

臨證指南醫案

卷五

溫熱

五

從氣血而成。混處氣血之邪。藉此破其蘊結。是得效之
因由也。夫溫熱時癘。上行氣分。而漸及於血分。非如傷
寒足六經。順傳經絡者。大抵熱氣鴟張。必薰塞經絡內
竅。故昏躁皆裡竅之欲閉。欲宣內閉。須得芳香。氣血久
鬱。必致癰毒內攻。謹陳大意。參末。議用紫雪丹三分。微
溫開水調服。

褚 溫邪中自鼻始而入肺。為咳嗽。繼傳膈中。則噎血。

乃心營肺衛受邪。然邪在上焦。雖過阻氣。必聚為熱。痰
臭。陰濕是欲內閉。惜不以河間三焦立法。或謂傷寒主
六經。或謂肺經泄氣血。致熱無出路。胸突腹大。危期

至速矣。卽有對病藥餌。氣湧沸騰。勢必湧吐。餘為望
有濟。夫溫熱穢濁。填塞內竅。神識昏迷。脹悶欲絕者。須
以芳香宣竅。佐牛黃金箔深入臟絡。以搜錮閉之邪。今
危篤若此。百中圖一而已。紫雪丹

陳 溫邪逆傳膈中。熱痰蔽阻空竅。所進寒涼消導。徒攻
腸胃。毫無一效。痰乃熱薰津液所化。膈中乃空靈之所。
是用藥之最難。至寶丹。芳香通其神明之竅。以驅熱痰
之結。極是。但穉年受溫邪。最易陰虧津耗。必兼滋清以
理。久伏溫邪為正。

犀角 鮮生地 玄參 連翹心

臨證指南醫案

卷五

溫熱

六

丹皮 石膏蒲 化服至寶丹

某 濕為漸熱之氣。迷霧隔間。神機不發。三焦皆被邪侵。
豈是小恙。視其舌伸縮如強。痰涎粘着。內閉之象已見。
宣通膈中。望其少甦。無暇清至陰之熱。

至寶丹四分 石膏蒲金銀花湯送下

王 十夜熱早涼。熱退無汗。其熱從陰而來。故能食形瘦。脈
數左盛。兩月不解。治在血分

生鱉甲 青蒿 細生地 知母
丹皮 淡竹葉

許 溫邪已入血分。舌赤音低。神呆潮熱。卽發斑疹。亦是

血中熱邪。誤汗消食。必變昏厥。	犀角 細生地 玄參 丹皮	舊金 石菖蒲	張 舌絛裂紋。面色枯槁。全無淖澤。形象畏冷。心中熱焚。	邪深竟入厥陰。正氣已經虛極。勉擬仲景復脈湯。合乎	邪少虛多治法。復脈去人參生薑加甘蔗汁代水煎	又 熱病誤投表散消導。正氣受傷。神昏舌強。勢如燎原。	前進復脈法。略有轉機。宜遵前方。去桂加參。以扶正氣	為主。復脈湯去桂加人參甘蔗汁代水煎藥	又 進甘葉頗安。奈陰液已涸。舌強音絛。撫之乾板。較諸	臨證指南醫案 卷五 溫熱 七	已前齟肉映血有間。小便欲解掣痛。猶是陰氣欲絕。欲	寐昏沉。午間煩燥。熱深入陰之徵。未能穩許愈期也。	生白芍 炙甘草 阿膠 雞子黃	人參 生地 麥冬 炒麻仁	某 誤下熱陷於裏。而成結胸。所以身不大熱。但短氣胸	滿煩躁。此皆邪熱內蟄。擾亂神明。內閉之象。轉手重恙。	微仲景瀉心法。備參末議。再候明眼定裁。	川連 黃芩 半夏 炮炭乾薑	生薑 枳實	吳 神氣如迷。不飢不食。乃苦辛消導。發散劫奪。胃津所
-----------------	--------------	--------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------------	--------------	---------------------------	----------------------------	---------------------	---------------	-------	----------------------------

致。蓋溫邪手經為病。今世多以足六經主治。故致此。	細生地 竹葉心 麥冬 玄參心	連翹心 舊金	王 溫熱十三日。舌黃。心中悶痛。初病手經不當用足經	方。老人怕其液涸。甘寒隨胃却熱。	鮮生地 竹葉心 麥冬 舊金	川斛 菖蒲根	吳 近日天未寒。病虛氣不收。藏所感之邪。謂冬溫。參	苓益氣。薄荷桔梗杏仁泄氣。已屬背謬。加補骨脂溫瀉	腎臟。尤不通之極。自述夜寐深更。熱繁有汗。釋年陰不	臨證指南醫案 卷五 溫熱 八	充。陽易泄。論體質可却病。	桑葉 大沙參 玉竹 苡仁	生甘草 糯米湯煎藥	陳 冬溫入肺。膠痰化熱。因未納穀之身。不可重藥消痰	某 脈數右大。煩渴舌絛。溫邪氣血兩傷。與玉女煎	炒麥冬 桑葉 大沙參 甜杏仁 地骨皮	生地 竹葉 石膏 知母	丹皮 甘草	陳 三陰虛溫邪。甘寒清上。
--------------------------	----------------	--------	---------------------------	------------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------	---------------	--------------	-----------	---------------------------	-------------------------	--------------------	-------------	-------	---------------

勞倦感 風營衛 開陽藥	久傷勞倦 溫邪今月旬又六微咳有痰並不渴	復脈湯去參薑桂麻加青甘蔗漿	除熱為主辛散苦降非宜	陽氣亦泄致神倦欲眠舌赤黃胎口不知味當以育陰	汪勞倦更感溫邪陽升頭痛寒熱戰慄冷汗邪雖外達	加參	無以上供夜臥喉乾燥與復脈湯去薑桂參三服後可	張五勞倦內傷溫邪外受兩月不愈心中溫溫液液津液	生白芍 茯苓	臨證指南醫案 卷五 溫熱 尤	阿膠 生地 麥冬 生牡蠣	黃體虛溫邪內伏頭汗淋漓心腹窒塞上熱下冷舌白 煩渴春陽升舉為病猶是冬令少藏所致色脉泰視極 當謹慎	炙甘草 阿膠 生白芍 麥冬	炒生地 炒丹皮 青甘蔗汁煎	關陰虛挾溫邪寒熱不止雖不宜發散消食徒補亦屬 無益擬進復脈湯法	南沙參 甜杏仁 玉竹 冬桑葉	南沙參 生甘草	南沙參 生甘草	南沙參 生甘草
-------------------	------------------------	---------------	------------	-----------------------	-----------------------	----	-----------------------	------------------------	--------	----------------	--------------	---	---------------	---------------	-----------------------------------	----------------	---------	---------	---------

伏陰邪	席脈左數右緩弱陽根未固陰液漸涸舌赤微渴喘促 自利溲數晝刻自熱神煩囈語夫溫邪久伏少陰古人 立法全以育陰祛熱但今見症陰分固有伏邪真陽亦	連翹 牛蒡子 馬勃 射干	滑石 夏枯草 金銀花露 金汁	藥味重濁徒攻腸胃矣微東垣普濟消毒意	當先治邪况頭面咽喉結邪必辛涼輕劑以宣通若	焦先受氣血與熱膠固致清竅不利條有痺寒之變理	寒熱隨現是象診脉右搏數左小乃溫邪觸自口鼻上	林氏腹滿已久非是暴症近日面頰腫脹牙關緊閉先有 結上焦	金黑山梔	臨證指南醫案 卷五 溫熱 尤	不飽不飢舌邊赤中心黃餘邪未清食入變酸乃邪熱 不勝穀以溫胆和之半麵溫胆去甘草茯苓枳實加鬱	香鼓 黑山梔 半夏 枳實 廣皮白	陳熱病後不飢能食不寐此胃氣不和	黃芪 桂枝 白芍 炙甘草	牡蠣 南棗	飲寒來微微齒瘡此營衛二氣大衰恐延虛脫議固衛 陽冀寒熱得平	不病退胃	不病退胃	不病退胃
-----	---	--------------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	------	----------------	--	------------------	-----------------	--------------	-------	---------------------------------	------	------	------

不肯收納。議微劉河間。濁藥輕投。不爲上焦熱阻。下焦根蒂自立。冀其煩躁熱漸緩。

熟地炭 茯苓 淡從蓉 遠志炭

川石斛 五味子 飲子煎法

又 晚診陰中伏邪。時而升。目赤羞明。舌絳而渴。與育

陰清邪法

生地炭 玄參心 川石斛 炒麥冬

犀角 石膏蒲

又 脉左數。右軟。舌乾。苔白。小便淋瀝。吸氣喘促。煩汗。腎陰不承。心神熱灼。蒙閉。以三才湯。滋水制熱。三才加

臨證指南醫案 卷五 溫熱

主

扶神黃柏金箔 晚進周少川牛黃清心丸一服

又 昨黃昏後診脉。較諸早上。左手數疾頓減。惟尺中垂而仍動。鑒語不已。若有妄見。因思腎熱乘心。膈中微閉。神明爲蒙。自屬昏亂。隨進周少川牛黃丸一服。俾迷漫無質之熱。皆可泄降。服後頗安。辰刻診脉。濡小。形質大衰。舌色淡。下利稀水。夫救陰是要旨。讀仲景少陰下利篇。上下交征。關開欲微。必以堵寒陽明爲治。以陽明司閫。有開無闔。下焦之陰。仍從走泄矣。試用桃花湯。

人參 赤石脂 炮薑 白粳米

又 晚服照方加茯苓

又 脉左沉數。右小數。暮熱微汗。時煩。辰刻神清。虛邪仍留。陰分議用清補。

人參 茯苓 川石斛 炙甘草

黑稻豆皮 糯稻根鬚

又 金匱麥門冬湯

程二

溫熱病已傷少陰之陰。少壯陰未易復者。恰當夏令發泄。百益酒釀造有灰。辛熱劫陰泄氣。致形體頹然。藥難見效。每日餌雞距子生用。其湯飲用馬料豆湯。

冬傷於寒。春必病溫者。重在冬不藏精也。蓋煩勞多

慾之人。陰精久耗。入春則裏氣大泄。木火內燃。強陽

臨證指南醫案 卷五 溫熱

主

無制。燔灼之勢。直從裏發。始見必壯熱煩渴。口乾舌燥之候矣。故主治以存津液爲第一。黃芩湯堅陰。邪即此義也。再者。在內之溫邪欲發。在外之新邪又加。惡段湯最爲捷徑。表分可以肅清。至於因循貽誤。豈止一端。或因氣燥津枯。或致陰傷液涸。先生用挽救諸法。如人參白虎湯。黃連阿膠湯。玉女煎。復脉法。申明條例甚詳。餘則治瘧厥。以甘藥緩肝。昏閉用幽芳開竅。熱痰之溫膽。蓄血而論通瘀。井井有條。法具周到。邵新甫

暑

某 在大暑暑在地為土 大凡暑與熱乃地中之氣。吸受致病。亦必傷人。氣分

氣結則上焦不行。下脫不通。不飢不欲食。不大便。皆氣

分有阻。如天地不交。遂若否卦之義。然無形無質。所以

清之攻之不效。
杏仁 通草 象貝 枯藁皮

白蔻 鬱金汁

姚 奔走氣亂。復飲燒酒。酒氣辛熱。有升無降。肺氣膈鬱。上下不通。舌白消渴。氣結自胸及腹。滯礙自利不爽。周

臨證指南醫案 卷五 暑 三

身膚脹皆痛。汗大出。不解。無非暑濕熱氣。始由肺受。漫布三焦。羣醫消導苦藥。但攻腸胃。在上痞結。仍然譏淡。滲佐以微辛。合乎軒岐上病治上之方。

西瓜翠衣 川白通草 大豆黃卷 馬兜鈴

射干 苡仁

范 伏暑阻其氣分。煩渴咳喘喘急。二便不爽。宜治上焦。

杏仁 石膏 炒牛夏 黑梔皮

厚朴 竹茹

又 痰多。嘔。是暑鬱在上。醫家亂投。沉降所以無效。

石膏 杏仁 炒牛夏 鬱金

香豉 黑山梔

王 舌白煩渴。心中脹悶。熱邪內迫。氣分阻閉。當治肺經。倘逆傳膈中。必致昏厥。

杏仁 鬱金 滑石 黃芩

半夏 橘紅 枯藁皮

陳 四暑濕傷氣。肺先受病。諸氣皆痺。當午後陽升。煩喘更加。夫無形氣病。難以重藥推消。多見不效。

西瓜翠衣 活水蘆根 杏仁 苡仁

又 酒客中虛。重鎮攻消。清氣愈傷。夫暑邪皆着氣分。苟肺司清肅。則其邪不攻自罷。議仍以廓清為法。若雨露

臨證指南醫案 卷五 暑 音

某 陽津陰液重傷。餘熱淹留。不解。臨晚潮熱。舌色苔。頻飲救亢。陽焚燎。究未能解。渴形脈俱虛。難投白虎。請以仲景復脈一法。為邪少虛多。使少陰厥陰二臟之陰少。則真得胃關復振。因左關尺空。數不藏。非久延所宜耳。

人參 生地 阿膠 麥冬

炙草 桂枝 生薑 大棗

燥為乾澀不通之疾。內傷外感。宜分。外感者由於天時風熱過勝。或因深秋偏亢之邪。始必傷人。上焦氣分。其法以辛涼甘潤。肺胃為先。喻氏清燥救肺湯及

竹葉

杏仁

鬱金

滑石

香豉

山梔

張四三癰之邪在陰。未經向愈。春季洞利。不食。想春雨外

濕水穀內聚亦濕。即濕多成五泄之謂。治瀉僅泄經隧

濕邪。而裏之濕邪未驅。長夏吸受暑邪。上蒙清室。諸數

咳嗽耳聾。的係新邪。非得與宿病同治而治。

連翹

飛滑石

嫩竹葉

荷葉過汁

桑葉

杏仁

象貝

黑山梔

程三暑風必挾濕。濕必傷於氣分。斷癰瘡發。即濕邪內發

之徵。濕伏熱蘊。致氣壅塞咽底腕中。及至進穀無碍。二

臨證指南醫案

卷五

暑

便通調中下無病顯然

白通草

西瓜翠衣

活水蘆根

苡仁

吳連朝驟熱。必有暑氣內侵。頭熱目眩。吸短神迷。此正

虛邪痺。清補兩難。先與益元散三四錢。用嫩竹葉心二

錢煎湯涼用三四小杯。常用菜豆煎湯服

錢六暑必挾濕。二者皆傷氣分。從鼻吸而受。必先犯肺。乃

上焦病。治法以辛涼微苦。氣分上焦廓清則愈。惜乎當

以陶書六經看病。仍是與風寒先表後裏之藥致邪之

在上漫延結銅。四十餘日不解。非初受六經。不須再辨

其謬。經云。病自上受者治其上。援引經義以論治病。非

邪僻也。宗河間法。

杏仁

栝蒌皮

半夏

薑汁

白蔻仁

石膏

知母

竹瀝

秋露水煎

又脈神頗安。昨午發疹。先有寒戰。蓋此病起於濕熱。當

此無汗。肌腠氣窒。至膚間皮脫如楚。猶未能全泄其邪。

風疹再發。乃濕因戰慄為解。一月以來病魔而肌無育

澤。瘦削枯槁。古謂瘦人之病。慮涸其陰。陰液不充。補之

以味。然醒癯濁味。徒助上焦熱痰。無益培陰養液。况宿

滯未去。腸胃氣尚窒鈍。必淡薄調理。上氣清爽。痰熱不

至復聚。從來三時熱病。怕反覆於病後之復。當此九切

臨證指南醫案

卷五

暑

幸加意留神為上

玄參心

細生地

銀花

知母

生甘草

川貝

丹皮

橘紅

鹽水

竹瀝

此煎藥方。只用二劑可停。未大便秘時。用地冬汁膏。大

便後。可用三才湯。

池伏暑至深秋而發。頭痛煩渴少寐。

薄荷

淡竹葉

杏仁

連翹

黃芩

石膏

赤芍

木通

張病幾一月。猶然耳聾。神識不慧。嘔甚痰粘。呼吸喉間

有音。此非傷寒暴感。昔夏秋間暑熱氣內鬱。新涼引

動內伏之邪。當以輕劑清解三焦。奈何醫者不曉伏氣為病。但以發散消食寒涼清火為事。致胃汁消亡。真陰盡藥。舌邊赤。齒板燥。血邪氣。中。有內閉。壅凝厥逆之變。况右脈小數。左脈沉弱。無因在裏。當此陰傷日久。下之再犯亡陰之戒。從家。頭面都是清靈。既為邪蒙。精華氣血不肯流行。諸發夫司聰明矣。此輕清清解。斷斷然也。議清上焦氣血之壅為先。不投重劑苦寒。正做古人肥人之病。慮虛其陽耳。

連翹心 芝參 犀角 荷金 橘紅 蜜水
黑梔皮 川貝 鮮薑蒲根 加竹瀝

臨證指南醫案 卷五 暑

又 昨進清上焦法。諸症雖然畧減。而神識猶未清爽。總由病久陰液內耗。陽津外傷。聰明智慧之氣。俱被濁氣蒙蔽。所以子後午前稍清。他時皆不清。間以陽盛時。人身應之也。擬進局方至寶丹。藉其芳香。足以護陽逐邪。庶無內閉外脫之虞。

至寶丹每服三分。燈心嫩竹葉湯送。

又 脈右緩大。左弱。面垢色已減。痰嗽不爽。其由胃中津液。為辛散溫燥所傷。心營肺衛。悉受其病。然迫致神呆喘急耳聾。清陽阻痺。九竅不利。首方宜解氣血。繼方芳香通竅。無形令其轉旋。三焦自有專司。豈與俗醫但曉

邪滯攻擊而已。今已獲效。當與清養胃陰肺氣。體素豐盛。陽弱不耐沉寒。然深秋久交。天氣降。則上焦先受。試觀霜露下。垂草木皆改容色。人在氣交。法乎天地。兼參體質施治。

批和藥 妙黃川貝 橘紅 荷金
茯苓 苡仁

王 暑風熱氣入肺上熱痰喘嗽

石膏 連翹 竹葉 杏仁

桑皮 苡仁 橘紅 金甘草

又 肺氣壅遏身熱喘咳溺少 薑蘆合葶藶大棗湯

臨證指南醫案 卷五 暑

某二 暑風外襲肺衛氣阻。頭脹咳嗽。畏風微熱。防作肺癰。

絲瓜葉 大杏仁 香薷 桔梗

連翹 六一散

某 舌灰黃。頭痛咳逆。左肢掣痛。此煩勞陽動。暑風乘虛襲入。最慮風動中厥。

鮮荷葉 鮮蓮子 茯神 益元散
川貝母 橘紅 牛 錢

楊女 暑熱穢濁阻塞肺部。氣痺腹滿。宜以輕可去實。

西瓜翠衣 白通草 活水蘆根 生苡仁

臨好加入石膏末二錢

周二暑風熱神呆。

鮮荷葉 苦丁茶 滑石 木通

杏仁 厚朴 廣皮 白蔻仁

郁六暑熱頭脹咳嗽。

鮮荷葉 杏仁 射干 橘紅

桑皮 桔梗 木通 滑石

暑熱風
氣中痞
不遇

胡不飢不食不便此屬胃病乃暑熱傷氣所致味變酸濁熱痰聚腕苦辛自能泄降非無據也。

半夏瀉心湯去甘草乾薑加杏仁枳實

王身熱自汗腹痛大小便不利脉虛右大左小暑熱。

臨證指南醫案

卷五 暑

完

閉擬和表裏法

薄荷 枳實 黃芩 生白芍

竹葉心 黑山極 通草 甘草

程二穢熱由清竅入直犯募原初頭痛肌脹今不飢痞悶

以苦辛寒法

杏仁 半夏 厚朴 橘紅

竹葉 黃芩 滑石

又脉虛古赤消渴伏暑熱氣過衛入營治在手厥陰

竹葉 犀角 生地 麥冬 玄參

某六舌黃腕悶頭脹口渴渴煩此受穢氣所致

飛滑石三錢 白蔻仁七分 杏仁三錢 厚朴一錢

通草一錢 廣皮白一錢

某三穢暑吸入內結募原腕悶腹痛便泄不爽法宜芳香

逐穢以疏中焦為主

藿香梗 杏仁 厚朴 茯苓皮

半夏麴 廣皮 香附 麥芽

楊秋暑內燃煩渴喜得冷飲脉右小弱者暑傷氣分脉

必芤虛也此非結胸症宜辛寒以徹裏邪

石膏 知母 厚朴 杏仁

半夏 薑汁

臨證指南醫案

卷五 暑

三

沈三脉小色白氣分不足兼之胃弱少食開穢濁要刮痰

陰柔之藥妨胃助瀉常以豬肚丸養胃入夏令熱更傷

氣每食遠進胃脘四君子湯一劑恪守日服可杜夏季

客暑之侵生芎四君子湯長服豬肚丸

下二春夏必不酸肢痠麻木此體虛不耐陽氣升泄乃熱

傷氣分爲病宗東垣清暑益氣之議

人參 黃芪 白朮 甘草 麥冬

五味 青皮 陳皮 澤瀉 葛根

升麻 黃柏 歸身 神麴

任六冲年真陰未長逢長夏濕熱交迫斯氣泄煩倦當靜

坐涼爽過月涼殿至炎熱去乃却病之期與清暑益氣之屬 清暑益氣法

徐長夏濕熱令行。肢起脹痛煩倦不嗜食此體質本怯而濕與熱邪皆傷氣分。當以注夏同參用清暑益氣法

人參 白朮 廣皮 五味 麥冬

川連 黃柏 升麻 葛根 神麴

麥芽 穀芽 乾荷葉汁泛丸

暑勞傷

施四以煩勞傷陽交長夏發泄令加見症都是氣弱亦熱

傷氣也煩渴有痰先治其胃蓋陽明經脈主平束筋骨

以流利機關耳 金匱麥門冬湯

臨證指南醫案 卷五 暑

三

吳診肝胆獨大尺中動數先天素弱水虧木少滋榮

常春深長夏天地氣機泄越身中煩倦食減皆熱傷元

氣所致進以甘酸充養胃陰少俟秋肅天降培植下焦

固納為宜

炒麥冬 木瓜 北沙參 生甘草 烏梅

程暑久入營夜寐不安不飢微痞陰虛體質議理心用

鮮生地 玄參 川連 銀花

連翹 丹參

顧三陰虛遺熱小便淋瀝近日冒暑初起寒熱頭痛汗出

不解肌肉麻木手足牽強神昏如寐成瘧則輕瘧厥則

重

犀角 玄參 小生地 連翹心 竹葉心

石菖蒲 滑石 飽牛黃丸 二服

某初病伏暑傷於氣分微熱渴飲邪犯肺也失治邪張

逆走膈中遂舌絳縮小便忽閉鼻煤裂血口瘡耳聾神

呆由氣分之邪熱漫延於血分矣夫肺主衛心主營營

衛二氣晝夜行於經絡之間與邪相遇或涼或熱今則

入於絡津液被劫必漸昏寐所謂內閉外脫

鮮生地 連翹 玄參 犀角

石菖蒲 金銀花

臨證指南醫案 卷五 暑

三

注暑風久入營絡微熱忽涼議用玉女煎

玉女煎去麥冬牛膝加丹皮竹葉

金熱止津津沫出伏暑已解只因病體日久平素積勞

形色脉象虛衰深慮變病今飲食未進寤寐未寧議以

飲液補虛

人參 茯神 麥冬 五味

炒白芍 塊辰砂一兩綿裹同煎

又熱久胃津被劫不飢不便亦病後常事耳古人論病

必寢寢食今食未加餐難寐神識未清為病傷元氣而

熱病必消燼真陰議用三才湯意

暑濕 入劫陰		人參 天冬 生地 麥冬 五味子
顧		右脉空大左脉小孔寒熱麻痺腰痛公汗平素積勞
內虛秋暑客邪遂干臟陰致神迷心熱煩躁刮痧似乎		暑爽病不肯解此非經絡閉病頗慮無深劫陰而為癰
厥張司農集諸賢論暑病謂人肝則麻痺入腎為消渴		此其明徵議清陰分之邪仍以養正輔之
阿膠 小生地 麥冬 人參		
小川連 烏梅肉		
某 暑濕熱氣觸入上焦孔竅頭脹腕悶不飢腹痛惡心		延久不清有癰痢之憂醫者不明三焦治法混投發散
臨證指南醫案 卷五 暑		消食宜乎無效
杏仁 香豉 橘紅 黑山梔		
半夏 厚朴 滑石 黃芩		
張 舌白罩灰黑胸皖痞悶潮熱嘔惡煩渴汗出自利伏		暑內發三焦均受然清理上中為要
杏仁 滑石 黃芩 半夏 厚朴		
橘紅 黃連 鬱金 通草		
某 暑熱鬱遏頭脹腹痛口渴渴短當清三焦		
絲瓜葉 飛滑石 淡竹葉 茯苓皮		
厚朴 藿香 廣皮 通草		

何 暑濕皆客邪也原無質故初起頭脹胸滿但傷上焦		氣分耳酒家少穀胃氣素薄一派清淨難以辛散苦寒
胃再傷殘在上濕熱延及中下遂協熱自利三焦邪蒸		氣衝塞填胸躁亂口渴瓜菓下脫格拒相鬪此中宮大
傷况進熱飲客受其為胃陽殘燄而邪結內歸可知矣		考暑門時風煩躁清濁交亂者昔賢每以來復丹五六
十粒轉運清濁為先攻補難施之際望其效靈耳		來復丹
吳 目黃脫悶咽中不爽嘔逆寒少熱多暑濕客氣之傷		三焦不通非風寒之症
臨證指南醫案 卷五 暑		
大竹葉 黃芩 杏仁 滑石 陳皮白		
厚朴 半夏 薑汁		
又 暑濕熱皆氣也並釀清濕痰於胃遂口甜膩滯不飢		議以宣氣理痰
川貝母 栝實皮 杏仁 黑山梔 澤瀉		
另用二賢散		
某 診脈弦午後惡寒似熱不飢溺澀短赤暑熱炎蒸外		襲肺衛遊行三焦致氣分窒痺而然當用和法宜薄滋
味庶杜瘧患		
杏仁 香薷 木通 飛滑石		

茯苓

厚朴

白蔻仁

淡竹葉

又 照前方去香薷加半夏

楊入暑熱必挾濕。吸氣而受。先傷於上。故仲景傷寒先分

六經。河間溫熱須究三焦。大凡暑熱傷氣。濕者阻氣。肺

主一身周行之氣。位高為手太陰經。據述病樣。面赤足

冷上。脈沉。其為上焦受病。顯著。緣平素善飲。胃中濕

熱。久伏辛溫燥烈。不但肺病不合。而胃中濕熱。得燥熱

錮閉下。利稀水。即協熱下利。故黃連苦寒。每進必利甚

者。苦寒以勝其辛熱。藥味尚留於胃底也。然與初受之

肺邪無當。此石膏辛寒。辛先入肺。知母為味清涼。為肺

臨證指南醫案

卷五 暑

五

之持氣。然不明肺邪。徒曰生津。焉是至理。昔孫真人未

診先問最不快事。再據主家說及病起兩旬。從無汗泄

經云。暑當汗出。勿小氣分室。日久熱侵入血中。咯痰

帶血。舌紅赤。不甚渴飲。上焦不解。漫延中下。此皆急清

三焦。是第一章旨。故熱病之於熱。留絡而為遺毒。注腑

腸而為洞利。便為束手無策。再論濕乃重濁之邪。熱為

薰蒸之氣。熱處濕中。蒸滯之氣。上迫清竅。耳為失聰。不

與小陽耳聾同例。青蒿派柴胡一等。亦是少陽本藥。且

大病如大敵。選藥若選將。苟非慎重。鮮克有濟。議三焦

分清治從河間法 初三日

飛滑石

生石膏

寒水石

大杏仁

炒黃芩

川通草

瑩白金汁

金銀花露

又 暮診診脈後。腹胸肌腠。發現癰疹。氣分濕熱。原有暗

泄之機。早間所談。餘邪遺熱。必兼解毒。者為此。下午進

藥後。診脈較大。於早晨。神識亦如前。但舌赤中心甚乾

燥。身體捫之熱甚。於早間。此陰分亦被熱氣蒸傷。瘦人

慮其液涸。然痰咯不消。黃陰。藥無往而弗勝。議得早

進清膈一劑。而三焦熱穢之蓄。當用紫雪丹二三匙。藉

其芳香宣竅。逐穢斯錮。熱可解。濁痰不粘。繼此調理之

方。清營分。滋胃汁。始可瞻顧。其宿垢欲去。猶在旬日之

臨證指南醫案

卷五 暑

五

外古人謂下不嫌遲。非臆說也。紫雪丹一錢六分

知母 竹葉心 連翹心 炒川貝 竹瀝

犀角 玄參 金汁 銀花露

又 一劑後用

竹葉心 知母 葉豆皮 玄參

鮮生地 金銀花

又 一劑後去銀花。桑豆皮。加人參。麥冬。

又 初十申刻診經月時。邪脈形小。數小為病退。數為餘

熱。故皮膜癰。氣血有流行之義。思食欲餐。胃中有醒

豁之機。皆佳兆也。第舌赤而中心黃。苔熱。既久。胃津

陰液俱傷。致嘔物咽中苦阻。溺漫尿管痼痛。咯痰濃厚。		宿垢未下。若急遽攻奪。恐真陰更涸矣。此存陰為主。而		清肺兼之。故亂進食物。便是助熱。惟清淡之味。與病不		悖。自來熱病。最怕食復勞復。舉世共聞。非臆說也。		細生地 玄參心 知母 炒川貝		麥冬 地骨皮 銀花露 竹瀝		又 脉症如昨。仍議滋清陰分餘熱。佐清上脫熱痰。		照昨日方去地骨皮銀花露加鹽水炒橘紅		某 脉虛傷暑。頭重脫悶。跣瘵。		絲瓜葉 三 大杏仁 三 六一散 三 茯苓皮 三		臨證指南醫案 卷五 暑		漢防已 一錢 綿茵陳 一錢 細木通 一錢 白蔻仁 五分		某 中惡暑厥。蒼朮白虎湯加滑石		王 暑邪寒熱。舌白不渴。吐血。此名暑療重症。		西瓜翠衣 竹葉心 青荷葉汁 杏仁		飛滑石 苡仁		萬 暑邪不解。陷入厥陰。舌灰滑濕。心下板實。嘔惡吐蚘。		寒熱下利血水。最危之症。		川連 黃芩 乾薑 生白芍		川椒 烏梅 人參 枳實		江 暑邪深入厥陰。舌絳少腹堅滿。聲音不出。自利上下	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--	---------------	--	-------------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	-------------------------	--	-------------	--	-----------------------------	--	-----------------	--	------------------------	--	------------------	--	--------	--	-----------------------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	---------------------------	--

格拒危期至速。勉擬暑門酸苦泄熱。輔正驅邪一法。		黃連 淡乾薑 烏梅 生白芍		半夏 人參 枳實		某 勞傷挾暑。肺氣受戕。咳血口乾。先清暑熱。		鮮荷葉 白扁豆 大沙參 茯神 苡仁		朱 三三伏中。陰氣不生。陽氣不潛。其頭脹身痛。是暑邪初		受。暑濕熱必先傷氣分。故舌白口渴身痛。早晨清爽。午		夜煩蒸。狀如溫瘧。沐浴運動血絡。宿病得時邪而來。仲		景云。先治新病。後理宿病。是亦陰氣先傷。陽氣獨發也。		鮮生地 石膏 知母 玄參		臨證指南醫案 卷五 暑		連翹 竹葉心 荷葉汁		王 九雖是欬痰失血。然強能食。不知飢。口黃。肺熱。舌心黃。		已現暑熱客邪症象。此先宜清理肺胃。莫因久恙而投		脈補		杏仁 象貝母 鬱金 川通草		桑葉 石膏 橘紅 苡仁		又 晚服枇杷葉膏。早六味加阿膠麥冬		又 阿膠 雞子黃 小生地 麥冬		桑葉 炒黑丹皮		徐 勞傷挾暑。咳血不飢。	
-------------------------	--	---------------	--	----------	--	------------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------	--	--------------	--	-------------	--	------------	--	-------------------------------	--	-------------------------	--	----	--	---------------	--	-------------	--	-------------------	--	-----------------	--	---------	--	--------------	--

鮮荷葉汁 大沙參 生以仁 六一散

菜豆皮 杏仁 橘紅 白蔻仁

天之暑熱一動。地之濕濁自騰。人在蒸淫熱迫之中。若正氣設或有隙。則邪從口鼻吸入。氣分先阻。上焦清肅不行。輪化之機。失於常度。水穀之精微。亦蘊結而為濕也。人身一小天地。內外相應。故暑病必挾濕者。卽此義耳。前人有因動因靜之分。或傷或中之候。以及入心入肝為瘧為痢。中痧霍亂。暴厥卒死。種種傳變之原。各有精義可參。茲不重悉。想大江以南。地卑氣薄。濕勝熱蒸。當此時候。更須防患於先。昔李笠

臨證指南醫案 卷五 暑

完

翁記中。所謂使天只有三時。而無夏。則人之病也。必稀。此語最確。蓋暑濕之傷。驟者在當時為患。緩者於秋後為伏氣之疾。其候也。脉色必滯。口舌必膩。或有微寒。或單發熱。熱時脫居氣室。渴悶煩冤。每至午後則甚。入暮更劇。熱至天明。得汗則諸恙稍緩。日日如是。必要兩三候。外目減一日。方得全解。倘如元氣不支。或調理非法。不治者甚多。然是病比之傷寒。其勢覺緩比之瘧疾。寒熱又不分明。其變幻與傷寒無二。其愈期反覺纏綿。若表之汗不易做。攻之便易瀉瀉。過清則肢冷嘔惡。過燥則唇齒燥裂。每遇秋來最多。

臨證指南醫案 卷五 暑

早

是症求之古訓。不載者多。獨已任編名之曰秋時。應發感症似瘧。總當以感症之法治之。要知伏氣為病。四時皆有。但不比風寒之邪。一汗而解。溫熱之氣。投涼卽安。夫暑與濕。為熏蒸粘膩之邪也。最難驟愈。若治不中竅。暑熱從陽上薰。而傷陰化燥。濕邪從陰下沉。而傷陽變濁。以致神昏耳聾。舌乾齟血。脫痞嘔惡。洞泄肢冷。棘手之候。叢生。竟至潰敗莫救矣。參先生用意。宗劉河間三焦論立法。認明暑濕二氣。何者為重。再究其病。實在營氣何分。大凡六氣傷人。因人而化。陰虛者火旺。邪歸營分。為多。陽虛者濕勝。邪傷氣分為多。一則耐清。一則耐溫。臟性之陰陽。從此可知也。於是在上者以辛涼微苦。如竹葉連翹杏仁薄荷之類。在中者以苦辛宣通。如半夏瀉心之類。在下者以溫行寒性。質重開下。如桂苓甘露飲之類。此皆治三焦之大意也。或有所夾。又須通變。至於治氣分有寒溫之別。寒者宗諸白虎法。及天水散意。溫者從乎二陳湯。及正氣散法。理營分知清補之宜。清者如犀角地黃。加入心之品。補者有三才復脉等方。又如濕熱沉混之蒼朮石膏湯。氣血兩燔之玉女法。開閉逐穢與牛黃及至寶紫雪等劑。扶虛進參附。及兩儀諸

法隨其變幻審其陰陽運用之妙存乎心也
詞高明致正 御新甫

濕

濕阻上焦
肺不降

馮三 舌白頭脹身痛肢疼胸悶不食溺阻

飛滑石 杏仁 白蔻仁 大竹葉

炒半夏 白通草

王二 酒肉之濕助熱內蒸釀痰阻塞氣分不飢不食便溺

不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣化也

杏仁 栝蘂皮 白蔻仁 飛滑石

半夏 厚朴

臨證指南醫案卷五 濕

吳五 酒客濕勝變痰化火性不喜甜熱聚胃口犯肺氣逆

吐食上中濕熱主以淡滲佐以苦溫

大杏仁 金石斛 飛滑石 紫厚朴 活水蘆根

孔 心中熱不飢不寐且黃自利濕熱內伏

淡黃芩 連翹 炒杏仁 白通草

滑石 野赤豆皮

某九 濕溫阻於肺衛咽痛足跗痺痛當清上焦濕尤氣目

和

飛滑石 竹葉心 連翹 栝梗

射干 蘆根

<p>周 病起旬日。猶然頭脹。漸至耳聾。正如內經病能篇所云。因於濕。首如裹。此呃忒鼻衄。皆邪混氣之象。况舌色帶白。咽喉欲閉。邪阻上竅。空虛之所。諒非苦寒直入胃中。可以治病。病名濕溫。不能自解。即有昏瘡之變。醫莫泛稱時氣而已。</p>	<p>連翹 牛蒡子 銀花 馬勃</p>	<p>射干 金汁</p>	<p>時令濕熱之氣。觸自口鼻。由募原以走中道。遂致清肅不行。不飢不食。但溫乃化熱之漸。致機數不為靈動。與形質滯濁有別。此清熱開鬱。必佐芳香。以逐穢為法。</p>	<p>臨證指南醫案 卷五 濕</p>	<p>枳殼 枳實 降香木</p>	<p>枳殼 枳實 降香木</p>	<p>枳殼 枳實 降香木</p>	<p>枳殼 枳實 降香木</p>	<p>枳殼 枳實 降香木</p>	<p>枳殼 枳實 降香木</p>
--	---------------------	--------------	--	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<p>鮮省頭草 知母 川斛 苡仁 妙麥冬</p>	<p>犀角 連翹心 玄參 石菖蒲</p>	<p>金銀花 野赤豆皮 煎送至寶丹</p>	<p>人參 生乾薑 黃芩 川連</p>	<p>枳實 生白芍</p>	<p>張六 此濕蘊氣中。足太陰之氣。不為鼓動運行。試以痞結胸滿。仲景列於太陰篇中。槩可推求其理矣。</p>	<p>半夏 醋炒 茯苓 川連 厚朴 通草湯煎</p>	<p>茅朮 厚朴 茯苓 澤瀉</p>	<p>豬苓 秦皮</p>	<p>又 五苓散 又 二木膏</p>	<p>范 四肢乍冷。自利未已。日黃稍退。而神倦不語。濕邪內伏。足太陰之氣。不運。經言脾竅在舌。邪滯竅必少靈。以致語言欲蹇。必當分利。佐辛香以默運坤陽。是太陰裏</p>
--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---	----------------------------	--------------------	--------------	--------------------	---

症之法。

生於木

錢三

厚朴 五分

茯苓 三錢

草薢仁 七分

木瓜 五分

澤瀉 五分

又 身體稍轉動。語蹇神呆。猶是氣機未為靈轉。色脉

非是有餘。而濕為陰邪。不徒偏寒偏熱已也。

生於木

茯苓

苡仁

鬱金

炒遠志

石菖蒲汁

又 脾胃不醒。皆從前濕蒸之累。氣升咳痰。參藥緩進。

炒黃川貝 茯苓

苡仁

鬱金

地骨皮

淡竹葉

臨證指南醫案

卷五 濕

望

又 濕滯於中。氣蒸於上。失降不得寐。口數白丹。仍不渴。

飲開上。得佐中。運利腸間。亦是宣通三焦也。

生於木 五錢

苡仁 三錢

寒水石 一錢

桔梗 七分

滑苓 錢

澤瀉 一錢

廣皮白 一錢

牛

曹三 腸胃屬腑。濕久生熱。氣阻不爽。仍以通為法。

生於木

川黃連

厚朴

淡生薑渣

廣皮白

酒煨大黃

水法九服三錢

李四 脉小滿。痰多上湧。食入脘阻。大便不爽。上秋至今夏。

不愈。自述飢飽失和。曾病黃疸。以濕傷氣。痺主治。

大杏仁

苡仁

半夏

薑汁

茯苓

橘紅

鬱金

香豉

俞五 酒濕鬱傷。脘中食阻而痛。治以辛苦寒。

小川連

半夏

薑汁

枳實

茯苓

香豉

某五 舌白目黃。口渴溺赤。脉象呆鈍。此屬濕鬱。

綿茵陳

生白朮

寒水石

飛滑石

桂枝木

茯苓皮

大猪苓

澤瀉

李 酒客中虛。粵地潮濕。長夏涉水。外受之濕。下起。水穀

不運。中焦之濕。內聚。治法不以宣通經腑。致濕阻氣分。

鬱而為熱。自脾胃不主運通。水濕橫瀆於脈絡之間。二

臨證指南醫案

卷五 濕

異

便不爽。濕熱滿氣。交相混亂。前輩治中滿。必曰分消。此

分字。明明謂分解之義。但亂藥既多。不能去病。就是脾

胃受傷於藥。蔓延腿肢。腫極且痛。病深路遠。藥必從喉

入胃。然後四布。病所未得藥益。清陽先已受傷。此湯藥

難以進商也。議用丹溪小溫中丸三錢。端以疎利腸中。

取其不致流散諸經。亦一理也。小溫中丸八服。

某三 陽微體質。濕痰內聚。便溺脫悶。肌麻舌乾。清理濕邪。

氣機升降自安。

金石斛

茯苓

半夏

廣皮白

鈎藤

白茯苓

張 脉右緩濕着阻氣

厚朴 廣皮 煨草菓 炒查肉

藿香梗 炒神麴

某二 不耐煩勞是本虛。脘悶便泄屬濕邪。先治濕。後治本。

藿香梗 廣皮 茯苓 大腹皮

厚朴 穀芽

陸 濕滯如痞

山茵陳 草果仁 茯苓皮 犬腹皮絨

厚朴 廣皮 猪苓 澤瀉

汪三 舌黃脘悶。穢濕內着。氣機不宣。如久釀蒸。必化熱氣。

臨證指南醫案 卷五 濕

即有身熱之累。

杏仁 藿香 茯苓皮 滑石

厚朴 廣皮白

某 閱病源。皆濕熱內停之象。當走濕清熱為主。至於藥

酒。雖濕助熱。尤當永戒。

生白朮 赤小豆皮 綿茵陳 黃柏

茯苓 澤瀉

某 脉濡。頭脹。胸身重着而痛。寒熱微嘔。此濕阻氣分。

厚朴 杏仁 白蔻仁 木通

茯苓皮 大腹皮 滑石 竹葉

某 長夏外受暑濕。與水穀之氣相併。上焦不行。下脘不

通。氣阻。熱從濕下。蒸逼不飢不食。目黃舌白。氣分之結。

厚朴 杏仁 廣皮 茯苓

半夏 薑汁

某 脉緩。身痛。汗出熱解。繼而復熱。此水穀之氣不運。濕

復阻氣。鬱而成病。仍議宣通氣分。熱自濕中而來。徒進

清熱不應。

黃芩 滑石 茯苓皮 大腹皮

白蔻仁 通草 猪苓

方四 形質頽然。脉遲小澹。不食不寐。腹痛。大便秘。瘕。平昔

臨證指南醫案 卷五 濕

嗜酒。少穀中虛。濕結陽傷。寒濕濁陰。鳩聚為痛。

炒黑生附子 炒黑川椒 生淡乾薑 葱白

調入猪胆汁一枚

王二 冷濕損陽。經絡拘束。形寒。酒客少穀。勞力所致。

桂枝 淡乾薑 熟附子 生白朮

莫五 今年夏四月。寒熱不飢。是時令潮。沴氣蒸。內應脾胃。

夫濕屬陰。必傷陽氣。吞酸形寒。乏陽運行。議鼓運轉。

旋脾胃一法。 苓薑朮桂湯

某六 地中濕氣。自足先腫。濕屬陰邪。陽不易復。畏寒。筋骨

猶牽強無力。以金匱苓薑朮桂湯。

陳一濁凝氣結有形酒肉挾濕

草撥 生香附汁 木香 草果

茯苓 廣皮白

江脈緩臍上痛腹微膨便稀溺短不爽此乃濕鬱脾胃之陽致氣滯裏急宗古人導濕分消用桂苓散方

生茅術 官桂 茯苓 厚朴 廣皮白

飛滑石 猪苓 澤瀉 炒查肉

林五中年清陽日薄忽然脫中痞悶乃清陽不自轉旋酒肉濕濁之氣得以凝聚矣過飲滯瀉濕傷脾胃胃陽微

仲景法以輕劑宣通其陽若投破氣開降最傷陽氣有

臨證指南醫案 卷五 濕

格拒之害 苓桂朮甘湯

嚴三胸滿不飢是陽不運行嗜酒必挾濕凝阻其氣久則

三焦皆閉用牛疏丸二便已通議治上焦之陽

苓桂朮甘湯

王六病人述病中厚味無忌腸胃滯雖下而留濕未解濕

重濁今氣下墜於肛肛墜痛不已胃不喜食陽明失調

舌上有白腐形色議助腸胃之濕

生茅術 人參 厚朴 廣皮

炮薑炭 生炒黑附子

胡二受濕患瘡久瘡不愈氣泄半年淹淹無力食少嘔噦

難化此脾胃病法以運中陽為要

茯苓 桂枝 生於朮 炙草

苡仁 生薑

汪夏令脾胃司氣兼以久雨泛潮地中濕氣上干食味重濁少運所謂濕勝成五泄也古云寒傷形熱傷氣芒

種夏至天漸熱其益氣分以充脾胃此夏三月必有康

健之理 補中益氣湯

濕邪某五械濕邪吸受由募原分布三焦升降失司脫腹脹悶

大便不爽當用正氣散法

藿香梗 厚朴 杏仁 廣皮白

臨證指南醫案 卷五 濕

茯苓皮 神麴 麥芽 綿茵陳

蔡仲景云小便不利者為無血也小便利者血旺諦也

此症是暑濕氣蒸三焦瀰漫以致神昏乃諸般阻寒之

兆至小腹硬滿大便不下全是濕鬱氣結彼分醫猶然

以滋味呆鈍滯藥與氣分結邪相反極矣議用甘露飲

法

猪苓 滑石 寒水石 晚蚕沙 皂莢子

某四臍間便澀身痛脉象模糊此屬濕蘊三焦

厚朴 廣皮 藿香梗 茯苓皮

大豆黃卷 木防已 川通草 苡仁

牛 向年積聚候服燥熱諸藥類與清奪推陳致新乃安

身處江南濕熱之鄉飲啖仍用山右濃重之味留熱由腸升膈三焦不清議攻無形之熱

清心涼膈去芒硝加菖蒲

韓三冷酒水濕傷中上嘔食下泄肚腹陽氣傷極再加浮腫作脹則危

人參 茯苓 熟附子 生於木

生白芍 生薑

又 酒濕類聚例以分利診脈微陽氣已敗濕壅生熱至胃脘脹清熱則陽亡即死木苓運中祛濕佐附迅走氣

臨證指南醫案

卷五 濕

至

分亦治濕一法

茯苓 熟附子 生白朮 左杜囑

澤瀉 車前子

龐四濕久脾陽消乏中年未育子腎真亦憊做安腎丸法

鹿茸 胡蘆巴 附子 韭子 赤石脂

補骨脂 眞茅朮 茯苓 兔絲子 大茴香

張五陽傷疲弱有濕麻痺瘰癧血

生白朮 附子 乾薑 茯苓

某三舌白身痛足跗浮腫從太谿穴水流如注此濕邪伏於足少陰當用溫蒸陽氣爲主

鹿茸 淡附子 草果 兔絲子 茯苓

楊 厥陰爲病必錯雜不一瘧痢之後肝臟必虛發症左

脇有痞腹中塊礪外堅脇下每常汨汨有聲惡虛就實常有寒熱胃中不知飢而又嘈雜吞酸脈長而數顯然厥陰陽明濕熱下滲前陰陽縮而爲濕熱症也議用升發陽明胃氣滲泄厥陰濕熱其症自愈

蒼朮 半夏 茯苓 紅 通草

當歸 柏子仁 沙蒺藜 蘇子 茴香

卽九方

浦氏 胸膈迷漫胃痛嘔食肢節屈曲處冷痛經落後來時

臨證指南醫案

卷五 濕

至

周身腰脊不舒脈弦沉痛即便溏此濕鬱阻閉氣血不行用藥先須斷酒

生茅朮 炮黑川烏 薑汁 白芥子

厚朴 廣皮 草撥 茯苓

徐 溫瘧初愈驟進濁膩食物濕聚熱蒸縈於經絡寒戰

熱熾骨節煩疼子起灰滯之形面日痿黃色顯然濕熱

爲痺仲景謂濕家忌投發汗者恐陽傷變病蓋濕邪重

着汗之不却是苦味辛通爲要耳

防已 杏仁 滑石 醋炒半夏

連翹 山梔 苡仁 野赤豆皮

某四風暑濕渾雜氣不主宣咳嗽頭脹不創右肢若廢法
當通陽驅邪

杏仁 三錢

苡仁 三錢

桂枝 五分

生薑 七分

厚朴 一錢

半夏 一錢

漢防已 一錢

白茯苓 二錢

麻黃

某汗多身痛自利小便全無胸腹白疹此風濕傷於氣
分醫用血分涼藥希冀熱緩殊不知濕鬱在脈為痛濕
家本有汗不解

苡仁

竹葉

白蔻仁

滑石

茯苓

川通草

濕為重濁有質之邪若從外而受者皆由地中之氣

臨證指南醫案

卷五

重

升騰從內而生者皆由脾陽之不通雖云霧露雨濕
上先受之地中潮濕下先受之然霧露雨濕亦必由
地氣上升而致若地氣不升則天氣不降皆成燥症
矣何濕之有其傷人也或從上或從下或遍體皆受
此論外感之濕邪着於肌軀者也此雖未必即入於
臟腑治法原宜於表散但不可大汗耳更當察其兼
症若兼風者微微散之兼寒者佐以溫藥兼熱者佐
以清藥此言外受之濕也然水流濕火就燥有同氣
相感之理如其人飲食不節脾家有濕脾主肌肉四
肢則外感肌腠之濕亦漸次入於臟腑矣亦有外不

受濕而但濕從內生者必其人膏粱酒醴過度或者

飲茶湯太多或食生冷瓜果及甜膩之物治法總宜

辨其體質陰陽斯可以知寒熱虛實之治若其人色

蒼赤而瘦肌肉堅結者其體屬陽此外感濕邪必易

於化熱若內生濕邪多因膏粱酒醴必患濕熱濕火

之症若其人色白而肥肌肉柔軟者其體屬陰若外

感濕邪不易化熱若內生之濕多因茶湯生冷太過

必患寒濕之症人身若一小天地今觀先生治法若

濕阻上焦者用開肺氣佐淡滲通膀胱是即啟上開

開支河導水勢下行之理也若脾陽不運濕滯中焦

臨證指南醫案

卷五

著

者用木朴薑牛之屬以溫連之以苓澤腹皮滑石等
滲泄之亦猶低窪濕處必得烈日晒之或以剛燥之
土培之或開溝渠以泄之耳其用藥總以苦辛寒治
濕熱以苦辛溫治寒濕藥以淡滲佐之或再加風藥
甘酸膩濁在所不用總之腎陽充旺脾土健運自無
寒濕諸症肺金清肅之氣下降膀胱之氣化通調自
無濕火濕熱暑濕諸症若夫失治變幻則有腫脹黃
疸泄瀉淋閉痰飲等類俱於各門兼參之可也 華

燥

某 脈右數大。議清氣分中燥熱。

桑葉 杏仁 大沙參 象貝母

香豉 黑梔皮

下 夏熱秋燥致傷都因陰分不足

冬桑葉 玉竹 生甘草 白沙參

生扁豆 地骨皮 麥冬 花粉

某 燥火上傳。齧脹咽痛。當辛涼清上。

薄荷梗 連翹殼 生甘草 黑梔皮

臨證指南醫案 卷五 燥 姜

桔梗 萊豆皮

心陽過 動傷液 王六 老人舌腐肉消肌枯。心事繁冗。陽氣過動。致五液皆

涸而為燥。冬月無妨。夏月深處林壑。心境凝然。可以延

年。每早服牛乳一杯。

陳 秋燥復傷。宿恙再發。未可補瀉。姑與甘藥養胃。

麥冬 玉竹 北沙參 生甘草

茯神 糯稻根鬚

某 上燥治氣。下燥治血。此為定評。今陽明胃腑之虛。因

久病嘔逆。投以辛耗破氣。津液劫傷。胃氣不主下行。致

腸中傳送失司。經云六腑以通為補。牛乳小效。全在一

通補工夫。豈徒理燥而已。議甘寒清補胃陰。

鮮生地 天冬 人參 甜梨肉 生白蜜

張 脈數虛。舌紅口渴。渴上齧乾涸。腹熱不飢。此津液被劫。

陰不上承。心下溫溫。液液用炙甘草湯。

炙甘草 阿膠 生地 麥冬

人參 麻仁

某氏 心中煩熱。正值經來。而熱渴不已。若清肺氣大謬。用

復脈法。

炙甘草 生地 阿膠 麥冬

棗仁 蔗漿

臨證指南醫案 卷五 燥 姜

桔梗 萊豆皮

心陽過 動傷液 王六 老人舌腐肉消肌枯。心事繁冗。陽氣過動。致五液皆

涸而為燥。冬月無妨。夏月深處林壑。心境凝然。可以延

年。每早服牛乳一杯。

陳 秋燥復傷。宿恙再發。未可補瀉。姑與甘藥養胃。

麥冬 玉竹 北沙參 生甘草

茯神 糯稻根鬚

某 上燥治氣。下燥治血。此為定評。今陽明胃腑之虛。因

久病嘔逆。投以辛耗破氣。津液劫傷。胃氣不主下行。致

腸中傳送失司。經云六腑以通為補。牛乳小效。全在一

先生用玉竹門冬桑葉薄荷梨皮甘草之類是也。傷者乃人之本病。精血下奪而成。或因偏餌燥劑所致。病從下焦陰分先起。其法以純陰靜藥。柔養肝腎。為宜。大補地黃丸。六味丸之類是也。要知是症大忌者苦瀉。最喜者甘柔。若氣分失治。則延及於血。下病失治。則稿及乎上。喘咳痿厥。三消噎膈之萌。總由此致。大凡津液結而為患者。必佐辛通之氣味。精血竭而為患者。必藉血肉之滋填。在表佐風藥而成功。在腑以緩通為要務。古之滋燥養營湯。潤腸丸。五仁湯。瓊玉膏。一炆丹。牛乳汁等法。各有端司也。邵新甫

臨證指南醫案

卷五 燥

毛

疫

瘟邪入心胞

朱

疫癘穢邪。從口鼻吸。受分布三焦。瀰漫神識。不是風寒客邪。亦非停滯裏症。故發散導滯。即犯劫津之戒。與傷寒六經大不相同。今喉痛丹疹。舌如硃。神躁昏。上受穢邪。逆走膈中。當清血絡。以防結閉。然必大用解毒。以驅其穢。必九日外。不致皆憤。冀其邪去正復。

犀角

連翹

生地

玄參

菖蒲

鬱金

銀花

金汁

姚 疫毒口糜丹疹喉啞。治在上焦。

臨證指南醫案

卷五 疫

癸

犀角

鮮生地

玄參

連翹

石菖蒲

銀花

金汁

至寶丹

譚 口鼻吸入穢濁。白肺系漸干。心胞絡初病。喉痛舌燥。最怕竅閉。神昏之象。疫毒傳染之症。不與風寒停滯同法。

玄參

連翹

鬱金

銀花

石菖蒲

龍葉

射干

牛蒡

冲入真白金汁一杯

楊 吸入疫癘。三焦皆受。久則血分漸凝。愈結愈熱。當以鹹苦之製。仍是輕揚理上。做古大製小用之意。

玄參

西瓜翠衣

金銀花露

瑩白金汁

金氏人靜則神昏。邪竟入腦。王先生方甚妙。愚意兼以

芳香宣竅逐穢。至寶丹。

亦不本

疫癘一症。都從口鼻而入。直行中道。流布三焦。非比

傷寒六經。可表可下。夫疫為穢濁之氣。古人所以飲

芳香。採蘭草以襲芬芳之氣者。重滌穢也。及其傳變

上行極而下。下行極而上。是以邪在上焦者。為喉啞

為口糜。若逆傳膈中者。為神昏舌絳。為嘔。滯丹疹。今

觀先生立方。清解之中。必佐芳香宣竅逐穢。如犀角

葛蒲。銀花。薄荷。金等類。兼進至寶丹。從表透裏。以有靈

之物。內通心竅。搜剔幽隱。通者通。鎮者鎮。若邪入營

臨證指南醫案

卷五 疫

弄

中三焦相滯。熱愈結。邪愈深者。理宜鹹苦大製之法

仍恐性速而走下。故用玄參金銀花露。金汁瓜

皮。輕揚理上。所謂倣古法而不泥其法者也。考是症

惟張景岳喻嘉言吳又可論之最詳。然宗張喻二氏

恐有遺邪留患。若宗吳氏。又恐邪去正傷。惟在臨症

權衡。無盛盛無虛虛。而道人天殃。方不愧為司命矣

錄九

二

癰痧疹癘

三焦

張伏氣熱蘊三焦。心竅熱發。煩渴。遍體赤斑。夜躁不寐。

兩脉數搏。

羚羊角

犀角

連翹心

玄參心

鮮生地

金銀花

花粉

石菖蒲

又寒熱必有形象攻觸。及於胃脘之下。口渴。喜飲煖湯。

癰已發現。病不肯退。此邪氣久伏厥陰之界矣。

桂枝

川連

黃芩

花粉

牡蠣

枳實

臨證指南醫案

卷五 癰痧疹癘

卒

溫

嚴濕溫雜受。身發斑疹。飲水渴不解。夜煩不成寐。病中

強食。反助邪威。議用涼膈疎斑方法。

連翹

薄荷

杏仁

鬱金

枳實汁

炒牛蒡

山梔

石膏

又舌邊赤。皆謬。早輕夜重。斑疹隱約。是溫濕已入血絡。

夫心主血。邪干膈中。漸至結閉。為昏。瘧之危。苦味沉寒。

竟入中焦。消導辛溫。徒劫胃汁。皆溫邪大禁。議清疎血。

分輕劑以透斑。更參入芳香逐穢。以開內竅。近代喻嘉

言申明戒律。宜遵也。

犀角

玄參

連翹

銀花

<p>石菖蒲 先煎至六分後和入雪白金汁一杯臨服研入周少川牛黃丸一丸</p>	<p>江溫邪發疹濕熱內蘊便閉不通先開上焦杏仁 蘇子 枯藁皮 紫苑 山梔</p>	<p>某風溫發疹薄荷 連翹 杏仁 牛蒡子 桔梗 桑皮 甘草 山梔</p>	<p>某風溫發疹薄荷 赤芍 連翹 牛蒡子 桔梗 桑皮 甘草 山梔</p>	<p>臨證指南醫案卷五 癰疹疹癰 空</p>	<p>費 暴寒驟加伏熱更熾邪鬱則氣血壅遏疹疹不肯外達痰氣交阻神迷喘促漸入心胞絡中有內閉外脫之憂熱注下迫自利粘膩不爽法當開其結閉消毒解其腹中之壅必得神清方保無變</p>	<p>連翹心 飛滑石 石菖蒲 炒金銀花 射干 通草 煎化牛黃丸一丸</p>	<p>朱二痧後痰多咳嗽氣急 蘆根 一兩 杏仁 一錢 桔梗 一錢 飛滑石 一錢 桑皮 八分 通草 一錢</p>	<p>某痧後伏火未清內熱身痛</p>
---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	---------------------------------------	--	--------------------

<p>王竹 白沙參 地骨皮 川斛</p>	<p>麥冬 生甘草 某痧後熱不止陰傷</p>	<p>生白芍 炙甘草 生扁豆 炒麥冬 川斛 穀芽</p>	<p>章 涼風外襲伏熱內蒸秋金主令內應乎肺喘咳身熱始而晝熱繼而暮熱自氣分漸及血分釀肉紫而肌黑發疹辛寒清散為是</p>	<p>薄荷 連翹 石膏 淡竹葉 杏仁 桑皮 苡仁</p>	<p>臨證指南醫案卷五 癰疹疹癰 空</p>	<p>吳 病在暴冷而發肌表頭面不透是外蘊為寒內伏為熱肺病主衛衛氣分兩解為是</p>	<p>麻黃 石膏 牛蒡子 枳殼汁 杏仁 射干 桔梗 生甘草</p>	<p>尹 環口燥裂而疵頭面身半以上發出癰疹赤痧乃陽明血熱久蘊成毒瘦人偏熱頗有是症何謂醫人不識犀角地黃湯再加風荷尤效</p>	<p>江溫邪自利癰疹 黃芩 連翹 牛蒡 桔梗 香豉 薄荷 杏仁 橘紅 通草</p>
----------------------	------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	---	---

李二發癩熱腫。獨現正面。每週九十月大發。五六月漸愈。

七八年來如是。因思夏令。陽氣宣越。營衛流行無間。秋
冬氣稟外薄。氣血凝滯。此濕熱漫無發泄。乃少陽木火
之鬱。及陽明蘊蒸之濕。故上焦尤甚耳。法以辛涼。佐以
苦寒。俾陽分鬱熱得疎。庶幾發作勢緩。

夏枯草 鮮菊葉 苦丁茶 鮮荷葉邊

粉羊角 黑梔皮 鬱金 苡仁

唐五麻木。忽高腫發癰。必有風濕襲入皮膚。及軀殼病。昔
人每以宣行通劑。此防重風。

片薑黃 粉羊角 川桂枝 撫芎

臨證指南醫案 卷五 癰疹疹癰 奎

半夏 白芥子

某十風塊癰癢。咳嗽腹癰。邪著表裏。當用雙和。

牛蒡子 杏仁 連翹 桔梗

桑枝 象貝母 煎藥送通聖丸

癰者。有觸目之色。而無碍于之質。即稠如錦紋。稀如
敗膿之象也。或佈於胸腹。或見於四肢。總以紅起
發者為赤。色紫成片者為重。色黑者為凶。色青者為
不治。蓋有諸內而形諸外。可決其臟腑之安危。邪正
之勝負也。始傷寒。溫疫諸症。失於宣解。邪蘊於胃。腑
而走入營中。每有是患耳。考方書之治。其法不一。大

抵由失表而致者。當求之汗失下而致者。必取乎攻。
火甚清之。毒甚化之。營氣不足者。助其虛而和之。托
之。至於陰癰一說。見象甚微。若必指定些些之癰點。
為陰。猶恐不能無誤。想前人此例。無非覺後人勿執
見癰為實熱之義也。吾故曰。必察之脈象。及兼證。方
安。痧者。疹之通稱。有頭粒而如粟象。癰者。即疹之屬。
腫而易痒。須知出要周勻。沒宜徐緩。不外乎太陰陽
明之患。故繆氏崇以肺胃論治為精也。若先生之法。
本乎四氣。隨其時令之勝復。酌以辛涼辛勝。及甘寒
苦寒鹹寒。淡滲等法。而治之。凡吾幼科諸友。於此尤
當究心焉。 御新甫

臨證指南醫案 卷五 癰疹疹癰 奎

痰

汪五宿哮久矣不發心忤震動似乎懊懷之象此屬痰火治以宣通鬱遏勿徒呆補

半夏 川連 石菖蒲 蛤粉 枳實

茯苓 川芎 金 橘紅 竹瀝薑汁法丸

劉痰火鬱遏氣滯吸烟上熱助壅是酒肉者不相宜古稱痰因氣滯熱鬱治當清熱理氣為先

川連 白朮 枳實 厚朴

茯苓 半夏 煨薑湯泛丸

臨證指南醫案 卷五 痰

沈氏痰火久嗽 海蛇丸

張氏痰火風眩量防仆跌

明天麻 妙半夏 茯苓 橘紅

羚羊角 鉤藤 竹瀝

陳氏老年痰火咳逆痰有穢氣

蘆根 苡仁 桃仁 絲瓜子

葶藶 大棗

又下虛不納觸之嘔逆痰穢氣

熟地炭 紫衣胡桃肉 炒杞子 炒牛膝

川芎 茯苓

某痰火上逆蒙竅耳鳴頭暈二陳加天麻鈎藤子苟 若羊獲皮

某夏至節兩關脈弦長五火燔燎而肝陽胃陽尤甚動

怒抽掣為肝病食辛香厚味即病至胃病使然痰火根

深非頃刻可掃除性靜養勿志忿薄味以清裏此病發

之勢必緩由漸加功議藥乃近理治法

羚羊角 犀角 川連 鬱金 山梔

北秦皮 牛黃 胆星 橘紅 生石膏

何如診脈右關弦滑痰多舌乾微強語言似塞蓋因痰火

臨證指南醫案 卷五 痰

上蒙津液不得上承老年頗慮風痰宜清上宣通勿進

剛燥及膩滯之藥

半夏 金石斛 橘紅 黑山梔 茯苓

鬱金 生甘草 石菖蒲 竹瀝 薑汁

張氏皆如寐神憤如迷痰熱內閉勢非輕渺

半夏 石菖蒲 桔梗 枳實

鬱金 橘紅 竹瀝 薑汁

某鬱痰

半夏麴 鬱金 石菖蒲 明天麻

白茯苓 橘紅 茯苓 鈎藤

臨 脈左弦堅搏痰多食不易運此鬱慮已甚肝侮脾胃
有年最宜開懷不致延及噎膈。

半夏 薑汁 茯苓 杏仁

鬱金 橘紅

又 脈如前痰氣未降 前方去杏仁加白芥子

金 四 濕熱內蒸痰火日夥根本漸怯陽泄爲汗陰泄遺濁
酒客喜於爽口食物醫藥中滋膩補方決不適用也。

豬肚丸方

葉 久寓南土水穀之濕蒸熱聚痰脈沉弦目黃肢末易
有瘡疾皆濕熱盛致氣隧不得流通法當苦辛寒清裏

臨證指南醫案 卷五 痰 至

通肌做前輩痰因熱起清熱爲要

生茅術 黃柏 瓜蒌實 山梔 萊服子

川連 半夏 厚朴 橘紅 竹瀝薑汁丸

某 病後原味蒸痰

風化硝 瓜蒌仁霜 枳實 鬱金

生茯苓 薑汁炒山梔 竹瀝法丸

汪 脈脹濕阻熱痰

半夏 茯苓 黑山梔 橘紅

製痰黎 遠志 降香

水火犯 徐 陽動內風用滋養肝腎陰藥壯水和陽亦屬近理夏

生痰

季脾胃主司肝胆火風易於貫膈犯中土受水火之
侮陽明脈衰痰多經脈不利矣議清少陽鬱熱使中宮
自安若畏虛滋膩上中愈實下焦愈虛二陳去甘草加
金斛桑葉升皮。

又 脈左浮弦數痰多喉中不爽煩則火升眩暈靜坐神
識安舒議少陽陽明同治。

羚羊角 連翹 廣皮 炒半夏麴

黑山梔皮 香豉

又 脈兩手已和惟煩動恍惚欲暈議用靜藥益陰和陽

人參 熟地 天冬 金箔

臨證指南醫案 卷五 痰 突

汪 痰火上盛腎氣少攝朝用通攝下焦暮服清肅上焦

方法

羚羊角 半夏 茯苓 橘紅

黑梔皮 鬱金 苦丁茶煎湯法丸暮服

熟地 淡從蓉 杞子 五味 牛膝

茯苓 遠志 線膠 蜜丸早服

暫 五色鮮明屬上有痰飲蓋上實則下虛半百年歲未得
種玉診得脈左小不靜右部弦滑法當清肺胃之熱痰

益腎甲之精血做曼倩衛生方法

燕窩膠 甜梨膏 人參 黃芪 麥冬

山藥

茯苓

於朮

黃芩

黑節

鹿尾膠

羊內腎

淡從蓉

故紙

青鹽

丙

向來痰多食少而參朮服餌未合此稟質為陽不受
溫熱剛燥之劑上年冬季溫煖入春痰愈多體中微倦
由乎藏聚未固春氣自地升舉之徵法當攝腎固真乃
治痰之本方為有益

熟地

茯苓

補骨脂

胡桃肉

杞子

五味

牛膝

遠志

車前

蜜丸

痰症之情形變幻不一古人不究標本每著消痰之
方立消痰之論者甚多後人遵其法而用之治之不

臨證指南醫案

卷五 痰

完

驗遂有稱痰為怪病者矣不知痰乃病之標非病之
本也善治者治其所以生痰之源則不消痰而痰自
無矣余詳考之夫痰乃飲食所化有因外感六氣之
邪則脾肺胃升降之機失度致飲食輸化不清而生
者有因多食甘膩肥腥茶酒而生者有因本質脾胃
陽虛濕濁凝滯而生者有因鬱則氣火不舒而蒸變
者又有腎虛水泛為痰者此亦因土衰不能制水則
腎中陰濁上逆耳非腎中真有痰水上泛也更有陰
虛勞症龍相之火上炎燥肺以致痰嗽者此痰乃津
液所化必不濃厚若欲消之不惟無益而徒傷津液

其餘一切諸痰初起皆由濕而生雖有風火燥痰之

名亦皆因氣而化非風火燥自能生痰也其主治之

法惟痰與氣一時壅閉咽喉者不得不暫用豁痰降

氣之劑以開之餘皆當治其本故古人有見痰休治

痰之論此誠千古之明訓蓋痰本飲食濕濁所化人

豈能禁絕飲食若欲欲消之由於外邪者邪散則痰

或可清如寒痰溫之熱痰清之濕痰燥之燥痰潤之

風痰散之是也若涉本原者必旋消旋生有至死而

痰仍未清者矣此乃不知治本之故耳今觀案中治

法有因鬱因火者必用開鬱清火為君以消痰佐之

臨證指南醫案

卷五 痰

半

有因濕因熱者則用燥濕清熱暑佐化痰之品若因
肝腎虛而生痰者則純乎鎮攝固補此真知治痰之
本者矣若因寒因濕者更當於痰飲門兼參而治之
華岫雲

痰飲

外寒引動宿飲上逆

某六高年衛陽式微寒邪外侵引動飲邪上逆咳嗽形寒仲景云治飲不治咳當以溫藥通和之

杏仁三錢 粗桂枝一錢 淡乾薑一錢 茯苓三錢

芍仁三錢 炙草四分

周向有耳聾鳴响是水虧木火蒙蔽冬陽不潛亦屬下元之虛但今咳聲喉下有痰音脇痛臥着氣衝乃衝陽升而痰飲泛脈浮當此驟冷恐有外寒引動內飲議開太陽以肅上

臨證指南醫案

卷五 痰飲

主

雲茯苓 粗桂枝 乾薑 五味 肺薑

白芍 炙草 當午時服

某三新涼外束肺受寒冷氣飲不降宿飲上下而病發矣法當陽護衛心宿病可却

淡生薑粉 半夏 蛤蜊粉 茯苓

桂枝木 杏仁煎湯

某五背寒咳嗽此屬飲象先當辛通飲邪以降肺氣

鮮枇杷葉 杏仁 茯苓 橘紅

生薑 半夏

某二脈右大弦氣喘咳嗽濁沫不能着枕喜飲湯水遇寒

病發此屬飲邪留於肺衛如見咳投以清潤愈投愈劇矣 葶藶子 山東大棗

徐氏痰飲上吐喘不得臥乃溫邪阻蔽肺氣氣不下降壅滯不能着右議用宣通開氣分方法

小青龍去細辛麻黃加杏仁白糖炒石膏

沈氏冬溫陽不潛伏伏飲上泛仲景云脈沉屬飲面色鮮明為飲飲家咳甚當治其飲不當治咳緣高年下焦根蒂已虛因溫煖氣泄不主收藏飲邪上擾乘肺肺氣不降一身之氣交阻薰灼不休絡血上沸經云不得卧卧則喘甚痺塞乃肺氣之逆亂也若以見病圖病昧於色

臨證指南醫案

卷五 痰飲

主

診候氣必致由咳變幻腹腫脹滿漸不可挽明眼醫者勿得忽為泛泛可也茲就管見畧述大意議開太陽以使飲濁下趨仍無礙於冬溫從仲景小青龍越婢合法

杏仁 茯苓 芍仁 炒半夏

桂枝木 石膏 白芍 炙草

方氏冷暖失和飲泛氣逆為浮腫喘咳腹脹卧則衝喘議用越婢方

石膏 杏仁 桂枝 炒半夏

茯苓 炙草 不用麻黃不減越婢

施氏勞煩太甚胃陽受傷外衛單薄怯寒畏冷食物小量

痰飲內起氣阻濁凝胸背皆痛辛甘理陽已效當此長夏脾胃主令崇其生氣體旺病可全好

六君子加益智木香

黃三身居沿海氛障霧露客邪侵入清陽陽傷畏寒久嗽病人不知却病護身猶然用力承辦裏結飲邪沉痾不却病 茯苓桂枝湯

胡六脈沉而微微則陽氣不足沉乃寒水陰凝心痛怔忡漸及兩脇下墜由陽衰不主運行痰飲聚氣欲阻致痛之來其心震之謂亦如波撼岳陽之義議用外臺茯苓飲合桂苓方

臨證指南醫案

卷五

痰飲

七

人參

茯苓

半夏

枳實

桂枝

薑汁

白六脈沉小弦為陰濁飲邪稟質陽不充旺胸中清氣不得舒展膈達偶觸入寒冷或誤進寒物飲邪暴冷凝結

胸痞當平日食物忌用酒內腿濕便清陽流行常服仲

景苓桂術甘湯百劑若病來因冷即服大順散

戴病去神已爽慧但本脈帶弦平素有飲為陽氣不足

之體年紀漸多防有風痺此酒肉宜少用勞怒當深戒矣議外臺茯苓飲方

人參

茯苓

廣皮

枳實

半夏

金石斛

數人

朱九煩勞太過陽傷痰飲日聚陽踴脈空寢不成寐衛陽失護毛髮自墜乃日就其衰奪矣初進通飲濁以甦陽

接服外臺茯苓飲

吳氏脈弦背中冷左偏微痛食少欲嘔四肢牽強此飲邪內結議通陽氣

桂枝

茯苓

半夏

薑汁

炙草

大棗

某眩暈惡心胸脘不爽脈右弦左弱面色紅亮此乃痰飲上泛有厥中之事

臨證指南醫案

卷五

痰飲

七

炒半夏

製蒺藜

橘紅

煨天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

尤口中味淡是胃陽虛夫濁陰下降痛緩向有飲濕為患若不急進溫通理陽濁陰必致復聚議大半夏湯法

人參

半夏

茯苓

枳實

薑汁

張七酒客穀少中虛常進疎散表藥外衛之陽亦傷其痰

飲發時脈中痛寒自述或飢遇冷病來其為陽氣受病

何疑不必見痰搜逐但護中焦脾胃使陽氣健運不息

陰濁痰涎焉有竊踞之理

生於朮

川桂枝

茯苓

淡薑渣

苡仁 澤瀉 薑棗湯法九

王三脈沉為痰飲是陽氣不足濁陰欲破當以理脾為先
俾中陽跳運即仲景公飲治脾之意

苓桂朮甘加半夏腹皮水法九

某三舌白咳逆不渴非飲象而何宜宣溫藥和之

杏仁 苡仁 半夏 乾薑

粗桂枝 茯苓 厚朴 炙草

某食後脘中痞阻按之漉漉存聲手麻脇痛心煩耳目

昏眩是氣不流行痰飲內聚中焦用桂苓九竹瀝薑法
法九

臨證指南醫案 卷五 痰飲 圭

又桂枝 人參 茯苓 半夏

廣皮 炙草

黃味過甘膩中氣緩不上運延綿百天聚氣結飲東垣

云病久髮不焦毛不落不食不飢乃痰飲為患飲屬陰

類故不渴飲仲景五飲互異其要言不繁當以溫藥和

之通陽方法固無容疑或大意外飲宜治脾內飲治腎

是規矩準繩矣議用苓桂朮甘湯

某形體似乎壯實陽氣外泄畏風怯冷脾陽消乏不可

健運水穀悍氣蒸變痰飲隧道日壅上實下虛仲景謂

飲邪當以溫藥和之苓桂朮甘得效從外飲立方

人參 淡附子 生於朮 枳實

茯苓 澤瀉 荆瀝薑汁法九

某老人久嗽妨食議以外飲治脾 苓桂朮甘湯

王三脈沉背寒心悸如墜形盛氣衰漸有痰飲內聚當溫
通補陽方復辟斯飲濁自解

人參 淡附子 乾薑 茯苓

生於朮 生白芍

馮陽虛則形寒汗出痰飲痞聚都是陰濁成形乘陽氣

衰微致上千竊踞古人法則必通其陽以掃陰氛但宿
病無急攻方況平素憂鬱氣滯血滯久耗之體不敢純

臨證指南醫案 卷五 痰飲 圭

剛防劫液耳

人參 熟附子 淡乾薑 炒川椒 川桂枝

烏梅肉 生白芍 另真武丸三兩

程八左脈沉靜右脈微弦四旬清陽日薄脾陽鼓運漸遲
加以煩心榮思水穀悍氣蘊蒸痰飲仲景謂外飲當治

脾陽況中年常有遺泄之患按脈非龍相之動搏議固

下益腎轉旋運脾二方分早晚服早服從還少聚精七

寶參用丸方

熟地 茯苓 枸杞 五味 萸肉 茯苓

山藥 菟絲 覆盆 魚膠 萸肉 遠志

<p>脾胃虛弱 虛飲逆</p>		<p>臨證指南醫案 卷五 痰飲</p>		<p>主</p>		<p>龍骨 青鹽 熟蜜同棗肉搗丸早服五七錢</p>		<p>茅朮 於朮 半夏 茯苓 廣皮 生益耆</p>		<p>白茯苓 鈎藤 薑棗湯泛丸晚服三錢開水下</p>		<p>徐 清陽未展渴陰欲臥久延必結痰飲議用真武丸二錢五分人參一錢煎湯送服胃陽得震渴當退避矣十服</p>		<p>某 脈沉弦飲泛陰咳乃下虛無以制上議早服腎氣丸攝納下焦散失以治水泛之飲午服外臺茯苓飲轉旋</p>		<p>中焦使食不致釀痰茯苓飲去朮</p>		<p>某 一高年久嗽脈象弦大寤不成寐乃陽氣微瀉渴飲上泛仲景云進溫藥和之</p>		<p>臨證指南醫案 卷五 痰飲</p>		<p>杏仁 三錢 茯苓 二錢 川桂枝 一錢 生薑 一錢</p>		<p>茯苓 三錢 炙草 四分 大棗 二枚</p>		<p>顧 四咳嗽數月嘔出涎沫建中不應已非營衛損傷視其面色鮮明飲食仍進做飲邪主治</p>		<p>小半夏湯加桂枝杏仁薑汁</p>		<p>李 入勞傷陽氣內起痰飲卧着氣鈍飲阻其效為多痰出稍通勢緩且體常汗泄非風寒表邪不解並不熱渴亦非火炎燥金仲景云飲家而飲當治飲不當治飲</p>		<p>茯苓 桂枝木 苡仁 炙草 薑汁</p>		<p>陳 脈滿小舌白不渴身動嘔痰身如在舟車中此寒熱</p>	
---------------------	--	-------------------------	--	----------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------	--	---	--	--	--	----------------------	--	---	--	-------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------	--	---	--	--------------------	--	--	--	------------------------	--	-------------------------------	--

<p>脾胃虛弱 虛飲逆</p>		<p>臨證指南醫案 卷五 痰飲</p>		<p>主</p>		<p>攻胃致傷逆氣痰飲互結通補陽明為正白朮甘草守中未能去濕宜緩商</p>		<p>人參汁 半夏 枳實汁 茯苓</p>		<p>竹瀝 薑汁</p>		<p>馬 三肌肉豐溢脈來沉緩始發右季脇痛湯飲下咽汨汨有聲吐痰涎頭痛此皆脾胃陽微寒濕滯聚年方壯盛不必介懷溫中佐其條達通通為宜</p>		<p>茅朮 厚朴 半夏 茯苓 陳皮</p>		<p>淡薑渣 胡蘆巴 炙草 薑汁 添加</p>		<p>馬 四甘緩頗安辛泄不受此陽分氣衰將來飲邪日聚然</p>		<p>臨證指南醫案 卷五 痰飲</p>		<p>主</p>		<p>卧着效多清氣失旋先用苓桂朮甘湯繼進外臺茯苓飲</p>		<p>曹 四中年陽氣日薄痰飲皆屬陰濕上干清道為衝逆咳嗽仲景治法外飲治脾內飲治腎分晰甚明昔年曾用桂苓澤朮得效是治支飲治法數年真氣更衰古人謂飲邪當以溫藥和之須忌治嗽肺藥</p>		<p>先用小青龍去麻辛 接服外臺茯苓飲</p>		<p>程 五老下元先虧氣不收攝則痰飲上泛飲與痰俱為熱矣今醫見嗽輒以清肺降氣消痰久而不效</p>	
---------------------	--	-------------------------	--	----------	--	--------------------------------------	--	----------------------	--	--------------	--	---	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------	--	----------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	---	--

不明痰飲皆屬濁陰之化。助助助助。試述着
枕欬喘一端。知身體卧着。上氣不下。必下衝上逆。其痰
飲伏於至陰之界。腎臟絡病無疑。形寒畏風。陽氣微弱。
而籬籬疎。仲景有要言。不煩曰。飲邪必用溫藥。和之
更分。外飲治脾。內飲治腎。不讀聖經焉知此理。

桂苓甘味湯 熟附都氣加胡桃

陳 痛久氣亂。陽微。水穀不運。羶醢聚濕。胃中之陽日薄。
痰飲水濕必傾囊上湧。而新進水穀之氣。與宿邪再聚。
復出。致永無痊期。仲景云。飲邪當以溫藥和之。又云。不
渴者。此為飲邪。未去故也。則知。陽。誠有合於聖

臨證指南醫案 卷五 痰飲

訓斷斷然矣 眞武湯

張 痰飲喘咳。肌肉麻痺。痞脹不堪。納穀。冬寒日甚。春暖
日減。全是陽氣已衰。陰濁逆干犯上。肺藥治嗽。無非辛
泄滋潤。蓋辛散則耗陽。滋清助陰。濁阻在陽分。氣不
肅。爲夜不得卧。小青龍意。主乎由上以泄水寒。直從太
陽之裏以通膀胱。表中裏藥也。仲景謂飲邪常以溫藥
和之。驅陰邪以復陽。一定成法。早腎氣去更換白芍
炒查炭水法丸 晚外臺茯苓飲薑棗湯法丸
程 腎虛不納氣。五液變痰上泛。冬藏失職。此病爲甚。不
可以肺咳消痰。常用八味丸。收納陰中之陽。暫時撤飲。

用仲景桂苓甘味湯

孫 未交冬至。一陽來復。老人下虛。不主固納。飲從下泛。
氣阻升降。而爲喘嗽。發散寒涼。苦瀉諸藥。焉得中病。仲
景云。飲家而咳。當治飲。不當治咳。後賢每每以老人喘
嗽。從脾腎溫養定論。是格遵聖訓也。

桂枝 茯苓 五味子 甘草湯代水加淡薑棗

李 腸紅久病。不必攻治。今者氣衝喘嗽。脘腹痞阻。是飲
濁上僭。最宜究悉。

川桂枝 茯苓 乾薑 一錢 五味子 同薑合

杏仁 牛 白芍 一錢 炙草 五分 生左牡蠣 三錢

臨證指南醫案 卷五 痰飲

吳 七壯年下元久虛。收納氣泄。每交秋冬受冷。冷氣深入。
伏飲夾氣上衝。爲咳喘嘔吐。疎肺降氣不效者。病在腎
絡中也。益精血少壯不旺。難以搜逐。病根不去。謂此絕
慾。一年小暑艾灸。靜養一百二十天可愈。附都氣加車
前。

潘 九勞力喘甚。肩背惡寒。飲泛上逆。皆係下元虛損。莫以
喘用瀉肺等藥。薛氏八味丸

王 秋深天氣收肅。背寒喘咳。飲濕上泛。緣體中陽氣少
振。不耐風露所致。最宜煖護背部。進通陽以治飲。

茯苓 桂枝 半夏 薑汁

改仁 炙草

又 早腎氣丸 夜真武丸

陳 脈虛微。春陽地升。濁陰上干。喘不得卧。治在少陰。

人參 淡熟附子 猪胆汁 非急症不用此

又 照前方加淡乾薑一錢半

又 脈弦。暮夜濁陰衝逆。通陽得效。議真武法以撤其飲。

人參 淡附子 生白芍 茯苓 薑汁

又 真武泄濁。脫通思食。能寐。昨宵已有渴欲飲水之狀。

考金匱云。渴者。飲邪欲去也。當健補中陽。以資納穀。

人參 生於朮 淡附子 茯苓 澤瀉

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

又 早服腎氣丸四五錢。晚用大半夏湯。

人參 半夏 茯苓 薑汁

董 脈弦右滿。陽微惡寒。飲濁上干。咳吐涎沫。且食減胃

衰。寒疝。踴躍。陰濁見症。豈止一端。喻嘉言謂濁陰上加

於天。非離昭當空。氛霧焉得退避。反以地黃五味陰藥

附和共陰。陰霧冲逆。肆虛飲邪。滔天莫制。議以仲景熟

附配生薑法。掃羣陰以驅飲邪。維陽氣以立基本。兄尊

年尤宜急護真陽為主

人參 茯苓 熟附子 生薑汁 南棗

載 十二月間。診得陽微濁飲上干。為咳不能臥。曾用小

青龍湯。減去麻黃。細辛。服後已得着枕。而卧想更醫後

用不明。治飲方法。交響。蠶陽氣發泄。病勢再熾。頃診脈

來濡弱。無神。痰飲咳逆未已。諒非前法可效。宗仲景真

武湯法。以熟附配生薑。通陽逐飲立法。

真武湯去白朮加人參

計 不卧。喘喘。泛起白沫。都是腎病。議通太陽膀胱

茯苓 川桂枝 淡乾薑 五味子

白芍 炙草

顧 飲邪泛溢。喘嗽。腎損。頭重。身動。喘甚。食則脫中。痞悶

卧則喘咳。不得息。肺主出氣。腎主納氣。二臟失司。出納

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

失職。議用早進腎氣丸三錢。以納少陰。晚用小青龍法

滌飲。以通太陽。經腑此皆聖人內飲治法。與亂投藥補

有間矣。小青龍去麻辛甘芍加茯苓杏仁大棗

某 形盛面亮。脈沉弦。此屬痰飲內聚。暮夜屬陰。喘不得

卧。仲景謂飲家而咳。當治其飲。不當治咳。今胸滿腹脹

小水不利。當開太陽以導飲逆。小青龍去麻辛台起婢

桂枝 半夏 乾薑 五味

杏仁 石膏 茯苓 白芍

某 服三拗湯。首出喘緩。可見苦寒沉降之謬。素多嘔逆

下血。中焦必虛。而痰飲伏顯。然議治其飲。

桂枝湯去甘草加杏仁茯苓改仁糖炒石膏	某 太陽經氣不開小水不利下股腫浮漸上着枕氣塞	欲坐渴飲上干竟有坐卧不安之象醫者但以肺病刻	治於理未合急用小青龍法使膀胱之氣無阻礙渴飲	痰氣自無逆冲之患矣	桂枝 杏仁 乾薑 五味	半夏 茯苓	章 伏飲鬱遏上干因春地氣主升而飲吐不飢自然	脾胃受傷六君子宜補方法未嘗不妙今診得吸氣甚	微小淺晨過青緣足踏浮腫其胸中之氣開闔失司最	臨證指南醫案 卷五 痰飲 全	慮中滿天太陽司開陽明司闔濁陰瀰漫通腑即是通	陽微仲景開太陽一法	牡蠣 澤瀉 防已 茯苓	五味 乾薑	張二 哈喘哮坐不得卧神迷如呆氣降則清水寒飲邪上	冲腹中用逐飲開濁法	薑汁炒南星 薑汁炙白附子 茯苓	桂枝 炙草 石膏	某三 咳緩痰少腕中不爽肌脰痠痛皆濕邪未盡痰飲竊	踞之象當用六安法
-------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------	-------------	-------	-------------------------	-----------	-----------------	----------	-------------------------	----------

杏仁 白芥子 炒半夏 茯苓	淡乾薑 橘紅	王 當年陽虛渴飲上泛喘急用真武湯九而效因平素	嗜酒少穀中虛濕聚熱蘊蒸痰目黃黧血未可為實熱	論治議方用外臺茯苓飲減甘草佐以微苦清滲理其	濕熱以酒客忌甜故也	茯苓 四兩 人參 二兩 芍藥 四兩 枳實 一兩	半夏 二兩 廣皮 二兩 金石斛 八兩煮汁為丸	汪 面色鮮明腕中柔濡欲嘔因鬱動熱氣蒸為痰飲宜	暫緩參術務清中焦熱痰	臨證指南醫案 卷五 痰飲 全	杏仁 枳實汁 橘紅 瓜蒌皮	鬱金 半夏麴 桔梗 黑梔皮	張氏 痰飲挾燥咳喉中養	杏仁 花粉 茯苓 象貝母	橘紅 半夏麴	陳 痰飲挾氣火上踞脘痞脹不爽宜理氣熱	半夏 茯苓 瓜蒌皮 黑梔皮	橘紅 鬱金	某 脈弦右澹面亮舌白口乾不喜飲頭重卒然胸脘	痺塞而痛得嘔氣稍舒酒客穀少中虛痰飲聚蓄當此
---------------	--------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------------	--------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	-----------------------

<p>夏令地氣上升飲邪挾氣上阻清空遂令前症之來金 賈云脈弦為飲色鮮明者為留飲口乾不欲飲水者此 為飲邪未去故也况漿漿汗出豈是風寒春夏溫邪辛 溫發散為大禁自云身體空飄年已六旬又四辛散再 泄其陽不亦左乎</p>	<p>半夏 薑汁 川連 吳更</p>	<p>學當伏</p>	<p>潘三遠客路途風寒外受熱氣內蒸痰飲日聚於臟之外 絡脈之中凡遇風冷或驟烈日或勞碌形體心事不寧 擾動絡中宿飲飲泛氣逆咳嗽氣塞喉底胸膈不思食 臨證指南醫案 卷五 痰飲 金</p>	<p>飲伏邪</p>	<p>物着使哈吐瀉痰氣降自愈病名哮喘伏飲治之得宜 除根不速到老年歲仍受其累耳 小青龍湯去細辛 童六背寒短氣背痛映心貫脇入腰食粥噫氣腕密瀉出 黃沫飲邪伏濕乃陽傷竊發此溫經通絡為要緩用人 參</p>	<p>川桂枝 生白朮 炒黑濁漆 炮黑川烏</p>	<p>胸次清 四小旋 支脈結</p>	<p>葉四脈右弦舌黃不渴當心似阻昔形壯今漸瘦咳久不 已則着則咳痰出稍安此清陽少旋支脈結飲議通上 焦之陽</p>
--	--------------------	------------	---	------------	---	--------------------------	----------------------------	---

<p>鮮薤白 瓜蒌皮 半夏 茯苓</p>	<p>川桂枝 薑汁</p>	<p>楊頭中冷痛食人不消筋脈中常似掣痛此皆陽微不 主流行痰飲日多氣隧日結致四末時冷先以微通胸 中之陽</p>	<p>乾薤白 桂枝 半夏 茯苓</p>	<p>瓜蒌皮 薑汁</p>	<p>又微通其陽已效痰飲阻氣用茯苓飲去廣皮加薑汁 程三支脈聚飲寒月喘甚初因寒濕而得故食辛稍安</p>	<p>杏仁 半夏 厚朴 苡仁</p>	<p>臨證指南醫案 卷五 痰飲 金</p>	<p>茯苓 薑汁法丸</p>	<p>趙支飲脇痛咳逆 小青龍去麻辛</p>	<p>汪氏支脈結飲阻氣喘脹人脇則痛厥逆為眩</p>	<p>茯苓 桂枝 半夏 杏仁</p>	<p>鬱金 糖炒石膏</p>	<p>黃支脈結飲發必喘急病發用</p>	<p>桂枝 茯苓 五味 炙草</p>	<p>馮惡飲流入胃中令人酸痛湧噫酸水當辛通其陽以 驅飲</p>	<p>枳枝木 半夏 茯苓 炒黑川椒 薑汁</p>
----------------------	---------------	--	---------------------	---------------	---	--------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	--------------------	----------------	---------------------	--------------------	--	--------------------------

又照前方加淡附子

施診脈右虛左小弦面色黃少華采左脇肋痛五六年未愈凡久恙必入絡絡主血藥不宜剛病屬內傷勿事賦補錄仲景旋覆花湯加栝子仁歸鬚桃仁

又初服旋覆花湯未應另更醫謂是營虛用參歸熟地

桂芍炙草服後大痛醫又轉方用金鈴牛夏桃仁延胡荪苓服之大吐大痛復延余治余再議方謂肝絡久病懸飲流入胃絡致痛不已議太陽陽明開闔方法

人參 茯苓 炙草 桂枝

煨薑 南棗

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

服苦藥痛嘔可知胃虛以參苓開陽明用草桂開太陽并辛香入絡用薑棗通營衛生薑恐伐肝故取煨以護元氣而微開飲氣也

又前方服之痛止議九方

人參 半夏 川椒 茯苓

桂枝 煨薑用棗湯九

某夏季陽氣大升痰多喘咳甚至夜不得卧穀味皆變大便或澀或秘診脈右大而弦議以懸飲流入胃絡用開闔導飲法

人參 茯苓 桂枝 炙草

煨薑 南棗

又早診脈兩手皆弦右偏大凡痰氣上湧咳逆愈甚日來小溲少下焦微脹議通太陽以撤飲邪

人參 茯苓 桂枝 炙草

五味 乾薑

又脈弦暑數不渴不思飲此飲濁未去清陽不主運行前方甘溫主乎開闔能令胃喜次法開太陽以撤飲邪亦主陽通據自述心下胃口若物阻呆滯其濁錮陽微大著其治法滋陰通為陰濁積穢矣議用大半夏湯法

大半夏湯加炒黑川椒

臨證指南醫案 卷五 痰飲 全

內經止有積飲之說本無痰飲之名而漢以前謂之痰飲仲景始分痰飲因有痰飲懸飲溢飲支飲之義而立大小青龍半夏苓桂術甘腎氣等湯以及內飲外飲諸法可謂闡發前賢獨超千古與後人所立風痰濕痰熱痰酒痰食痰之法迥異總之痰飲之作必由元氣虧乏及陰盛陽衰而起以致津液凝滯不能輪布留於胸中水之清者悉變為濁水積陰則為飲飲疑陽則為痰若果真元充足胃強脾健則飲食不失其度運行不停其機何痰飲之有故仲景云病痰飲者當以溫藥和之乃後人不知痰飲之義妄用滾

派九茯苓丸消痰破氣或滋填臟補等法大傷脾胃
 性砌助濁其於仲景痰飲之法豈不大相乖謬乎然
 此與飲雖爲同類而實有陰陽之別陽盛陰虛則水
 氣凝而爲痰陰盛陽虛則水氣溢而爲飲故王晉三
 先生取仲景之小半夏茯苓及外臺飲三湯從脾胃
 二經分痰飲立治法而先生又取仲景之苓桂朮甘
 外臺茯苓飲腎氣丸真武湯分內飲外飲治法而於
 痰飲之症無遺蘊矣愚歷考先生治痰飲之法則又
 有不止於此者然而病變有不同治法亦有異如脾
 腎陽虛膀胱氣化不通者取仲景之苓桂朮甘湯伏
 苓飲腎氣真武等法以理陽通陽及固下益腎轉旋
 運脾爲主如外寒引動宿飲上逆及膀胱氣化不通
 飲逆肺氣不降者以小青龍合越婢等法開太陽勝
 脫爲主如飲邪伏於經絡及中虛溼熱成痰者則有
 川烏蜀漆之溫經通絡外臺茯苓飲去甘草少佐苦
 辛清滲理濕之法其飲邪上冲膈中及懸飲流入胃
 中而爲病者又有薑附南星菖蒲旋覆川椒等聖飲
 咽濁辛通陽氣等法絲絲入冠一以貫之病情治法
 必有成竹矣非深於得道者其孰能之
 九

臨證指南醫案目

卷六

鬱

肝火

不寐

餓

三消

脾痺

瘧

瀉

臨證指南醫案目

古吳葉桂天士先生醫案 錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

鬱

鬱損心

于五鬱損心陽陽墜入陰為淋濁由情志內傷即為陰虛

致病見症亂治最為庸劣心藏神神耗如憤諸般失司

非偏寒偏熱藥治必得開爽其有向安服藥以草木功

能恐不能令其歡悅妙香散

臨證指南醫案卷六

心脾氣結神志不消

陸六人參 桔梗 烏藥 木香 各三分磨汁

又夜服白金丸

又久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參 石菖蒲 龍骨 棗仁

遠志 茯神

心下痞結

胡四悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連 乾薑 半夏 薑汁

茯苓 連皮瓜蒌

鬱損心脾

季九老年情志不適鬱則少火變壯火知飢脘中不爽口

熱

舌糜腐心脾鬱損木火劫燥精華肌肉日消惟怡悅開
爽內起鬱熱可平但執清火苦寒非調情志內因鬱熱
矣

金石斛 連翹心 炒丹皮 經霜桑葉

川貝 茯苓

接氣養心脾之營少佐苦降法

人參 川連 炒丹皮 生白芍

小麥 茯神

某 脘痛已止味酸乃肝鬱也

金石斛 黑山梔 丹皮 半夏麴

臨證指南醫案卷六

橘紅 枇杷葉

某 初起左邊麻木舌強筋脈後痛痰阻咽喉此係肝

風上引必由情懷鬱勃所致

羚羊角 連翹心 鮮生地 玄參

石菖蒲 鬱金汁

某 氣鬱不舒木不條達噤則少寬

逍遙散去白朮加香附

某 肝鬱成熱加味逍遙去白朮加鬱金

某 鬱熱吞酸溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

肝脾氣血

沈三脈虛瀉情懷失暢肝脾氣血多鬱牛載不愈難仁峻

劑議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中宮虛寒爲泥。

吳四勞倦噴怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宣補。

鈎藤 生香附 丹皮 桑葉

神麴 白芍 茯苓 廣皮

葉氏怙鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火風變動氣橫爲痛爲脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必變格拒中滿與辛潤少佐和陽。

臨證指南醫案 卷六 鬱 三

栝子仁二錢 歸鬚二錢 桃仁三錢 生白芍一錢

小川連三錢 川棟子一錢

某惱怒肝鬱思慮服傷而黃脈澁瘕不成寐宗薛氏法治之。

人參 黃芪 熟於朮 茯神 棗仁 桂圓肉

當歸 炙草 黑山梔 丹皮 遠志

戴氏隱情曲意不伸是爲心疾此草木攻病難以見長乃七情之鬱損以丹溪越鞠方法。

香附 川芎 小川連 茯苓

半夏 橘紅 炒查肉 神麴漿丸

程脈弦澀外寒內熱齒痛舌乾無寐乃肝脾鬱結不舒。

鬱金 鈎藤 丹皮 夏枯草

生香附 薄荷 廣皮 茯苓

肝火 吳四操持過動肝胆陽升胃氣日減脈應左搏從鬱熱治。

丹皮 黑山梔 薄荷梗 鈎藤

廣皮 白芍 茯苓 神麴

陸二鬱傷筋脈心痛。

鈎藤 生香附 鬱金 白蒺藜

丹皮 薄荷 廣皮 茯苓

肝火 王六勞怒傷陽氣逆血滯致痛痞脹便溲風木侮土前方

臨證指南醫案 卷六 鬱 四

既效與通補陽明厥陰。

大半夏湯加栝子仁栝子仁當歸薑棗湯法。

肝火 朱三因抵鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲。

貫膈冲咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火。

但非六氣外來寒連之屬不能制伏固當柔緩以濡之。

合乎肝爲剛臟濟之以柔亦和法也。

生地 天冬 阿膠 茯神 川芎

牡蠣 小麥 人中白 熬膏

趙四鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不飢肝陽上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣

痺不通之象。病能篇以議。禁鼓。火丹溪謂上升之氣。從肝胆相火。非無據矣。	生地 阿膠 玄參 丹參	川斛 黑稽豆皮 朱氏 脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣。上衝。此邪鬱既久。少火化為壯火。氣純不循胞脈。遂痺。治以泄少陽補太陰。氣自流利。鬱熱可解。	人參 柴胡 當歸 白朮	丹皮 甘草 茯苓 吳三 脈弦滑數。頸項結癭。咽喉痛腫。阻痺。本穀難下。此皆	情志鬱勃。肝胆相火內風。上循清竅。雖清熱直降。難制。情懷之陽。是以藥藥勿效也。	鮮枇杷葉 射干 牛蒡子 蘇子	大杏仁 紫降香	朱 情懷鬱鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘。不舒。脹及背。部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫令鬱痺綿延。	鮮枇杷葉 杏仁 瓜蒌皮 鬱金 牛夏 茯苓 薑汁 竹瀝	又 脈左大弦數。頭目如蒙。背俞脹。都是鬱勃熱氣上
-------------------------------------	-------------	--	-------------	--	---	----------------	---------	---	----------------------------	--------------------------

升氣有餘便是火。治宜清上。	羚羊角 夏枯草 青菊葉 瓜蒌皮	杏仁 香附 連翹 山梔	又 苦辛清解鬱勃。頭目已清。而脈嘔氣。頗覺錢渴。此肝胆厥陽。由胃系上冲所致。丹溪謂上升之氣。自肝而出。是其明徵矣。	川連 薑汁 牛夏 枳實	桔梗 橘紅 瓜蒌皮 吳氏 氣血鬱痺。久乃化熱。女科八脈失調。漸有經阻。痰帶諸疾。但先治其上。勿滋膩氣機。	黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮	杏仁 鬱金 橘紅	徐氏 火升頭痛。來去無定期。咽喉垂下。心悸。二便不爽。帶下不已。固奇經。通補陽明。及養肝熄風。展轉未能却病。病從情志內傷。治法惟宜理偏。議先用滋腎丸三錢。早上淡鹽湯送。四服。	虞三 脈數。舌白神呆。得之鬱怒。	犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志 鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯苓 王十 痰多咽痛。頻遭家難。鬱傷。心中空洞。陰逆不已。議與
---------------	-----------------	-------------	---	-------------	---	-------------------	----------	---	------------------	---

胃藥 金匱麥門冬湯	陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸右脇之間常有不舒之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣	天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志	石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝法九	血絡鬱 趙六脈左瀉右弦始覺口鼻中氣觸脹今則右脇板痛呼吸不利卧着不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡	金鈴子 延胡 桃仁 歸翹	鬱金 降香	臨證指南醫案 卷六 鬱 七	肝鬱 王女陰虛齒齕腸血未出閣鬱熱為多與養肝陰方	生地 天冬 阿膠 女貞子	早蓮草 白芍 茯神 烏骨雞	張六情志連遭鬱勃厥陰中熱內蒸舌絳赤糜乾燥心動悸若飢食不加餐內傷情懷起病務以寬懷解釋熱在至陰鹹補苦泄是為醫藥	雞子黃 清阿膠 生地 知母	肝鬱 許厥陰少陰厥液乾涸陽升結痺於喉舌背心境失暢所致藥無效者病由情懷中來草木涼藥僅能治六氣
-----------	---	-----------------	----------------	---	--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------	---------------	---	---------------	---

外來之偏耳	熱地 女貞 天冬 霍山石斛 栝子仁 茯神	趙氏久鬱氣血不行升降皆鈍外涼內熱骨節沉痛肌腫腹膨膨脹無注用藥務在宣通五鬱六鬱大旨	香附汁 白茯苓 鉤藤 丹皮 山梔	撫芎 澤蘭 薑黃 神麴	金氣血久鬱成熱腕脇痺悶不通常有風疹腹痛癢痺已深發時宜用通聖一劑平時以通調氣熱之鬱	土瓜蔓皮 枇杷葉 黑山梔 鬱金	臨證指南醫案 卷六 鬱 八	楊驚惶忿怒都主肝陽上冒血沸氣滯癰濁宜宣通以就下因悞投止塞舊瘀不清新血又凝絡中匝月屢屢反覆究竟肝胆氣血皆鬱仍宜條達宣揚滿湯在肝得體中稍健設法	旋覆花 新絳 青葱管 炒桃仁 栝子仁	趙氏瘰癧寒熱盜汗腕中痠聚經期不來大便澀滯咳嗽減食春深至冬未痊此乃鬱損成勞難治之症	香附 丹皮 歸身 白芍	川貝 茯苓 牡蠣 夏枯草
-------	----------------------	--	------------------	-------------	--	-----------------	---------------	---	--------------------	--	-------------	--------------

頭項結核。夜寒熱盜汗。此乃憂鬱不解。氣血皆虛。倘若經阻。便難調治。

炒當歸 炒白芍 炙草 廣皮

伏神 鉤藤 南棗

張氏據說。喪子悲哀。是情志中起。因鬱成勞。知創不能食。內珠忽陷。忽脹。兩脇忽若刀刺。經先期。色變病紫。半年來醫藥無效者。情懷不得解釋。草木無能為矣。

人參 當歸 生白芍 炙草

肉桂 炒杞子 茯苓 南棗

素問六元正紀大論。言五鬱之發。乃因五運之氣。有

臨證指南醫案 卷六 鬱 九

太過不及。遂有勝復之變。由此觀之。天地且有鬱。而況於人乎。故六氣着人。皆能鬱而致病。如傷寒之邪。鬱於衛。鬱於營。或在經。在腑。在臟。如暑濕之蘊結在三焦。瘟疫之邪。客於募原。風寒濕三氣雜感而成痺症。總之邪不解散。即謂之鬱。此外感六氣而成者也。前人論之詳矣。今所輯者。七情之鬱居多。如思傷脾。怒傷肝之類是也。其原總由於心。因情志不遂。則鬱而成病矣。其症心脾肝胆為多。案中治法。有清泄上焦鬱火。或宣暢少陽。或開降肺氣。通補肝胃。泄胆補脾。宣通脈絡。若熱鬱至陰。則用鹹補苦泄。種種治法。

未能按症分析詳論。今舉其大綱。皆因鬱則氣滯。氣滯久則必化熱。熱鬱則津液耗而不流。升降之機失度。初傷氣分。久延血分。延及鬱勞沉痾。故先生用藥

大旨。每以苦辛涼潤宣通。不投燥熱。欲濟呆補。此其治療之大法也。此外更有當發明者。鬱則氣滯。其滯或在形軀。或在臟腑。必有不舒之現症。蓋氣本無形。鬱則氣聚。聚則似有形而實無質。如胸膈阻。心下虛痞。脅脹背脹。腕悶不食。氣瘕攻衝。筋脈不舒。醫家不察。誤認有形之滯。放膽用破氣攻削。迨至愈治愈劇。轉方又屬呆補。此不死於病。而死於藥矣。不知情

臨證指南醫案 卷六 鬱 十

志之鬱。由於隱情曲意不伸。故氣之升降開闔。樞機不利。雖內經有泄折達發奪五鬱之治。猶慮難獲全功。故疏五過論。有始富後貧。故貴脫勢。總屬難治之例。蓋鬱症全在病者能移情易性。醫者構思靈巧。不重在攻補。而在乎用苦泄熱。而不損胃。用辛理氣。而不破氣。用滑潤濡燥。而不滋膩。氣機用宣通。而不振苗助長。庶幾或有倖成。若必欲求十全之治。則惟道家有一言可以蔽之。曰欲要長生。先學短死。此乃治鬱之金丹也。華岫雲

肝火

對風火上

秦氏年前肝風眩暈。主以涼血分。和陽熄風。一年未發。今歲正月春寒。非比天暖開泄。此番病發。必因勞怒觸動。情志。至於嘔逆。微冷條熱。交丑寅漸作耳鳴咽痺。食納久留腕中。想少陽木火盛於寅。膽脈貫耳。犯逆之威。必向陽明而後上。憑諸竅。脈右濇大。胃逆不降。食味不甘。而腕中逆亂。薰蒸日熾。營血內耗。無以養心。斯寤不肯寐。心搖蕩漾。有難以鳴狀之象。今頭重腕痺。全是上焦為木火升騰。阻遏清陽。前方滋清血藥居多。必不奏功。臨證指南醫案卷六 肝火 十一

今議湯劑方。以苦降其逆。辛通其痺。然湯宜小其製度。以久病體虛。初春若此。冬藏未為堅固可知。其丸劑當以局方龍膏丸替服半月再議。

連翹一錢 黑梔皮一錢 羚羊角一錢 鮮菊葉三錢
紫苑二錢 鬱金八分 大杏仁 去皮尖勿研六粒

土瓜蔓皮一錢 鮮菖蒲根四分 午服
沈女腹痛少減。嘔逆已止。上焦熱下焦冷。肝陽尚未和平。擬進當歸龍膏法。

當歸 龍胆草 川棟子 蘆薈
川連 吳萸 大茴

黃氏肝膽風火上鬱。頭面清空之筋掣不和。治以清散。

羚羊角 犀角 山梔 連翹

瓜蔓皮 荷葉梗 薄荷梗 青菊葉

鄭氏顛風神迷。經脈抽痛。脹悶不欲納食。一月經期四至。此鬱傷氣血成病。龍膏丸二錢五分三服。

葉氏厥陽擾亂神明。經色已黑。肢冷面青便秘。龍膏丸一錢二分十服。

勞心火

關十誦讀吟咏。身雖靜坐。而心神常動。凡五志之動皆陽。陽胃無制。清靈遂蒙。易盲以蒙乃外加之義。述病發之時。頭中欲搐。脈欲撫摩。二便必不自利。此腑氣之窒。由

臨證指南醫案卷六 肝火 十一

乎肝胆厥逆起見矣。議從手經上焦治。

羚羊角 連翹心 玄參 石菖蒲根

鬱金 麥冬 竹葉

氣火鬱

唐女脈左濇右弦。氣火不降。胸脇隱痛。腕不來。最慮失血。

川貝 山梔 丹皮 鬱金汁

鈎藤 瓜蔓皮 茯苓 橘紅

又氣火上鬱。腕中室痛。嘔涎。先以開通壅遏。

香豉 瓜蔓皮 山梔 鬱金

竹茹 半夏 杏仁

經動胆

葛氏嗔怒喧嚷。氣火逆飛。致血痺咽痛。食物厭惡。耳聾後

達肩閃刺議解少陽

夏枯草

丹皮

桑葉

鉤藤

山梔

地骨皮

肝腎虛
虛風陽
上升

朱五頭痛神煩忽然而至五行之速莫如風火然有虛實

內外之因非徒發散苦寒為事矣如向有肝病自疾喪

明是陰氣久傷體質今厥陰風木司天春深發泄陽氣

暴張即外感而論正內經冬不藏精春必病溫百陰可

使熱清大忌發散益陰根久傷表之再傷陽劫津液仲

景謂一通自引日再逆促命期矣余前主阿膠雞子黃

湯佐地冬壯水為甘培土亟和其厥陽衝逆之威鹹味

臨證指南醫案

卷六 肝火

主

入陰甘緩其急與內經肝病三法恰合今已入夏三日

虛陽條上煩躁頭痛當大滋腎母以甦肝子補胃陰以

杜木火乘侮旬日不致反覆經月可望全好

人參

熟地

天冬

麥冬

龜膠

阿膠

北味

茯神

陸鼻左竅有血左耳聾腎痛皆君相多動營熱氣偏脈

得右虛左數先以清肝通絡

丹皮

山梔

羚羊角

夏枯草

蚕沙

紅藤

連翹

青菊葉

肝者將軍之官相火內寄得真水以涵濡真氣以制

伏木火遂生生之機本無是症之名也蓋三陽志下

舒則生鬱言語不投則生噴謀慮過度則自焚而罷

極之本從中變火攻衝激烈升之不熄是風陽升而

不透為鬱氣腕脇脹悶眩暈猝厥嘔逆淋瀝狂躁見

紅等病由是來矣古人雖分肝風肝氣肝火之殊其

實是同一源若過鬱者宜辛宜涼乘勢達之為要過

升者宜柔宜降緩其旋擾為先自竭者全歸平虛當

培其子母之臟至於犯上侮中乘下諸累散見各門

可致 御新甫

臨證指南醫案

卷六 肝火

主

不寐

倪 多痛陽升陰液無以上注舌潤赤絳煩不成寐當益

腎水以制心火

鮮生地 玄參 麥冬 菴豆皮

銀花 竹葉心

吳 少陽營火不寐

丹皮 半夏 鉤藤 桑葉

茯苓 橘紅

程氏 上晝氣逆填腕子夜寢不肯寐乃陽氣不降議用溫

臨證指南醫案 卷六 不寐 圭

膳湯 溫膳去積實加金斛 滾痰丸二錢五分

頭四 鬚髮已蒼面色光亮操心煩勞陽上升動痰飲亦得

上益 靈樞云陽氣下交入陰陽躋脈滿令人得寐今氣

越外泄陽不入陰勉飲酒醴欲其神昏假寐非調病之

法程凡中年已後男子下元先損早上宜用八味丸服

時用牛夏秋米湯

某 陽不交陰夜臥寐躁 小牛夏湯

趙氏 嘔吐眩暈肝胃兩經受病陽氣不交於陰陽躋穴空

寤不肯寐 靈樞方牛夏秋米湯主之

又 接用人參溫膳湯

某 四脈滿不能充長肌肉夜寐不適脾胃消索無以灌漑

故耳當用歸脾湯意溫之

嫩黃芪 於朮 茯神 遠志 棗仁

當歸 炙草 桂圓 新會皮

某 肝陽不降夜無寐進酸棗仁法

棗仁 知母 炙草 茯神

小麥 川芎

某 不寐六十日溫胆諸藥不效嘔痰不適明係陽升不

降用金匱酸棗仁湯

棗仁 知母 茯苓 川芎 炙草

臨證指南醫案 卷六 不寐 六

陳 陰精走泄復因洞瀉重亡津液致陽暴升胃逆食入

欲嘔神識不靜無寐議酸棗仁湯

棗仁 五錢 炙草 五分 知母 二錢 茯苓 二錢

某 三寢不成寐食不甘味厄羸脈細數瀉陰液內耗厥陽

外越化火化風燔燥煽動此屬陰損最不易治姑與仲

景酸棗仁湯

棗仁 炒黑勿 研三錢 知母 一錢 雲茯神 三錢

生甘草 五分 川芎 五分

田 臟液內耗心腹熱灼陽氣不交於陰陽躋穴空令人

寤不成寐靈樞有牛夏秋米法但此病乃損及肝腎欲

求陽和須介屬之賦佐以酸收甘緩庶幾近理	龜膠	茯苓	萸肉	五味	遠志
又鹹苦酸收已效下焦液枯須填實肝腎	龜鹿膠	熟地	從蓉	天冬	
	萸肉	五味	茯苓	羊內腎	
不寐之故雖非一種總是陽不交陰所致若因外邪而不寐者如傷寒瘧疾等暴發營衛必然窒塞升降必然失常愁楚呻吟日夜難安當速去其邪攘外即所以安內也若因裏病而不寐者或焦煩過度而離					
臨證指南醫案 卷六 不寐 七					
宮內燃從補心丹及聚仁湯法或憂勞憤鬱而耗損心脾宗養心湯及歸脾湯法或精不凝神而龍雷震蕩當壯水之主合靜以制動法或肝血無藏而魂搖神漾有鹹補甘緩法胃病則陽蹻穴滿有靈樞半夏秫米湯法膽熱則口苦心煩前有溫胆湯先生又用桑葉丹皮山梔等輕清少陽法營氣傷極人參人乳並行陽浮不攝七味八味可選餘如因驚宜鎮因怒宜疎飲食痰火爲實新產病後爲虛也 邵新甫					

陽升		心陽熱		血虛		肝陰虛	
某、陽升饋雜		某、心中煩熱頭上汗泄汗止自安易饋		程氏 血虛心饋咽喉		某氏 經半月一至夜饋痛	
麥冬三錢	生地二錢	茯苓三錢	黑糯米皮三錢	南棗	辰砂	生白芍	炙草
柏子仁一錢	川斛三錢	淮小麥	柏子仁	茯神	炙草	生地	阿膠
						白芍	丹參
						饋有虛實真偽其病總在於胃經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺又云脾與胃以膜相連耳又云脾主為胃行其津液者也由此觀之脾屬陰主乎血胃屬陽主乎氣胃易燥全賴脾陰以和之脾易濕必賴胃陽以運之故一陰一陽互相表裏合沖和之德而為後天生化之源也若脾陰一虛	
						臨證指南醫案 卷六 饋 六	
						生白芍 炙草 茯神 麻仁	
						天冬 女貞子	
						天冬 茯神	

則胃家飲食遊溢之精氣全輸於脾不能和胃津液以自潤則胃過於燥而有火矣故欲得食以自資稍遲則饑雜愈甚得食則饑可暫止若失治則延便閉三消噎膈之症治當補脾陰養營血兼補胃陰甘涼濡潤或稍佐微酸此乃脾陰之虛而致胃家之燥也更有切熱病之後胃氣雖漸復津液尚未充亦有是症此但以飲食調之可以自愈此二種乃為虛饑症所謂實者年歲壯盛脾胃生發之氣與腎陽充旺食易消磨多食易饑而饑得食即止此非病也不必服藥以上皆是真饑症所云僞者因胃有痰火以致

臨證指南醫案 卷六 九

九

三消

計四能食善飢渴飲日加癯瘦心境愁鬱內火自燃乃消症大病

生地 知母 石膏 麥冬

生甘草 生白芍

王五肌肉瘦弱善飢渴飲此久久煩勞壯盛不覺體衰病發皆內因之症自心營肺衛之傷漸損及乎中下按脈偏於左搏營經虛熱故苦寒莫制其烈甘補無濟其虛是中上消之病

臨證指南醫案 卷六 三消 三

犀角 三錢 鮮生地 兩 立參心 二錢 鮮白沙參 二錢

麥冬 二錢 柳霜 一錢 生甘草 四錢 鮮地骨皮 三錢

又 固本加甜沙參

楊八肝風厥陽上冲眩暈犯胃為消

石膏 知母 阿膠 細生地

生甘草 生白芍

某液涸消渴是臟陰為病但胃口不醒生氣易振陽明

陽土非甘涼不復肝病治胃是仲景法

人參 麥冬 梗米 佩蘭葉

川斛 陳皮

腎陰虛

胡七元陽變動為消與河間甘露飲方 河間甘露飲

錢十陽動消燥甘緩和陽生津

生地 炙黑甘草 知母 麥冬

棗仁 生白芍

楊六渴飲煩飢渴渴此屬腎消陰精內耗陽氣上燔

舌碎絳赤乃陰不上承非客熱宜此乃藏液無存豈是平常小恙

熟地 萸肉 山藥 茯神

牛膝 車前

某脈左數能食六味加二冬龜版女貞旱蓮川斛

臨證指南醫案卷六 三消 主

腎陰虛

王五形瘦脈搏渴飲善食乃三消症也古人謂入水無物

不長入火無物不消河間每以益腎水制心火除腸胃

激烈之燥濟身中津液之枯是真治法 玉女煎

姜五經營無有不勞心心陽過動而腎陰暗耗液枯陽愈

熾灼凡入火之物必消燥乾枯是能食而肌肉消癯用

景岳玉女煎

三消一症雖有上中下之分其寔不越陰陽亢津

潤熱滯而已故古治法唯仲景之腎氣丸助真火蒸

化上升津液本事方之神効散取水中鹹寒之物遂

其性而治之二者可謂具通天手眼萬世準繩矣他

如易簡之地黃引子朱丹溪之清渴方以及茯苓丸

黃芪湯生津甘露飲皆錯雜不一毫無成法可遵至

先生則範於法而不囿於法如病在中上者膈膜之

地而成燎原之場即用景岳之玉女煎六味之加二

冬龜甲旱蓮一以清陽明之熱以滋少陰一以救心

肺之陰而下顧真液如元陽變動而為消燥者即用

河間之甘露飲生津清熱潤燥養陰甘緩和陽是也

至于壯水以制陽光則有六味之補三陰而加車前

牛膝導引肝腎斟酌變通斯誠善矣 鄒滋九

臨證指南醫案卷六 三消 主

脾瘕

某 無形氣傷於結不飢不食。豈血分膩滯可投口

甘一症。肉經膠為脾瘕。中焦因不轉運可知

川連 淡黃芩 人參 枳實

淡乾薑 生白芍

某 口甜是脾胃伏熱。未法宜用溫胆湯法。

川連 山梔 人參 枳實

花粉 丹皮 紅 竹茹

生薑

臨證指南醫案 卷六 脾瘕 重

口甘一症。肉經膠之脾瘕。此甘非甘美之甘。即熱之謂也。人之飲食入胃。賴脾真以運之。命陽以腐之。脾胃造酒蒸津者。然倘一有不和。肥甘之疾頓發。五液清華失其本來之真味。則滯滯之甜味上泛不已也。胃脫必滯。口舌必膩。不飢不食之由。從此至矣。內經設一蘭草湯。其味辛足以散結。其氣清足以化濁。除陳解鬱。利水和營。為奇方之祖也。來暑夾溼之候。每兼是患。以此為君。參以苦辛之勝。配合瀉心等法。又知胃虛穀少之人。亦有是症。又當宗大牛夏湯及六君子法。遠甘益辛可也。 偏新甫

脾瘕症經言因數食甘肥所致。蓋甘性緩。肥性膩。使脾氣過滯。致有口甘。內熱中滿之患。故云治之以蘭。

除陳氣也。陳氣者。即甘肥醴成陳腐之氣也。夫蘭草

即為佩蘭。俗名為省頭草。婦人插於髻中。以辟髮中

油穢之氣。其形似馬蘭而高大。其氣香。其味辛。其性

涼。亦與馬蘭相類。用以醒脾氣。滌甘肥也。今二案中

雖未曾用。然用人參以助正氣。餘用苦辛寒以開氣

泄熱。枳實以理氣滯。亦祖蘭草之意。即所謂除陳氣

也。此症久延。即化燥熱。轉為消渴。故前賢有膏粱無

厭。發瘕瘕。熱燥所致。痰藪不堪生。腫脹寒濕而然之

臨證指南醫案 卷六 脾瘕 重

論余於甘肥生肉熱一症。悟出治胃寒之一法。若食人淡。其茹素不困外邪。亦非冷飲停滯。其本質有胃寒。症者。人皆用良薑丁香。草薢。吳茱萸。乾薑。附子等。以溫之。不知辛熱剛燥。能散氣。徒使胃中陽氣過而外泄。故初用似效。繼用則無功。莫若漸以甘肥投之。或稍佐鹹溫。或佐酸溫。凝養胃陽。使胃脂胃氣日厚。此所謂藥補不如食補也。又有腎陽胃陽兼虛者。曾見久服鹿角膠而愈。即此意也。未識高明者。以為然否。 華岫雲

瘧

孫陰氣先傷。陽氣獨發。瘧是伏暑內動。當與金匱瘧瘵

同例。

竹葉

麥冬

生地

玄參

知母

梨汁

蘆漿

施發熱身痛。咳嗽。暑濕外因。內阻氣分。宜微寒。保皆節

病也

竹葉

連翹

薄荷

杏仁

滑石

鬱金汁

臨證指南醫案

卷六 瘧

玉

又微寒多熱。舌心乾。渴飲腕不爽。此屬瘧瘵。治在肺經

杏仁

石膏

竹葉

連翹

半夏

橘紅

症陰氣先傷。陽氣獨發。有瘧熱無寒之慮。

鮮生地

知母

麥冬

竹葉心

滑石

未病形容先瘦。既病暮熱早涼。猶然行動安舒。未必

真正重病傷寒也。但八九日。病來小愈。驟食粉糲腥麵。

當宗食穀發熱。損穀則愈。仲景未嘗立方。此腹痛洞瀉。

食滯阻其腸胃。大腑不司變化。究其病根。論幼科體具

純陽。瘦損於病前。亦陽亢為消燦。仲景謂瘧瘵者。單熱

不寒。本條云。陰氣孤絕。陽氣獨發。瘧瘵。免令入。此

肌肉。不設方。但云。以飲食消生之。嘉言言。三。此

生津可愈。重後。大胃氣耳。洞瀉既。津液更。其寒多

餌。熱仍不已。暮夜昏。自言胸中格拒。腹中不和。此皆

病輕藥重。致陰陽二氣之殘。他法當。其寒。故進甘

酸。解其煩渴。方有斟酌。

又鼻衄。唇裂。舌腐。頻與不連。熱不肯已。此病太。藥重

於攻擊。致流行之氣。結閉不行。鬱遏不通。其熱愈甚。上

則不嗜飲。不納食。小溲頻利。便必管痛。三焦皆。神昏

瘧瘵有諸。

臨證指南醫案

卷六 瘧

玉

連翹心

鮮石薑油汁

牛一錢

川貝母

三錢

杏仁

射干

二分

淡竹葉

一錢

又自傷。狼藥。日有向愈之機。胃困則痞悶不飲食。今雖

未加餐。已知甘美。皆津之漸也。童真無下虛之理。漫溺

欲出。尿管必痛。良由肺津胃汁。因苦辛燥熱。烈氣味。劫

奪枯槁。腸中無以運行。庸醫觀此。必以分利。所謂泉源

既竭。當滋其化源。九竅不和。都屬胃病。

麥門冬

錢

甜杏仁

錢

甜水梨皮

錢

煎漿

一木

張舌赤。煩汗不。肢體忽。乃群年瘧瘵。暑邪深入所

致。

溫瘧		杏仁	滑石	竹葉	西瓜翠衣
又	熱甚而厥。幼穉瘧症皆然。竹葉石膏湯去人參牛	知母	花粉		
夏加知母					
某	風溫陽瘧				
杏仁	滑石	連翹	黃芩		
青蒿	淡竹葉				
丁	脈右數。左小弱。面明。夏秋伏暑。寒露後發。微寒。多熱。嘔逆。身痛。蓋素自痰火。暑必挾濕。病自肺經而起。致氣				
不宣化。不飢不食。煩渴短縮。乃在氣。不當與溫瘧同					
臨證指南醫案	卷六 瘧				
例忌葛柴足六經藥	桂枝白虎湯加半夏				
胡	按仲景云。脈如平人。但熱無寒。骨節煩疼。微嘔而渴				
者。病名溫瘧。桂枝白虎湯主之。桂枝白虎湯					
蓋今年夏秋久熱。口鼻吸暑。其初暑邪輕小。不致病					
發。秋深氣涼外束。裏熱欲出。與衛營二氣交行。邪與					
二氣遇觸。斯為熱起。臨解必有微汗者。氣邪兩泄。然					
邪不盡。則混處氣血中矣。故聖人立法。以石膏辛寒					
清氣分之伏熱。佐入桂枝辛甘溫之輕揚。引導涼藥					
以通營衛。兼知母專理陽明獨勝之熱。而手太陰肺					
亦得秋金肅降之司。甘草粳米和胃陰以生津。此一					

溫瘧		舉兼備方。下自註云。一劑知。二劑已。知者謂病已知			
其對症已者。中病當愈之稱耳					
鄧	寒少熱多。胸中痞脹。溫邪未解。設言止截				
淡黃芩	炒牛夏	薑汁	生白芍		
草菓	知母	烏梅	瘧症石豆		
又	照前方去半夏薑汁加紫甲				
吳	間日寒熱。目黃口渴。渴溫邪兼雨濕外薄為瘧				
滑石	杏仁	白蔻仁	淡黃芩		
牛夏	鬱金	此非紫胡不可			
又	脈數。舌紅口渴。熱邪已入血分				
臨證指南醫案	卷六 瘧				
竹葉	石膏	生地	丹皮		
知母	青蒿梗				
又	飲食不節。腹中不和。瘧邪攻胃				
鮮首烏	烏梅肉	生薑甲	黃芩	丹皮	
草菓	知母	送保和丸二錢			
又	人參	生穀芽	枳實汁	茯苓	廣皮
炒牛夏					
朱	舌黃煩渴。身痛。心腹中熱。躁暑熱不解為瘧。經言暑				
脈自虛。皆受從前疲藥之累瘳					
石膏	知母	生甘草	炒粳米		

竹葉

使邪勢輕參朮芪附皆固閉邪氣也

草果仁 知母

青蒿
花粉

無能去邪矣

石膏 杏仁

指南醫案 卷六

知母
竹葉

何解痼疾而不似紫胡散少湯出入之辨不暇何

川連 黃芩

白蔻仁 薤白

其製仍祖其意

川連
桔梗

茵陳 茯苓皮

藥

滑石 黄芩

白蔻 半夏

黃琴

證指南醫案 卷六

江日微冷熱多舌白腕悶嘔惡暑穢過募原爲瘧

杏仁 鬱金

黃芩 炒半夏

主旨達而成濕瘡

厚朴半一錢
杏仁半一錢

茯苓 三錢

五二 瘡止面浮漸及腕腹

苡仁 桑白皮

薑皮
廣皮

某 間癰寒熱俱微此屬濕瘧

杏仁 三錢 厚朴 一錢 桂枝 木五分

草果 八分 炒牛夏 一錢 茯苓皮 三錢 綿茵陳 三錢

牛八寒來喜飲熱湯發熱後反不渴間瘧已四十五日今雖

止不飢不思食五味入口皆變初病舌白乾噤濕邪中

於太陰脾絡濕膏氣滯喜熱飲暫通其膏邪蒸濕中生

熱六腑熱灼津不運行至大便輒秘此為氣痺濕結當

薄味緩調令氣分清肅與脾約似同但仲景氣血兼治

此病却專傷氣分

炒黃牛夏 生益智仁 綿茵陳 廣皮

臨證指南醫案卷六瘧

厚朴 茯苓

又 瘧止舌白不飢大便旬日不通此皆留邪堵塞經腑

隧道之流行久延必致腹脹癰瘕

杏仁 白蔻仁 半夏 厚朴 生香附汁

廣皮 茯苓皮 接服牛確丸二錢

某 脉右弦左弱留邪未盡大便粘稀最防轉痢較七八

日前勢減一二但去疾務盡苦辛寒遂其蘊伏而通利

小便亦不可少

草果 知母 厚朴 茯苓

木通 滑石

濕熱

曹 身痛舌白口渴利此濕溫客氣為瘧不可亂投藥

葛仲景有濕家忌汗之律此其苦言云症

飛滑石 杏仁 鬱金 淡黃芩

又 濕甚為熱心痛舌白便澀治在氣分

竹葉心 非麥冬 鬱金 菖蒲

飛滑石 橘紅 化服牛黃丸

又 心下觸手而痛自利舌白煩躁都是濕熱阻氣分議

開內閉用瀉心湯

川連 淡黃芩 乾薑 半夏

臨證指南醫案卷六瘧

人參 枳實

又 神氣稍清痛處漸下至臍濕傷在氣熱結在血吐咯

帶血猶是上行為逆熱病瘵留必從下出為順

川連 黃芩 乾薑 半夏

人參 枳實 白芍 炒查肉

費 舌白渴飲身痛嘔惡大便不爽診脉濡小乃暑濕從

口鼻入濕甚生熱四末掇中瘧發脈疾煩燥當以苦辛

寒清上微邪不可謂遺泄而痲亂以溫補助邪

黃芩 知母 白蔻 鬱金 薑皮

厚朴 杏仁 半夏 薑汁 石膏

又 脈濡口渴餘熱向熾		人參 知母 石膏 竹葉	
甘草 麥冬		又 熱緩不飲食津液受燥當和胃生津	
人參 五味 知母 橘紅		炒白芍 半夏 麴	
張 瘡家濕癰忌用表散 蒼木白虎湯加草果		曹 寒從背起汗泄甚面無渾澤舌色仍白邪未盡正先	
怯心虛瘧震恐亡陽厥脫議用仲景救逆法加參		又 舌絳口渴汗泄瀉來日吳熱過多身中陰氣大傷	
臨證指南醫案 卷六 瘧		剛補勿進議以何人飲	
人參 何首烏		孫 陽虛之體伏暑成瘧涼藥只宜少用身麻屬氣虛用	
生薑瀉心法		半夏 生薑汁 茯苓 炙甘草 南棗肉	
挑 陽微復瘧		桂枝 當歸 黃芪 防風	
鹿角脂 薑汁 南棗		范五 勞瘧入陰夏月陽氣發泄仍然勞苦經營以致再來	
不愈用藥以辛甘溫理陽為正但未易驟效耳			

人參 當歸 肉桂 炙草		川蜀漆 生薑 南棗	
方 寒甚於背陽脈衰也		人參 鹿茸 炒當歸 炙草	
鹿角霜 官桂 龜甲煎丸		吳六 背寒舌白粉脫知飢食無味此為無陽溫中下以托	
邪時寒以印未盡也非溫補可愈		生白朮 厚朴 桂枝 附子	
草果仁 茯苓		又 照方去茯苓加人參炙草生薑	
臨證指南醫案 卷六 瘧		程 寒熱經月不止屬氣弱留邪以益氣升陽	
補中益氣湯 何山青用紫胡		又 生鹿茸 鹿角霜 人參 歸身	
茯苓 炙草 生薑		某氏 建中法甚安知營衛二氣交餒夫太陽行身之背瘧	
發背不由四肢是少陰之陽不督太陽此汗大泄不		已矣孰謂非藥傷陽之咎歟議用桂枝加熟附子湯	
人參桂枝湯加熟附子		華氏 二十歲天癸始通而黃汗泄內熱外冷先天既薄瘧	
傷不復內經謂陽細為病苦寒熱網維無以振頓四肢			

骨節疼痛。通入脈以和補調經可以却病。

淡從蓉 鹿角霜 當歸 川芎

杜仲 小茴 茯苓 香附

顧氏進護陽方法。諸症已減寒熱未止。乃久病陽虛。脈絡

未充。尚宜通補為法。

人參 生鹿茸 當歸 紫石英

茯苓 炙草 大棗

又經邪不盡。寒熱未止。移瘥久。當傷氣。傷脈。絡中空乏。

尉進補法。僅能填塞。絡中空隙。不能驅除。羈伏之邪。滋

進養營法。取其養正邪自却之意。

臨證指南醫案 卷六 瘥 三

人參 當歸 杞子 生白芍 茯神

桂心 炙草 遠志 煨薑 南棗

袁脈弦緩。寒戰甚。則嘔吐噎氣。腹鳴漉漉。是足太陰脾

寒也。且苦辛寒。屢用不效。俱不對病。反傷脾胃。

人參 半夏 草果仁 生薑

新會皮 醋炒青皮

又靈樞經云。中氣不足。溲便為變。況老年人驚恐憂勞。

深夜不得安寐。遂致寒戰。瘥發當以病因而體貼諦視。

其為內傷實屬七八。見瘥通套已屬非法。若云肺瘥。則

秋涼不發。何傳及於冬。今小雪。當以勞瘥稱之。天勞必

傷陽氣。宜乎四末先冷。瘥邪傷中。為嘔惡腹鳴矣。用露

薑飲。

又陽陷入陰。必目瞑欲寐。寒則肉腠筋骨皆疼。其籜籜

一護衛太怯。查不知飢。焉得思穀。老年人須血氣充溢。使

邪不敢陷伏。古賢有取升陽法。

嫩毛鹿角 人參 當歸 桂枝 炙甘草

又前議勞傷陽氣。當知內損邪陷之理。凡女人天癸既

絕之後。其陰經空乏。豈但營衛造偏之寒。熱而已。故溫

脾胃。及露薑治中宮營虛。但畏寒不知熱。為牝瘥。蓋牝

為陰。身體重着。亦是陰象。此辛甘理陽。鹿茸自督脈以

臨證指南醫案 卷六 瘥 三

與提。非比薑附。但走氣分之剛暴。驅邪益虛。却在營分。

奇經曰。陽維脈為病。發寒熱也。

鹿茸 鹿角霜 人參 當歸

浮桂 茯苓 炙草

又正氣和營。瘥戰已止。當小其製。

人參 鹿茸 當歸 炒杞子

沙苑 茯苓 炙草

某瘥後。脾胃陽虛。便溏畏寒。肢體疲倦。當防腫脹。

附子 白朮 茯苓 澤瀉

苡仁 生薑 大棗

某 陰瘧已亂汗多

桂枝 牡蠣 生黃芪 炙草

歸身 五味 煨薑 大棗

某 脉沉舌白呃忒時煩躁向係陽虛痰飲瘧發三次

卽止此邪窒不能宣越竝非邪去病解今已變病陰

痰濁阻塞於中致上下氣機不相維續逆勢險危拾通

陽一法無方可擬必得中陽流通瘧症復作庶有愈機

淡附子一錢 生草果仁半錢 生白芍三錢 茯苓三錢

生厚朴一錢 薑汁五分 一劑 此冷香真武合劑

某 伏暑胃涼發瘧以羌防蘇藜辛溫大汗汗多衛陽大

傷胃津亦被劫乾致渴飲心煩無寐診脉左弱右促目

微黃嗜酒必中虛穀少易於聚濕蘊熱勿謂陽傷驟補

做內經辛散太過當食甘以緩之

大麥仁 炙草 炒麥冬 生白芍

茯神 南棗

又 藥不對症先傷胃口宗內經辛苦急急食甘以緩之

仲景謂之胃減有不飢不欲食之患藏用全瓠麥門冬

湯避胃汁以開痰飲仍佐甘藥取其不損陰陽耳金匱

麥門冬湯去棗米加茯神糯稻根鬚

又 脉右大間日寒熱目眇微黃身痛此平素酒濕挾時

邪流行經脉使然前因辛溫大汗所以暫養胃口今脉

症既定仍從瘧門調治

草果 知母 人參 枳實

黃芩 半夏 薑汁

項 瘧已過月形脉俱衰平素陽虛虛則邪難解散腹脹

是太陰見症治從脾胃

人參一錢 半夏二錢 生於朮二錢 茯苓二錢

草果仁二錢 淡薑一錢

陳 邪伏於裏積久而發路已遠未能日有寒熱汗出

不解攻表無謂平昔用垂前痛必有濕痰阻滯舌白不

喜飲治在太陰陽明

炒半夏 厚朴 草果 知母

薑汁 杏仁

某 遺泄損陰瘧熱再傷陰聲嘶火升乃水源不充易怒

神躁水不涵木之象用何人飲佐清陰火

製烏梅 人參 天冬 麥冬

知母 茯苓

某 瘧已半年今但微熱無汗身弱自乳血去傷陰此頭

痛是陽氣浮越心痛如飢哺熱都是陰虛成勞若不斷

乳經去不至為乾血則服藥亦無用

生地 三錢	阿膠 一錢	生白芍 一錢	炙甘草 四分
麥冬 一錢	火麻仁 一錢	粗桂枝 木三分	
某瘧後心悸氣怯便後有血是熱入傷陰用固本九加首烏阿膠			
人參	生地	熟地	天冬
麥冬	製首烏	阿膠	
某陰液消亡小溲短赤皆瘧熱所傷不飢不納陰藥勿以過膩甘涼養胃為穩			
人參	生地	天冬	麥冬
川斛	蔗漿	另服養生丸	
臨證指南醫案 卷六 瘧			
鄭自來陰虛有遺洩瘧邪更傷其陰寐多盜汗身動氣促總是根本積弱不主斂攝此養陰一定成法			
熟地	生白芍	五味	炒山藥
茯苓	芡實	湖蓮肉	
張脈數瘧來日遲舌乾渴飲積勞悵臂內傷居多致邪氣乘虛漸劫陰氣熱邪墜於陰熱來小溲頻數故汗多不解議清陰分之熱以救津液			
活鱉甲	知母	草果	鮮生地
炒桃仁	花粉		
翁脈左弦暮熱早涼汗解渴飲治在少陽			

青蒿	桑葉	丹皮	花粉
鱉甲	知母		
沈九用力失血無非陽乘攻絡瘧熱再傷真陰肌消食減自述夏暑汗泄頭顱脹大都是陰虛陽升清火皆苦寒未必能和身中之陽也			
鱉甲	生白芍	天冬	首烏
炙草	茯苓		
某氏瘧熱傷陰小溲淋痛			
生地	鱉甲	丹皮	知母
茯苓	澤瀉		
臨證指南醫案 卷六 瘧			
朱五瘧久後陰傷瀉血炒焦六味加龜甲黃柏			
吳十	陰瘧後內熱	清骨散	
項	陽氣最薄暑入為瘧先由肺病桂枝白虎湯氣分以通營衛為正治今中焦痞阻冷飲不適熱邪宜清胃陽亦須扶護用半夏瀉心法		
半夏	川連	薑汁	茯苓
人參	枳實		
王汗出不解心下有形自按則痛語言氣窒不爽瘧來鼻準先寒邪結在上當開肺痺醫見瘧治瘧焉得中病			
桂枝	杏仁	炙草	茯苓

乾薑 五味

又汗少喘緩。肺病宛然。獨心下痞結不通。猶自微痛。非關候下結胸。陷胸等法未安。况舌白渴飲。邪在氣分。微仲景與堅開痞。

生牡蠣 黃芩 川桂枝 薑汁

花粉 炒黑蜀漆

又照前方去花粉加知母草果

又驚甲煎九一百八十粒

王 舌白不大渴。寒戰後熱。神躁欲昏。而心胸飽悶更甚。瘧係客邪。先由四肢以擾中宮。痰嗽嘔逆。顯是肺胃。

臨證指南醫案 卷六 瘧

聖

虛邪聚閉。寒不通。故神昏煩悶。鬱蒸汗泄。得以暫解。營衛之邪未清。寒熱漫延無已。此和補未必中窠。按經設法為宜。

白蔻仁 大杏仁 焦牛夏 薑汁

黃芩 淡竹葉

又寒熱瘧邪交會中宮。邪聚必脹悶嘔逆。邪散則安舒。當心胸之間。並無停食之地。夫不正之氣為邪。穢濁瀰漫。原非形質。可以攻消。苟非芳香。何以開其蒙閉之機。濁欲少望。見效捨此捷徑。無成法可導。道中知否耶。
牛黃丸二服

樂二熱多昏謔。舌邊赤。舌心黃。煩渴。脈弱。是心經熱瘧。醫

投發散消導。津劫液涸。瘧厥至矣。

犀角 竹葉 連翹 玄參

麥冬 銀花

陳 前方復瘧昏迷。此皆陽氣上胃。救逆湯去薑加芍。

又鎮逆厥止。議養心脾營陰。乃病後治法。

人參 炙草 杞子 桂圓

炒白芍 棗仁 茯神 遠志

某四 舌白渴飲。咳嗽寒從背起。此屬肺瘧。桂枝白虎湯。

加杏仁

臨證指南醫案 卷六 瘧

聖

范 脈寸大汗出口渴。伏邪因新涼而發。間日瘧來。議治

手太陰

淡竹葉 大杏仁 滑石 花粉

淡黃芩 橘紅

金氏 肺瘧腕痞

黃芩 白蔻仁 杏仁 橘紅

青蒿梗 白芍

張 暑風入肺成瘧

淡黃芩 杏仁 滑石 橘紅

青蒿梗 連翹

陳六 歲冷暖不調。夜熱多汗。咳嗽。忌葷腥油膩。可免疳勞溫邪如瘧。當治手太陰。

竹葉心 麥冬 粳米 飛滑石

知母 炙草

柳 暑濕都傷氣分。不渴多嘔。寒起四肢。熱聚心胸。乃太陰瘧也。仍宜苦辛。或佐宣解裏熱之劑。

川連 黃芩 炒半夏 枳實 白芍

薑汁 煩躁甚另用牛黃九一丸

某 寒起嘔痰。熱久不渴。多煩中焦之邪。仍以太陰脾法。

草果 知母 生薑 烏梅

臨證指南醫案 卷六 瘧

炒半夏 桂枝木 早服驚甲煎方

葛 瘧久。舌白泄瀉。太陰脾傷。肌肉微浮。宜補中却邪。大忌消尅發散。

人參 草果 白芍 茯苓

煨老薑 炙草

王 脈濡不渴。嘔痰不飢。是太陰脾瘧。當辛溫以理中焦之陽。

生於木 半夏 草果 紫厚朴

茯苓 薑汁

又 太陰脾瘧。必有寒濕凝阻其運動之陽。所防久虛變

幻浮腫腹脹。人參未能多用。權以生木代之。但與絡方少遜。佐以通藥則無礙。

生於木 桂枝木 炒常山 茯苓

生鹿角 生薑汁

其 寒起四末。渴喜熱飲。屬脾瘧狀。先當溫散。

杏仁 厚朴 草果仁 知母

生薑 半夏

金 既成間日寒熱。嘔吐痰涎。其瘧邪大犯脾胃。故不飢不食。脈仍虛。舌白。治在太陰。不必攻表。

人參 半夏 草果 橘紅

臨證指南醫案 卷六 瘧

黃芩 知母 薑汁

沈 脈濡寒熱。瘧日遲。腹微滿。四肢不暖。是太陰脾瘧。用露薑飲以升陽。

人參 一錢 生薑 一錢 露一宿溫暖服

華 用勳藥瘧止。新沐瘧來。陽弱失衛。外邪直侵入裏。試以瘧來不得汗。邪不從外解。大著。

川桂枝 炮黑川烏 生白朮 炒黑蜀漆

全蠍 厚朴 薑汁丸

王 二 暑濕傷氣。瘧久傷陰。食穀煩熱。愈加邪未盡也。病已一月。不飢不飽。大便秘阻。仍有潮熱。全是津液暗傷。胃

子 53—582

口不得甦醒。甘寒清熱。佐以酸味。胃氣稍振。清補可投。		麥冬		乾首烏		烏梅肉		知母	
火麻仁		生白芍		高		陰虛溫瘧。雖止而腰獨痛。先理陽明胃陰。俾得安穀。		再商治腎	
北沙參		麥冬		木瓜		蜜水沙知母		大麥仁	
烏梅		周		舌白。脉小。暑邪成瘧。麻黃劫汗傷陽。遂變瘧症。今痰		鹹有血。右脇痛引背部。不知飢飽。當先理胃津。		大沙參	
桑葉		麥冬		茯神		臨證指南醫案		卷六	
瘧		生扁豆		苡仁		楊		高年瘧熱。劫胃汁。遂不飢不飽。不食不便。渴不嗜飲。	
味變酸濁。藥能變胃方甦。		人參		川連		枳實		牡蠣	
淡乾薑		生薑		徐		脉數。左寸大。關弦。瘧後食大。薑太早。胃氣受傷。不得		下降。致痞悶惡心。痰多唇燥。大便不利。俱是腑氣不宜	
之象。擬進溫膽湯法。以和胃氣。		炒焦竹茹		炒焦半夏		草果仁		生枳實	
杏仁		橘紅		金斛		花粉			

黃		瘧後不飢。咽即吐。此脫膈痰與氣阻。胃不降則不受		納。做溫膽湯意。佐以苦味降逆。		鮮竹茹		枳實	
妙半夏		茯苓		橘紅		川連		苦杏仁	
舊金汁		李		不飢口湧甜水。瘧邪未清。肝胃不和。		川連		乾薑	
枳實		瓜蒌仁		半夏		廣皮白		薑汁	
又		口湧甜水。脾瘕。		川連		黃芩		厚朴	
半夏		煎送脾約丸		生乾薑		廣皮		臨證指南醫案	
瘧		又		橘半枳木丸		金		寒自背起。衝氣由臍下而升。清涎上湧。嘔吐。遂飢不	
能食。此瘧邪深藏厥陰。邪動必犯陽明。舌白形寒。寒勝		都主胃陽之虛。然從補純守無益。		人參		牛夏		廣皮白	
薑汁		川椒		烏梅		附子		生乾薑	
方		先厥而瘧。蛇蠱下出。嘔逆腹鳴。皖痞室塞。此厥陰瘧		疾勿得亂治。		川連		淡乾薑	
薑汁		生白芍		烏梅肉		黃芩		秋露水煎藥	

又 陽微寒勝瘧久不已理胃陽以壯中宮使四末之邪不令徒犯脾胃

人參 炒牛夏 生薑 烏梅

草果 炒常山 秋露水煎

又 辛酸兩和肝胃已效

人參 草果 生薑 生白芍

烏梅 炙鱉甲

吳 體豐色白陽氣本虛夏秋易發痰飲為瘧寒熱夜作邪已入陰冷汗頻出陽氣益傷今診得脈小無力主白虛象已著恐延厥脫之慮擬進救逆湯法

臨證指南醫案 卷六

人參 龍骨 牡蠣 炙草

桂枝木 炒蜀漆 煨薑 南棗

又 關前陽氣偏泄今年久熱傷元初瘧發散不能去病便是再劫胃陽致邪入厥陰昏冒大汗思肝腎同屬下焦厥陽挾內風胃厥吐涎沫膠痰陽明胃中久寒熱肢擾空虛若谷風自內生聞醫藥不分經辨症但以稱虛道實宜乎鮮有厥效議用仲景安胃泄肝一法

人參 川椒 烏梅 附子 乾薑

桂枝 川連 生牡蠣 生白芍

又 諸症畧減寒熱未止尚宜實陽明泄厥陰細法

人參 炒牛夏 淡乾薑 桂枝木

茯苓 生牡蠣

又 天暴冷陽傷泄瀉脈得左手似數口微渴舌仍白陰液既虧飲水自救非熱熾也議通壅滯用薑其寒熱再緩

人參 淡附子 桂枝木 茯苓

生牡蠣 炒黑蜀漆

蔡 惡進穀食舌乾腹脹不飢不知味寐多寐少皆由鬱汗嘔逆都令諸陽交升胃氣不降則不食陽不下潛則無寐肝風內震則火升心熱法當和胃陽平肝氣肝平

臨證指南醫案 卷六

知母 北沙參 麥冬 新會皮

烏梅肉 新穀露沖

金 五 強截瘧疾裏邪凝結心下水飲皆嘔吐無餘病在胃口之上老年陽衰防其呃厥含瀉心之外無專方

人參 枳實 乾薑 半夏

川連 黃芩

又 舌白氣衝心痛噤噎味酸嘔吐涎沫皆胃虛肝乘倣仲景胃中虛客氣上逆可與旋覆花代赭石湯

旋覆花 代赭石 人參 半夏

<p>茯苓 薑汁 粳米</p> <p>又 諸恙向安。寢食頗逸。平昔肝木易動。左脈較右脈弦長。味變酸。木侮土。秋前宜慎。</p>	<p>人參 半夏 茯苓 廣皮</p> <p>生穀芽 生白芍</p>	<p>馬 瘧半月不止。左脇下已有瘧母。寒熱時必氣痞嘔逆。乃肝邪乘胃。有邪陷厥陰之象。擬進清心法。</p>	<p>川連 黃芩 乾薑 半夏</p> <p>人參 枳實</p>	<p>宋女 厥陰衝氣上攻眩暈間瘧 安胃丸三錢。椒梅湯送。</p> <p>臨證指南醫案 卷六 瘧 吳</p>	<p>陳氏 瘧母是瘧邪入絡。與血氣扭結。必凝然不動。今述遇必勞怒。衝氣至腕痛必嘔逆。必三日氣降痛緩。而後水飲得入。此厥逆之氣。由肝入胃。衝脈不和。則經水不調。</p>	<p>延胡 川棟子 半夏 蓬朮</p>	<p>蒲黃 五靈脂 薑汁</p>	<p>韓 瘧不止欲吐</p> <p>炒半夏一錢 厚朴一錢 青皮一錢 炒枳殼母半錢</p>	<p>吳 背寒瘧來漸晏。邪有入陰之意。此伏邪不肯解散。都因久積煩勞。未病先虛也。飲水少腹如墜。腕中痞結。不</p>
---	-----------------------------------	--	---------------------------------	---	---	---------------------	------------------	--	---

<p>舒中焦。屢受邪迫。陽氣先已微弱。而和太陰陽明法。</p>	<p>草果 知母 半夏 厚朴</p>	<p>薑汁 肉桂 黃芩 花粉</p>	<p>又 進雨和陰陽。寒熱已止。診脈右濡。明是氣衰。宜和胃生津。使餘邪不攻自解。</p>	<p>人參 知母 炙蠶甲 生白芍</p>	<p>烏梅肉 大麥仁 炒丹皮</p>	<p>又 脈左數。舌絳。暮渴。</p> <p>炒麥冬 人參 首烏 白芍</p>	<p>丹皮 茯苓 別更衣丸二錢</p> <p>臨證指南醫案 卷六 瘧 辛</p>	<p>陸六 口湧清。不飢不食。寒熱邪氣交會中焦。脾胃日困。</p>	<p>半夏 薑汁 茯苓 厚朴</p> <p>炒常山 草果 烏梅</p> <p>又 大半夏湯加草果烏梅</p> <p>凌十 瘧久。脾胃氣傷。不食倦怠。半年不肯復元。論理必用參朮益氣。但貧窘。豈能久用。然久延不愈。倘腹滿浮腫。便難調治。白朮膏加砂仁末。</p> <p>某三 瘧邪由四末以擾中宮。脾胃受傷無疑。但寒暑更遷。病邪既久。臟腑真氣自衰。兩年來納穀不進。漸覺衰微。不耐風冷之侵。並無凝痰聚氣見症。此必胸中宗氣自</p>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--	----------------------	--------------------	---	--	-----------------------------------	--

飯致清陽不司轉運當以仲景苓桂大甘湯

又六君子湯去甘草加檀香沉香木

吳瘧已復瘧渴渴淋痛拜年脾虛太陰不慎色黃腹膨

有滯脾胃愈衰東垣云氣不足變力變為秋交冬

迭加反覆久則五疳勞瘵當慎於食此令脾胃氣靈可

效宗脾胃論升降補法

人參 茯苓 炙草 廣皮 使君子

神麴 查肉 麥芽 澤瀉

祝此勞傷陽氣更感冷熱不正之氣身熱無汗肢冷嘔

熱自利舌灰白微嘔顯然太陰受病診脈小右濡不飢

臨證指南醫案 卷六 瘧 至

入夜昏謔語但如寐不加狂躁論脾為柔臟體陰用陽

治法雖多從未及病當遵前重冷香縮脾遺意

人參 益智仁 茯苓 新會皮

生厚朴 苡仁 木瓜 砂仁

又脈右弦來去不齊左小弱舌邊紅舌心白黃微絳

鼻冷四肢冷熱時微渴不飢不思食前議太陰脾臟受

病瘧邪從四末乘中必脾胃受病鼻準四肢皆冷是陽

氣微弱因病再傷竟日不暖但形肉消燥不敢開劫攻

邪以宣通脾胃之陽在陰伏邪無發散清熱之理

人參 草果 炒半夏 生薑

茯苓 新會皮 蒸烏梅肉

二帖後加附子後又加牡蠣

吳瘧傷脾胃腹中不和脈右滑食入脹甚前方通調氣

血佐以泄木服之積滯既下痛隨利減仍宜到木安土

不可作陽虛溫補治

生於朮 川連 枳實 麥芽

雞肫皮 廣皮 厚朴 炒山查

陳四瘧邪由四末以擾中皆陽明微陰界域陽明衰則厥

陰來乘津液少斯內風必動昔賢以麻屬氣虛木是濕

痰敗血今戊亥頻熱行走淋汗頭熱液虛陽動風生脂

臨證指南醫案 卷六 瘧 至

液不得灌漑肢末非濕痰氣分之恙

冬桑葉 熟首烏 黑芝蔴 柏子仁 茯神

當歸 杞子 菊花炭 蜜丸

李脈左弦嘔吐發熱後腕中痞悶不爽宜慎口腹清肅

上中二焦不致再延成瘧進苦辛法

杏仁 鬱金 山梔 豆豉

白蔻 枳殼

孫高年發瘧寒熱夜作胸悶不欲食煩渴熱頻最慮其

邪陷為厥進陽旦法

桂枝 黃芩 花粉 生白芍

生左牡蠣 煨薑

南棗

姬 瘧脉沉滿中脫宿結此屬裏症用瀉心法

半夏

川連

橘紅

枳實

黃芩

生薑汁

又 厥沉右關大瘧未止寒熱子後作煩渴中悶不欲食

醋炒半夏

杏仁

黃芩

花粉

草果

生薑

陸 瘧截虛氣痞結成身痛

桂枝

炒焦半夏

薑汁

廣皮白

當歸

茯苓

臨證指南醫案卷六 瘧

五

錢氏 暑熱傷氣成瘧胸痞結嘔吐痰沫有熱氣之結前醫

瀉心法極是

人參汁

枳實汁

黃連

黃芩

炒半夏

杏仁

厚朴

薑汁

汪 此濕熱與水穀交蒸全在氣分嘗得三焦分清解

既成間日瘧疾邪正互爭原無大害初候於混指傷寒

六經再認於參朮守補致邪瀰漫神昏喘急妄語瘧瘧

皆邪無出路內閉則外脫求其協熱下利已不可得診

脉細澹按腹膨滿夫瘧滿最氣燥實在血今洞利後而

加腹滿諸氣皆結豈非閉塞而然潰敗分裂至此難望

挽救

細葉葛蒲根汁 二錢

草果仁 五分

茯苓皮 三錢

紫厚朴 一錢

納蘭陳 三錢

辰砂益元散 五錢

連翹心 一錢

金銀花 三錢

另用牛黃丸一服用涼開水緩緩以茶匙化服

潘氏 伏邪發熱厥後成瘧間日一至咳嗽痰多惡心中痞

其邪在肺胃之絡擬進苦辛輕劑

杏仁

黃芩

半夏

橘紅

白蔻

花粉

程氏 脉右大寒熱微嘔脫痞不納四末瘧邪交於中宮當

臨證指南醫案卷六 瘧

五

苦辛泄降酸苦泄熱邪勢再減二三必從清補可愈

川連

炒半夏

薑汁

黃芩

知母

草果

炒厚朴

烏梅肉

毛氏 用玉女煎寒熱未已渴飲仍然惡惡已減周身皆痛

診脉兩手俱數舌色灰白邊赤汗泄不解擬用酸苦泄

其在裏熱邪務以瘧止再調體質

黃芩

黃連

草果

白芍

烏梅

知母

用秋露水煎藥

又 寒熱由四末以擾中宮胃口最當其戕害熱因不飢

胃傷邪留清熱利痰固為要法但有年氣弱兼之病經

匝月清邪之中必佐輔正議用半夏瀉心法

人參 半夏 黃連 黃芩

枳實 薑汁

方 勞瘧再發

人參 草果 生薑 烏梅 秋露水煎

又 補中益氣湯加草果知母薑棗

陳 絡虛則痛陽微則脹左脇有瘧母邪留正傷此勞瘧

人參 當歸 肉桂 炙甘草

茯苓 廣皮 生薑 薑棗

四劑後用五苓散一服

臨證指南醫案卷六瘧

某 勞瘧畏寒下虛不納六味加肉桂五味

某 瘧未止熱陷下痢中痞不欲食

人參 川連 黃芩 生白芍 廣皮

炒當歸 炒山查 乾薑 枳實 銀花

又 瘧後勞復

人參 當歸 白芍 棗仁

茯苓 廣皮 生薑 南棗

范三 脉小滿病起瘧後食物不和仍誦讀煩勞遂至左脇

連及少腹常有厥起或攻胃脘或聚腹中凝着脹脹古

語云瘧不離乎肝膽亦猶咳不離乎肺也蓋肝得邪動

木勢張揚中上必然受侮木氣自怯運納之權自減清

陽既少展舒濁陰日踞漸為痞滿上年溫養辛甘久進

未見病去其治體之法諒不能却自述靜處病加煩動

小安其為氣血久阻為營議用通絡法以病根由瘧久

邪留絡中耳

紫降香 桃仁 小香附 淡薑渣 神麴

雞肫皮 南山查 韭根汁法丸

高 瘧發既多邪入於絡絡屬血分汗下未能逐邪仲景

製蠶甲煎丸一法搜剔絡中留伏之邪五六日必效

早午暮各服七粒

臨證指南醫案卷六瘧

某 瘧邪經月不解邪已入絡絡聚血邪攻則血下究竟

寒熱煩渴目黃苦膩溺赤短少全是裏邪未清凡腥葷

宜禁蔬食不助邪壅閱醫藥柴葛攻表消導通便與瘧

無異用仲景蠶甲煎丸朝十粒午十粒黃昏十粒開

水送

費 瘧邪迫傷津液胃減不飢腸燥便紅左脇微堅有似

瘧母結聚當宣絡熱以肅餘邪

生地 知母 丹皮 麻仁 生蠶甲

某氏 瘧邪內陷變成陰瘧久延成勞務以月經通爽不致

邪劫乾血

瘰癧

生鱉甲一錢 桃仁三錢 炒丹皮一錢 穿山甲三錢

查肉一錢 生香附一錢

顧左脇有瘰癧乃氣血交結之故治宜通絡

鱉甲 桃仁 金鈴子 牡蠣

丹皮 夏枯草

江遠客水土各別胃受食物未和更遭憤怒動肝木犯胃土瘰癧腸中有形瘰聚三年前恙氣血暗消但久必入血湯藥焉能取效宜用緩法以疎通其絡若不追拔致陽結陰枯釀成噎膈難治矣

生鱉甲 桃仁 麝香 麝蟲 韭白根粉

臨證指南醫案 瘰癧 卷六 瘰癧 手

歸鬚 郁李仁 冬葵子 熬膏

吳四瘰癧反覆左脇瘰癧

生鱉甲 生牡蠣 炒桃仁 當歸鬚 炒延胡

柴胡稍 桂枝木 炒查肉 青皮

某夏秋濕熱瘰癧正虛邪留混入血絡結成癰瘰瘰癧

夫濕氣熱氣本屬無形醫治非法血脈蘊邪故寒熱間

發仲景立法務在緩攻急則變為中滿慎之兼服鱉甲

煎丸

知母 草果 半夏 黃芩

烏梅 生薑 秋露水煎

金一經年老瘰癧左脇已結瘰癧邪已入絡與氣血膠結成形區區表裏解散之藥焉得入絡通血脈攻堅壅佐以辛香是絡病大旨

生牡蠣三錢 歸鬚二錢 桃仁二錢 桂枝五分

炒蜀漆一錢 公丁香三粒

某三少陰三瘰癧已入當升湯溫經

鹿茸 熟附子 人參 粗桂枝

當歸 炒黑蜀漆

呂二陰瘰癧一年方止羸瘦妨食食入不運不飲湯水四肢無力診脈微弱不鼓屢進六君益氣無效當溫裏通陽

臨證指南醫案 瘰癧 卷六 瘰癧 手

從火生土意

人參 熟附子 生益智 茯神

白芍 生薑

吳四三瘰癧愈後反覆寒多有汗勞則陽波致瘰癧議護陽却邪

邪

川桂枝 熟附子 生於朮 炙草

生薑 南棗肉

某陰瘰癧汗多下焦冷用升陽法

人參 鹿茸 桂枝木 當歸

炙甘草 生薑 大棗

陸七邪深留陰。三日始有瘧發。但熱來必神昏譫妄。是源

中震動所致。議定未病兩日日進清心牛黃丸一服。試

看後期瘧至何如。

蔡氏三日瘧一年有餘。勞則欲發。內熱未平。有結。今長大

攻走不定。氣逆欲嘔。經閉四載。當厥陰陽明同治。

半夏 川連 乾薑 吳萸 茯苓

桂枝 白芍 川椒 烏梅

蔡三三瘧不飢不納惡心。渴喜熱飲。診脈沉細。脾陽因類

不能送邪外出。治以四獸飲。

沈三三瘧腹脹不渴。嘔水邪在脾胃之絡。溫疎裏邪。勿用

臨證指南醫案 卷六 瘧

芩

表散

草果 粗桂枝 生薑 厚朴

炒蜀漆 茯苓

又溫脾通胃得效。

生於朮 淡附子 川桂枝 炒黑蜀漆

厚朴 生薑

某四三瘧經年。至今復受濕邪。及發日來舌白。脘悶渴喜

熱飲。當溫太陰。

杏仁 草果 知母 桂枝

半夏 生薑 厚朴 烏梅

蔡九三瘧脾發。用露薑法寒止熱盛。加入烏梅五分。取其

酸味以和陰。謂其瘧久。陰亦傷耳。

胡陰瘧。滯傷脾胃。用苦辛溫得效。瘧未已。腹脹便秘。議

理中陽。

人參 益智 木香 茯苓

厚朴 廣皮 生薑

錢三遇勞瘧發數年。初起即三陰。此傷損已在厥陰之絡。

最難速效。甘溫益氣久進益氣湯。

某三三瘧早載。中陽室寒。脘脹不運。背寒肢冷。

草果仁 杏仁 半夏 茯苓

臨證指南醫案 卷六 瘧

卒

桂枝 厚朴 廣皮 生薑

某脈濡面黃舌白。脘中格拒。湯水皆嘔。三日瘧一至。據

色脈診。乃足太陰陽微飲。當以溫藥和之。

半夏 華撥 丁香柄 草薢

厚朴 薑汁

李初病勞倦。熱投東垣益氣湯。未嘗背謬。而得湯反

劇。聞穀氣穢。間日瘧來。渴思涼飲。此必暑邪內伏。致營

衛週流與邪觸着。為寒熱分爭。故甘溫益氣。升舉脾

臟氣血。與暑熱異岐。胃中熱灼。陽土愈燥。上脘不納。腸

結便閉。其初在經在氣。其久入絡入血。由陽入陰。間日

延為三癰奇脉。臍維皆微邪傷內經。謂陽維為病。苦寒熱也。維為一身網維。故由四末寒凜而起。但仍是脉絡為病。故參芪木附不能固陽以益其虛。歸桂地芍無能養營以却邪矣。昔軒岐有刺癰之旨。深慮邪與氣血混成。一所汗吐下無能分其邪耳。後漢張仲景推廣聖經。蘊奧謂癰邪經月不解。勢必邪結血中。有癰瘕癰母之累。瘕製方驚甲煎丸。方中大意。取用重蟻有四。意謂飛者升走者降。靈動迅速。追拔沉混氣血之邪。益散之不解邪非在表攻之不勝邪非著裏補正却邪正邪並驅無益。故聖人另闢手眼以搜剔絡中混處之邪。治經千

臨證指南醫案

卷六 癰

癰

百歷有明驗服十二日干支一週倘未全功當以升其八脉之氣由至陰返於陽位無有不告安之理

某

陰癰兩月或輕或重左脇按之痠痛邪伏厥陰血絡恐結瘕母議通絡以逐邪用仲景驚甲煎丸每早服三十粒當寒熱日勿用

癰母

昌

三癰皆邪入陰絡故汗下為忌經年癰瘕癰瘕母仍聚季脇邪攻血氣之結攻逐瘀聚升降以通陰陽乃仲景成法但診脉細微食減神衰攻法再施恐擾中滿前與溫補通陽頗安然守中之補姑緩為宜

人參

當歸

淡附子

淡乾薑

茯苓

肉桂

驚甲膠丸

諸癰由伏和而成非旦夕之因為患也六淫之氣惟燥不能為害而新涼收束實屬有關考之聖訓獨手三陽手厥陰邪無其症名醫者當辨其六氣中所傷何氣六經中病涉何經若小柴胡專主少陽豈能氣招也夫溫癰瘕癰瘕食瘕癰諸瘕皆有成方予不復贅但此症春月及冬時間有惟夏秋暑濕為患者居多暑必挾濕濕傷氣分第一要分別其上焦中焦之因暑濕二氣何者為重若暑熱重者當究上焦肺臟清氣瘕來時必熱重而寒微唇舌必絳赤煩渴而喜

臨證指南醫案

卷六 癰

癰

涼飲飲多無痞滿之患其脉色自有陽勝之候當宗桂枝白虎法及天水散加辛涼之品為治若濕邪重者當議中焦脾胃陽氣瘕來時雖則熱勢蒸燔舌必有粘膩之苦渴喜暖湯胃脘覺痞脹嘔惡其脉色自有陽氣不舒之情狀當宗正氣散及二陳湯去甘草加香薷生薑之類主之必要陽勝於陰而後配和陽之劑日後方無貽累倘症象兩兼則兩法兼之可也大凡是症若邪氣輕而正不甚虛者寒熱相等而作止有時和氣重而正氣怯者寒熱模糊來勢必混而不分又云邪淺則一日一發邪稍深則間日一發邪

最深則三日一發。古稱爲三陰大瘧。以肝脾腎三臟之見症爲要。其病爲寒濕。亦不離仲景治三陰之法。爲根蒂。可知陽經雖虛。而方治之無益也。所云移早則邪達於陽。移晏則邪陷於陰。陰陽勝復於此可參。若久而不已。必有他症之虞。太陰之虛。浮脹滿有通補之理。中法開胃之五苓湯。少陰之痰弱成勞。有滋陰之復脈湯。溫養之升奇法。厥陰之厥逆吐衄。及邪結爲瘕。母有烏梅丸。與醫中煎法。又如心經瘧久。勢必動及其營。則爲煩渴見紅之累。肺經瘧久。理必傷及其津。則爲胃秘腸澀之候。一則涼陰爲主。一則清降爲宜。然而瘧之名目不一。而瘧之兼症甚多。若不達權通變。而妄能一一盡善。卽如暑濕格拒三焦。而嘔逆不納者。宗半夏瀉心法。穢濁蒙蔽膈中而清靈昧者。用牛黃清心丸。心陽暴脫有龍螭之救逆。胃虛嘔呃。有旋覆代赭之成方。如表散和解。通陽補氣。滋陰化營。搜邪入絡。動藥劫截。辛酸兩和。營氣血補。及陽瘧之後。養胃陰。陰瘧之後。理脾陽等法。已全備矣。彙集諸家。融通無拘。所謂用藥如用兵。先生不愧良工之名也。臨新前

泄瀉

周 因長夏濕熱食物失調。所謂濕多成五泄也。先用日苓湯分利陰陽。胃苓湯去甘草。

溫 長夏濕勝爲瀉。腹鳴溺少。腑陽不司分利。先宜導濕和中。胃苓湯。

又 向年陰分傷及陽位。每有腹滿便澹。長夏入秋常有滯下。此中焦氣分積弱。水穀之氣易於聚濕。或口鼻胸入。被邪遂令脾胃不和。是夏秋調攝最宜加意。擬夏秋應用方。備採天暖氣蒸南方最有中痧痞脹諸恙。未受

病前。心懷疑慮。卽飲芳香正氣之屬。毋令邪入爲第一義。

藿香梗 白蔻仁 榴紅 桔梗

杏仁 鬱金 降香 厚朴

夏至後熱勝濕蒸。氣傷神倦。川東垣益氣湯。若汗出口渴。兼生脈散飲液。

某 秋暑穢濁。氣從吸入。寒熱如瘧。上咳嗽。下洞泄。三焦蔓延。小水短赤。議芳香辟穢分利滲濕。

藿香 厚朴 廣皮 茯苓塊 甘草
猪苓 澤瀉 木瓜 滑石 檀香汁

又進藥稍緩所言穢濁非臆說矣其陰虛者服是藥熱甚而下墜入腑與方書莖欬症有間議河間法

厚朴 杏仁 滑石 寒水石

石膏 猪苓 澤瀉 絲瓜葉

其陰虛久傷成疝。便不能卧。脊強。脉垂。足跗浮腫。乃督

脉不用。漸至僂僂廢疾。近日暑濕內侵泄瀉。先宜分利和中。

厚朴 藿香 廣皮 茯苓 澤瀉

木瓜 炒扁豆 炒查肉 炒砂仁

蔡二氣短少續為虛。近日腹中不和。泄瀉暑傷。先以清暑

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 奎

和脾。預防滯下。

厚朴 廣皮 炙草 茯苓 澤瀉

炒扁豆 麥芽 木瓜 炒查肉 砂仁

又香砂異功散

葉五平素操持積勞。五志之火易燃。上則鼻竅堵塞。下有

肚痔腸紅。冬春溫邪。是陽氣發越。邪氣乘虛內伏。夫所

伏之邪。非比暴感發散可解。况兼勞倦內傷之體。病經

九十日來。足跗日腫。大便日行五六次。其形粘膩。其色

黃赤紫滯。小便不利。必隨大便而稍通。此腎關樞機已

廢。二腸陽腑失司。所進水穀脾胃不主運行。釀濕墜下。

轉為癰腐之形。正當土旺入夏。脾胃主氣。此濕熱內滯

由乎脾腎日傷。不得明理之醫。一誤再誤。必致變現腹

滿矣。夫左脉之緩清。是久病陰陽之損。是合理也。而右

脉弦大。豈是有餘形質之滯。即仲景所云。惡為胃滅。大

則病達。亦由陽明脉絡漸弛。脾胃下日。上之義。守中治

中。有妨食滋滿之弊。大旨中宜運通。下宜分利。必得小

便。自利。脾氣開闔。始有轉機。若再延綿月餘。夏至陰生。

便難力挽矣。四苓加椒目厚朴益智廣皮白

又服分消方法五日。瀉減。溺通。足跗浮腫未消。要知脾

胃久困。濕熱滯濁。無以運行。所進水穀。其氣蒸變為濕。

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 奎

濕勝多成五瀉。欲使濕去。必利小便。然滲利太過。望六

年歲之人。又當慮及下焦久病。入夏正脾胃司令時候。

脾臟宜補。則健胃腑宜疎。自清。扶正氣。驅濕熱。乃消補

兼施治法。晚服資生丸。炒米湯送下。

服早 人參 廣皮 防己 厚朴 茯苓

生朮 澤瀉 神麴 黃連 吳萸

朱 口腹不慎。濕熱內起。泄瀉復至此。多成五泄。氣瀉

則腹脹矣。

人參 茅朮 川連 黃芩 白芍

廣皮 茯苓 澤瀉 查肉

陳 脉緩大。腹痛泄瀉。小溲不利。此水穀內因之濕。傳蒸腸胃。致清濁不分。若不清理分消。延為積聚。粘膩滯下。議用芩芍湯。		淡黃芩	生白芍	廣皮	厚朴
張 脉緩瀉。腹滿。痛瀉不爽。氣鬱滯久。濕凝在腸。用丹溪小溫中丸。		藿香	茯苓	猪苓	澤瀉
針砂 小川連 蒼朮 白朮 香附		半夏	廣皮	青皮	神麴漿丸
程 診脉肝部獨大。脾胃緩弱。平昔納穀甚少。而精神頗臨證指南醫案 卷六 泄瀉 七		好。其先天充旺。不待言矣。目今水瀉。少腹滿脹。少腹為厥陰肝位。由陰陽不分。濁踞於下。致肝失疎泄。當以五苓散導水利濕。倣古急開支河之法。			
黃九 久瀉兼發瘧疾。是濕勝熱鬱。苦寒必佐風藥。合乎東垣脾宜升胃宜降之旨。		人參	川連	黃柏	廣皮 炙草 生於朮
朱三 形瘦尖長。木火體質。自上年泄瀉。累用脾胃藥不效。此陰水素虧。酒食水穀之濕下墜。陰弱不能包涵所致。宜苦味堅陰。淡滲勝濕。		羌活	防風	升麻	柴胡 神麴 麥芽

炒川連 炒黃柏 厚朴 廣皮白		茯苓	猪苓	澤瀉	炒查肉
陳 寒濕已變熱鬱。六腑為窒。為瀉。		生白朮	厚朴	廣皮	白茯苓
某三 酒濕內聚。痰飲餘濕下注。五泄。常用一味茅朮丸。		益智仁	木瓜	茵陳	澤瀉
王氏 頭暈。喜冷飲。咳嗽。心中脹。泄瀉不爽。此為中風。故止瀉血藥更甚。舌色白。議清上焦氣分。		炒半夏	茯苓	苡仁	刺蒺藜 新會皮
臨證指南醫案 卷六 泄瀉 笑		石膏	淡黃芩	炒半夏	橘紅
王二 自春徂冬。瀉白積。至今腹痛。小水不利。想食物非宜。脾胃水寒。偏注大腸。當分其勢。以導太陽。胃苓湯主之。		厚朴	杏仁		
胡三 三瘧劫截不效。必是陰臟受病。血熱濕。食入不化。痛瀉。二者相反。思病延已久。食物無忌。病中勉強進食。不能充長精神。即為滯濁阻痺。先以脹瀉調理。不必以瘧相混。		草果	厚朴	陳皮	木香
郁八 經營勞心。納食違時。飢飽勞傷。脾胃受病。脾失運化。		茯苓皮	大腹皮	猪苓	澤瀉

夜屬陰陽。至天明洞瀉粘膩。食物不喜。脾弱。惡食。柔濁之味。五苓通膀胱分泄。濕氣已走。前陰之竅。用之小效。東垣謂中氣不足。溲便乃變。陽不運行。濕多成五泄矣。		人參	生白朮	茯苓	炙草
某五	炮薑	肉桂	厚朴	廣皮	半夏
某八	形寒便瀉。舌白。	桂枝木	生薑	厚朴	益智仁
程氏	寒濕腹痛。惡心泄瀉。	藿香梗	益智仁	廣皮	乾薑
臨證指南醫案 卷六 泄瀉		炒茅朮	煨木香	茯苓	澤瀉
吳氏	寒凝胃陽。腹痛泄瀉。	草果	厚朴	茅朮	廣皮
吳氏	吳更	炒查肉	人參	生益智	炮薑
程氏	瀉後腹脹。	厚朴	廣皮	砂仁	茯苓
陸氏	氣滯爲脹。濕鬱爲瀉。主以分消。	炒厚朴	大腹皮	茯苓	澤瀉
愚益智	廣皮	炒查肉			

某氏 雨濕涼氣。乘於脾胃。泄瀉之後。腹膨減食。宜健中運濕。		焦白朮炭	厚朴	廣皮	生穀芽
程女	濕鬱脾陽。腹滿。肢冷泄瀉。四苓散加厚朴廣皮。	炒扁豆	木瓜	茯苓	澤瀉
鄒氏	濕傷泄瀉。小便全少。腹滿欲脹。舌白不飢。病在足太陰脾。宜溫中佐以分利。	生茅朮	厚朴	草果	廣皮
又	早服眞武丸。薑湯送二錢五分。一兩。	茯苓	猪苓	澤瀉	炒砂仁
臨證指南醫案 卷六 泄瀉		夜服針砂丸。開水送一錢五分。六錢。	又人參	附子	枳實
乾薑	生白芍	某氏	脉沉緩。肌肉豐盛。是水土稟質。陽氣少於運行。水穀聚濕。布及經絡。下焦每有重着筋痛。食稍不運。便易泄瀉。經水色淡。水濕交混。總以太陰脾臟調理。若不中竅。恐防脹病。	人參	茯苓
倪六	陽傷濕聚。便溲足腫。	羌活	獨活	防風	澤瀉
倪七	陽傷濕聚。便溲足腫。	白朮	炙草	廣皮	

粗桂枝 生白朮 大防已 茯苓 澤瀉	又 脈緊足腫便溲陽微濕氣不流暢相成單脹 照前方加藟陳	又 晨泄肢腫	生白朮 桂枝木 淡附子 茯苓 澤瀉	陸五 當濟動氣子夜瘕泄晝午自止是陽衰寒濕滯瀉 陽不運每瀉則脹減宜通不宜瀉	製川烏 生茅朮 茯苓 太香	厚朴 廣皮	朱 消渴乾嘔口吐清涎舌光赤泄瀉熱病四十日不食	臨證指南醫案 卷六 泄瀉	孰邪入陰厥陽犯胃吞酸不思食久延為病傷成勞	川連 烏梅 黃芩 白芍	人參 訶子皮	陶十 病由春木正旺中焦受尅先泄瀉繼以腹痛小便不利 利食不思納皆是六腑不和所致夫胃為陽土肝屬陰木 木剋宜通肝宜柔宜涼治胃必佐泄肝制其勝也閱方 呆補不知臟腑陰陽故辨及之	泡淡黃芩 炒小川連 炒廣皮 厚朴	生白芍 炒烏梅肉 猪苓 澤瀉	楊 因驚而瀉腹痛欲嘔是為飢厥當用酸苦忌進甜物
-------------------	-------------------------------	--------	-------------------	---	---------------	-------	------------------------	--------------	----------------------	-------------	--------	---	------------------	----------------	------------------------

川椒 烏梅肉 川連 淡乾薑	金鈴子 延胡 桂枝木 生白芍	唐 胃中不和不飢少寒肝風震動頭暈泄瀉高年經月 未復兩和厥陰陽明	炒半夏 人參 枳實 茯苓 炒烏梅肉	潘 入夜咽乾欲嘔食納腹痛即瀉此胃口大傷陰火內 風劫燥津液當以肝胃同治用酸甘化陰方	人參一錢 焦白芍三錢 訶子皮七分 炙甘草五分 陳倉米三錢	又 去陳米加南棗一枚	又 咽乾不喜湯飲腹鳴溺濁五液消燥虛風內風擾於 臨證指南醫案 卷六 泄瀉	人參 木瓜 焦白芍 赤石脂 炙草	朱 經月減食泄瀉下焦無力以扶土泄木法	人參 焦木 炒益智 茯苓	木瓜 廣皮	某 病後陰傷作瀉	烏梅 白芍 炙草 廣皮	茯苓 荷葉	王 霍亂後痛瀉已緩心中空洞肢節痿弱此陽明脈虛 內風閃燥益虛象也 異功去參朮加烏梅木瓜白芍
---------------	----------------	------------------------------------	-------------------	---	------------------------------	------------	--	------------------	--------------------	--------------	-------	----------	-------------	-------	---

又上吐下瀉之後中氣大虛身痛肢浮虛風內動以補中爲法 異功散加木瓜薑棗

某腹鳴晨泄 顛眩脫痺形質以屬陽不足診脉小弦非

二神四神溫固之症蓋陽明胃土已虛厥陰肝風振動內起久病而爲發泄用甘以理胃酸以制肝

人參 茯苓 炙草 廣皮

烏梅 木瓜

某頭痛損目黎明腸鳴泄瀉煩心必目刺痛流淚是木火生風致脾胃土位日戕姑議泄木安土法

人參 半夏 茯苓 炙草

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 圭

丹皮 桑葉

徐六自春季胸脇肌腠以及腹中疼痛從治肝小愈腹鳴泄瀉不止久風殭泄都因木乘土位東垣云治脾胃必先制肝倣此

人參

焦木 炙草 木瓜

烏梅 炒兔絲餅

程勞損經年食入腹脹痛瀉心中寒涼膚腠熱蒸此陽不內潛脾胃久困萬無治嗽清降之理議用戊己湯扶

土制木法

葉三左脇氣脹在皮膚之裏此絡脉中病也泄肝破氣久

服脾胃受困而爲泄瀉得養中小愈然以藥治藥脈絡之病仍在

半夏 桂枝 茯苓 遠志

歸鬚 橘紅 薑棗湯泛丸

張如腹鳴腹脹清晨發泄先以熄肝風安脾胃方

人參 茯苓 木瓜 炒烏梅 炒菟絲子

又泄肝醒胃方

吳萸 生白芍 炒烏梅 人參 茯苓

某脉右弦腹膨脹泄瀉半年不痊此少陽木火鬱傷脾土久則浮腫脹滿法當疎通泄鬱非辛溫燥熱可治

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 圭

黃芩 白芍 桑葉 丹皮

柴胡 青皮

吳陽虛惡寒惡心吞酸泄瀉乃年力已衰更飲酒中虛

治法必以脾胃扶陽

人參 茯苓 附子 白朮

乾薑 胡盧巴

趙晨泄難忍臨晚稍可寧耐易飢善食仍不易消磨其故在乎脾胃陰陽不和也讀東垣脾胃論謂脾宜升則健胃宜降則和援引升降爲法

人參 生於朮 炮附子 炙草 炒歸身

<p>又腸風鳴震泄利得緩猶有微痛而下都緣陽氣受傷垢滯未不清楚必以溫通之劑為法</p>		炒白芍	地榆炭	炮薑炭	煨葛根	煨升麻
<p>金五能食不化腹痛泄瀉若風冷外乘肌肉着冷其病頃刻即至上年用石刻安腎丸初服相投兩旬不效知是病在中焦不必固下矣自述行走數十里未覺衰倦痛處選臍議用治中法足太陰陽明主治</p>		生於朮	生茅朮	生益智	淡乾薑	
<p>臨證指南醫案卷六泄瀉</p>		胡蘆巴	茯苓	木瓜	萆撥	
<p>王五三年久損氣怯神奪此溫養補益皆護元以冀却病原不藉乎桂附辛熱以劫陰液今胃減咽乾大便澹泄經月夏三月脾胃主候宜從中治</p>		人參	炒白芍	炙草	煨益智	
<p>金冲年遺恙先天最薄夏秋癰傷食少不運痞脹澹瀉都是脾胃因病致虛當薄味調和進治中法</p>		炒木瓜	茯苓	廣皮		
<p>人參</p>		益智	廣皮	茯苓		
<p>木瓜</p>		炒澤瀉	穀芽	煨薑		

<p>李氏脉沉形寒腰髀牽強腹鳴有形上下攻觸每晨必瀉經水百日至一週仲景意</p>		茯苓	炮淡乾薑	生於朮	肉桂	
<p>某氏陽微瀉瀉吐瀉心痛皆辛溫開氣胃陽建醒乃安</p>		炒半夏	厚朴	廣皮	益智仁	
<p>某二色白脉弱體質陽薄入春汗泄神力疲倦大便澹洩不爽皆脾陽因頓不克勝舉無以鼓動生生陽氣耳刻下姑與和中為先</p>		煨木香	烏藥	香附汁	薑汁	
<p>臨證指南醫案卷六泄瀉</p>		益智仁	廣皮	薑炭	茯苓	生穀芽
<p>楊小便不利大便澹泄補脾法中佐以淡滲分其陰陽</p>		人參	熟朮	茯苓	象牙屑	
<p>薛三水穀濕邪內著脾氣不和腹膨不飢便澹四肢痠痺</p>		厚朴	茯苓皮	大腹皮	防已	
<p>又肢痠腹膨便澹</p>		廣皮	澤瀉	苡仁	桂枝木	
<p>馬一飲酒少穀中氣久虛晨泄下部冷腎陽脾陽兩虛</p>		木防已	生白朮	苡仁	木瓜	
<p>桂枝木</p>		澤瀉				

飢少納法當理陽酒客性不喜甘膩滋柔之藥

茯苓 覆盆子 生益智 炒菟絲餅

補腎脂 芡實

朱 酒濕內因脾腎陽虛用黑地黃丸蒸餅水煮和丸

徐 九 晨泄病在腎少腹有痼亦是陰邪若食葷腥厚味病

即頓發乃陽氣積衰議用四神丸

席 五 陰瘧初愈不慎食物清陽既微健運失司腸胃氣滯

遂為洞泄且足跗微腫慮其腹筋欲滿夏季脾胃主令

尤宜淡薄藥以通陽為先平時脾腎兩治

胃苓湯去白朮甘草 接服黑地黃丸去五味

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 七

朱 一 久瀉無有不傷腎者食減不化陽不用事八味腎氣

乃從陰引陽宜平少效議與升陽

鹿茸 人參 陽起石 茯苓

炮附子 淡乾薑

又 久瀉必從脾腎主治但痛利必有粘積小溲短縮不

爽溫補不應議通腑氣

厚朴 黃反 茯苓 猪苓 澤瀉

川連 煨木香 炒山查 炒神麴

僧 五 痼泄一年食減腹鳴屬脾腎陽衰近腹中微痛兼理

氣滯用陳無擇三神丸

某 背部牽掣入脇晨瀉 苓桂朮甘去甘加鹿角茸

龔 二 診脈兩關緩弱尺動下垂早晨未食心下懊懣納穀

仍不易化蓋脾陽微中焦聚濕則少運腎陰衰固攝失

司為痼泄是中宜旋則連下宜封乃藏是醫藥至理議

早進治中法夕用四神丸

高 氏 經來腹膨臍脊痠垂自秋季泄瀉不已脫肛妨食用

濟生丸不應

鹿角霜 炒菟絲餅 生杜仲 淡從蓉

茯苓 砂苑 焦歸身 炒黑小茴

陳 氏 產育十五胎下元氣少固攝晨泄自古治腎陽自下

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 七

涵蒸脾陽始得運變王氏以食下不化為無陽凡腥膩

沉着之物當忌早用四神丸晚服理中去朮草加益

智木瓜砂仁

張 氏 泄瀉脾腎虛得食脹

人參 炒菟絲子 炒黃乾薑 茯苓

煨益智 木瓜

某 瀉五十日腹鳴渴飲溲瀉不利畏寒形倦寐醒汗出

用溫中平木法

人參 胡蘆巴 炮薑 茯苓

訶子皮 附子 粟殼

某 脾腎不攝五更瀉

巴戟 菟絲子 五味 補骨脂 芡實

建蓮 山藥 炙草

某 久瀉脈虛

人參 五味 禹餘糧石

張氏 產後不復腹疼痼瀉

炒菟絲餅 鹿角補 生杜仲 淡補骨脂

炒黑小茴 炒杞子 茯苓

顧氏 閱病原是勞損自三陰及於奇經第腹中氣升胃痛

壁有行動觸衝任脈之守補則滯涼潤則滑漏瀉久瀉

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 羌

寒熱最為吃緊先固攝下焦為治

人參 炒菟絲餅 芡實 湖蓮

茯神 赤石脂

某 腎虛痼瀉

炒香菟絲子 生杜仲 炒焦補骨脂

尚香 雲茯苓

又 陽微子後股鳴前方痼瀉已止

人參 炒菟絲子 炒補骨脂 湖蓮肉

芡實 茯苓

顧 脾腎痼瀉腹膨肢腫久病大虛議通補中下之陽

人參 川熟附 茯苓 澤瀉 炒黃乾薑

某 腎虛痼瀉乃下焦不攝純剛恐傷陰液以腎惡燥也

早服震靈丹九 晚間米飲湯調服參苓白朮散

二錢 二藥服十二日

中虛腹 高 脈細下垂高年久咳腹痛泄瀉形神憔悴乃病傷難

復非攻病藥石可愈擬進甘緩法

炙甘草 炒白芍 炒仙糖 茯神 南棗

汪 過食泄瀉胃傷氣附津不上潤臥則舌乾微渴且宜

薄味調攝和中之劑量進二三可安

人參 葛根 生穀芽 炙甘草

臨證指南醫案 卷六 泄瀉 今

廣皮 荷葉蒂

泄瀉注下症也經云濕多成五泄曰飧曰瀉曰飧曰瀉

濡曰滑飧泄之完穀不化濕兼風也瀉泄之腸垢汚

積濕兼熱也飧泄之溲清溺白濕兼寒也濡泄之身

重軟弱濕曰勝也滑泄之久下不能禁固濕勝氣脫

也是以胃風湯治有血之瀉泄清六九瘵腸垢之熱

瀉瀉瀉便清溺白中有硬物選用理中治中滑泄脈

微氣脫洞下不禁急投四柱六柱飲健瀉瀉有虛有

實或以胃苓或以木附至於脾泄胃泄腎泄大腸泄

小腸泄大瘕泄痰泄鬱泄傷酒傷食泄古方古法條

載甚詳其急則治標必使因時隨症理固然也及其緩則治本惟知燥脾滲濕義有未盡者乎蓋脾同坤土本至靜之體而有乾健之用生萬物而役於萬物從水從火為寒為熱歷觀協熱下利者十不得一二從水之寒泄者十常八九焉言當然者主治在脾推所以然者必求之水火因思人身水火猶權衡也一勝則一負火勝則水負水勝則火負五泄多濕濕水同氣水之盛則火之衰也於是推少陽為三陽之樞相火寄焉風火扇胃而熟腐五穀少陰為三陰之樞龍火寓焉薰蒸臟腑而轉輸糟粕胃之納脾之輸皆

臨證指南醫案

卷六

泄瀉

全

火之運也然非雷藏龍馴何能無燥無濕勢有胃明燎上之傳如果土奠水安從此不泛不溢定無清氣在下之患矣吾故曰五泄之治平水火者清其源崇隄土者塞其流耳今觀葉氏診記配合氣味妙在清新縱橫治術不離規矩依然下者升滑者固寒者溫熱者清脉弦治風脉濡滲濕總之長於辨症立方因而投劑自能輒效所謂讀古而不泥於古採方而不執於方化裁之妙人所難能者余友吳子翼文昔在葉氏門牆曾言先生洞達人情諳練時務使之應世一人傑也以故小道居此盛名又聞其應酬之暇好

讀兩漢出辭自必高古惜乎著作長案不能一見令人嘆息不忘耳

蔣式玉

臨證指南醫案

卷六

泄瀉

全

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

癰厥

驚

癰

臨證指南醫案 卷七目

古吳葉桂天士先生著 鄒山鄒錦晚滋九全較

邵銘新甫

痢

沈 暑必挾濕傷在氣分古稱濕下此滯字非停滯飲食

言暑濕內侵腑中流行阻遏而為滯矣消導升舉溫補

暑邪無有出路胸痞不飢不食麻未已而肛門沉墜

裏結二焦皆受邪蒸上下渾如兩截延為休息痢疾纏

臨證指南醫案 卷七 痢

綿展轉豈旦晚驟愈之病

外有暑和濕時不可用涼有冬連不解救也 淡黃芩

不 人參 枳實

徐 夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔

白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

枳榔汁 青皮 陳皮 厚朴

川連 黃芩 木香 炮黑山查

又 濕熱下痢必用苦辛寒為治粟殼瀉腸止瀉久痢成

方當此熱邪未清宜通斯滯可去因色白氣弱未敢峻

攻耳

厚朴 黃芩 川連 木香汁

查肉 炒銀花 麥芽

盧痢症濕熱皆是夏令伏邪但以攻消大傷胃氣不能去病今微嘔不飢不寐大便欲解不通是九竅六腑不和總是胃病

人參一錢 吳萸炒川連四分 泡淡生乾薑五分

茯苓三錢 川棟子肉一錢 生白芍一錢

某女舌色灰黃渴不多飲不飢惡心下利紅白積滯小溲不利此熱濕內伏三焦氣機不主宜通宜用分理氣血不必見積以攻滌下藥

證指南醫案 卷七 痢

飛滑石 川通草 猪苓 茯苓皮

藿香梗 厚朴 白蔻仁 新會皮

陸氏經來暑穢痧脹心煩自利黑瘀

淡黃芩 枳實 川連 石菖蒲

鬱金 橘紅

陳姬瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸膈痞悶納穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾邪焉存補瀉可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘手重症矣

人參 茯苓 川連 淡乾薑

生白芍 枳實

某臍上青筋突痛太陰脾受傷此前症也近日腹痛白積兩旬不已是新受夏秋暑濕與病與岐先理新病導氣分消主之

藿香 厚朴 廣皮 茯苓皮

川連 木香 木瓜 扁豆

某痰喘宿病正在初秋而發又值寒熱下痢血積腹痛吐逆脈來右弦左弱且黃蓋明必是暑濕凝滯着裏以補虛之中佐以清邪乃通劑法

人參 黃芪 白芍 廣皮 石蓮子

證指南醫案 卷七 痢

川連 查肉 草決明 金銀花

王痢疾古稱滯下乃是濕熱氣薄腸胃阻閉氣分故利仍不爽河間丹溪僉用清熱導氣者爲此

黃芩 川連 草決明 炒黑查肉

生白芍 石蓮 丹皮 廣木香汁

倪六面垢舌白心下脘中淒淒痼室至圖復便不爽此水穀之濕內蒸爲熱氣道阻閉上熱下冷若外受客邪既過募原必有寒熱矣

淡黃芩 川連 淡竹葉 板榔汁

白芍 厚朴 廣皮白

某 濕溫下痢脫肛 五苓散加寒水石

江 食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而泄下三月不愈清
疎帶補之

人參 川連 炒白芍 炒查肉

廣皮 茯苓 炒當歸 久痢可用常脾

陸 濕熱內結中焦痞結陽氣虛虛體質濕注自利不爽
神識昏亂將變柔症

炒牛夏 人參 枳實 川連

乾薑 黃芩 薑汁

顧 得湯飲腹中澀澀自利稀水平昔酒客留濕濕勝內

證指南醫案 卷七 痢

四

濕腸胃不爽凝積東垣清暑益氣亦為濕熱傷氣而設
但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾

生茅朮 四兩 炒黑黃柏 二兩 炒黑地榆 二兩

猪苓 一兩 澤瀉 一兩 水法丸服三錢

葛 酒客大便久瀉腸上曾發瘡瘍春夏脇下有形腹形

滿脹此久蘊濕熱瘴膿自利未能泄邪腸胃氣壅利頻
不爽法當分消以去濕熱若攻劫太過必傷脾胃議用

丹溪小溫中丸早進二錢五分夜進二錢五分 三兩

某 潮熱自利腹痛

黃芩 生白芍 枳實 桔梗

檳榔汁 木香汁

徐 能食腹痛下痢兼和其陰

人參 生白芍 黃芩 枳實

川連 乾薑

某 濕熱內蒸下利紅積

炒黑神麴 炒黑查肉 茯苓皮 飛滑石

新會皮 厚朴 淡竹葉 扁豆葉

祝 三十年久痢須推飲食遺忌酒客濕滯腸中非風藥之
辛佐苦味入腸何以勝濕逐熱久病飲食不減腸中病
也

證指南醫案 卷七 痢

五

綿茵陳 香白芷 北秦皮 茯苓皮

黃柏 藿香

某 形瘦陰虧濕熱下痢誤投消食反劫津液邪未盡津

先耗咽喉痛且喉痧所謂濕未罷已上燥矣

川連 銀花 通草 黃芩

川貝 茯苓皮

某 濕熱內阻氣分腹痛下痢且苦黃舌光不渴議清裏

泄濕熱

黃芩 寒水石 川連 厚朴

秦皮 鬱金

山五濕腎腹痛利紅如豆汁

生茅術錢三 炒山查半錢 厚朴一錢 紅麴一錢

廣皮一錢 猪苓一錢

某夏秋痢疾固是濕熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽古方香連丸取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯濕熱積聚無容留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與痢門濕熱大異蓋滋則呆滯氣窒寒宜乎欲便不出究竟濕熱邪仍在桂附燥又致肛墜痛如刀割補中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義

應證指南醫案卷七痢

六

謂諸痢久都屬腎傷小腹痛墜忌冷顯然是下症議與升陽亦須下治

人參 茯苓 澤瀉 炙草 防風根

羌活 獨活 細辛 生薑 大棗

某舌白渴不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽微嘔有痰口味有變頭中空痛兩頰赤此水穀氣蒸濕熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩燥難堪苦況法當苦寒泄熱苦辛香流氣滲泄利濕蓋積滯有形濕與熱本無形質耳

川連 黃芩 鬱金 厚朴

厥陰伏

猪苓 枳米 秦皮

包先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

淡黃芩 川連 升皮 生芍

炮薑 炒銀花

陳氏溫邪經句不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥陰恐致變逆

白頭翁 川連 北秦皮

黃柏 生白芍

又溫邪誤表劫津神昏身熱

炒生地 阿膠 炒麥冬 生白芍

應證指南醫案卷七痢

七

炒丹皮 女貞子

邱進潤劑痛緩積稀知厥陰下利宜柔宜通血虛有風

顯然

生地 阿膠 丹皮 生白芍

銀花 小黑稽豆皮

某熱漸入裏痢痞便泄議酸苦泄熱

黃芩 川連 枳實 白芍

廣皮白 滑石 甘草 穀芽

蔡內虛邪陷協熱自利脉左小右大病九日不減是為重症議用白頭翁湯方加黃芩白芍

滯 時令暑濕都從口鼻而受氣得則營衛失於轉運必
身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦傷腹
痛瀉積無非濕熱之化此分清利濕則可若以表藥則
傷陽氣矣

茯苓 陳皮 厚朴 木香

炒扁豆 炒山查

又 協熱下利粘膩血水是腸胃中濕熱之化也

北秦皮 白頭翁 茯苓 澤瀉

炒銀花 益元散

其 春溫內陷下痢最易厥脫

臨證指南醫案卷七痢

八

川連 阿膠 淡黃芩 炒生地

生白芍 炙草

王 熱毒逗留不化潮熱下利

川連 黃芩 炒白芍 茯苓

澤瀉 木瓜

張三 江南地薄氣弱夏季食物內蘊積今熱迫內聚濕熱

赤痢入冬不愈皆飲食不思之累宜淡清滋味

生茅朮 厚朴 南山查 草果仁

檳榔皮 槐花 廣皮 銀花

又 痢血三月晝痢夜止肛門微腫以氣陷門戶不藏

人參 當歸 白芍 肉桂 炙草
此非血痢之方反用此藥以耗其血

某 四血痢半載少腹痛六味地黃加炒查肉炒延胡

某 血積痛痢起於夏令秋半不減明是濕熱滯於腸胃

久延面色消奪右脈搏大乃痢症所大忌稍通積聚兼

以和血

酒炒大黃 川連 黃芩 丹皮

肉桂 歸身 白芍 生甘草

袁二 久痢腹痛下血

生黃芪 錢三 生白朮 錢三 炒歸身 錢一 炒查肉 錢二 炒地榆 錢一

證指南醫案卷七痢

九

廣皮 一錢 厚朴 一錢 羌活 五分 防風 根五分

朱九 下痢帶瘀血肛中氣陷腹不痛

炒黑榜根皮 兩 生茅朮 錢一 生黃柏 錢一 炒黑查肉 錢三

炒黑地榆 錢一 炒焦銀花 錢一 赤苓 三錢 猪苓 一錢

某 痢痢不爽已有血下暑濕不獨在氣分且積勞茹素

攻奪宜慎

當歸 白芍 南山查 厚朴

草果 炮薑

某 脈緩臍上痛便稀溺短此乃濕鬱脾胃之陽致氣滯

裡急宗古人導濕分清意

生茅木 廣皮 厚朴 官桂 飛滑石

茯苓 猪苓 澤瀉 炒山查

張五 脉沉伏久痢腹痛畏寒少食氣弱腸滯以溫通方法

熟附子 生茅木 生大黃 茯苓

厚朴 木香

又溫下相投腸滯不通皆因腸氣微弱古賢治病不離通瀉二法

當歸 肉桂心 茯苓 厚朴

南山查 生麥芽

王三平昔溫補相投是陽不足之證聞患痢兩月不思食

臨證指南醫案 卷七 痢

物脾胃滯塞不加嘔惡夫六腑宜通治痢之法非通即瀉肝腸結閉陽虛者以溫藥通之

熟附子 製大黃 厚朴 木香 茯苓皮

范七痢稱滯下謂有滯必先痛後下况病起不慎口腹陽氣室塞積聚留著試閱前方宜通者有妙宜慎則病劇

六腑皆以宜通為用

附子 大黃 茯苓 厚朴

生草果 廣皮

又溫下已效腸胃留滯都因陽不主運再佐理氣兼之

附子 製大黃 茯苓 廣皮

厚朴 生益智 木香 猪苓

李痢將兩月日微黃舌白且乾唇燥渴飲之軟竟

日小便不通病者自述肛門室塞努掙不已僅得迸出

粘積點滴若有稀糞自必傾腸而多思夏秋間暑濕內

着為病軒岐稱曰滯下謂滯着氣血不獨食滯一因凡

六腑屬陽以通為用五臟皆陰藏蓄為體先瀉後痢脾

傳腎則逆即土剋水意然必究其何以傳剋之由蓋伏

邪垢滯從中不清因而下注矣遷延日久正氣因虛仲

景論列三陰至太陰篇中始舉出腹滿字樣脾為柔臟

惟剛藥可以宣陽驅濁但今二腸室痺氣不流行理中

臨證指南醫案 卷七 痢

等法決難通腑考內經二虛一實者治其實開其一面也然必溫其陽佐以導氣逐滯欲圖扭轉機關拾此更

無他法

製附子 生厚朴 木香 製大黃 炒黑大黃

又概弛牛月脾胃復健脾散不主健運納食皆變痰沫

腎真失司納氣水液上泛阻咽昔痢傷陽變脈未傳

脈見弦勁是無胃氣小愈變病最屬不宜入冬為藏陽

之令今陽漸潰散而陰液枯槁渴不多飲飲不解渴治

陽必用剛藥其陰更洞矣轉展無可借者勉與脾腎分

調脾陽動則冀運腎陽靜可望藏王道固難速力援之

體用不可險藥

早服炒白腎氣丸 午服參苓白朮散加益智仁

許勞倦咳嗽失血 仍然不避寒暑 食物腹中瀉痢 病上加病 後服法當先治 以分病有新舊

厚朴 益智 廣皮 茯苓皮

白芍 炙草 木瓜 炒扁豆

又咳嗽瀉痢 藥治相背 治肺礙脾 治脾礙肺 方今交冬 治病為要 病人說早食相安 晚食腹瀉 脾胃陽氣已乏 勿徒消滯寒濕矣

白芍 桂酒拌 益智 廣皮 茯苓

臨證指南醫案 卷七 痢 三

焦白朮 炙草 穀芽 砂仁殼

下痢瀉痢之後 診脈右弦大 胃虛少納 陽弱不運 運化法當通腑之陽

人參 益智仁 炒薏絲餅 炒砂仁末

茯苓 廣皮白

陸二腹痛自瀉 脈來濡小 病在太陰 況小便清長 非臍病

濕熱之比法當溫之

生於朮 附子 茯苓 厚朴 乾薑

許四痢疾一年 已浮腫溺瀉 古稱久痢必傷腎 肝前用理陰煎不應 詢及食粥 吞酸色瘁 脈濡中焦之陽日憊 水

穀之濕不運 仍辛溫以甦脾陽 佐以分利 用胃苓湯去甘草加益智

陳痢積雖然少緩 諸熱不減 面色青晦 四肢厥冷 仍在險途 擬進益黃散法

人參 煨益智仁 公丁香 茯苓

廣皮 青皮 木瓜 炒冬米

某脈微細 肢厥下痢 無度 吳茱萸湯 但能止痛 仍不進食 此陽敗陰瀾 腑氣欲絕 用桃花湯

赤石脂 乾薑 白粳米

某痢後大便不實 食不化 選色脈俱虛 象此清陽失

臨證指南醫案 卷七 痢 三

曠於中 陰氣先走泄於下 先理中焦 再當攝陰

人參 白朮 茯苓 炙草

廣皮 炮薑 益智

某自利不渴者 屬太陰 呃忒之來 由于胃少納穀 衝氣

上逆有土敗之象 勢已險焉 議金匱附子粳米湯

人參 附子 乾薑 炙草 粳米

某長齋有年 土海氣餒 加以久痢 少穀欲嘔 脾胃之陽

衰矣 由夏及今 半載不痊 倘忽腫脹 何法施治

人參 白朮 乾薑 炮薑

丁香 茯苓

袁 中下陽微嘔呃下利溫中不應恐延衰脫夫陽宜通陰宜守此關開不致潰散春回寒谷生氣有以把握候王先生主議

人參 附子 炮薑 炒粳米

某 春痢入久痢止腹痛食少童年那有活慾之擾此係寒熱不和脾胃受傷也六君子湯加肉桂
某 脈沉微下痢紅紫黑舌胎粉白並不渴飲此太陰脾營虛寒也做理陰煎

當歸頭 白芍 炮薑 炙草

唐氏 下痢四十餘日形寒腹痛

茯苓 益智 炒當歸 生白芍 肉桂 炒山查

陽明不 沈 議堵截陽明一法

某 六高年下痢寒多舌乾脈右空大神困音低乃脾腎兩虛一氣虛有年致此恐非所宜
人參 一錢 菟絲子 一錢 赤石脂 三錢 炮薑 一錢 茯苓 三錢 木瓜 一錢

王 十久痢久瀉為腎病下瀉久而陰傷氣墜四神丸治脾腎晨泄辛溫香燥皆剛佐入五味酸柔不過稍製其雄烈此肛墜尻痠乃腎液內少而氣陷矣腥油肉食須忌

熟地 禹餘糧石 五味子

蔣 五久痢用辛甘溫而效是脾陽久傷治由東垣法極是述食血腥滑必便溏四肢忽有肉疹營衛內應脾胃氣血未得充復五旬外下亦怯用脾腎兩補

人參 山藥 茯苓 湖蓮 芡實 補骨脂 從蓉 萸肉 五味 巴戟 菟絲 覆盆子

某 下痢腹痛舌乾肛墜痢傷陰也

熟地炭 炒歸身 炒白芍 炒查肉

某 滯濁下行痛緩議養陰通腑

茯苓 炙草 生地 何膠 丹皮 山梔

孫 脈左數下利腹不甚痛暮夜微熱所伏暑熱乘陰虛下陷是清熱理脾不效當攝陰升陽

熟地炭 當歸炭 山查炭 炒黑麥芽 炙黑甘草 防風根 炒黑升麻 又 照方去山查麥芽加人參焦白芍

又 瀉痢久必陰損液耗此口渴微咳非實火客邪與甘酸化陰

人參 山藥 炙草 炒烏梅

木瓜 炒湖蓮肉

蔡 脉右數左細數面赤舌燥白苔點點肌膚甲錯左脇動氣伏暑當秋涼而發初病如瘧當從苦辛寒法裏寒熾烈變為下痢胃津被劫陰液大耗昔賢於熱病液涸急以救陰為務苟胃開得甦漸以冀安否則犯喻氏所指客邪內陷液枯致危之戒矣 復脉湯去薤桂麻又 酸甘化陰法

臨證指南醫案 卷七 痢

人參 生地 烏梅 炙草

麥冬 木瓜

鮑 痢久陰液消亡無以上承必唇燥舌乾奈胃關不和善噫難飢此由陰虛柔劑所致擇其不膩滯者調之

人參 炙草 炒白芍 炒烏梅肉

炒麥冬 茯苓

周 痢後氣墜都主陰傷但噴怒不已木犯土致病留連攝陰之中聊佐和肝

熟地 茯苓 炒山查 炒烏梅 木瓜

某 陰液涸則小水不通胃氣逆則厭食欲嘔此皆癰之

欬症也治以中下二焦為主議理陰煎此方忌食不食

熟地 白芍 附子 五味

吳 痢久陰傷腹痛肛門墜脹秋病入冬不愈已屬休息症和陰劑中仍有升降做東垣法

炒熟地 炒當歸 炒白芍 炙草

生山查 生穀芽

陳 瀉痢久則傷腎多見下焦沉墜先傷在陰剛藥不效

人參 鹿茸 菟絲子 茯苓

舶茴香 製補骨脂 砂仁

臨證指南醫案 卷七 痢

張 晨泄痢血崩腎病無痛墜等因用黑地黃丸

范 瀉痢起於長夏醫謂時令濕熱胃苓湯苓芍法固非

謬說因高年腎陽肝陰先虧使客氣內擾阻滯中流之

砥柱坐鎮致注瀾滔天耳病經兩旬不減重陰無陽陰

諸神識尚清其外邪為少而內損為多八脈無權下無

收攝漏卮不已理必生陽泄下焦冷此皆陰虛二氣微

絕治病則勞治本為宜非置之不理實究天人而已

人參 鹿茸 炒黑當歸 生杜仲

生沙苑 茯苓

李 自痢五六年血崩身痛痺益腸胃病致經絡筋骨

辭疎撤陽失衛藥難效靈書此代煎

冬於術 從蓉 熟附子 河水煎

吳四治痢大法無過通塞二義夏秋濕熱固多初痢不痛

已非濕熱色滯者腸中陳腐也至今痛而痢痛後復痛

按之痛減屬虛小者不愈陽不來復久痢治腎然非滋

臟先用苓薑木桂湯

某氏治痢古法不越通瀉經停有痕腹浮腫八脉之病醫

惑於見痢認爲脾胃症議用濟生腎氣丸

宋五痢久肛墜是下焦腎虛失於收納治脾胃藥無功

熟地炭 炒歸身 赤石脂 五味子 炒查肉

臨證指南醫案 卷七 痢

周六痢久必傷腎陰八脉不固腸膩自滑而下但健脾

無用病不在中納穀遲遲下焦坎陽亦衰用二神丸

五味子 補骨脂 肉果

某痢久陰陽兩傷少腹墜連兩腰膝脊骨痠痛由腸

腑絡傷已及奇經則議轉陽升陽助投仍從下治

人參 附子 此當歸

茴香 黃絲子 杜仲

周轉方柔藥相安雖然久痢傷及腎陰當用理陰煎兼

用禹糧石脂丸以攝固腸中

熟地炭 歸身炭 人參 炙甘草

五味子 炒查肉 兼服禹糧赤石脂丸

金氏脉數動下痢腹鳴痛後時則氣衝咳嗽吐粘涎產

後過月顯是下損至中納穀日少心神日衰勢已延成

勞難期速功

熟地炭 人參 扶神 炒山藥

建蓮 赤石脂

某氏休息痢經二年明是下焦陰陽皆虛不能收攝經期

不來小腹撫摩有形上行似乎瘕瘕其實氣結若不急

進溫補恐滋擾腫脹之累也

人參 附子 茯苓 炙草

臨證指南醫案 卷七 痢

五味 白芍

氣虛下陷門戶不藏

人參 黃芪 廣皮 炙草

歸身 炒白芍 防風 升麻

某痢經五十日來小愈再發腸鳴後重下墜此爲氣陷

則門戶不藏亦胃中風乘襲議隨者舉之

人參 歸身 白芍 炙草

升麻 荷葉

建蓮 諸邪氣內陷變痢延已一月脾胃氣衰面浮肚膨

急欲墜之象中虛代邪進以和解

黃芩

柴胡

人參

丹皮

炒當歸

白芍

穀芽

妙山查

蔡

神氣素然。腹中動氣。舌紅。喉乾。寒熱日進。平素積勞。

致虛。邪伏厥陰。脈促細。難用。勉議復脈湯。存陰。

勿測。希圖援救。復脈湯。

又

兩投復脈。色脉畧轉。所言平素積虛。不但瘧邪內陷。

陽結於上。則胸痞陰走於下。則頻利。非徒開泄攻邪也。

救逆湯去薑。

又

奔豚動氣。皆是陽虛濁泛。當和營理陽。

人參

茯苓

歸身

炙草

臨證指南醫案

卷七

三

桂心

牡蠣

煨薑

大棗

又

衛氣填塞。邪陷下痢。勢非輕小。用瀉心法。

人參

淡黃芩

熟附子

川連

黃芩

根實

又

人參

淡乾薑

生地

妙桃仁

張

氣衰熱伏。腹痛下痢。腕中痞悶。不欲納食。由瘧變痢。

經邪入肺。斯病勢已重。清理濕熱。以開痞。延久必須扶

正。

此非任邪入胃之方

淡黃芩

川連

人參

生白芍

乾薑

根實

某邪自瘧後。終癉傷及厥陰。症見氣上撞心。飢不能食。

煎噤。腹滿。全是肝病。邪為五臟之臟。和火內寄。仲景注。

法不用純剛燥烈之藥。以肝為剛臟故也。今正交土旺。

土木為營。五日內未為表當。

人參

妙當歸

妙白芍

妙烏梅肉

茯苓

淡吳茱

生香附汁

真北秦皮

孫

下痢無積。肛墜。腸間汨汨有聲。此屬腸風。當用攝固。

熟地炭

麝肉炭

妙歸身

妙杞子

川斷

北味肉

煎藥送赤石脂丸三錢。

某當年久痢。用三神丸得效。是脾腎兩因。兼理氣分之

臨證指南醫案

卷七

三

濕體質陽虛。遇冷病加。今病起長夏。小水不通。必係夏

熱阻其宣化。久則氣血凝着。而為腸紅。先與桂苓甘露

飲。分清其濕。

於朮

茯苓

猪苓

澤瀉

滑石

桂心

炙用炮炙

包

川連

人參

黃芩

白芍

草決明

妙山查

妙銀花

又

藥山。痢及熱氣。山上下。而此。胃中。腸中。傳導皆逆。

阻似閉。腹痛在下。尤甚。吞連極。僅食中焦。未能泄下。

熱燔。若不急清。陰液同歸於盡。姑明其理。以俟高明。

備採 白頭翁湯

又 脉左細數右弦乾嘔不能納穀腹痛裏急後重痢積不爽此暑濕深入着腑勢屬喉口痼疾症非輕渺議用苦寒清解熱毒必痛緩胃開方免昏厥之變

川連

黃芩

銀花

炒山查

乾薑

白芍

木香汁

又 下午病劇乃陰氣消亡之徵若但陰柔恐生生不至

疎補胃藥正宜進商

生地

阿膠

人參

生白芍

炒山查

炒銀花

臨證指南醫案

卷七 痢

三

初起無寒熱即瀉痢惡不食乃噤口痢重病夫暑邪之傷由口鼻吸氣而入邪與水穀交混蒸發濕熱醱爲積滯膿血腸胃氣窒欲解不能通爽遂致裏結後重香連苦辛理氣導濕清熱初用頗是皆緣勞碌之人非膏粱溫養之質痰滯積勞中氣易傷四十日來積少痛緩醫稱病解而食不下咽不知飢飽診得脉弦形衰舌白不渴飲水日瀉數行全屬胃弱氣奪中宮脾虛下陷不攝穀不能咽焉能承受湯藥藥味氣劣其裏必惡久痢久瀉務在能食古人非醒脾胃即安醫稱病解而食不下咽或陰或陽議以上脫宜通其清陽下焦當開

其滑脫故古方中參苓白朮散末當以米飲日服二次間以不膩滑之物食些少勿多以示助之脈爲補必得胃氣漸醒方有轉危爲安

人參二錢

焦朮一錢

茯苓一錢

炙草五分

炒扁豆二錢

苡仁一錢

桔梗一錢

砂仁七分

炮薑炭一錢

肉豆蔻一錢

右藥研細秤准分兩每次

用香梗米飲湯調服一錢五分右藥須日進二次

絕舌心黃邊白渴飲水漿停胃脘乾嘔微微冷呃自痢稀水小便不利診脉堅動不和八旬又二暑濕熱邪內着必脾胃氣醒始可磨耐以高年不敢過清過消用清

臨證指南醫案

卷七 痢

三

暑益氣方法

川連

黃芩

石蓮子

煨乾葛

丁附片

人參

茯苓

厚朴

猪苓

澤瀉

又口中乾燥小水全無泉源已竭陰液無以上承痢症噤口都是濕熱毒於胃口下元衰憊傷脾氣虛高突此

攻病保真理難捉摸矣

川連

黃芩

草決明

石蓮子

烏梅

白芍

痢症古名濕下惟夏秋暑濕積者居多其次則風淫火迫寒侵也推之燥氣獨不爲患故前法悉有定

例不必再述。至於暑者，陰暑陽暑之源，其邪必兼乎濕。夫陰暑由於人之陽氣先虧，加以貪涼喜冷，鬱折生陽，故主於溫陽。陽氣之熱，伏阻氣化，濁則重於清，而醫之下手工夫，於此須細心認定。但邪之來也，似水之流，臟腑間一有罅隙，則乘虛而着，故有在氣在血之分。傷陽傷腑之異。若表之邪鬱，而氣機下流不息者，喻氏論人參敗毒散，裡之積滯，而寒熱交粘者，潔古立芍藥湯。在氣分有苦辛調氣，與辛甘益氣等法。在血分有酸苦行血，及鹹柔養血諸方。若表症急，從乎三陽，有桂枝湯葛根湯連湯。小柴胡湯。臨證指南醫案 卷七 痢

裏勢實，端究脾胃有小承氣湯溫脾湯總之治腑以三焦見症為憑。治臟以足三陰為要。領得虛實之情形，酌以或通或瀉之法，則臨症僅宜，庶乎不錯矣。但是症不治之怪，甚多最難愈者，莫如休息痢。攻補之法非一，予亦不贅。最危險者莫如噤口痢，却有兩端。若因暑濕邪充格拒三焦者，氣機皆逆傳而閉。上下之勢，渾如兩截。若治不得其要，則邪無出路，正立消亡。此丹溪立法最高。後世都宗其旨。先生又借用牛夏瀉心湯，截去守中之品，取補以運之，辛以開之，苦以降之。與病情尤為允協。所以先生之見，長集

之奧妙，每每在此。又因脾胃之陽素虛，陰邪從中而下者，先傷太陰，繼傷少陰，關開大開，痢泄無度。戊癸少化火之機，命陽無蒸發之力，此不饑不食，為嘔為脹，理宜然矣。與邪多積滯之候相異。雖然不同，然之仲景理中湯，腎氣丸，及後世溫中散，胃關煎等法可也。吾鄉姚顯真先生，化出提徑良法，以九劑從微配入參歸身附片桂枝白芍之類，治之靡不應手而愈。想蕤蓉之性，溫能達下，酸可利胃，質之柔潤，以補陽中之陰，較地黃阿膠尤勝。與之腸膏竭盡，絡脉結滯而痛者，堪稱神品。自此推廣，用治甚多。若日某方某藥，但治某症，不知活用，反稱杜撰，則禁絕後人靈活之心，無從施發矣。邵新甫

便血

鄭 夏至後濕熱內蒸腸風復來議後苦法

川連 黃芩 烏梅炭 生白芍 廣皮

厚朴 荆芥炭 菊苣炭 又駐車丸二錢

某 脈右數形色蒼黑體熱復受長夏濕熱內蒸水

穀氣壅血從便下法以苦寒佐以辛溫得味經月可愈

病愈

茅朮 川連 黃芩 厚朴

地榆 槐米

臨證指南醫案 卷二 便血

程 年前痰飲哮喘不得安臥以辛溫通陽劫飲而愈知

脾陽內弱運動失職水穀氣蒸飲邪由濕而成濕屬陰

久鬱化熱熱入絡血必自下但體質仍屬陽虛凡腸紅

成方每多苦寒若屬連之類於體未合毋欲速也

生於木 茯苓 地榆炭

桑葉 丹皮

俞 陽虛腸紅瀉瀉議劫胃水 理中換生茅朮生厚朴

附子炭炮薑

程 十脈沉寒後下血少年淳朴得此乃食物不和腸絡空

隙所滲與升降法

茅朮 厚朴 廣皮 炮薑

炙草 升麻 柴胡 地榆

又 脈緩濡弱陽氣不足過飲濕勝大便溏滑似乎不察

便後血色紅紫兼有成塊而下論理是少陰腎臟失司

固攝而陽明胃脈但開無合矣從來治腑以通為利與

治臟補法迥異先擬緩胃通陽一法

生茅朮 人參 茯苓 新會皮

厚朴 炮附子 炮薑炭 地榆炭

程 一食入不化飲酒厚味即瀉而腸血未已蓋陽微健運

失職酒食氣蒸濕聚陽鬱脾陽清陽日陷矣議用東垣

臨證指南醫案 卷七 便血

升陽法

人參 茅朮 廣皮 炙草

生益智 防風 炒升麻

某 陽虛體質食入不化飲酒厚味即瀉而腸血未止蓋

陽微健運失職酒食氣蒸濕聚脾陽清陽日陷矣當從

謙甫先生法

人參 乾薑 附子 三錢 茅朮 五錢 升麻 三錢

白朮 二錢 厚朴 二錢 茯苓 二錢 廣皮 二錢 炙草 二錢

歸身 二錢 白芍 一錢 葛根 二錢 益智 一錢 地榆 三錢

神龜 二錢 右藥各與黃耆湯九

溫 濕勝中虛便紅

焦木 炒當歸 炒白芍 炙草

防風根 煨葛根 乾荷葉

劉六 鬱怒腸紅復來木火乘脾絡腹中微痛議與和陰

冬桑葉 丹皮 生白芍 黑山梔

廣皮 乾荷葉

張 二年前衝氣入腹... 前後有血此屬厥陽

擾絡風動內燥頭顱... 每日用煎丸

葉 噴怒動肝絡血乃下按之痛減為虛夫肝木上升必

犯胃口遂服欲嘔清陽下陷門戶失職致裏急便血參

臨證指南醫案 卷七 便血 天

木炮薑辛甘溫暖乃太陰脾藥焉能和及肝胃丹溪云

上升之氣自肝而出自覺冷者非真冷也

駐車丸二錢

程四 少陽絡病必犯太陰脾陽衰微中焦痞結色淡如瘁

便後有血論脾乃柔臟非剛不能健陽然鬱勃致病溫

燥難投議補土泄木方法

人參 當歸 枳實汁 炒牛黃

桑葉 丹皮

參歸養脾之營枳中通陽明之滯桑丹泄少陽之鬱

某 凡有痔疾最多下血今因噴怒先腹滿隨瀉血向來

糞前近日便後是屬木剋於土中氣滯為脹氣走為腸

議理中陽泄木佐之

人參 附子 炮薑 茅木

厚朴 地榆 升麻 醋炒 柴胡 醋炒

某 便紅脈數

生地 三錢 銀花 三錢 黃芩 一錢 白芍 一錢 槐花 一錢

程三 脈數能食腸紅陰自下泄腸脈熱所致非溫補之

症

細生地 此方和偶 丹參 黑檀豆皮

地榆炭 柿餅灰 棉花 金石斛

臨證指南醫案 卷七 便血 天

某三 內熱腸紅熱熾當清陰分之熱

生地 炒丹皮 酒炒黃芩 炒黑槐花

柿餅灰 玄參 銀花 黑山梔

汪 嗽血已止糞中見紅中焦之熱下移腸胃屬肺止血

亦屬易事花甲以外年歲熱移入下到底下元寒矣

細生地 川石斛 柿餅灰 天冬

趙三 勞倦便後血

炒黑槐根皮 兩 炒黑地榆 三 炒焦丹皮 一 五加皮 三

炒焦銀花 一 枳木 一 茯苓 二 炒澤瀉 一

錢十 陰虛內熱腸紅不止

<p>炒黑樗根皮一錢 炒生地三錢 炒銀花一錢 炒黑地榆二錢 歸身一錢 生白芍一錢 炒丹皮一錢 茯苓一錢 蔡三脈濡小食少氣弱不食便血大便時結時澀思春夏 陽升陰弱少攝東垣益氣之屬升陽恐陰液更損議以 甘酸固濟圖陽明為法</p>	<p>人參 炒粳米 禹糧石 赤石脂 木瓜 炒烏梅</p>	<p>某能食腸血脈細色痿肌時下陰酸苦惡風堅陰 更肉灰 五味所 黃和炭 地榆炭 禹糧石 赤石脂</p>	<p>脾氣 吳入中滿過於消冠便血食入易滯是脾胃病血凝於脾 脾健自能統攝歸脾湯嫌其守疎腑養臟相宜 九蒸白朮 南山查 茯苓 廣皮</p>	<p>穀芽 麥芽 葛根湯法 某二便血如注面黃脈小已經三載當益胃法 人參 焦朮三錢 茯苓三錢 炙草五分</p>	<p>木瓜一錢 炮薑五分 李三上年夏季絡傷下血是操持損治在心脾 歸脾飲丸</p>	<p>朱入暮腹痛嘔噎畢九久已偏脈春正下血經月顏色</p>
--	---	--	---	--	--	------------------------------

<p>鮮明此痛決非傷脈積聚乃常損寒乘木來侮土致十 四載之纏綿調治皆土以甘泄木散鬱宜辛節口戒慾 百天可效</p>	<p>人參 炒當歸 炒白芍 肉桂 炮薑 茯苓 炙草 南棗</p>	<p>又細推病情不但營氣不振而高陽亦傷漏泄不已而 辛潤宜減甘溫宜加從桂枝加桂湯立法 人參 桂枝 茯苓 生白芍 炙草 肉桂 煨薑 南棗</p>	<p>又仍議理營 人參 於朮 茯苓 炮薑 桂心 白芍 真武丸二錢</p>	<p>某八便後下血此遠血也 焦朮一錢 炒白芍一錢 炮薑一錢 炙草五分 木瓜一錢 炒荷葉邊二錢</p>	<p>方脈小左數便實下血乃肝絡熱勝血不自寧醫投參 芪歸桂甘辛溫煖脈於相火寄藏肝胆火焰風翔上蒙 清空鼻塞頭暈喘咳不已一候再候遺患中厥天下虛 別上實陰傷陽厚胃乃一定至理</p>	<p>連翹心 竹葉心 鮮生地 玄參</p>
---	---	---	--	--	---	-----------------------

丹皮 川斛

又下血陰傷走泄虛弱上升頭目眩暈參朮桂辛甘
助上致鼻翼耳聾用清上五六日右原已小左仍細數
乃陰虧本象下愈虛則上愈實以滋水制火之方

生地 玄參 天冬 川斛

茯神 炒牛膝

又脉左數耳聾脉痛木失水涵養以致上泛用補陰丸
補陰丸五錢 又虎潛丸羊肉膠丸

某 陽紅精帶四年不痊陰氣致傷肛墜刺痛大便不爽
藥難驟功當以潤劑通腑

臨證指南醫案 卷七 便血

生地 稽豆皮 杏肉 麻仁

久萎子 歸鬚

姚 勞傷下血絡脉空乏為痛營衛不主循序流行而為
偏寒偏熱診脈右空大左小促通補陽明使開關有序

歸芪建中湯

唐 內經以陰絡傷則血內流若燒酒氣雄擾動臟絡聚
血之所難得小愈而神采爪甲不榮猶是血勝之色也

既便其治在脾腎以脾為攝血之司腎主攝納之柄故
也 晚歸脾去木香 早六味去丹澤加五味共實蓮

肉阿膠丸

凡酒濕汚血皆脾腎柔脈主病當與藥 黑地黃丸

凡脾腎為柔脈可受剛藥心肝為剛脈可受柔藥不
可不知謙市治此症立法以平月散作主加桂附乾
薑歸芍重加炒地榆以收下濕用之神效即此意也

吳 腹痛下血食藥難愈乃泄肺導濕之藥既愈
以來復有筋骨痠寒熱夜臥口乾乃濕去氣泄陽明

脉之不主用事營衛失度津液不升之象大真丸主之

去人參

支 痔血久下肌肉痿黃乃血脫氣餒漸加喘促浮腫
延腹脹便不可為此症臟陰有寒胸陽有熱詳於金匱

臨證指南醫案 卷七 便血

穀疸篇中極難調治

人參 焦朮 茯苓 炒菟絲子

廣皮 生益智 木瓜

楊 中年形勞氣餒陰中之陽不足其便血已多以滋養
固下男子有年下先虛也

人參 茯苓 歸身 淡黃芩 補骨脂

巴戟 炒遠志 生精羊肉於腎丸服五錢

田 久矣晨泄腹痛近且有紅積此屬腎虛
補骨脂 大茴香 加味 茯苓 生菟絲

陳 脉左虛滑右緩大尾闕痛連脊骨便後重
三 脉左虛滑右緩大尾闕痛連脊骨便後重

胃欲量兼之納穀最少明是中下交損八脉全虧早進
青藥斑龍九峻補玉堂關元君服歸脾膏滋養陰守
之經年形體自固

鹿茸生切薄另研 鹿角霜另研 鹿角膠鹽湯化 柏子仁去油烘乾

熟地九蒸 非子鹽水炒 菴絲子另磨 赤白茯苓蒸

補骨脂胡桃肉搗爛蒸一日搗碎炒香

右溶膏煉蜜爲丸每服五錢淡鹽湯送

鹿茸壯督脉之陽鹿霜通督脉之氣鹿膠補督脉之

血骨脂獨入命門以收散越之氣柏子涼心以益腎

熟地味厚以填腎非子養精少陰以升氣固精重

臨證指南醫案 卷七 便血

用茯苓淡滲本草以陽明本藥能引諸藥入於至陰

之界耳不用更味之酸以酸能柔陰且不能入脉耳

胡八上下失血先瀉血後便海月陰傷液耗胃納頗安

且無操家之勞安養閑坐百日所謂靜則陰充

熟地 黃肉 茯神 山藥

五味 龍骨

汪 腎虛當春陽升動咳嗽止聲音未震發有血陰難

充復不肯上承用陰藥固攝

熟地 白芍 茯神 黑糯米皮

炒焦烏梅肉

陳 腎陰虛經中熱肝風動腸紅三載不已左脇及腹不
爽少陽亦通多以神中調攝故未見奏功姑用疎補爲
益藏通腑

熟地炭 炒當歸 炒查肉 炒地榆

炒丹皮 冬桑葉

又 益陰泄陽四劑血止但腰痠腕中痺咽燥喜涼飲肛

熱若火烙陽不和平仍是陰精失調用虎潛法

熟地炭 白芍 當歸 地榆炭

龜膠 知母 黃柏 猪骨髓丸

某 沫血鮮紅塊紫黑陰絡傷損治在下焦况少腹痛

臨證指南醫案 卷七 便血

瘕肝腎見症前此精濁日久亦令陰傷於下

人參 茯神 熟地炭 炒黑杞子

五味 炒地榆 生杜仲

又 左脉小數堅肝陰虛

人參 茯神 湖蓮肉 芡實

熟地炭 五味

陳 氏 脉小瀉血有二十年經云陰絡傷血內溢自病起十

六載不得孕育述心中痛墜血下不論寒熱前後開升

椎腰尻痠楚而經水仍手跡膝常冷而骨熱熱由陰

液損傷傷及陽不固密閱頻年服藥歸氏雜入涼肝焉

是遵古治病議從奇經升固一法

鹿茸

鹿角霜

枸杞子

歸身

紫石英

沙苑

生杜仲

炒大茴

補骨脂

禹餘糧石

蒸餅漿丸

張三勞力見血胸背脇肋諸脉絡牽掣不和治在營絡

人參

歸身

白芍

茯苓

炙草

肉桂

計五瘀血必結在絡絡反腸胃而後乃下此一定之理平

昔勞形奔馳寒暄飢飽致傷苟能安選身心瘀不復聚

不然年餘再聚不治

臨證指南醫案 卷七 便血

美

旋覆花

新絲

青葱

桃仁

當歸鬚

栢子仁

宋氏當年腸紅繼衄血喘喘已見陽氣乘絡絡為氣乘漸

若懷孕者然氣攻則動如梭胎動過異倘加勞怒必

有汚濁暴下推理當如是觀

栢子仁

澤蘭

卷柏

黑大豆皮

茯苓

大腹皮

便血一症古有腸風臟毒脉痔之分其見不外乎風

淫腸胃濕熱傷脾二義不若內經謂陰絡受傷及結

陰之旨為精切仲景之先便後血先血後便之文尤

簡括也陰絡即臟腑隸下之絡結陰是陰不隨陽之

微以先後分別其血之遠近就遠近可決其臟腑之

性情感不致氣失統攝血無所歸如漏卮不已耳肺

病致燥滿宜潤宜降如桑麻丸及天冬地黃銀花柿

餅之類是也心病則火燃血沸宜清宜化如竹葉地

黃湯及補心丹之類是也脾病必濕滑宜燥宜升如

茅朮理中湯及東垣益氣湯之類是也肝病有風陽

痛迫宜柔宜泄如駐車丸及甘酸和緩之劑是也腎

病見形消腰折宜補宜填如虎潛丸及理陰煎之類

是也至暗經為樞機逆則木火煽營有桑葉山梔柏

臨證指南醫案 卷七 便血

三

子丹皮之清養大腸為燥腑每多濕熱風淫如辛涼

苦燥之治胃為水穀之海多氣多血之鄉臟腑病

無不兼之宜補宜和應寒應熱難以拘執而言若勞

力損傷者通補為上膏粱醞積者清疎為宜痔瘡則

滋燥兼投中毒須知寒熱餘如黑地黃丸以治脾濕

腎燥天真丸以大補真氣真精平胃地榆之升降脾

胃歸脾之守補心脾理龍以溫煦奇督建中之復生

陽枳朮之疎滯中土再糧赤脂以者截陽明用五仁

湯復從前之腸液養營法善病後之元虛此皆先生

祖古方而運以匠心為後學之津梁也 邵新甫

脫肛

熱氣下陷

翁六濕熱皆主傷氣氣下陷墜肛而痛。漫說按脈。非疎着於脈其痛為甚。夫厥陰肝脈連陰。按脈濡弱。非疎泄主治。議進陷者舉之。從黃連補中益氣湯。

虛下

孫面色痿黃。腹痛下血。都下食重傷脾胃。氣下陷為脫肛。經月不愈。正氣已虛。宜甘溫益氣。少佐酸苦。務使中焦生旺。而經年易虧之陰自堅。冀有向安之理。

人參

川連

炒歸身

炒白芍

炙草

廣皮

石蓮肉

烏梅

臨證指南醫案

卷七 脫肛

吳

又肝熱結血。不但脾弱氣陷。下焦之陰亦不攝固。而色唇爪已無華。此益氣乃一定成法。攝陰亦不可少。然

幼弱補藥。須宜通以易虛易實之體也。

人參

焦木

廣皮

白芍

炙草

歸身

刀喙

升麻

醋炒

醋炒

其

便後少腹痠。肛墜。溺則便澀。皆虛不攝。

熟地炭

五味

黃肉

茯苓

妙遠志

炒菟絲子

其

肛墜。尻痛。利多傷陰。

熟地炭

刀喙

茯苓

妙山藥

炒查肉 炒菟絲子 煎送禹糧石脂丸

王六陽氣下陷。腎真不攝。肛墜氣泄如風。向老下元陽。非升柴能舉其陷。

人參

鹿茸

補骨脂

炒大茴香

茯苓

調入陽起石三分

吳五脫肛。漸血過勞。即發。病經十六載。色萎黃。背脊痛。診

脈尺中下垂。法當升陽攝陰。兼理奇脈。

斑龍丸加五味子蜜丸

脫肛一症。其因不一。有因久痢。久瀉。脾腎氣陷而脫

者。有因中氣虛寒。不能收攝而脫者。有因酒濕傷脾

者。有因中氣虛寒。不能收攝而脫者。有因酒濕傷脾

臨證指南醫案

卷七 脫肛

吳

色然傷腎而脫者。有因腎氣本虛。關門不固而脫者。

有因濕熱下墜而脫者。又肛門為大腸之使。大腸受

寒受熱。皆能脫肛。老人氣血已衰。小兒氣血未旺。皆

易脫肛。經曰。下者舉之。徐之才曰。瀉可去脫。皆治脫

之方。然治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝

之方。然治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝

之方。然治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝

之方。然治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝

之方。然治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝

之方。然治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝

之方。然治脫肛之症。亦不越乎升舉固攝

茸陽起石等提陽固氣一法王叔和云有氣熱血熱而肛反挺出者宜用芩連龍柏及四物升柴之類愚謂即或間有此症終非可訓之法存之以質君子

滋九

臨證指南醫案

卷七 脫肛

四

痿

肺熱葉焦

湯六有年偏痿日瘦色蒼脈數從金匱肺熱葉焦則生痿臂論肺也痿是傷中一症其病屬陽明居夏

玉竹 大沙參 地骨皮 麥冬

桑葉 苦百合 甜杏仁

徐三而瘰癧此屬肺熱痿瘻

連翹 花粉 黑山梔 赤小豆

桑葉 白通草

張濕中伏熱沉着下焦用苦勝濕辛通氣分然必循經

臨證指南醫案 卷七 痿

入絡漸次達及陽明

綿茵陳三錢 生茅術五分 黃柏一錢 晚蚕沙一錢

寒水石三錢 茯苓皮三錢

又色蒼脈實體質強壯雖年踰四旬氣元充旺詢知平日善飲酒醴甘肥此痰積濕火蘊結下焦今少腹微腫

硬二便滯澀自覺少腹氣脹上冲兩足沉重艱於步履

腿股皮中甚熱即內經所云濕熱不攘大筋縴短小筋

弛長縴短為拘弛長為痿也更述曾因熬煉膏藥中有

廣蟲蜈蚣等物吸受穢濁毒氣未始非與濕熱糾蓄沉

伏下焦前議苦辛寒燥茲再佐以搜逐絡隧然此病從

口而入。必茹素戒飲。一二年之久。病根可拔。當恪守勿懈爲要。

綿茵陳三錢 黃柏一錢 川草薢一錢 茯苓皮三錢

金鈴子一錢 穿山甲三錢 大板柳汁一錢

又 綿茵陳 草薢 茯苓皮 黃柏 蚕沙

漢防己 龍胆草 山梔 青黛

又 病去七八常服二妙丸可也。

黃柏八兩 茅山木米泔浸切片同烏芝煎飯上

二味研末水法丸空心服三錢開水下

吳二雨濕泛潮外來水穀聚濕內起兩因相湊經脈爲痺

臨證指南醫案卷七 痿

始病繼以瘡癰漸致痿癱筋弛氣隧不用濕雖阻氣而

熱蒸燥及筋骨久延廢棄有諸

大豆黃卷 飛滑石 杏仁 通草 木防已

廉三診脈論體從濕滯傷經而舉跳穴痛遂不舉行走

臟陰傷及腑陽陽氣日加室塞經脈不司舒展食入壅

脫欲吐大便旬日不通痞阻日甚而爲痿症內經論治

痿獨取陽明無非流通胃氣蓋胃脈主乎束筋骨利機

關竅也議用加味溫胆湯

又 大便旬日不通用更衣丸取意小腸火腑非苦不通

非下不奪也

某五頭目口鼻喘邪纏而足痿此爲入絡所致

羚羊角 犀角 玄參 細生地

黃柏 川斛 草薢

俞 五旬又四陽氣日薄陽明脈絡空乏不司束筋骨以

流利機關肩痛肢麻頭目如蒙行動痿弱無力此下虛

上實絡熱內風沸起當入夏陽亢爲甚濕熱利痰必不

應病議清營熱以熄內風

犀角 鮮生地 玄參 連翹心

冬桑葉 丹皮 鉤藤 明天麻

陳 陽明脈空厥陰風動自右肩臂漸及足跗痿癱長夏

臨證指南醫案卷七 痿

氣泄秋半不主收肅顯然虛症先用通攝方法

淡從蓉 熟地 杞子 川牛膝

川斛 茯苓 遠志 炒黑 石菖蒲

夏四自稱壯失血遺精兩交夏月四肢痿癱不得轉動指

節亦不能屈曲凡天地間冬主收藏夏主發洩內損多

年不復元陽明脈衰所致

當歸 羊肉膠 杞子 鎖陽

菊花炭 茯苓 青鹽

吳三下焦痿癱先有遺泄濕場頻進滲利陰陽更傷雖有

參芪朮養脾肺以益氣未能收下卽如畏冷陽微

濕熱肝

飯後吐食。乃胃陽頓衰。應乎外衛失職。但下焦之病。多屬精血受傷。兩投柔劑。溫通之補。以腎臟惡燥。久病宜通任督。通攝兼施。亦與古賢四斤金剛健步諸法。互參。至於胃藥。必須另用。夫胃腑主乎氣。氣得下行。為順。東垣有升陽益胃之條。似乎相悖。然苓連非苦降之氣味乎。凡吐後一二日。暫停下焦血分藥。即用扶陽理胃二日。俾中下兩固。經旨謂陽明之脈。束筋骨以利機關。諒本病必有合矣。

鹿茸

淡從蓉 當歸

杞子

補骨脂

巴戟天 牛膝

柏子仁 茯苓

川斛

臨證指南醫案

卷七 痰

四

吐後間服大半夏湯加淡乾薑薑汁

沈

長夏濕熱經脈流行氣鈍。兼以下元絡脈已虛。痿弱

不耐。步趨常似酸楚。大便或結或溏。都屬肝腎為病。然

益下必佐宣通脈絡。乃正治之法。倘徒呆補。恐季夏後

濕熱還擾。須為預理。

鹿角霜

當歸

生茅術

熟地 薑汁 茯苓

桑椹子

菴蓉

巴戟

遠志

小茴

金毛狗脊三觔酒蒸水熬膏和九淡鹽湯送下

李

九痿躄在下。肝腎病多。但素飲必有濕熱。熱瘀濕滯。氣

血不行。筋縮。肌肉不仁。體質重着難移。無非濕邪之深

沉也。若論陽虛。不該大發瘡痍。但久病非速攻。莫計效。遲方可愈疾。

細生地

鹹從蓉

當歸鬚

牛膝

黃柏

生刺蒺

川斛

葶藶

包五寢食如常。脈沉而緩。獨兩腿內外肌肉麻木。五旬又

三陽脈漸衰。蹠維不為用事。非三氣雜感也。溫通以佐

脈絡之流暢。做古賢四斤金剛之屬。

淡從蓉

枸杞子

牛膝

茯苓

白蒺藜

木瓜

草薢

金毛狗脊膏丸

郭雨足痿弱。遇冷筋掣。三年久病。藥力焉得速拔。況不

臨證指南醫案

卷七 痰

四

明受病何因。徒見病而治。難期速功。據云精滑溺後。通

納下焦為宜。

淡從蓉

茯苓

川斛

生茅術

生杜仲

金毛狗脊

沈六寢食如常。儀容日瘦。語言出聲。舌絡牽強。手足痿弱

不堪動作。是肝腎內損。漸及奇經諸脈。乃痿痺之症。未

脾腎雙補中運下攝固體治病

脾腎雙補丸 山藥粉丸 經傳方

有丸

能收功連功 地黃飲子去更味桂

山水後診得右脉頰和左關尺大堅搏不附於春陽

初萌裏真漏泄有風動枯癢之慮議乙癸同滿意

熟地 淡菴蓉 杞子 五味 莖肉

牛膝 川斛 茯神 菊花 山藥粉丸

李氏右肢附足無力如癰交子夜痰多哈嗽帶下且頰是

衝脉虛寒浮火上升非治嗽清熱大衝爲血海起於陽

明文科八脉奇經最要內經論之女子五七年歲陽明

日衰今天癸將絕年歲脉絡少氣非見病治病而淺之

見思意通陽攝陰以實奇脉不必綴治

臨證指南醫案 卷七 痰

薛氏加減八味丸二兩勻七服鹽湯送下

金於去血乃經脉管絡之傷若損及厥脈修氣莫救

後此嘔怒動肝屬五志中陽氣逆逆與客邪化火兩途

苦辛泄氣順服既多陽遂發泄形雖若豐盈而收藏因

攝失職少腹約束陽道不舉背脊脊脊少腰無力背足

疲弱症端漸至痿廢議以通納之法而事滋養生真冀

下元之陽八脉之氣收者收通者通庶乎近理

鹿角霜 淡菴蓉乾 生杜仲粉 生杜仲粉

歸身 五明 大商神 遠志

家壯子 覆盆子 雲茯苓 蒜汁泛丸

唐三脉左沉小右弦芤足腰痠無力舌本腫脹頸頸

轟然蒸熱痰涎湧出味苦此腎虛收斂少權督脉不司

約束陰火上升內風齊煽久延痰涎流注清根在下通

奇脉以收拾散越之陰陽爲法

虎潛去知柏歸加枸杞青鹽三味膠丸

萬脉濡弱右大心熱煩渴舌紅惡熱體倦伸縮不得自如

此乃下焦陰虛熱燥筋骨虛爲痿躄

生虎潛去龜廣續等之參

黃二冬藏精氣既少當春夏發泄失血遺精筋弛骨痿不

堪行走精血內怯奇脉中少氣三年久損若不絕欲安

臨證指南醫案 卷七 痰

固有供養難狀之疾

鹿筋膠 獨羊肉膠 牛骨髓 猪脊髓

線魚膠 菴蓉乾 紫巴戟 枸杞子

茯苓 沙苑子 牛膝 青鹽

病後陰傷骨痿

生杜仲 熟地 龜甲 黃柏

虎骨 牛膝 當歸 巴戟

某症如歷節但汗出筋縱而痛冬月爲甚腰脊僵攣形

俯據述未病前夢遺已久是精血內損無以營養筋骨

難與攻迫議香茸丸溫通太陽腎脉

鹿茸 三兩

生當歸 二兩

麝香 一錢

生川烏 五錢

雄羊腎三對酒煮爛搗丸

經云肺執葉焦則生痿癭又云治痿獨取陽明以及
脉痿筋痿肉痿骨痿之論內經於痿症一門可謂詳
審精密矣奈後賢不解病情以諸痿一症或附錄於
虛勞或散見於風濕大失經旨賴丹溪先生特表而
出之惜乎其言之未備也夫痿症之旨不外乎肝腎
肺胃四經之病蓋肝主筋肝傷則四肢不為人用而
筋骨拘攣腎藏精精血相生精虛則不能灌溉諸末
血虛則不能營養筋骨肺主氣為高前之臟肺虛則
臨證指南醫案 卷七 痿 吳

高燥化絕化絕則水涸水涸則不能濡潤筋骨陽明
為宗筋之長陽明虛則宗筋絕宗筋絕則不能束筋
骨以流利機關此不能步履痿弱筋縮之症作矣故
先生治痿無一定之法用方無獨執之見如衛任虛
寒而成痿者通陽攝陰氣貫奇脉為主濕熱沉着下
焦而成痿者用苦辛寒燥為主腎陽奇脉兼虛者用
通納八脉收拾散越之陰陽為主如下焦陰虛及肝
腎虛而成痿者用河間飲子虎潛諸法填納下焦和
肝熄風為主陽明脉空厥陰風動而成痿者用通攝
為主肝腎虛而兼濕熱及濕熱蒸灼筋骨而成痿者

益下佐以溫通脉絡兼清熱和濕為主胃虛室寒筋
骨不利而成痿者用流通胃氣及通利小腸火為
主胃陽腎督皆虛者兩經中下為主陽明虛營絡熱
及內風動而成痿者以清營熱熄內風為主肺熱葉
焦而成痿者用甘寒清上熱為主邪風入絡而成痿
者以解毒宣行為主精血內奪奇脉少氣而成痿者
以填補精髓為主先生立法精詳真可垂諸不朽矣
鄒滋九

臨證指南醫案

卷七 痿

吳

痺

思痺

吳 歷濕相搏，一身盡痛，加以墮水，外寒裏熱，痛極發厥，此屬周痺。

桂枝木 片薑黃 羚羊角 海桐皮

花粉 白茯苓

又 照前方去薑黃白茯苓加大豆黃卷木防已

鮑 風濕客邪，留於經絡，上下四肢流走而痛，邪行觸犯

不拘一處，古稱周痺，且數十年之久，豈區區湯散可效

凡新邪宜清，舊邪宜緩攻

臨證指南

卷七 痺

手

蛇蚶鱗 全蠍 地龍 穿山甲

蜂房 川烏 麝香 乳石

水煎自膏，此藥丸，主傷風寒濕，傷風寒，右藥製末，以無灰酒煮黑，大豆汁泛丸

杜 三溫，暖胃泄寒，外加風寒，溫三氣，交傷為痺，逆走上

下為楚邪入經，隨汗不解，貴乎宣通

桂枝 杏仁 滑石 石膏

川草薢 漢防已 苡仁 通草

又 經脈通而痛痺滅，絡中虛則痿弱無力，周身汗出，陽

泄已多，豈可再用苦辛以傷陽，泄氣乎，自經以前緩為

陽明脈虛，當宗此旨。

黃芪 防風 白大 茯苓 炙草

桂枝 當歸 白芍 苡仁

又 大凡邪中於經，發痺，邪中於絡，發痿，今痺痿全止，行

走痿弱無力，經脈受傷，陽氣不仁，護持法當溫養通補

經旨春夏養陽，重在扶元，生薑三錢

黃芪 四兩 茯苓 三錢 三白朮 三錢 炙草

淡從蓉 二兩 當歸 三錢 牛膝 二兩 仙靈脾 二兩

虎骨膠 金毛狗脊 十二兩 無灰酒 膠膏為丸

劉 三頑海風潮濕，着於經脈之中，此為周痺，痺則氣血

不通，陽明之陽不主司事，食腥膩，遂不化為濡瀉，病有

臨證指南

卷七 痺

手

六七年，正虛邪實，不可急攻，宜緩

生白朮 生黃芪 海桐皮 川桂枝木

羌活 防風根

周 痛勢流走而腫，後感外邪，參藥不可與也，從行痺治

羌活 木防已 石膏 生甘草

海桐皮 杏仁

吳 寒入陰分，筋骨痛爽，此為痺症，遺泄內應，忌用表散

劫真

當歸 沙苑 北細辛 桂枝木

生白朮 茯苓

又虎骨 當歸 北細辛 生白朮 茯苓		又行痺入左足		生虎骨 防已 革薺 苡仁		半夏 茯苓		某氏風濕化熱萃於經脈腫痛游走病名行痺世俗呼爲歷節風是也		桂枝 羌活 石膏 甘草		杏仁 防風		又行痺腹中痛便難不知飢		瓜蒌皮 紫苑 杏仁 鬱金		臨證指南醫案卷七痺		半夏 山梔 桑枝		餘肩脚連及臂指走痛而腫一年乃肢痺也絡虛留邪和正		黃芪 防風 海桐皮 生白朮		歸身 川羌活 片薑黃 白蒺藜		李三脈小弱當長夏四肢痺痛一止之後筋骨不甚舒展此衛陽單薄三氣易襲先用陽明流暢氣血方		黃芪 生白朮 漢防已 川獨活		苡仁 茯苓		朱二肢痺痛頻發	
-------------------	--	--------	--	--------------	--	-------	--	-----------------------------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	--------------	--	-----------	--	----------	--	-------------------------	--	---------------	--	----------------	--	--	--	----------------	--	-------	--	---------	--

羚羊角 木防已 川桂枝尖 晚蚕沙		川草薺 白通草 生苡仁 茯苓		汪冬月溫暖真氣未得清發乘其虛而伏因驚蟄節春陽內動伏氣乃發受風寒已從熱化兼以夜坐不眠身中陽氣亦爲泄越醫者仁執風寒濕三邪合成爲痺不曉病隨時變之理羌防葛根再泄其陽必致增劇矣焉望痛緩議用仲景木防已湯法		木防已 石膏 桂枝 片薑黃		杏仁 桑枝		又氣中伏邪得宜右肢痺痛已緩血分留熱難着左肢痛勢未衰足微腫體質陰虛仍以宣通輕劑		羚羊角 桂枝木 片薑黃 花粉		木防已 杏仁 桑皮		額濕熱流着四肢痺痛		川桂枝 木防已 蚕沙 石膏		杏仁 威靈仙		某左脉如刃右脉緩濇陰虧本質暑熱爲熱水穀濕氣下墜肢末遂成痺今已使瀉濕食厚冷陽明氣衰極矣當緩調勿使成疾		生白朮 狗脊 獨活 茯苓	
------------------	--	----------------	--	--	--	---------------	--	-------	--	--	--	----------------	--	-----------	--	-----------	--	---------------	--	--------	--	---	--	--------------	--

木防已 仙靈脾 防風 威靈仙

又濕痺脉絡不通用苦溫滲濕小效但汗出形寒泄瀉陽氣大傷難以濕甚生熱例治通陽宣行以通脉絡生氣周流亦却病之義也

生於朮 附子 狗脊 苡仁

茯苓 黃芩

徐九長夏濕勝氣阻不飢不食四肢痺痛甚於午後子前乃陽氣破陰濕之過色痿黃脉小滿以微通其陽忌投劫汗

茯苓 木防已 晚蚕沙

臨證指南醫案 卷七 痺

澤瀉 金毛狗脊

黎 肢膝麻痺足膝爲甚

當歸 杞子 生虎骨 油松節 各二兩 川芎

狗脊 草薢 淮牛膝 仙靈脾 檀香泥

白茄根 沙苑 各一兩 火酒醇酒各半浸七日

某三寒濕濕於經絡身牛以下筋骨不舒二便不爽若非迅疾飛走不能效 蠲痛丹

某 勞力感濕腰痺酸痛四肢乏力

生杜仲 生以仁 沙苑子 茯苓

粗桂枝朮 金毛狗脊 晚蚕沙 木防已

某十五年痺痛三發連痛久流及肢節骨屈曲之脉皆腫赤此寒濕熱爲欲解病在軀殼筋骨無害命之理但病深沉下甚已屬陰邪小腹脹小波全無

川獨活 八分 漢防已 八分 川熟附 八分 粗桂枝 木錢

茯苓 五錢 川草薢 一錢 木猪苓 一錢

又生白朮 三錢 茯苓 三錢 川熟附 一錢 川獨活 五錢

北細辛 一分 漢防已 五分 猪苓 一錢 澤瀉 一錢

又陽虛濕痺痺愈下焦無力用幹旋其陽

茯苓 四兩 生白朮 二兩 炮炙生乾薑 一兩 肉桂 五錢

已上四味生研末涼水泛丸每早服三錢開水下

臨證指南醫案 卷七 痺

何三脉沉且黃舌腫周身四肢疹發胃痛肢末皆腫強遇冷飲涼即病此久伏濕邪陽氣傷損議溫氣分以通周行之脉

川烏頭 生白朮 桂枝 木 茯苓

牛夏 薑汁

唐 右後脇痛連腰脇發必惡寒逆冷暖護良久乃溫此脉絡中氣血不行遂至凝塞爲痛乃脉絡之痺症從陽維陰維論病

鹿角霜 小茴香 當歸 川桂枝

沙苑 茯苓

沙苑

沙苑

沙苑

沙苑

王 努力經氣受傷客邪乘虛而入風濕阻遏經隧為腫為痛大汗出而汗不止而大便反滑其濕邪無有不傷陽氣者固衛陽以却邪古人正治以濕家忌汗耳

生於朮 三錢 防風根 五錢 生黃芪 三錢 片薑黃 一錢

桂枝木 五錢 海桐皮 一錢 羌活 五錢 獨活 五錢

又 人參 一錢 生於朮 二錢 黃芪 三錢 炒當歸 一錢

川桂枝 一錢 炙甘草 五錢 蠶繭 七分 南棗 二枚

又 風濕腫痺舉世皆以客邪宜散然治之則不明先因勞倦內傷也蓋邪之所乘其氣必虛矣未益氣佐以風

臨證指南醫案 卷之七 痺

藥氣壯托出其邪痛斯止矣病人自云手足如墮如無

計非陽微不及行乎四末乎此皆誤治致參藥過費耳

人參 一錢 生於朮 二錢 黃芪 二錢 歸身 一錢

肉桂 三分 炙甘草 三錢 煨薑 一錢 南棗 一枚

又 遺泄陰傷兼以欬喘

人參 一錢 生於朮 二錢 黃芪 三錢 歸身 一錢 炙草 五分

熟地 三錢 茯神 三錢 五味 五分 白芍 一錢

方九 人參 二兩 黃芪 四兩 茯神 二兩 杞子 二兩 鹿角霜 二兩

鹿茸 二兩 歸身 三兩 炙草 一兩 菊化炭 二兩 煉蜜九

王 風濕痺痛

防已 生於朮 川獨活 茯苓

炒黃柏 生苡仁

又 痺在四肢

羚羊角 白蒺藜 海桐皮 滑石

大豆黃卷 苡仁

又 照前方去痰黎苡仁加連翹青菊葉花粉

又 羚羊角 犀角 連翹 海桐皮

大豆黃卷 花粉 薑黃 金銀花

金 風濕熱走痛二便不通此痺也

杏仁 木防已 寒水石 鬱金

臨證指南醫案 卷之七 痺

生石膏 木通

李 風濕肌腫而痛畏熱

炒黃柏 茅朮 製痰黎 木防已

秦艽 鈎藤

又 黃柏 防已 茯苓 苡仁

草薢 虎骨

楊 四肢流走痺痛風勝松木下焦為甚邪人

陰分 蠲痛丹

蔣氏 便澹食少腰腹已下骨節沉痛

人參 生於朮 梨白松香 茯苓

張 風濕相搏一身腫痛周行之氣血為邪阻蔽做仲景 木防已湯法		毛氏 風濕相搏一身腫痛周行之氣血為邪阻蔽做仲景 木防已湯法		王 身半已上屬陽風濕雨露從上而受流入經絡與氣 血交混遂為痺痛經月來外邪已變火化攻散諸法不 能取效急宜宣通清解毋使布及流注		漢防已 北細辛 川獨活 苡仁	
防已	黃芩	滑石	杏仁	防已	黃芩	杏仁	滑石
木防已	石膏	杏仁	川桂枝	木防已	石膏	杏仁	川桂枝
威靈仙	羌活	威靈仙	羌活	威靈仙	羌活	威靈仙	羌活
洪 三溫濕下生痰漸有痿痺之狀乃陽明經隧為壅不 可拘執左屬血右屬氣也金匱云經熱則痺絡熱則痿 今有痛處治在氣分		生於米錢 生黃芪錢三 片薑黃錢一 川羌活錢一		生於米錢 生黃芪錢三 片薑黃錢一 川羌活錢一		生於米錢 生黃芪錢三 片薑黃錢一 川羌活錢一	
宇夏	防風	加桑枝	錢五	宇夏	防風	加桑枝	錢五
風法 葛木固衛升陽左肩脾痛未已當治營中以辛甘化		風法 葛木固衛升陽左肩脾痛未已當治營中以辛甘化		風法 葛木固衛升陽左肩脾痛未已當治營中以辛甘化		風法 葛木固衛升陽左肩脾痛未已當治營中以辛甘化	
黃芪	當歸	炙草	防風	黃芪	當歸	炙草	防風
桂枝	肉桂	桂枝	肉桂	桂枝	肉桂	桂枝	肉桂

虛之質忌辛散苦寒藥		桂枝木		木防已		苡仁		羚羊角	
大豆黃卷		杏仁		橘紅		方		左脉弦大而赤痰多大便不爽此勞怒動肝令陽氣	
不交於陰陽維陽蹻二脉無血營養筋風燥筋對蹻痺		痛晝夜為甚者厥陰旺時也病在脉絡		金斛		晚蚕沙		漢防已	
半夏		草解		大板榔汁		又		痛右緩左痛濕熱未盡液虛風動也	
生地		阿膠		龜版		稽豆皮		又	
茯苓		通草		杏仁		蘇梗		木防已	
茯苓皮		花粉		晚蚕沙		茵陳		吳氏	
升降營衛不肯宣通怕延中痰		生石膏		杏仁		川桂枝		苡仁	
又		石膏		杏仁		木防已		炒半夏	
黑山梔		薑汁		竹瀝		橘紅		又	

石 脉數右大溫漸化熱及經絡氣血交阻而為痺痛陽邪主動自為遊走陽動化風肉勝淨腫俗諺稱為白虎歷節之謂

川桂枝 木防已 杏仁 生石膏

花粉 鬱金

又 照前方去鬱金加寒水石晚蚕沙通草

又 脉大已減右數象未平痛緩什七肌膚甲錯發瘡腹微滿大便不通陽明之氣未化熱未盡去陰已先虛不可過劑

麻仁 鮮生地 川斛 丹皮

臨證指南醫案 卷七 痺 卒

寒水石 鈎藤

某 久痺釀成歷節舌黃痰多由濕邪阻着經脉

漢防已 嫩滑石 晚蚕沙 寒水石

杏仁 苡仁 茯苓

宋 病者長夏露天奔走內躁重墜發斑下焦痛起繼而筋掣及於腰窩左臂經云傷於濕者下先受之夫下焦奇脉不流行內躁重着陰維受邪久必化熱燥而風動內舍乎肝胆所謂少陽行身之側也診得右脉緩左脉實濕熱混處血絡之中搜逐甚難此由濕痺之症失治延為痠廢沉痾矣三年病根非倉猝迅攻姑進宣通營

絡系之奇經為治考古聖治痠痺獨取陽明惟通則留邪可拔耳

鹿角霜 生白朮 桂枝 茯苓

撫芎 歸鬚 白蒺藜 黃菊花

某 初病濕熱在經久則瘀熱入絡膿瘍日多未已漸而筋骨疼痛企圖云經熱則痺絡熱則痠數年宿病勿事速攻夜服疾黎丸

服午 犀角 玄參 連翹心 野赤豆皮

細生地 丹參 薑黃 桑枝

張九 四肢經隧之中遇天令陰晦疼痛拘攣癰疽瘍潰膿

臨證指南醫案 卷七 痺 卒

其病不發癰愈病復至抑且時常血熱經以風寒濕三氣合而為痺然經年累月外邪留着氣血皆傷其化為敗瘵凝痰混處經絡蓋有諸矣倘失其治年多氣衰延至廢棄沉痾

當歸 乾地龍 穿山甲 白芥子

小撫芎 生白蒺 酒水各半法九

沈 從來痺症每以風寒濕三氣雜感主治召恙之不同由乎暑暘外加之濕熱水穀內蘊之濕熱外來之邪着於經絡內受之邪着於腑絡故辛解汗山熱痛不減余以急清陽明而致小愈病中復反者口鼻復吸暑熱也

是病後宜薄味使陽明氣爽斯清陽流行不息肢節脈絡舒通而痺痿之根盡拔至若溫補而圖速效又非壯盛所宜

人參 茯苓 半夏 廣皮 生於朮

枳實 川連 澤瀉 竹瀝薑汁法丸

暮服白茯苓丸

某 冬月溫舒陽氣疎豁風邪由風池風府施及四末而為痺症忽上忽下以風為陽陽主動也診視鼻明陽明中虛可見邪之邪之邪在乎宜通經脈

桂枝 羚羊角 杏仁 花粉

臨證指南醫案 卷七 痺

防已 桑枝 海桐皮 片薑黃

又 症已漸安脈絡有流通意仲景云經熱則痺絡熱則痠知風濕於內治以甘寒寒可去熱甘味不傷胃也

甜杏仁 蓮翹 玄參 花粉

菉豆皮 梨汁

又 餘熱微留下午足寒晨餐頸汗胃未調和食不甘美因大便微瀉不必過潤

北沙參 麥冬 川貝 川斛

陳皮 穀芽

沈三 用養肝血熄風方右指仍麻行走則屈伸不舒戊亥

必心熱煩蒸想前法不效杞歸辛溫陽動風亦動矣謹去辛用酸若疑慮迷次虛邪未盡致脈絡留滯兼以通逐緩攻亦妙

熟地 龜膠 阿膠 秋石 天冬

麥冬 五味 茯苓 蜜丸晨服

桃仁 穿山甲 乾地龍 撫芎 歸身

丹皮 紅花 沙苑 香附各一衣服

某 仲景以經熱則痺絡熱則痠今痺痛多日脈中筋急熱入陰分則中下焦為其所謂上焦屬氣下焦屬血

耳 熱入陰分則中下焦為其所謂上焦屬氣下焦屬血

臨證指南醫案 卷七 痺

柏子仁 當歸 丹皮 鉤藤

川斛 沙苑

又 痺痛右膝甚

生虎骨 柏子仁 牛膝 萆薢

苡仁 茯苓

某 四脈弦勁右足踝腫痛得煖得摩稍適此風寒濕三氣混入經隧而為痺也當用辛溫宜通經氣為要

活絡丹一丸陳酒下

某 痺痛在外踝筋骨妨於行走邪留經絡須以搜剔動

藥

氣滯	肝胃	肝脾	臨證指南醫案	<p>川烏 全蝎 地龍 山甲 大黑豆皮</p> <p>某病後過食肥膩氣滯難消口膩延指節常有痺痛當從氣分宣通方法</p> <p>蘇梗 杏仁 薑皮 鬱金</p> <p>牛夏麴 橘紅</p> <p>陳四勞動太過陽氣煩蒸中年液衰風旋周身痺痛此非客邪法宜兩調陽明厥陰</p> <p>黃芪 生白朮 製首烏 當歸</p> <p>白茯苓 黑糯米皮</p> <p>張五煩勞鬱勃之陽變現氣內風內經以熱淫風消必</p> <p>臨證指南醫案 卷七 痺</p> <p>用甘寒前議謂酒客不喜甘味且痰多食少亦忌甘膩滋滯用清少陽胆熱者酒氣先入肝胆也酒汁濕看腸胃受之理明以通胃胃腸氣機流行食加滑泄頗賦今者氣熱富午上胃經絡痺痛亦減於平日主以和陽甘寒宣通經脈佐之</p> <p>童桑 羚羊角 天門冬 枸杞子 白蒺</p> <p>丹皮 茯苓 霍山石斛 共熬膏</p> <p>血虛風痺骨節腫痛</p> <p>羚羊角 細生地 玄參 當歸</p> <p>桂枝 桑枝 白蒺藜</p>				
----	----	----	--------	---	--	--	--	--

精血	氣虛	臨證指南醫案	<p>金三痺痛在下重着不移論理必係寒濕但左脈搏數極月遺泄三四痛處無形豈是大活邪聚然感道深遠藥餌未易奏功佐以艾炙冀得效靈</p> <p>枸杞子 肉苁蓉 虎骨膠 麋角膠 杜仲</p> <p>桑椹子 天冬 沙苑 茯苓 溶膠丸</p> <p>孫脉右大陽明空氣短閃爍欲痛</p> <p>人參 生黃芪 熟白朮 炙草 廣皮</p> <p>當歸 白芍 牛夏 防風根 羌活</p> <p>又益氣頗安知身半已上痺痛乃陽不足也</p> <p>人參 黃芪 熟於朮 炙草</p> <p>臨證指南醫案 卷七 痺</p> <p>桂枝 歸身 白芍 川羌</p> <p>沈痺痛在右氣弱有痰</p> <p>生於朮 川桂枝 川獨活 片薑黃</p> <p>白茯苓 陳防己</p> <p>王辛香走風宣通經絡壅結氣分之濕有却病之能無補虛之益大凡藥餌先由中宮以布諸經中焦為營氣之本營氣失養轉旋自鈍然攻病必藉藥氣之偏朝夕更改豈是去疾務盡之道另於暮夜進養營一貼</p> <p>人參 茯苓 桂枝木 炙草</p> <p>當歸 炒白芍 南棗</p>				
----	----	--------	--	--	--	--	--

吳三 筋縱痛甚邪留正痺當此天暖開用針刺以宣脈絡

初補氣血之中必佐宣行通絡之治

生黃芪 防風 桂枝 炒黑常山

歸身 青菊葉汁

其 痺痛偏左入夜尤甚血中之氣不行

歸身 桑枝 苡仁 白蒺藜

薑黃 木防已

劉三 周禮採毒藥以供醫事蓋因頑鈍沉痾着於軀殼非

臟腑虛損故必以有毒攻拔使邪不留存凝着氣血乃

效既效矣經云大毒治病十去其五當此只宜愛護身

治痺症指南醫案 卷七 痺

矣

體勿勞尚志便是全功道理愚入必日以藥除根不知

天地之氣自勝有復人身亦然穀食養生可御一寒

解氣血之入服不親方士煉服金石丹藥而發而死

者此也

何首烏 黑芝麻 桑枝桂枝湯丸

麻沉小散中留熱筋骨尚有微痺宜通經絡佐清

熱

鈎藤 細生地 當歸身 白蒺藜

丹皮 片薑黃

此症與風病相似但風則陽受之痺則陰受之故多

重着沉痛其在內經不越乎風寒濕三氣然四時之

令皆能為邪五臟之氣各能受病其實痺者閉而不

通之謂也正氣為邪所阻臟腑經絡不能暢達皆由

氣血虧損脈理踈豁風寒濕三氣得以乘虛外襲留

滯於內致濕痰濁血流注凝滯而得之故經云三氣

雜至合而為痺又云風勝為行痺寒勝為痛痺濕勝

為着痺以及骨痺筋痺脈痺肌痺皮痺之義可知痺

病一症非偏受一氣足以致之也然而病症多端治

法亦異余亦不能盡述茲以先生治痺之法為申明

一二有衛陽疎風邪入絡而成痺者以宣通經脈甘

治痺症指南醫案 卷七 痺

矣

寒去熱為主有經脈受傷陽氣不為護持而為痺者

以溫通補扶持生氣為主有暑傷氣濕熱入絡而

為痺者用舒通脈絡之劑使清陽流行為主有風濕

腫痛而為痺者用參朮益氣佐以風藥壯氣為主有

濕熱傷氣及溫熱入血絡而成痺者用固衛陽以却

邪及宣通營絡兼治奇經為主有肝陰虛痺邪入絡

而為痺者以酸苦滋陰兼以通逐緩攻為主有寒濕

入絡而成痺者以微通其陽兼以通補為主有氣滯

鬱而為痺者從氣分宣通為主有肝胃虛滯而成

痺者以兩補厥陰陽明為治有風寒濕入下焦經隧

而為痺者用辛溫以宣通經氣為主有肝胆風熱而成痺者用甘寒和陽宣通脈絡為主有血虛絡滯及營虛而成痺者以養營養血為主又有周痺行痺肢痺筋痺及風寒濕三氣雜合之痺亦不外乎流暢氣血祛邪養正宣通脈絡諸法故張景岳云治痺之法祇宜峻補其陰宜通脈絡使氣血得以流行不得過用風燥等藥以再傷陰氣亦見道之言也。鄒滋九

癰厥

此症候為少陰者能少

癰火

李 先因嘔吐腹痛隨即昏迷此氣火痰上蒙清神為厥

某 陽氣暴張精絕令人煎厥

先用烏梅擦牙令牙關得開然後用藥 至寶丹三分

又煎厥者下焦陰液枯燥衝氣上逆為厥議用鹹寒降逆血肉填陰

細生地 玄參 龜膠 阿膠

淡菜 蚶水

又液涸消渴都是臟陰為病前議填陰藥汁膿膩不能多進但胃口不醒生氣何以再振陽明陽土非甘涼不復況肝病治胃自來有諸

人參 麥冬 川斛 新會皮

白粳米 乾佩蘭葉

王 一經云煩勞則張精絕辟積於夏令人煎厥大勞動陽氣弛張則陰精不司留戀其陽雖有若無故曰絕積之既久逢夏季陽正開泄五志火動風生若煎然者然斯為量厥耳治法以清心益腎使肝胆相火內風不為暴起然必薄味靜養為穩

連翹心 玄參心 竹葉心 知母

細生地 生白芍 方不切病

某二腎脈由背脊而升發時手足逆冷山吐涎沫喉加刀刺蓋足少陰經脈上循喉嚨抵舌本陰濁自下上犯必

循經而至做計學士椒附意通陽以泄濁陰耳

炮附子 淡乾薑 川椒 胡盧巴

半夏 茯苓 薑汁泛丸

某腎厥氣逆至頭 玉貞丸二十粒

盛九臍上心下熱熾咽喉間陳腐氣遂神昏仆厥經時汗出而醒病來口湧血沫乃臍中熱擁以致心竅受蒙若

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 辛

非芳香清透不能宣通絡中痰痺

生烏犀角 天竺黃 丹參 鬱金 一兩

雲茯神 石菖蒲 麝香 一錢 冰片 五分

各生研野赤豆皮煎湯泛丸竹葉湯送下二錢食後

服

謝熱鬱於內則機竅不靈春令升泄木火化風旋擾痰癱瘓病有癰瘤之慮不可進通經再劫其陰液

細生地 鬱金 犀角 丹參

石菖蒲 生白芍 竹瀝

又火淫於內治以苦寒佐以鹹寒

黃連 黃芩 黃柏 黑山梔

牡蠣 生地 冲入方諸水

又脈左堅經阻牛載戌亥陰時厥逆肢掣逾時方甦即欲渴飲龍膏宜寢鹹苦清火未效且大便兩旬不解定

是熱結在血做古人厥應下之義用張子和玉燭散

玉燭散

溫邪內陷津液被劫厥陽挾內風上逆遂致瘧厥

生牡蠣 阿膠 熟地炭 生白芍

炒遠志 石菖蒲

又厥陰候進剛藥五液劫盡陽氣與內風鳴張遂變為

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 圭

瘧平昔內損繼以暴邪本屬難調此陰氣竭絕戌亥當

防此症不注

熟地炭 磁石 生白芍 木瓜

遠志 茯神

毛瘦人而病溫熱神呆舌赤診脈時兩手牽掣震動此

津液受劫肝風內鼓是發瘧之原議以養胃汁熄肝風務在存陰耳用仲景復脈湯法去參薑桂

余脈細促神迷舌縮言蹇耳聾四肢牽引牙關不緊病

已月餘乃溫邪劫液陽浮獨行內風大震變幻瘧厥危病議以育陰熄風法必得瘧止神清方有轉機

<p>暑邪內陷胞絡 閉結</p>		<p>唐 積勞伏暑欲寐時心中蟲然上升自覺神魂縹緲此皆陽氣上冒內風鼓動所以陡然昏厥</p>		<p>復脈湯去薑桂</p>		<p>又 舌絳汗泄齒燥痰膩熱劫津液最防痙厥</p>		<p>臨證指南醫案 卷七 痙厥 圭</p>		<p>又 神氣稍甦脈來欬靜五液交涸風陽尚動滋液救其焚燎清補和陽去熱用藥全以甘寒津液來復可望向安</p>		<p>阿膠 二錢 雞子黃 一錢 人參 秋石 天冬 一錢</p>		<p>細生地 二錢 白芍 一錢 方不切病</p>		<p>又 神氣稍甦脈來欬靜五液交涸風陽尚動滋液救其焚燎清補和陽去熱用藥全以甘寒津液來復可望向安</p>		<p>阿膠 人參 淡菜 鮮生地</p>		<p>天冬 川斛</p>		<p>毛 少陰不藏溫邪深入喘促汗出渴不多飲舌辛似縮症非輕小擬用復脈湯為邪少虛多之治去薑</p>		<p>又 舌絳汗泄齒燥痰膩熱劫津液最防痙厥</p>		<p>臨證指南醫案 卷七 痙厥 圭</p>		<p>復脈湯去薑桂</p>		<p>唐 積勞伏暑欲寐時心中蟲然上升自覺神魂縹緲此皆陽氣上冒內風鼓動所以陡然昏厥</p>		<p>石膏 知母 甘草 粳米</p>		<p>生地 麥冬 竹葉心</p>		<p>方 熱閉神狂因乎食復畏人與肢筋牽動仍屬暑病變</p>		<p>痙通三焦以清神明冀有轉機 紫雪丹 二錢</p>		<p>又 舌欲痿膚燥筋掣熱劫脂液殆盡為痙用河間甘露飲再服紫雪丹一錢</p>		<p>楊 暑由上受先入肺絡日期漸多氣分熱邪逆傳入營</p>	
----------------------	--	--	--	---------------	--	---------------------------	--	-----------------------	--	---	--	---------------------------------	--	--------------------------	--	---	--	---------------------	--	--------------	--	---	--	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------	--	--	--	--------------------	--	------------------	--	-------------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------------	--	-------------------------------	--

<p>肝風</p>		<p>遂通心胞絡中神昏欲蹶舌音縮手足牽引乃暑熱深陷謂之發痙熱閉在裏肢體反不發熱熱邪內閉則外脫豈非至急考古人方法清熱必藉芳香開裏竅以清神識若重藥攻邪直走腸胃與胞絡結閉無干涉也</p>		<p>犀角 玄參 鮮生地 連翹</p>		<p>鮮菖蒲 銀花 化玉寶丹 四九</p>		<p>金 暑熱結聚於裏三焦交阻上則神呆不語牙關不開下則少腹衝氣小溲不利邪結皆無形之熱閉塞漸有痙厥之狀昨大便既下而現此象豈是垢滯議芳香宣竅通解在裏蘊熱 紫雪丹 一錢五分開水化勻三服</p>		<p>臨證指南醫案 卷之 痙厥 圭</p>		<p>鮑 舌白渴欲冷飲氣促喘咳而呃胸悶昏謔此暑風濕熱穢濁痙塞宿垢尚在小腸旬日間漸變痙厥是為陰機遂逐穢結以蠶屎清</p>		<p>大杏仁 連翹心 竹葉心 川貝母</p>		<p>葛蒲根汁 辰砂益元散 煎藥化牛黃丸一服</p>		<p>蔡 暑濕熱都着氣分乃消食苦降滋血亂治熱熾津涸舌板成瘡究竟邪閉阻竅勢屬不穩</p>		<p>人參 生甘草 石膏 知母 粳米</p>		<p>潘 肝陽化風上冒為厥風陽內熾脂液涸而作痛此非實症剛燥忌用</p>	
-----------	--	--	--	---------------------	--	-----------------------	--	---	--	-----------------------	--	---	--	------------------------	--	----------------------------	--	---	--	------------------------	--	-------------------------------------	--

生地	阿膠	牡蠣	天冬
茯神	生白芍		
夏二 五 中年已後陽氣日衰。是下焦偏冷。陽不及護衛周身。氣分更虛。右肢如痿。當春地氣上升。身中肝風大震。心嘈。嗔怒。痰湧音啞。乃厥象也。皆本氣自病。最難見效。			
熟地	熟淡附子	牛膝炭	炒麥冬
遠志炭	茯苓		
馬一面青眊白。入夜顫顫漸赤。耳聾。舌心乾板而縮。並不渴飲。間有寒戰。後熱。此厥陰肝臟液涸。風旋勢成。瘧厥危症。勉從經旨之訓。辛苦急當食甘以緩之。			
臨證指南醫案 卷七 瘧厥 誌			
甘麥大棗湯加阿膠			
陸面青。頭痛動搖。手足搖擗牽掣。驚嚇惱怒。病從肝起。如饑求食。晝夜無寐。都是肝風盤旋鼓舞。漸為癲厥。此乃五志之病。			
阿膠	牡蠣	生地	天冬
小麥	生白芍		
某衝氣崩脹厥。龍薈丸一錢二分			
顧此瘧厥也。蓋厥陰風旋。陽胃神迷。則為厥。陽明絡空。四末不用。而為瘧。厥午後黃昏。乃厥陰陽明旺時。病機發現矣。凡此皆屬絡病。金匱篇中有之。仲景云。諸厥宜			

下下之利不止者死。明不下降之藥皆可止厥。但不可硝黃再傷陰陽耳。但積年沉痾。非旦夕速效可知矣。			
活蠶甲 真阿膠 方諸水 鮮生地			
玄參 青黛			
又 照前方去玄參加天冬			
厥從肝起。其病在下。木必得水而生。陰水虧。斯陽風熾。筋而絡中熱沸。卽厥拙擬血屬介類。味鹹入陰。青色入肝。潛陽爲法。			
又 陰絡空。厥陽內風掀然鼓動而爲厥。余用鹹味入陰和陽。介類有情之潛伏。頗見小效。但病根在下深遠。			
臨證指南醫案 卷七 瘧厥 誌			
湯劑輕浮。焉能填隙。改湯爲膏。取藥力味重以填實之。亦止厥一法。			
鮮蠶甲 敗龜版 猪脊髓 羊骨髓			
生地 天冬 阿膠 淡菜			
黃柏 熬膏早服七錢。午服四錢。			
林據說六七年前。驚駭起病。氣從左脇存。或及胸腹。心中脹極。氣降脹減。必汗出溼溼。此屬肝厥。凡煩勞動怒。卽刻舉發。肝木風火內寄。其來必驟。且有聲音。久恙非湯藥可投。緩調須用丸藥。更發作自必輕減。			
人參 乾薑 附子 桂枝 川椒			

<p>小川連 川棟子 當歸 白芍 烏梅肉九 顧 平昔腸紅陰絡久傷左脇下宿痰肝家風氣易結形 瘦面青陰虛陽氣易胃血絡不得凝靜諸陽一井遂爲 厥衝氣自下犯胃爲呃症似蓄血如狂奈脈細勁咽喉 皆痛眞陰枯槁之象水液無有風木大震此剛劑強鎮 不能熄其厥胃耳</p>	<p>生雞子黃一真阿膠二 淡菜 五錢 龜板 五錢 冲入熱童便一杯</p>	<p>戴 酒客中虛多濕陽明素虛厥陰來乘當穀雨土旺用 事風木與陽俱升逆鬱胃而厥此平昔積勞內因與外 臨證指南醫案 卷七 瘧疾 主</p>	<p>邪無涉閱醫多用風藥是再傷肌表護衛之陽乃召風 以致中耳 川桂枝 於羊角 炒半夏 橘紅</p>	<p>明天麻 茯苓 當歸 鈎藤 吳三 肝風癰厥迅發莫制都因腎真內怯平素多遺診脈 花弱議用固本丸 固本加五味肉桂骨全消蜜丸 謝八有年下虛春木自地而升陽浮上蒙清竅經云下虛 上實爲厥癰疾肝風內震倘加惱怒必致厥仆瘵中大 忌攻痰祛風藥</p>	<p>熟地 天冬 萸肉 五味 牛膝</p>
--	--	--	--	--	-----------------------

<p>龜甲 磁石 茯神 遠志 菖蒲 夏九少腹氣攻有形嘔吐頭脹陰厥不至頭面厥陰脈上 至顛頂四肢逆冷卽厥象也不是癰母宿冷肝脈環選 陰器爲遺洩</p>	<p>炒黑川椒 川棟子 炒橘核 青木香 小茴香 茯苓</p>	<p>王 右脉已伏左小緊四肢冰冷乾嘔煩渴厥陰濁注胃 陽欲絕此屬痛厥姑以辛熱泄濁通陽 泡淡吳萸 製附子 川棟子 延胡 淡乾薑 茯苓</p>	<p>臨證指南醫案 卷七 瘧疾 主 又 脉微爲無陽下利冷汗嘔逆不食肢厥不肯回陽一 團濁陰阻蔽却有閃腕之危議四逆之屬護陽驅濁 人參 淡附子 枳實 茯苓 生淡乾薑</p>	<p>又 肢厥惡心吞酸胸滿大便秘不通有六日 川連 淡乾薑 人參 枳實 陳皮 半夏 茯苓 宜用調系</p>	<p>史 溫熱已入厥陰陰傷致風陽上顛遂爲癰厥厥發丑 寅陽明少陽之陽震動昨進鹹苦清其陰分之熱已效 今複入鎮陽以止厥 生地 天冬 阿膠 雞子黃</p>
--	------------------------------------	--	---	--	---

生龍骨 小麥

蔣 眩暈心痛。嘔吐涎沫。周身麻木。此厥陰肝臟中陽過胃貫膈。逆衝不已。有瘧厥之意。

川連 吳更煮 乾薑 川棟子 烏梅

牡蠣 白芍

又 開泄和陽入陰已效。當停煎藥。龍薈丸。

程 厥邪熱深。生薑性辛溫。大泄脈陰。陽遂上冒。心熱暈厥。但陰虛熱熾。苦寒不可多進。以滋陰却熱為穩。

生薑甲 鮮生地 生白芍 知母

山梔 橘紅

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 支

張 未病先有驚恐。先寒戰。後發熱。心中極熱。乾嘔煩躁。

渴飲冷。仍不解渴。診脈小弦。舌白無胎。曾服冷如冰。此

熱邪已入厥陰肝經。所謂熱深厥深也。病全入裏。極為

棘手。議用紫雪丹開深伏之熱。始取其芳香宜。冀得

躁擾勢緩。方有轉機。紫雪丹二錢。

王 心中疼熱。耳聾目利。熱邪已入厥陰。三日不厥。方有

好音。

鬱金 川連 秦皮 黃芩

連翹心 石菖蒲汁

某 先發水痘。已感冬溫。小愈不忌葷腥。餘邪復熾。熱不

可遏。入夜昏煩。輒云頭痛。邪深走厥陰。所以發厥。診脈兩手俱細。是陽極似陰。鼻燥舌乾。目青黃。多屬邪閉。壞敗。諒難挽回。用涼膈散。

肝風燥 陰 伍 室女經來。衝脈自動。動則陽升。陽升則逆。逆則為瘧。

厥前厥陽明虛胃失降。厥陰熱。肝愈橫。風陽上冒。清空

神迷。諸竅似閉。皆入夏大地發泄之徵。本足表實。先理

其實。議用局方龍薈丸。純苦直降。非湯飲留連腸胃之

比。每服三錢。不拘二三次分服。接用復脈法。去參薑桂

施 氏 諸厥屬肝。肝病犯胃。為嘔逆腹痛。乃定例也。診脈虛小。望色皸白。據述懷妊。病竟不發。思中流砥柱。斯肝木

臨證指南醫案 卷七 瘧厥 支

疑然。則知培植胃土。乃治病法程矣。

六君子去木皮加芍藥木瓜煨薑南棗

某 氏 厥屬肝病。幾番病發。都因經水適來。夫血海貯聚既

下。斯衝脈空乏。而風陽交動。厥之暴至之因由也。厥寒

濡潤。亦和陽泄內風之義。治之未應下焦。聞冷。後含胸

痺。思衝脈乃陽明所屬。陽明虛則失調。厥氣上犯。莫過

內經治肝不應。當取陽明。制其侮也。曾用通補入肝。取

乎腑以通為補。小半夏湯加白糯米。

龔 三 諸厥皆緣厥陰。痙瘕。心熱脇脹。中消便難。乃肝陽內

風妄動。消熾犯及陽明矣。經言治肝不應。當取陽明。肝

胃一臟一腑相對不耐溫積者是肝用太過肝體不及也		各異陰人遇生病不用此方		九孔石決明 淮小麥 清阿膠 細生地		天冬 茯神		陳 嘔怒微厥肝陽升舉宜益胃陰以制伏		人參 麥冬 茯神 鮮蓮子		竹葉心 生甘草 微溫服		葉氏 脉右大熱升風動鬱胃為厥宗陳無擇羚羊角散方		羚羊角 小生地 玄參 丹參		連翹 黑豆皮		臨證指南醫案 卷七 瘧疾 全		又 厥後驚惕汗泄陽風無制都緣陰枯不主戀陽議用		六味益陰和陽妙六味去山藥加人參秋石		又 渴不欲飲陰不上乘况寐醒神識不靜易驚汗出法		當飲補		人參 炙肉炭 熟地 五味		茯神 遠志		半月經水兩至痛自下焦衝突而厥病由陰維衝任		蓋八脉所司也此養營僅到中宮所以無效		從蓉 鹿角霜 當歸 柏子霜		桂枝木 茯苓	
------------------------	--	-------------	--	-------------------	--	-------	--	-------------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------------------	--	---------------	--	--------	--	----------------	--	------------------------	--	-------------------	--	------------------------	--	-----	--	--------------	--	-------	--	----------------------	--	-------------------	--	---------------	--	--------	--

又 前法已中病情須從奇經治義		照前方去桂枝木加鹿角膠		又 病去八九僅以溫補下元為法不必窮治		淡從蓉 炒杞子 當歸 柏子仁		茯苓 小茴香		陶氏 脉數厥止熱在營中		犀角 玄參 丹皮 連翹心		胆星 橘紅		王 口鼻觸入異氣胃傷嘔吐土衰則木尅肝風內橫三		虫擾動為痛從蛇厥論治		臨證指南醫案 卷七 瘧疾 全		川椒 乾薑 桂枝木 川棟子		人參 川連 烏梅 生白芍		黃二 據述十一年前夏秋間多用升水鹽梅因此昏厥已		後三五日一發病愈雖醒日瘦日減間有語言不自接		續想其至理水鹽梅酸大泄肝腎臟陰厥者陽氣逆亂		胃神憤憤勢成沉痾非痼厥門治痰治火清發者是臆		陰受病臟主乎藏畜醫偏搜逐劫燥凡陰涸欲絕譬諸		油盡燈焰忽明忽昏撲然息矣先聖先賢從無成法未		敢奏藥欺人 常用人乳一杯 不水不取		某 脉左動如數右小濡弱病起嘔怒即寒熱汗出心悸	
----------------	--	-------------	--	--------------------	--	----------------	--	--------	--	-------------	--	--------------	--	-------	--	------------------------	--	------------	--	----------------	--	---------------	--	--------------	--	-------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------	--	------------------------	--

繼而神竟自覺。故述大肝厥證。因怒則諸陽皆動。所見病源無非陽動。變化內風。而為厥。故凡屬厥症。多隸厥陰。肝病者。內經治肝。不外乎以理用。滋以治體。甘以緩急。今精彩散失。鎮固。及南方書泄肝平肝抑肝方法。儘多。至於清法。多。以子母相生。為治此病。全以肝腎下焦主法。為正所服。醫家。並無師古之方。未識何見。

肝腎虛
衝氣逆

阿膠一錢 雞子黃一枚 人參一錢 生地三錢 金箔五片

某冷是足上貫於心。初起身麻。木。今則口鼻皆有冷氣。病起為惡。內傷肝腎為厥。衝脈隸於肝腎。二臟失藏。

臨證指南醫案 卷七 瘧厥

全

衝氣沸亂。其脈由至陰而上。故多冷耳。

淡從蓉 熟地炭 五味子 紫石英

茯苓 牛膝

汪胃陽傷殘。濁氣上攻。將為痛厥。當治陽明之陽。

吳茱萸 薑汁 半夏 茯苓 梗米

又照前方去吳茱萸加廣皮。

某熱甚而厥。其熱邪必在陰分。古稱熱深厥深。病中道。

泄。陰傷邪陷。發表攻裏。斷難施用。和正托邪。是為正法。

草果 知母 人參 半夏

薑汁 烏梅

厥者從下逆上之病也。病者明其風強之狀也。所以

二字每每並言。原與傷寒門所載者有間。想是症總

由氣血日偏。陰陽一升而成。譬如風雷之猛烈。極

而發也。若發而漸復者。猶可轉危為安。若發而轉逆

者。必至直拔根。乃已。斯存亡之機。在乎命脈之盈

虧耳。考方書之名目不一。致病之因由亦繁。大抵可

吐者。如痰食填塞於胸中。用瓜蒂散之類。及燒鹽探

引方法。可清可折者。如厥陽壯火升逆。而與制用玉

女煎。及宣明龍薈丸法。可開可降者。如氣厥薄厥。而

形氣暴絕。有五磨飲子。及蒲黃酒法。穢濁蒙神。而昏

臨證指南醫案 卷七 瘧厥

全

亂無知。有牛黃至寶。及蘇合香丸之兩法。飛尸卒厥。

先宜酒醴以引導。并可按穴而施鍼法。及灸法。若從

虛而論者。如內奪而厥。則為瘡痍。有地黃飲子之通

攝下焦法。煩勞陽張。令人煎厥。有人參固本。加入金

箔方諸水。為壯水制火法。血厥。有參附湯。乎從

陰從陽法。色厥而精脫於下。急以參附湯。元法。腎厥

宗許學士之椒附以通陽。就實有神效之玄蛇法。陽

極用救陰。峻劑。陰極有扶陽方法。和緩模已為全

備。及參案中。先生於是症獨重在肝。蓋肝者將軍之

官。善十他臟者也。要知肝氣一逆。則諸氣皆逆。氣逆

則痰生遂火沸風旋神迷魂蕩無所不至矣若犯於上者不免凌金燥液有門冬湯及瓊玉膏之補金柔制法若犯於中而為嘔為脹者用六君去朮加木瓜姜芍之類及附子梗水湯加人參為補胃凝肝法若震及心脾而為昏為清者用甘麥大棗湯合龍蠅之屬為緩急重鎮法若挾少陽之威而乘巔搖絡者用羚羊鉤藤玄參連翹之類為熄風清絡法若本臟自病而體用失和者以椒梅桂芍之類為益體宣用法若因母藏之虛而擾及子藏之位者用三才配合龜甲磁硃及復脈湯辛味復入雞黃之屬為安攝其子

臨證指南醫案

卷七 癲風

金

母法至於痿厥之治尤覺神奇取血肉介類改湯為膏謂其力味重實填隙止厥最速此豈非補前人之未備開後學之法門者乎參是案者幸毋忽諸

邵新

驚

某驚則氣逆陽泄為汗用重鎮壓驚

川桂枝木五分 黃芪二錢 人參一錢 龍骨煅一錢 錢牛

左顧牡蠣一錢 錢牛

某驚恐傷神不語

建蘭根汁 薑汁 金汁 共和一處隔

湯燉徐徐服

某因驚外觸見症神怯欲迷已經肢厥冷汗怕動微鎮

怯理虛

臨證指南醫案

卷七 驚

金

人參 茯神 棗仁 生龍骨 石菖蒲

炙草 南棗 陳淮小麥 早上服

楊氏經血期至驟加驚恐即病寒熱心悸不寐此驚則動

肝恐則傷腎最慮久延腦燥即有肝厥之患

淮小麥 天冬 龍骨 牡蠣

白芍 茯神

陳九心中苦烟霧噴則氣散少頃即聚易驚恐畏懼嘔逆

不渴自述難鳴苦况瀉後亡陰熱藥劫陰前議和胃不

應主以鎮之攝之

炙甘草 淮小麥 大棗 棗仁 青龍骨

肝腎陰虛

驟驚陽逆暴厥為肝風病甚則心悸是陽動夜則氣
墜屬陰厥用收固腎肝可救

生地 五錢 麝香 一錢 龍骨 三錢 牡蠣 三錢

五味 一錢 真金箔 三張

經云驚則傷胎恐則傷腎大凡可畏之事猝然而至
者謂之驚若從容而至可以宛轉思維者謂之恐是
驚急而恐緩也夫驚症大人亦有之小兒最多因其
神志未堅胆氣未充故每遇稍異之形聲即陡然而
驚矣驚之所傷由心猝及乎胆由胆即及乎肝遂致
心主君火兼肝胆中相火風太驟然而起症現搐搦

臨證指南醫案 卷七 驚

全

痙瘓神昏譫妄肢冷厥逆吐乳身熱目竄口噤種種
所患無非心肝胆之現症而實毫無外感之風邪此
因外受之驚而動內之木火風也故但當以一驚字
立為病名斯乃切當因其內風沸起遂加一風字因
病來迅速又加一急字故遂有急驚風之病名此已
屬牽強附會矣至於今之混稱為急驚風者更屬背
謬總因小兒陰氣未充外感之風溫風熱風火以及
寒邪化熱并燥火諸症最易傷肝傷則血不營筋
液傷則脈絡滯滯熱盛亦能使內之木火風相繼而
起所現之症與受驚者類亦相同然實非因受驚而

起其所治之法大有區別如果因驚者治宜安養心

神鎮驚定怯甘涼清內熱柔潤熄肝風或少佐芳香

通其竅絡舒其結閉至於剛熱燥渴表散之藥藥不

可用若無驚而但感外邪者有宜於涼散有宜於溫

散有宜於苦寒清火有宜於甘溫扶陽或補或瀉自

當按六淫之邪而施治與驚字毫無干涉奈今之醫

者每遇非驚之症因不能辨則六氣中所傷何氣却

定不出病名遂強將一驚字混入藉口漫稱為急驚

風症掩飾欺人病家亦酷信之以為小兒防範難遇

焉有無驚之理其所訂之方錯雜游移不知治驚總

臨證指南醫案 卷七 驚

全

以心肝胆為主若治時邪須兼肺胃脾腎三焦營衛
經絡而論大不相同也更有一種稱慢驚風之病名
者九屬怪誕不經必當亟為駁正有論在幼科吐瀉
之後宜合觀之 華嶠雲

癲癇

火升

孫八神呆厥沉因驚恐以致癲疾語言不甚明了此痰火阻其靈竅深戒酒肉厚味靜室善調經年可愈

黃連

黃芩

山梔

枳實

橘紅

胆星

菖蒲

遠志

陳動怒驚觸乃外加擾內致五志陽越莫制古人集癲制狂辨以陽併於陰陰併於陽互與今以陽逆狂亂非苦藥之降未能清爽其神識也當歸龍薈丸三錢

但驟然驚惕陽氣上逆神呆不寐低微叫喊不食不語此指胃腎系

卷七 癲癇

兌

既不便有驚悸之象

虛則痰病已成難愈

竹節白附子

天竺黃

陳胆星

石菖蒲

川連

爵金

茯神

橘紅

汪驚恐陽升風動宿癲遂發吐痰即逆不言絡脈夫利也

羚羊角

石菖蒲

胆星

遠志

連翹

鉤藤

天麻

橘紅

曹十四春病及長夏癲厥屢發前用龍薈九意苦泄肝膽和服即瘳此久病陰分已虛誤理陰和陽入酸以約束之

生雞子黃

阿膠

川連

黃柏

生白芍

米醋

金二痛厥神呆眩強

犀角

羚羊角

玄參

菖蒲

炒牛夏

炒遠志

爵金

橘紅

吳驚狂乃木火擾動雖得平靜仍心悸怔忡夜卧不寐診脈虛細如絲已非痰火有餘誤補心丹以理心之用

人參

茯神

棗仁

玄參

丹參

天冬

麥冬

生地

川連

柏子仁

菖蒲

桔梗

遠志

臨證指南醫案 卷七 癲癇 兌

葉氏

每遇經來紫黑癲疾必發暮夜驚呼聲震其則神呆面青多笑火風由肝而至泄胆熱以清神再商後法

丹皮

丹參

細生地

黑山梔

羌蔚子

胡黃連

調入琥珀末

張二入冬不寐癲疾遂發此陽不潛藏治在肝腎

用虎潛法

某

癲疾脈不鼓指議交心腎益神志

生地

龜甲

黃柏

川連

酒炒菖蒲

茯神

遠志

山梔

竹葉

葉二

五志陽升神識迷惑忽清忽甚者非有形質之邪乃

火升

火升

火升

熱氣化風上竄。致於竟夜不寐。攻痰疎利。決不效驗。尤以極苦之藥。冀其元陽潛降。

生地 龍胆草 丹參 木通

山梔 薊蔚 青黛 薄荷

過勞心太

某 平昔操持身心皆動。悲憂驚恐。情志內傷。漸漸神志恍惚。存似癲癩。其病不在一臟矣。醫藥中七情致損。二

千年來。從未有一方包羅者。然約育總以陰陽迭偏爲定。評凡動皆陽。當宗靜以生陰。是議陽乘於絡。臟陰不

安。飲攝鎮固。久進可效。家務見聞。必宜屏絕。百日爲期。

人參 廉珠 茯神 棗仁 炙草

臨證指南醫案

卷七

癲癩

七

生龍骨 莖肉 五味 金箔

天地一陰陽也。陰陽和則天清地寧。一有偏勝。遂有

非常之變。人身亦一陰陽也。陰陽和則神清氣定。一有偏勝。自致不測之病。故內經曰。重陽者狂。重陰者

癲。癲與癩。其原則同也。古人集諸病狂辨。以爲陽併於陰。陰併於陽。此誠不刊之論。言乎現症。狂則少卧

不餓。妄言妄笑。甚則上屋。其候多躁而常醒。癩

則或歌或哭。如醉如癡。甚至不知痛癢。其候多靜而常昏。癩則發作無時。卒然昏仆。筋脈痠癢。口中作聲。後人因其證似分馬癲牛癲猪癲羊癲雞癲五名。其

候經時而必止。推其病因。狂由大驚大怒。病在肝膽。

胃經三陽併而上升。故火熾則痰湧。心火熾爲之閉塞。

癲由陰虛。病在心脾。胞絡三陰。故而不宣。故氣鬱則痰迷。神志爲之混淆。癩病或由驚恐。或由飲食

不節。或由母腹中受驚。以致內臟不平。經久失調。一

觸積。或氣內風。猝焉暴逆。莫能禁止。待其氣反。然

後已。至於主治。察形證。診脈候。以辨虛實。狂之實者。

以承氣白虎。五折陽明之火。生鐵落飲。重制肝膽之

和。虛者當壯水以制火。二陰煎之類。主之。癩之實者。

以滾痰丸。開痰閉。清心丸。淡火。癩者當養神。

臨證指南醫案

卷七

癲癩

七

而通志。經中主之。癩之實者。用五癩丸。以

攻風。控涎丸。以劫痰。龍膏丸。以瀉火。虛者當補助氣

血。調攝陰陽。養營湯。河車丸之類。主之。狂癲癩三症

治法。大旨不過乎此。今加肝風痰火者。苦辛以開泄。

神虛火炎者。則清補並施。肝膽痰火風旋逆者。以

極苦之藥。折之神志。兩虛者。用交心腎法。勞神太過

者。宗靜以生陰意。爲飲補鎮攝。方案雖未詳備。而零

珠碎玉。不忍其爲世寶哉。醫者惟調理其陰陽。不使

有所偏勝。則鬱逆自消。而神氣得反其常焉矣。癲癩

年

臨證指南醫案目

卷八

衄

痢

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

臨證指南醫案卷八目

腰腿足痛

諸痛

耳

口

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南醫案卷八

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦昫滋九全較

邵銘新甫

衄

某溫邪衄血

連翹

杏仁

某風溫衄血

某溫邪衄血

丹皮

茅花 黑梔皮

某三熱此熱蒸於水穀之濕衄血熱衄衄納穀如昔治在陽明

熟地

知母

陳女常有衄血今夏忽起神識如呆診脈直上魚際大忌驚恐惱怒天癸得通可愈

犀角

連翹

林六陽升鼻衄不止

細生地

烏犀角 炒知母 牛膝 黑山梔

川斛 丹皮 炒黑側柏葉

某 努力傷陽逆鼻衄

犀角二錢 細生地三錢 炒丹皮一錢 玄參一錢

炒牛膝一錢 黑山梔一錢 炒黑側柏葉五錢

臨服沖鮮荷葉汁一小杯

趙十脈左數衄血火升

生地 阿膠 天冬 麥冬

淡菜 生白芍 茯苓 炒山藥

程 從前衄血都以養陰益氣而愈知非實熱皆勞役陽
冒以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘

臨證指南醫案 卷八 衄

口中膩涎濁沫竟是腎精帶傷收納失職之象急急保

養遠戒酒色猶可向安

熟地 人參 黃肉 湖蓮

芡實 補骨脂 山藥粉丸

朱七脈數陰虧陽升頭暈心中煩雜鼻衄

生地 玄參 金銀花 川斛

丹皮 石決明

某 咳逆失音衄血

生地 龜板 丹皮 牛膝

山藥 茯苓

某十歲鼻衄時發

生地 玄參 丹皮 山藥

茯苓 澤瀉 黃柏 人中白

某 食燒酒辛辣及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味偏勝肺陽傷陰為傷此病以養胃陰和法

生白扁豆 北沙參 麥冬 白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不

同清道即指至高之分由山根以上睛明之次而來

也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脈之會及衝

脈交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸

臨證指南醫案 卷八 衄

書雖已詳明惟景岳辨之尤切但衄之為患總由于

火外為六淫之變化內因五志之掀騰氣血日為錯

亂陰陽為之相乘天人交感之處虛實攸分矣若風

寒壅盛於經陽氣鬱而迫營者宜奈麻黃桂枝症之

大意若溫風暑熱拂鬱而動血外溢者用辛涼清潤

等劑總定經絡之高下若火邪極甚而散血上泛者

有苦寒鹹寒之法審其原委之淺深此外因主治法

也至於煩冗曲運耗及木火之營肝臟厥陽化火風

上灼者甘酸柔婉理所必需多勞過慾病及天一之

真陽浮引陰血以胃上竅者滋潛厚味法從峻補血

脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽的毒
之劑。因努力用培中益下之方。此內因主治法也。學
者惟審內外兩因庶乎施治無誤矣。 邵新甫

臨證指南醫案

卷八

四

疝

督任陽

某

七疝治法。最詳子和其旨辛香以泄肝。得氣疎泄而
病緩矣。按法調理不愈。七味導引納腎。益氣升舉脾陽。
而墜氣仍然。艾炙蒸臍。原得小安。內經任脉為病。男子
內結七疝。女子帶下瘕聚。同為奇經主之。故疎泄諸方。
能治氣實。參朮升補。僅治中虛下陷。與元海奇經中病。
無補。壯歲至老。病根不輟。下焦日衰。可知升陽一法。體
症頗合。衰年僅可掙持。勿使病加可矣。

生鹿茸三錢 鹿角霜一錢 當歸二錢 生菟絲子五錢
臨證指南醫案 卷八 疝

沙蒺藜一錢 川桂枝尖五分 飢時服

朱一勞傷。溫裏已效。臍旁動氣。小腹結疝。黑丸偏墜。皆陽
氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。

當歸 舶茴香 淡苳蓉 枸杞子

安息香 茯苓

孫 疝墜於右。筋絡連小腹痛。此寒主收引。議進溫通厥
陰之絡。

川棟子二兩 穿山甲二兩 炮黑川烏五錢 去皮

炒黑小茴香二兩 橘核二兩 乳香五錢

用老韭白根汁送丸。飢時服二錢五分。

明 臍下少腹。形象橫梗。發必痛遶腸腰。以及陰囊。此乃

厥陰肝氣不宣。以苦辛如左金。佐通經脈之凝滯。

川連 吳萸 穿山甲 青木香

金鈴子 延胡 青橘葉湯丸

郁七肝病。絡虛氣聚。少腹脹。前用河間金鈴子散。加牡

蠣橘葉。合鹹苦辛勝法。小效。加食。述飢則脇腹鳴盛而

濁氣下泄。頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可

純攻。

桃仁 當歸稍 炒小茴 橘核

郁李仁 南山查 蔥白汁丸

臨證指南醫案 卷八 疝 六

謝五七疝皆肝。少腹堅聚有形。是閉塞不通之象。百日久

恙。血絡必傷。古人治疝。必用辛香。助燥氣勝之品。宜緩

商矣。

歸鬚 杜牛膝根 小茴香 川棟子

穿山甲 柏子仁

林 脈右弦。左瀉。當臍痛連少腹。已屬凝聚有形。嘔吐黃

瀝。大便欲解不通。若患處瀉。瀉有聲。痛勢稍減。惟臥着

體不轉移。其痛更加。此屬肝氣疝。癢辛香流氣。所稱通

則不痛耳。

炒桃仁 炒橘核 金鈴子 炒延胡

非白汁 兩頭尖 小茴 青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香

無以入絡。非穢濁無以直走至陰之域。以子和方合

奉議意

元。立。久。前。一。日。寒。戰。後。熱。屬。厥。陰。食。蟹。鹹。寒。沉。墜。浮。腫。

囊。大。漫。漶。甚。少。至。晚。臍。腹。愈。加。顯。然。陽。微。濁。聚。治。從。氣

分開泄冷濕

粗桂枝 吳萸 川棟子 茯苓

生牡蠣 澤瀉 磨青皮汁十匙

唐三寒濕已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊莖腫

臨證指南醫案 卷八 疝 七

五苓散加獨活。漢防已

某 肝風筋疝。怒勞致傷。宜通補熄風。

苳蓉 補骨脂 歸鬚 小茴 韭子

茯苓 胡桃肉 青鹽 羊內腎蒸熟和丸

朱 動氣疝。腹連臍。汗汗存聲。男子精氣不充。是下焦損

傷。溫補勿過。剛燥須察八脈。以推病情。

淡苳蓉 歸身 炒枸杞 小茴

炒沙苑 茯苓 紅棗肉

肝氣

汪 自云鬱怒不已。夏季忽起腹脹。譬以快氣疎滯湯藥。其服竟入小腹下墜。青筋外突。脹甚延及腎囊。乃肝疝

之症議子和法

歸鬚 橘核

青木香 青皮

小茴 黑山梔

青蔥管

周六久久勞怒肝木內震脇中少腹皆肝脉遊行之所氣

疑聚為脹聚久結形為癰情懷憂鬱不能痊以內起情志不尚草木微功耳

炒小茴 黑山梔

川棟子 延胡

青木香 青皮

生香附 橘核

肝痛犯

吳六味酸食不化湧吐逆少腹厥氣上冲下有宿癰以肝蜀攻胃經云食出完穀是無陽也

臨證指南醫案卷八

生炮黑附子

生淡乾薑

狗胆汁

吳萸 川棟子

癰結少腹按之堅升過飢必衝突至臍吐酸脹腹逆

熱從怒勞而得內應乎肝肝逆犯胃便則胃弱肝乘上

暖下洩氣則減

肉桂 真橘核

青木香 小茴

穿山甲 粗桂枝

李根白皮

項寒勝癰隆亦屬厥陰蓋陽明聚厥邪來乘須胃陽復

辟疑寒自罷

人參一錢 炮烏頭一錢 淡乾薑一錢 吳萸一錢 泡茯苓三錢

朱 七癰在肝內經謂衝脉為病但衝脉隸於陽明肝木

必乘尅胃土胃翻湧逆缺吐呃逆湯飲不入呃忒不

止皆逆亂無已為厥厥危病矣肝體本剛相火內寄一

派執燥藥餌以剛濟剛竟有缺折之虞欲泄其濁疑用

朱南陽法

韭白根 兩頭尖 金鈴子 延胡

歸鬚 肉桂心

毛 癰發已過肢冷潮熱其納食減半濁陰內迫犯胃無

發汗攻表之理議泄厥陰以安陽明

人參 炒黑川椒 附子 茯苓

臨證指南醫案卷八

川棟子 胡盧巴

詹 老年久癰因噤怒而腫大熱痛肝失泄火腑濕熱

蘊結不通溫補升陽罔謬蓋肝性主剛濕閉反從燥化

此龍胆苦堅不應議柔苦制熱反佐辛熱以開血中鬱

痺用東垣滋腎丸

戴二濕熱下注久則囊腫形堅下焦血多氣少子和法中

原有虎潛諸論後醫棄置不用惜哉

龍胆草 黃柏 蘆薈 山梔 知母

海金沙 猪苓 澤瀉 細辛

陳三 癰多肝病宜乎辛泄但形體羸弱是濕熱蘊阻

二便不為通爽先以通太陽方

寒水石 海金沙 猪苓 澤瀉

通草 木香汁

倪 疝瘕結聚少腹大便閉阻小渡短澀舌白渴飲不能
納穀無對症方藥姑與滋腎丸嘗服十粒十服

許六久有疝症十年來寒熱勞形則右胸脇中一股氣墜
直走少腹片大小便用力皆然而赤亮痰多食腥膩更
令病加此濕熱久滯隨中緩攻為宜

控涎丹四分間日服十服

又 脉沉弦多手脈赤瘰癧在下右脇氣墜少腹瀉

臨證指南醫案 卷八 疝

控涎丹連服木應想久聚濕熱沉痾非皮膜經脈之藥
用清川丸四十粒勻二服間日一進竟通腑聚然後再

議

又 通腑宜早結痰既下其疝仍聚於右且盛於寒天冬
月卧安必有聲自消行走勞動必不消而陰囊久病
急攻無效議辛甘化風方法古人以補為肝病什居八
九

當歸 鹿角 桂枝 肉桂 小茴

川芎 炙草 茯苓 生薑 羊肉膠丸

張五 痛自腎囊漸踞少腹之左夫厥陰之脉繞乎陰器操

持誤慮都主傷肝一氣結聚變幻形象諸病名曰疝

疝分有七彙疝多與久少多熱泄氣痛緩宜通可以却

病只因下焦乃深遠之鄉氣熱濕鬱稟可知矣

川連 小茴 黑山梔 橘核

川楝子 青木香 郁李仁 冬葵子

陳 脉沉弦舌灰邊白腰膝氣痛腎囊丸腫大此濕熱
為病亂吃藥散消導濕邪下墜為疝治當分消

草薢 黃柏 山梔 茯苓

丹皮 防己 猪苓 澤瀉

陳二 辛香流氣以治疝未嘗不通服之五日遍身疼痛下

臨證指南醫案 卷八 疝

十一

午四肢浮腫肌膚漸見高突塊瘰思走泄氣勝都是陽
傷氏附湯主之

生薑氏一兩附子二錢

朱五 厥陰三痛久延邪攻肝經絡脉少腹痛漸硬氣串達
陰器筋痛乃結疝瘕之象病久雖少壯不可治於泄氣
溫腎宜肝為急

淡菴 歸身 枸杞子 炒黑小茴

穿山甲 全蝎

陸三 瘕母十年沉痾宿病藥不能效夫瘕邪既久邪與氣
血兩凝結聚絡脉藥難入絡耳瘕不離乎肝胆疝不外

乎肝病七疝。子和分割大著虛實不可揣以辛香下墜為甚。議有情溫通以培生氣。

鹿茸

大茴香

穿山甲

當歸

水安息香

炮黑川烏

全蝎

用黑大豆炒

赤淋酒一杯。濾酒汁和丸。每服二錢。煖酒送。

經云任脈為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。又督脈生病。從少腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。又曰。痺傳之腎。病名曰疝。瘕又曰三陽為病。發寒熱。其傳為癰疝。又曰和客於足厥陰之絡。令人卒疝暴痛。此素問言諸經之疝也。又經脈等篇云足陽明之筋病。

臨證指南醫案

卷八 疝

七

癰疝腹痛。急足太陰之筋病。陰器紐痛。下引臍兩脇痛。足厥陰之經筋病。陰器不用。此癰疝言諸經之疝也。後人因有筋水狐癰氣血寒七疝之名。其主治各有專方。立法可謂大備。然其中不無錯雜之處。終非可訓之定法。惟仲景先生獨以勇氣為名。其所出三方。亦以溫散祛寒。調和氣血為主。不雜入氣分之藥。而子和治法。又以辛香流注為主。謂肝得疎泄而病愈矣。其金鈴虎潛諸法。可謂前人所未發。故疝病之本。不離乎肝。又不離乎氣。以肝脈絡於陰器。為至陰之臟。足太陽之脈。屬腎絡膀胱。為寒水之經。故

仲景所云寒疝腹中痛。逆冷。手足不仁。腹滿脈弦而

緊。惡寒。不欲食。繞臍痛。及脇痛。裏急。是內外皆寒。氣

作主。無復界限。其烏頭二方。專以破邪治標為急。虛

實在所不論。是急則治標之義也。其當歸羊肉一方。

專以補虛散寒為主。故以當歸羊肉辛甘重濁。溫煖

下元。而不傷陰。佐以生薑。隨而肉有清之品。引入下

焦。溫散沍寒。是固本不治標也。子和膈云。疝不離乎

肝者。以疝病有陰囊腫脹。或高而裏急。筋縮。或莖中

作痛。或牽引睪丸。或少腹攻衝作痛。或號笑忿怒。而

致。此皆肝經脈絡之現症。其金鈴散一法。以泄肝散

逆為主。故以川棟導滯。枳實小腸之熱。玄胡和一身上

下諸痛。以肝主疎泄故也。其所取虎潛一法。以柔緩

導引為主。故方中用虎骨。想肝風壯筋骨。羊肉氣板

補髓填精。佐以地黃補腎。當歸補肝。使以陳皮利氣

疎肝。芍藥通肝調營。是治肝而顧及於腎也。及觀先

生治疝之法。又更有逆者。其旨以暴疝多寒。久疝

多熱。為疝病之大綱。其餘隨症施治。如氣墜下結者。

以鹿茸鹿角升陽為主。其脈結有形。痛甚於下者。宗

丹溪通陽泄濁為治。其火腐濕熱鬱結不通者。用桑

苦制熱反佐辛熱。以開血中鬱滯為主。其寒濕下墜

臨證指南醫案

卷八 疝

七

太陽之裏膀胱之氣不和二便不爲通利者五苓散
加麻通太陽膀胱爲主其濕熱久聚氣滯少腹陰囊
者用控涎丹清川丸等逐痺通腑分消兼辛甘化風
法爲主如下焦陰陽兩虛者用有情溫通以培生氣
兼通補炮風爲主而先生於治痢之法可謂曲盡病
情諸法備矣仲景又有狐痢一方究非干瀉之品茲
不具贅 都滋九

頭痛

風火

徐六冬月嘔吐之後漸漸頭頂作痛下焦久有積熱痔瘡
厥陰陽明偏熱凡陽氣過動變化火風迅速自爲升降
致有此患

連翹心 玄參心 桑葉 丹皮

黑山梔皮 荷葉汁

胡三脉左弦數右偏頭痛左齒痛

連翹 羌活 獨活 蔓荊子 蔓荊子 蔓荊子 蔓荊子

黑梔皮 鮮菊葉 苦丁茶 乾荷葉邊

臨症指南卷八 頭痛

某 高年氣血皆虛新涼上受經脈不和腦後筋型牽痛

條起候靜乃陽風之邪誤用清散輕劑

荷葉邊 苦丁茶 蔓荊子 菊花 連翹

王三邪鬱偏頭痛

鮮荷葉邊 苦丁茶 連翹 黑山梔

蔓荊子 杏仁 木通 白芷

郁五風鬱頭疼

鮮荷葉 苦丁茶 淡黃芩 黑山梔

連翹 蔓荊子 木通 白芷

某四內風頭痛淚冷 漢治有是方

炒杞子 製首烏 柏子仁 茯神	炒菊花炭 小黑糯米皮	沈氏 痛在頭左腦後厥陽屬不上觸	細生地 生白芍 柏子仁 炒杞子	菊花 茯神	孫四 暑伏寒熱頭痛	鮮荷葉邊 連翹 苦丁茶 夏枯草	山梔 蔓荊子 厚朴 木通	某 暑風濕熱混於上竅津液無以運行凝滯遂偏頭痛	舌強乾涸治宜清散	臨證指南醫案 卷八 頭痛 夫	連翹 石膏 生甘草 滑石	蔓荊子 羚羊角 荷梗 桑葉	程 既知去血過多為陰虛陽冒之頭痛再加發散與前	意相反矣 復脈去參薑桂加左牡蠣	又 脈數虛而動足微陰氣大傷陽氣消越頭痛筋惕仍	與錯攝之法	牡蠣 阿膠 人參 生地	炙草 白芍 天冬	朱 據說就涼則安遇暖必頭痛筋掣外以摩挾可緩大	凡肝風陽擾胃絡必虛食進不甘是中焦氣微雖鹹潤
----------------	------------	-----------------	-----------------	-------	-----------	-----------------	--------------	------------------------	----------	----------------	--------------	---------------	------------------------	-----------------	------------------------	-------	-------------	----------	------------------------	-----------------------

介屬潛陽獲效說來依稀想像諒非入理深談聊以代	煎酸甘是商且五旬又四中年後矣陰久進亦有鐵	代生氣之弊牛月來乏少診之功姑為認慎用固本膏	徐 當年下虛曾以溫腎涼肝獲效春季患目是陽氣驟	升乃冬失藏聚水不生木之徵也類以苦辛治目風陽	上聚頭顱肝木橫擾胃受戕賊至於嘔吐矣今心中乾	燥如焚頭中岑岑震痛忽冷忽熱無非陰陽之逆肝為	剛體溫燥決不相安况辛升散起燥固豈可再蹈前轍	姑以鎮肝益虛冀有陽和風熄之理	阿膠 小麥 麥冬 生白芍	臨證指南醫案 卷八 頭痛 七	北沙參 南棗	又 條冷忽熱心煩頭痛厥陽之逆已屬陰液之虧前案	申明剛藥之非代補味酸氣陰乃強鎮之品亦剛藥也	考七疳中子和慣投辛香走泄其中虎潛一法亦採可	見疳門亦有柔法醫者熟藥成法若下泄心體認皆希	圖附會矣今嘔逆既止其陰藥分可暫投即水生涵木	之法議以固本成方五更時從陽引導可也加秋石	葉 臨晚頭痛火升心嘈風陽上胃防厥	細生地 阿膠 牡蠣 茯神	麥冬 生白芍
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	--------------	----------------	--------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------	--------------	--------

史 頭形象天義不受濁今久痛有高突之狀似屬客邪

蒙閉清華氣血然常何桂附河車亦未見其害思身半

以上屬陽而元首更爲陽中之陽大凡陽氣先虛清邪

上入氣血瘀痺其痛流連不息法當宣通清陽勿事表

散以艾炷按法灸治是一理也

熟牛夏 北細辛 炮川烏 炙全蠍 薑汁

又 陽氣爲邪阻清空機發不宜考周禮採毒藥以攻病

藉虫蟻血中搜逐以攻通邪結乃古法而醫人忽畧者

今痛滋腦後心下嘔逆厥陰見症久痛延虛攻邪須兼

養正

臨證指南醫案 卷八 頭痛

六

川芎 當歸 牛夏 薑汁

炙全蠍 蜂房

張二 太陽痛連額骨後牙齦夏令至稍降不痊代邪未

解治陽明少陽

連翹 羚羊角 牛膝子 葛根

赤芍 白芷 鮮荷葉

頭痛之會與厥陰肝脈會於額陰火邪不能

能少元太寒此移大寒不寒不寒不寒

上通惟陽氣壅塞濁邪得以「提厥陰風火乃能逆

上作痛故頭痛一症皆由清陽不升火風乘虛上入

所致觀先生於頭痛治法亦不外此如陽虛濁邪阻

寒氣血瘀痺而爲頭痛者用虫蟻搜逐血絡宣通陽

氣爲主如火風變動與暑風邪氣上鬱而爲頭痛者

用鮮荷葉苦丁茶蔓荊山梔等辛散輕清爲主如陰

虛陽越而爲頭痛者用仲景復脈湯甘麥大棗法加

膠乃牡蠣鎮攝益虛和陽想風爲主如厥陽風木上

觸兼內風而爲頭痛者用首烏柏仁檀豆甘菊生芍

杞子輩熄肝風滋腎液爲主一症而條分縷析如此

詳明可謂手法兼到者矣 鄒時乘

臨證指南醫案 卷八 頭痛

九

心痛

驚悸

田三脉細數。驚雷被驚。心下漾漾作痛。逍遙散去柴胡。

加鈞藤丹皮 常用鎮心方

勞傷血

宋脉左瀄伏。心下痛甚。舌白不能食穀。下咽阻膈。痛極昏厥。此皆積勞損陽。前者曾下瘀血。延綿經月不止。此為難治。此為瘀血心痛。當治之。

生鹿角 當歸鬚 黃芩 官桂

桃仁 炒牛夏

脾寒厥

譚三心痛引背。口湧清涎。肢冷氣塞。脘中此為脾厥心痛。

臨證指南醫案 卷八 心痛 三

病在絡脈。例用辛香。

高良薑 片薑黃 生茅朮 公丁香 香柄

草果仁 厚朴

驚悸

朱重按痛勢稍衰。乃一派苦辛燥劫傷營絡。是急心痛。

症若上引泥丸。則大危矣。議用公丁香。

人參 桂枝尖 川椒 炙草 白蜜

厥心痛一症。古人辨論者多。日精矣。茲不復贅。但厥

心痛與胃脘痛。情狀似一。而症實有別。世人因內經

胃脘當心而痛一語。往往混而視之。不知厥心痛。為

五臟之氣厥而入心胞絡。而胃實與焉。則心痛與胃

痛。不得不各分一門。今先生案中。聞雷被驚者。用逍

遙散。夫柴胡加鈞藤丹皮治之。以其肝陽上逆。不容

升達。為之養血以平調也。積勞損陽者。用歸鹿姜桂

桃仁牛夏治之。以其勞傷血痺。無徒破氣。為之通絡

以和營也。脾厥心痛者。用良姜姜黃茅朮丁香草果

厚朴治之。以其脾寒氣厥。病在脉絡。為之辛香以開

通也。重按而痛稍衰者。用人參桂枝川椒炙草白蜜

治之。以其心營受傷。攻劫難施。為之辛甘以化陽也。

方案雖未全備。然其審病之因。製方之巧。無不一一

破的。果能舉一反三。其義豈有盡乎。 子

臨證指南醫案 卷八 心痛

胃脘痛

肝犯胃
嚴二
胃脘痛年乾嘔

金鈴子 延胡 半夏 茯苓

山梔 一生香附

張衝氣上攻成形痛嘔痛後則散此厥陰順乘陽明陽

明虛筋骨亦掣痛安蛻丸三錢四服椒梅湯送

某五勞力氣阻胃痛

川棟子 延胡 炒半夏 烏藥

橘紅 生香附汁

臨證指南醫案 卷八 胃痛

陳宿病衝氣胃痛今飽食動怒痛發嘔吐是肝木侵犯

胃土濁氣上踞脹痛不休逆亂不已變為先寒後熱煩

躁面赤汗泄此為厥象厥陰肝臟之現症顯然在日夫

痛則不通通字須究氣血陰陽便是看診要旨矣議用

瀉心法

乾薑 川連 枳實

半夏 薑汁

吳七食倉痛發嘔水泄沫六年久病入絡連大便忽閉忽

澀患處澀澀有聲議通胃陽兼制木侮

淡吳更 良薑 半夏 延胡

炮川烏 茯苓 蒲黃

李氏舌白胸脘脘痛如束乾嘔便秘氣阻凝痰聚膈當以

泄降宜劑若竟攻瀉當夏熱土旺傷及太陰恐滋脹滿

之憂

醋炒半夏 川棟子 延胡 橘紅

杏仁 厚朴

王氏氣逆填胸阻咽脘庫而痛病由肝臟厥氣乘胃入膈

致陽明經脈失和周身掣痛夜甚甚緩者戌亥至陰為

肝旺時候也此症多從驚恐噴衄所致失治變為昏厥

半夏 薑汁 金鈴子 延胡

臨證指南醫案 卷八 胃痛

杏仁 瓜蒌皮 香豉 白蔻

又痛緩後深復熾前後心膈板掣脈左數病在血絡中

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 白蔻仁

董氏產後三年經水不調胃痛得食必嘔汗出形寒腰左

動氣閃爍大便七八日始通脈細弦右滑舌白消渴脘

中响動下行痛緩病屬厥陰順乘陽明胃土久傷肝木

愈積法當辛酸兩和厥陰體用仍系通補陽明之陽俾

濁少上僭痛有緩期

人參 同煎 開口吳萸 滾水炮洗 生白芍 錢

<p>肝風 顧氏 天癸當絕仍來昔壯年已有頭暈七年前秋起胃痛若嚕今春悲哀先麻木頭眩痛發下部膝脛冷三日病屬肝厥胃痛述痛引背脇是久病絡脈空隙厥陽熱氣因情志鬱勃拂逆氣攻乘絡內風旋動襲陽明致嘔逆不能進食。</p>	<p>良薑 七分 熟半夏 二錢 雲茯苓 三錢 切塊</p>	<p>九孔石決明 清阿膠 生地 枸杞子</p>	<p>茯苓 桑寄生 川石斛 某 脇痛入脘嘔吐黃濁水液因驚動肝肝風震起犯胃平昔液衰難用剛燥滋養胃汁以熄風方</p>	<p>臨證指南醫案 卷八 胃痛 三</p>	<p>人參 茯苓 半夏 廣皮白 麥冬 白粳米 胃痛久而屢發必有痰聚病老年氣衰病發日重乃邪正勢不兩立也今納物嘔吐甚多味帶酸苦脈得左大右小蓋肝木必侮胃土胃陽虛弱而出且呃逆沃以熱湯不減其胃氣拂逆如不嗜湯飲飲濁滿留脘底用藥之理遠柔用剛嘉言謂能變胃而不受胃變開得上關再商治法 紫金丹含化一九日三次 又 議以辛潤苦滑通胸中之陽開滌濁凝結聚古人謂通則不痛胸中部位最高治在氣分</p>
---	-------------------------------	-------------------------	--	-----------------------	--

<p>鮮薑白 三錢 瓜蒌實 三錢 熟半夏 三錢 茯苓 三錢 川桂枝 錢一 生薑汁 四分 此仲景之成</p>	<p>古有薤露之歌謂薤最滑露不能留其氣辛則通壯體滑則降仲景用以主胸痺不舒之痛瓜蒌苦潤豁痰陷胸湯以之開結半夏自以和陰茯苓淡滲桂枝辛甘輕揚載之不急下走以攻病所薑汁生用能通胸中痰沫兼以通神明去穢惡也</p>	<p>肝鬱化 某氏 胃脘引脇 川棟子 柴胡 黑山梔 鉤藤 半夏 橘紅</p>	<p>臨證指南醫案 卷八 胃痛 三 朱氏 苦寒辛通 川連 土瓜蔓皮 白芥子 茯苓 炒半夏 薑汁 橘紅 竹茹</p>	<p>又 肝厥胃痛兼有痰飲只因悞用莖木人參固守中焦痰氣阻閉致痛極痞脹更醫但知理氣復降不知氣閉熱自內生是不中窾前方尚以苦寒辛通為法已得效驗况酸味亦屬火化議河間法</p>	<p>金鈴子 延胡 川連 黑山梔 橘紅 半夏 張 老年鬱勃肝陽直犯胃絡為心下痛久則液枯氣結</p>
---	--	--	---	---	---

成格。

金鈴子

延胡

黑山梔

淡豆豉

炒香

張九壯年面色痿黃。脉滿小無力。胃脘常痛。情志不適。即

發。或飲煖酒暫解。食物不易消化。脾胃之土受尅。却因

肝木來乘。怡情放懷。可愈此病。

人參

廣皮

半夏

茯苓

苡仁

桑葉

丹皮

桔梗

山梔

薑汁

水泛丸

某味淡短氣。腕中微痛。

人參

淡附子

桂枝

炒遠志

煨薑

某積滯久着。胃脘不宜。不時脇痛。已經數載。陽傷奚疑。

臨證指南醫案

卷人

胃痛

三

炒半夏

淡乾薑

草撥

草果

廣皮

茯苓

汪七診脉弦滑。胃脘痛。遺背。穀食漸減。病經數載。已入胃絡。

姑與辛通法。

甜桂枝

延胡索

半夏

茯苓

三錢

良薑

蜜水煮生薑

牛一錢

張陽微不司外衛。脉絡牽掣。不和。胃脘痛。夏秋不發。陰內

陽外也。當冬寒驟加。宜急護其陽。用桂枝附子湯。

桂枝

附子

炙草

煨薑

南棗

戴九始於傷陰。繼則損陽。痛似拘束。食物逾時不運。

當理中焦健運。二陽通補為宜。守補則謬。

桂枝木

茯苓

生薑渣

炒焦遠志

炒黃半夏

生益智仁

余三胃疼發。前後心冷嘔吐。

淡吳萸

炒半夏

草撥

淡乾薑

草果仁

厚朴

廣皮

桂枝木

某中州陽失健運。腕中痛。食不化。

益智仁

穀芽

廣皮

炙草

茯苓

檀香汁

半夏麴

炒荷葉

顧五清陽失職。腕中痺痛。得暖曠達。當辛以通之。

臨證指南醫案

卷人

胃痛

三

薤白

半夏

桂枝

茯苓

乾薑

顧五營虛。胃痛。進以辛甘。

當歸

甜桂枝

茯苓

炙草

五分

煨薑

南棗肉

錢

費九勞力氣泄。陽傷。胸脘痛發。得食。已非實滯停滯。

然初病氣傷。久泄不止。營絡亦。古謂絡虛則痛也。攻

痰破氣。不去病。即傷胃。致納食不甘。噯噯欲嘔。顯見胃

傷陽敗。當以辛甘溫方。

人參

桂枝

茯苓

炙草

煨薑

南棗

陽虛陰濁 某 胃痛已久。聞發風疹。此非客氣外感。由乎情懷鬱勃。氣血少於流暢。夫思慮鬱結。心脾營血暗傷。年前主歸脾一法。原有成效。今食積滯。培中土而理營輔之。異功加歸芍用南棗肉湯泛丸。		程氏 厥寒背寒。食入脘痛。		人參 茯苓 當歸 白芍		炙草 煨薑 南棗		某女 形寒脘痛。得食甚。手按少腹。非有客邪。擬進和營補法。歸桂枝去芍加茯苓。		蔣 陽微氣阻。右腕痛痺。據云努力痛起。當兩調氣血。		臨證指南醫案 卷八 胃痛 寒		延胡 半夏 厚朴 橘紅		桂枝木 良薑 瓜蒌皮 茯苓		某八 努力飢飽失時。好飲冷酒。脉弦硬。中脘痛。		熟半夏二錢 雲茯苓三錢 桃仁去皮尖炒		良薑一錢 延胡一錢 紅豆蔻去殼		熟半夏三兩 雲茯苓二兩 生芍藥二兩 小附子一兩		草果仁一兩 高良薑一兩 老薑汁法九每服三錢		朱 痛固虛寒。吐酸泄氣。稱緩。當通陽明。勿雜多岐。		人參 半夏 薑汁 淡附子		茯苓 淡乾薑	
--	--	---------------	--	-------------	--	----------	--	--	--	---------------------------	--	----------------	--	-------------	--	---------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-----------------	--	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------------	--	--------------	--	--------	--

陽虛陰濁 某 陽微痰滯。胃痰痛脹。用阿魏丸六分。		施六 胃痛。濕痰上逆。		代赭石 炒半夏 淡吳萸 淡乾薑		茯苓 廣皮 藟擦 生益智仁		張四 陽微濁凝。胃下疼。		炒黑川椒一錢 炮黑川烏三錢 炮黑川附子三錢		炮淡乾薑半錢		高五 素多鬱怒。陽氣室痺。渴飲凝泣。湯飲下咽。嘔出酸水。胃脘痛痺。已經三載。漸延噎膈。先與通陽微飲。俾陽氣得宣。庶可向安。		臨證指南醫案 卷八 胃痛 寒		半夏 枳實皮 桂枝木 茯苓 淡乾薑		又 脉右弦不飢。納穀不運。吞酸渴飲。尙阻。陽仍不宜。		半夏 良薑 桂枝木 茯苓		延胡 淡乾薑		高 脉虛滿。胃脘久治在血分。		桃仁 當歸 桂枝 茯苓		遠志 炙草		錢六 酒肉滯氣。胃痛。鄉人稱為穿心箭風。方書所無。不可稽考。苦辛泄降可效。		延胡 川棟子 桃仁 蒲黃 五靈脂	
-----------------------------	--	-------------	--	-----------------	--	---------------	--	--------------	--	-----------------------	--	--------	--	---	--	----------------	--	-------------------	--	----------------------------	--	--------------	--	--------	--	----------------	--	-------------	--	-------	--	---------------------------------------	--	------------------	--

盛大胃痛。食。腸中泄氣。則安。敗年痛。必入絡。治在

血中之氣

桂枝木 桃仁 蘇白汁 歸鬚 茯苓塊

又陽微胃痛

當歸 桂枝木 桃仁 炙甘草

煨薑 南棗

席 經幾年宿病。病必在絡。痛非虛症。因久延。體質氣餒。

遇食物不進。或情懷鬱勃。痰因氣滯。氣阻血凝。諸脈逆。

亂。嘔吐涎沫。而大便反秘。醫見嘔吐肢冷。認爲虛脫。以

理中加附子溫裏護陽。大陽氣皆屬無形。況乎病發有

臨證指南醫案

卷八 胃痛

三

因失非陽微。欲脫。憶當年病來。宛是肝病。凡疎通氣血。

皆效。其病之未得全好。由于性情食物居多。夏季荷以

太陰陽明通劑。今痛處在腕。久則瘀濁復聚。宜淡味薄

味清養。初由竹瀝泛丸仍用。早上另立通導方法。

酸木 人參 鬱金 桃仁 歸尾

精子仁 琥珀 莢蔚 紅棗肉九早服二錢

秦 久有胃痛。更加勞力。致絡中血凝。經氣通。其患總在

絡脈中痺室耳。醫藥或攻裏。或攻表。置病不理。宜乎無

效。形瘦清減。用緩逐其瘀一法。

蟻螂虫 一 麝虫 一 五靈脂 炒 一 桃仁 一

川桂枝尖 生五 用老薑根白湯汁泛丸

每服二錢滾水下 此是七病之藥。必真見有積滯乃

潘氏 脈弦滿。經事不至。寒熱。胃脘拒按。噯噯不納。此因久

病胃痛。瘀血積於胃絡。議辛通瘀滯法。

川棟子 延胡 桂枝木 五靈脂

蒲黃 香附

吳氏 氣火鬱胃痛

川棟子 橘紅 炒查肉 鬱金

黑山梔 香附

江二 胃疼絞。氣逆不降。

臨證指南醫案 卷八 胃痛

三

鮮枇杷葉 杏仁 生香附 降香汁

厚朴 橘紅 桔梗 白蘞

范氏 諸豆皆能閉氣。漿凝爲腐。宛是呆滯食物。食已脘痞

痛脹。乃清氣之阻。診脈小滿。舌白粘膩。當理氣以開曠

胸中

杏仁 厚朴 老蘇梗 廣皮白

白蓮仁 枳殼汁 桔梗汁

陽明乃十二經脈之長。其作痛之因甚多。蓋胃者彙

也。乃衝繁要道。爲患最易。虛邪賊邪之乘機竊發。其

間消長不一。習俗辛香溫燥之治。斷不容一例而漫

施然而足病其要何在不初病在經久痛入絡以經主氣絡主血則可知其治氣治血之當然也凡氣既久阻血亦應病而行之脈絡自痺而辛香理氣辛柔和血之法實為對待必然之理又如飽食痛甚得食痛緩之類於此有宜補不宜補之分焉若素虛之體時就煩勞水穀之精微不足以供其消磨而營氣日虛脈絡枯澀求助於食者甘溫填補等法所宜頻進也若有形之滯堵寒其中容納早已無權得助而為實質攻之逐之等劑又不可緩也寒溫兩法從乎喜燥喜涼滋燥之味調其便清便滑至於飲停必吞酸食滯當暖腐散氣乃散漫無形瘀傷則定而有象就虫動振當動痛而吐沫痰濕壅塞必善吐而脈滑營氣兩虛者不難乎動悸肝陽高亢者定然煩渴而喜飲陰邪之毒其來必速解火之患由是而愈也。

臨證指南醫案

卷八

胃痛

三

脇痛

肝鬱

張五六脇脹夜甚嘔動則降七情致傷之病

橘葉 香附汁 川棟子 半夏

茯苓 薑渣

陳 氣熱攻冲擾脘入脇

川連 牡蠣 夏枯草 炒半夏

香附 炒白芥子

徐四勞怒陽動左脇閃閃腹中微滿診脈弦搏左甚當先

用苦辛

臨證指南醫案

卷八 脇痛

三

雞金 山梔 半夏 降香末

橘紅 金石斛

湯十氣逆咳血後脇疼

降香汁 川貝 鮮枇杷葉 白杏仁

杏仁 橘紅 錢

丁 由虛里痛起左脇下堅滿脹及脇右大便澀滯不爽

用緩攻方法 小溫中丸 當和血藥

飲 痰飲搏擊脇痛

半夏 茯苓 廣皮 甘草

白芥子 刺薊菜 鉤藤

寒入絡

沈二左脇下痛食入則安 當歸桂枝湯加內桂

朱二左乳傍痛連腰腹重按得熱少緩此屬陰絡虛痛十

一年不愈亦痛疾矣

當歸二錢 肉桂一錢 小茴七分 丁香皮五分

茯苓二錢 淡乾薑一錢

尤四痛從中起連及右脇胃之絡脈受傷故得食自緩但

每痛發必由下午黃昏當陽氣漸衰而來是有取乎辛

溫通絡矣 內有通血

當歸 茯苓 炮薑 肉桂

炙草 大棗

協證指南醫案 卷八 脇痛

寒入絡

郭三痛必右脇中有形攻心嘔吐清涎周身寒凜痛止寂

然無踪此乃寒入絡脈氣乘填塞阻逆以辛香溫通法

蘇梗 半夏 川棟子 延胡

吳萸 良薑 蒲黃 茯苓

血絡瘀

汪六噎怒動肝寒熱旬日左季脇痛難以舒轉此絡脈瘀

痺防有見紅之事靜調勿勞可愈

桃仁 歸鬚 五加皮 澤蘭

丹皮 鬱金

又 桃仁 歸鬚 丹皮 桑葉

川棟子皮 黑山梔皮

又 絡虛則熱液虧則風動痛減半有動躍之狀當甘緩

理虛 炙甘草湯去桂枝

又 痛止便難液耗風動為秘議用東垣通幽法

當歸 桃仁 柏子霜 火麻仁

郁李仁 松子肉 紅花

凌 肝著脇中痛勞怒致傷氣血

川棟子皮 炒延胡 歸鬚 桃仁

生牡蠣 桂枝木

沈二初起形寒熱漸及脇肋腕痛進食痛加大便燥結

久病已入血絡兼之神怯瘦損辛香剛燥決不可用

臨證指南醫案 卷八 脇痛

白旋覆花 新絳 青葱管 桃仁

歸鬚 柏子仁

王二左前後脇極痛食後痛脹今三年矣久病在絡氣血

皆窒當辛香緩通

桃仁 歸鬚 小茴 川棟子 半夏

生牡蠣 橘紅 紫降香 芥子 水泛丸

注 痛在脇肋遊走不一漸至痰多手足少力初病兩年

寢食如常今年入夏病甚此非臟腑之病乃由經脈繼

及絡脈大凡經主氣絡主血久病血瘀瘀從便下諸家

不分經絡但忽寒忽熱宜乎無效試服新絳一方小效

乃絡方耳議通少陽陽明之絡通則不痛矣

歸鬚 炒桃仁 澤蘭 柏子仁 香附汁

丹皮 穿山甲 乳香 沒藥 水泛丸

程八診脈動而虛左部小弱左脇疼痛勢上引得食稍

安此皆操持太甚損及營絡五志之陽動擾不息嗑乾

舌燥心悸久痛津液致傷也症同屬虛但參朮歸芪補

方未能治及絡病內經肝病不越三法辛散以理用酸

泄以體用甘緩以益用宜辛甘潤溫之補蓋肝為剛臟

必柔以濟之自臻效驗耳

炒桃仁 柏子仁 新絳 歸尾

臨證指南醫案 卷八 脇痛 美

橋紅 琥珀

痛緩時用丸方

眞阿膠 小生地 枸杞子 柏子仁 天冬

刺蒺藜 茯神 黃菊花四兩丸

朱 肝絲凝滯脇痛須防動怒失血

旋覆花湯加歸鬚桃仁柏仁

李九左脇痞積攻疼

生牡蠣 南山查 炒延胡 犀榛子

炒桃仁 歸鬚 丹皮 桂枝木

蔣六宿傷左脇腹背痛

炒桃仁 歸鬚 炒延胡 丹薑黃

五加皮 桂枝木 橋紅 炒小荷

沈 暮夜五心熱左脇痛肝腎陰虧

人參 生地 天冬 麥冬

柏子霜 生白芍 不知病

肝風入絡 黃 左脇骨痛易飢嘔涎肝風內震入絡

生地 阿膠 生白芍 柏子仁

丹皮 澤蘭

又 照前方去白芍澤蘭加桃仁桑枝

又 肝胃絡虛心嘈如飢左脇痛便燥少血

臨證指南醫案 卷八 脇痛 三

生地 天冬 枸杞 桂圓

桃仁 柏仁 熬膏加阿膠收

程 脇下痛犯中焦初起上吐下瀉春深寒熱不止病在

少陽之絡

青蒿梗 歸鬚 澤蘭 丹皮

紅花 鬱金

肝胃 胡三診脈右弦左小弱瀉病起積勞傷陽操持勞思五志

皆逆而肝為將軍之官謀慮出焉故先脇痛睡時脊陽不

用事其病漸劇是內傷症乃本氣不足日餌辛燥氣泄

血耗六味滋柔膩藥原非止痛之友不過矯前藥之謬

以辛熱		不遇	
生白朮	吳萸	良薑	川熟附
茯苓	小茴		
某 腑陽不通腹痛用禹餘糧丸暖下通消二便通脹緩			
腹反此無形之氣未振宜疎補醒中			
生白朮	厚朴	廣皮	半夏
茯苓	生益智	薑汁	
某 氣結腹痛食少寒熱 逍遙散去木加鬱金香附			
某氏 肝鬱腹痛有形經不調			
香附	川芎	當歸	肉桂
臨證指南醫案 卷八 腹痛			
五靈脂	木香	吳萸	炒白芍
畢 小便自利大便秘色當臍腹痛十五年漸發日甚脉			
來沉而結滿此鬱勃傷及肝脾之絡致血敗瘀留易役			
動怒宿病乃發目今冬深閉藏忌用攻下議以辛通潤			
血所謂通則不痛矣			
桃仁	桂枝木	穿山甲	老韭白
煎送阿魏丸一錢			
徐四 疹發五六年形體畏寒病發身不大熱每大便秘腹痛			
裏急此皆氣血凝滯當以鬱病推求			
當歸	酒製大黃	枳實	桂枝

勞傷中 氣入絡	營分虛 寒	勞傷中 氣入絡	營分虛 寒
某 勞力傷氣浮腫食入腹痛始用戊巳調中	某 勞力傷氣浮腫食入腹痛始用戊巳調中	某 勞力傷氣浮腫食入腹痛始用戊巳調中	某 勞力傷氣浮腫食入腹痛始用戊巳調中
白芍二錢	炙草五分	白芍二錢	炙草五分
廣皮一錢	煨薑一錢	廣皮一錢	煨薑一錢
聚肉	河水煎	聚肉	河水煎
當歸	炙草	當歸	炙草
炮薑	南棗	炮薑	南棗
肉桂	茯苓	肉桂	茯苓
華 腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成	華 腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成	華 腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成	華 腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成
因怒左脇有形痛連腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆	因怒左脇有形痛連腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆	因怒左脇有形痛連腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆	因怒左脇有形痛連腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆
臨證指南醫案 卷八 腹痛	臨證指南醫案 卷八 腹痛	臨證指南醫案 卷八 腹痛	臨證指南醫案 卷八 腹痛
巧入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用惟氣辛熱	巧入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用惟氣辛熱	巧入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用惟氣辛熱	巧入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用惟氣辛熱
可解論藥必首推氣味	可解論藥必首推氣味	可解論藥必首推氣味	可解論藥必首推氣味
粗桂枝木一錢	天南星一錢	粗桂枝木一錢	天南星一錢
真橘核一錢	炒香打	真橘核一錢	炒香打
川棟子肉一錢	李根東行皮一錢	川棟子肉一錢	李根東行皮一錢
某 長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾	某 長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾	某 長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾	某 長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾
胃疎泄肝木最屬近理若守中之補及膩滯血藥皆左	胃疎泄肝木最屬近理若守中之補及膩滯血藥皆左	胃疎泄肝木最屬近理若守中之補及膩滯血藥皆左	胃疎泄肝木最屬近理若守中之補及膩滯血藥皆左
人參	廣皮	人參	廣皮
穀芽	生益智仁	穀芽	生益智仁
白芍	茯苓	白芍	茯苓
腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而	腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而	腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而	腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而
主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如聚	主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如聚	主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如聚	主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如聚

疑火鬱氣阻營壅及夏秋之交。二類是也。所謂有形爲患者如蓄血食滯癥瘕就曉內痛及平素偏好成癖。是也。審其痛處之高下。辨其色脈之衰旺。細究其因。確從何起。大者在臟者以肝脾腎爲主。在腑者以腸胃爲先。夫臟有賊討之情。非比腑病而可以通爲用也。此通字勿執攻下之謂。古之建中湯理中湯三物厚朴湯及厚朴散。各具至理。考先生用古。若通陽而泄。如吳茱萸湯及四逆湯法。清火而泄鬱者如左金丸及金鈴散法。開通氣分者如四七湯及五磨飲法。宣改營絡者如穿山甲桃仁歸身。臨證指南醫案 卷八 腹痛 聖

鬚韭根之劑及下瘀血湯法。緩而和者如芍甘湯加減及甘麥大棗湯法。柔而通者如茯苓栢子肉桂當歸之劑及復脈加減法。至於食滯消之。虻擾安之。癥瘕理之內痛平之。痧穢之候以芳香解之。偏積之類究其原而治之。是皆先生化裁之法也。若夫瘍科內癰婦科四症兼患是病者。更於各門兼參其法而用之。則無遺蘊矣。 邵新甫

肩臂背痛

此當入風痺。忘不必另立一門。

痛達耳後

徐

通日天令驟冷。診左脈忽現孔濇。痛時筋攣。達耳後。此營虛脈絡失養。風動筋急。前法清絡涼劑不應。營虛不受辛寒。破重甘舒筋湯意。

當歸

生黃芪

片薑黃

桂枝

防風

生於朮

薑藥化活絡丹一九

某 勞倦肩臂疼

川桂枝木

木防已

五加皮

茯苓

生苡仁

炒白朮

臨證指南醫案 卷八 肩臂背痛 聖

塗六 痛起肩臂漸入環跳髀膝是爲絡虛

黃芪

於朮

當歸

茯苓

防已

防風根

羌活

五加皮

又 照前方去防風羌活加杞子沙苑

鄒 五句又四陽明脈衰肩臂筋緩不舉而痛治當通補

脈絡莫進攻風

生黃芪

於朮

當歸

防風根

薑黃

桑枝

王 二陽明氣衰厥陰風動頭眩目昏右肩膊麻脇下有聚

氣足厥陰主治

黃柏 五分
川棟子肉 錢一
生白芍 二錢

失養風動筋急者不受辛寒當倣東垣舒筋湯之意。

佐以活絡丹勞傷筋脈之痛寒濕骨痛者以辛甘爲君佐以通經入絡之品陽明氣衰厥陰風動右肩痛麻者用拘杞歸身黃氏羚羊桑枝膏爲陽明厥陰營氣兩虛主治血虛風動者因陽明絡虛受肝臟風陽之擾用首烏枸杞歸身胡麻柏子仁丹莖藜等味以柔甘爲溫養失血背痛者其虛亦在陽明之絡用人參歸身聚仁白芍炙甘草以填補陽明若腎氣上逆則腎虛爲主病宜用通經之藥以峻補真陽至於口鼻吸受寒冷阻滯氣逆痛自胸引及背者宗內經諸痛皆寒之義以溫藥兩通氣血更有古法如臨證指南醫案

卷八 肩背骨痛 吳

防風湯散肺俞之風指迷丸治痰流臂痛徐澣月治流注牽引此皆從實證而治所謂通則不痛也醫者不拘守一法洞悉病源運巧思以製方而技於是進冀商年

腰腿足痛

腰痛

曹九濕鬱少腹痛引腰右脚痠

木防已 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮

杏仁 厚朴 草果 萆薢

俞五勞倦挾濕腰疼

川桂枝尖 木防已 生苡仁 茯苓皮

晚蠶沙 萆薢

何四腰痛環跳穴痛痺

沙苑 桂枝木 小茴 茯苓

臨證指南醫案 卷八 腰腿足痛 吳

桑寄生 炒杞子

翁三努力傷腰疼

生杜仲 當歸 五加皮 炒牛膝

枸杞子 茯苓 青鹽 生辛腰子

吳氏脉虛身熱腰髀皆痛少腹有形攻觸臟陰奇脉交傷

不可作外感治

當歸 炒白芍 桂枝 茯苓

炙草 煨薑 大棗

汪三脉滿腰髀環跳悉痛煩勞即發下焦空虛脉絡不宜

所謂絡虛則痛是也

膝腿足痛		腰膝痛	
歸身	桂枝木	生杜仲	木防已
沙苑	牛膝	草薺	小茴
某	便溺腰痛無力	木茺丸方	
朱	脉細色奪肝腎虛腰痛是絡病治法		
生羊內腎	當歸	炮杞子	小茴
紫衣胡桃	茯神		
王	老年腰膝久痛牽引	不堪步履奇經之脈	
隸於肝腎為多			
鹿角霜	當歸	肉蓯蓉	薄杜
小茴	柏子仁		
臨證指南醫案	卷八	腰腿足痛	吳
王	五脉遲緩飲酒便溺遺精數年不已近日腰膝足膝疼痛麻木此濕凝傷其脾腎之陽滋填固澁決不應病先議用苓薑木桂湯驅濕煖土再商後法		
吳	舌白乾渴腕不知創兩足膝跗筋掣痛雖有宿病近日痛發必挾時序溫熱濕蒸之氣阻其流行之隧理進宣通莫以風藥		
飛滑石	石膏	寒水石	杏仁
防已	苡仁	威靈仙	
蔣	七歲足膝腫疼久不止內熱		
生虎骨	炒牛膝	草薺	金毛狗脊

足痛	
當歸	仙靈脾
又	照前方加生虎骨黃耆
張	二勞力傷左腿骨痛
生虎骨	當歸 二兩
獨活	一兩
白茄根	二兩
油松節	二兩
金毛狗脊	八兩
痛着右腿身前肌肉不腫必在筋骨且入夜分勢篤邪留於陰間有偏墜治從肝經	
生杜仲	一兩
當歸	二兩
穿山甲	二錢
小茴香	一錢
北細辛	三分
乾地黃	二錢
某	嘔逆吐涎衝氣攻心足大指硬強而痛
臨證指南醫案	卷八
淡吳更	熟附子
獨活	北細辛
當歸	漢防已
某	兩足皮膚癢之則痛由厥陰犯陽明胃厥所致脉弦而數治當疎泄
川楝子	延胡
青皮	黑山梔
歸鬚	桃仁
橘紅	炒黑查肉
陸	二飽食則噦是為胃病兩足骨節皆痛陽明胃脉不司束筋骨攻痛議轉旋陽氣法
苓薑木桂湯	
某	右足患處麻木筋強微腫老人氣血不得宣通冬病至長夏食不加餐脉小弱主以溫養

虎脰骨生打 淮牛膝一錢 歸身炒一錢 杞子炒三錢

生杜仲三錢 川斛三錢 車薢一錢 白茯苓炒去刺一錢

腰者腎之府腎與膀胱為表裏在外為太陽在內屬

少陰又為衝任督帶之要會則腰痠一症不得不以

腎為主病然有內因外因不外五之別舊有五辨

一曰陽虛不足少陰腎寒二曰風寒濕熱着腰痛

三曰勞役傷腎四曰虛損傷五曰寢卧濕地其說

已詳而景岳更增一曰虛實寒熱之論尤為詳悉

夫內因治法腎虛者有虧則益火之本以消陰翳

腎臟之陰內奪則引水之源以制陽光外因治法寒

臨證指南醫案 卷八 腰腿足痛 辛

濕傷陽者用苦辛溫以通陽泄濁濕鬱生熱者用苦

辛以勝濕通氣不內外因治法勞役傷腎者以先後

天同治墜墮損傷者辨傷之輕重與瘀之有無為或

通或補若夫腿足痛外感者惟寒濕濕熱濕風之流

經入絡經云傷於濕者下先受之故當以治濕為主

其間佐溫佐清佐散隨症以製方內傷則不外肝脾

腎三者之虛或補中或填下或養肝隨病以致治古

來治腰腿足痛之法大畧如此也然審症必如燃犀

燭怪用藥尤貴以芥投針今閱案中有飲酒便溲遺

精不已腰痛麻木者他人必用滋填固澀等藥先生

斷為濕熱傷脾腎之陽用苓桂六薑湯以驅濕煖土

有老年腰痛者他人但投幾味通利補腎藥以治先

生獨想及青經之脈歸於肝腎用血肉有情之品鹿

角當歸從蓉薄桂小茴以溫養下焦有痛着右腿肌

肉不腫入夜勢篤者先生斷其必在筋骨邪流於陰

用歸鬚地龍山甲細辛以辛香苦溫入絡搜邪有兩

足皮膜撫之則痛者似乎風濕等症先生斷其厥陰

犯陽明用川棟延胡歸鬚薤仁青皮山梔以疎泄肝

臟有飽食則噉兩足骨節皆痛者人每用疎散攻劫

先生宗陽明虛不能束筋骨意用苓薑木桂湯以轉

臨證指南醫案 卷八 腰腿足痛 辛

旋陽氣種種治法非凡手所及要之治病固當審乎

虛實更當察其虛中有實實中有虛使第虛者補而

實者攻誰不知之潛玩方案足以補後人之心智也

豈淺鮮哉 葉商年

血絲

諸痛

痛在何處則各歸其門不必另

陳久痛必入絡氣血不行發黃非疸也

旋覆花 新絳 青葱 炒桃仁 當歸尾

龐八絡虛則痛有年色脈衰奪原非香薷劫散可效醫不

明治絡之法則愈治愈窮矣

炒桃仁 青葱管 桂枝 生鹿角 歸尾

此旋覆花湯之變制也去覆花之鹹降加鹿角之上

升方中惟有葱管通下餘俱辛散橫行則絡中無處

不到矣

諸痛

聖

又辛潤通絡病愈廿日因勞再發至於上吐下閉是關

格難治矣且痛勢復來始與通陽 阿魏丸四錢分四

服

李六積傷入絡結血皆瘀則流行失司所謂痛則不通也

久病當以緩攻不致重損

桃仁 歸鬚 降香末 小茴 穿山甲

白蒺藜 片薑黃 煨木香 韭白汁法丸

楊三由周身筋痛遷至腹中遂不食不便病久入絡不易

除根

歸身 川桂枝 茯苓 柏子仁

遠志 青葱管

章痛乃血病當治其發之由今痺氣脹悶食入不安得

頻吐之餘疹形則發是陳腐積氣膠結因吐經氣宣通

微伸景胸中煩懷便用梔子或湯主之

又胸中煩悸如來氣隨有欲通之象而血絡仍然

細結形體畏寒怯冷乃營衛之氣失司非陽微惡寒

之比試用宣絡之法

歸鬚 降香 青葱管 鬱金

新絳 柏子仁

黃痛則氣亂發熱頭不痛不渴飲脈不浮非外感也暫

臨證指南醫案 卷八 諸痛

聖

用金鈴散一劑

金鈴子 炒延胡 炒桃仁 桂圓

又痛而重按少緩是為絡虛一則氣逆紊亂但辛香破

氣忌進宗仲景用着之病用金匱旋覆花湯法

旋覆花 新絳 青葱管 桃仁

柏子霜 歸尾

汪婦脈小澹久因怙鬱腕痛引及背脇病入血絡經年延

綿更兼如素數載陽明虛餒肩臂不舉倉卒難於奏效

是緩調為宜議通血絡潤補勿投燥熱劫液

歸鬚 柏子仁 桂枝 桃仁

肝腎虛
下焦虛

生鹿角 片薑黃

朱 頭顱至足底木刺通熱熨 滋腎丸

張 初受寒濕久則化熱深入陰分必寐夜痛甚醫用和

血驅風焉能直入陰分議東垣滋腎丸搜其深藏伏邪

肉桂 八錢忌 黃柏 四兩 知母 四兩 俱塩水炒水泛丸

王 脉數而細忽痛必熱腫且痛來迅速思五行六氣之

流行最速莫如火風高年脂液久耗人身之氣必左升

右降相火寄於肝髓火起於腎並從陰發越本乎根蒂

先虧內藏納之職司矣每日服東垣滋腎丸三錢秋

石湯送以爲陰中伏熱 肉桂非宜

臨證指南醫案 卷八 諸痛

五

許 一痛爲脉絡中氣血不利醫當分經別絡肝腎下病必

留連及奇經八脉不知此旨宜乎無功

鹿角霜 桑寄生 杞子 當歸

沙苑 白薇 川石斛 生杜仲

范 病後精采未復多言傷氣行走動筋謂之勞復當與

甘溫和養氣血下焦痛肝腎素虛也

人參 小茴香拌炒當歸 沙苑蒺藜

茯神 炒杞子 菊花炭

經云諸痛痒瘡皆屬於心夫心主君火自當從熱而

論然此乃但言瘡耳若癆科之或癰或疽則有陰奇

陽不可但執熱而論矣又如舉痛論中所言十四條

惟熱留小腸一條則主乎熱餘皆主乎寒客故諸痛

之症大凡因於寒者十之七八因於熱者不過十之

二三而已如欲辨其寒熱但審其痛處或喜寒惡熱

或喜熱惡寒斯可得其情矣至於氣血虛實之治占

人總以一通字立法已屬盡善此通字勿誤認爲攻

下通利講解所謂通其氣血則不痛是也然必辨其

在氣分與血分之殊在氣分者但行其氣不必病輕

藥重攻動其血在血分者則必兼乎氣治所謂氣行

則血隨之是也若症之實者氣滯血凝通其氣而散

臨證指南醫案 卷八 諸痛

五

其血則愈症之虛者氣餒不能充運血衰不能滋榮

治當養氣補血而兼寓通於補此乃概言其大綱耳

若夫諸痛之症頭緒甚繁內因七情之傷必先臟腑

而後達於肌軀外因六氣之感必先肌軀而後入於

臟腑此必然之理也在內者考內景圖在外者觀經

絡圖其十二經游行之部位手之三陰從臍走手手

之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從

足走腹凡調治立方必加引經之藥或再佐以外治

之法如針灸砭刺或敷貼熨洗或按摩導引則尤易

奏功此外更有跌打閃挫陰疽內疔積聚癰疽蛇蟻

痲痺痧脹中惡諸痛。辨明證端。不可混治。今觀各門痛證諸案。良法儘多。難以殫叙。若撮其大旨。則補瀉寒溫。准用辛潤宣通。不用酸寒飲瀉以留邪。此已切中病情。然其獨得之奇。尤在乎治絡一法。蓋久痛必入於絡。絡中氣血虛實寒熱。稍有留邪。皆能致痛。此乃古人所未及詳言。而先生獨能剖析明辨者。以此垂訓後人。真不愧為一代之明醫矣。華玉堂

耳

風溫上

某溫邪上鬱。耳聾右脹。

此當外治

薄荷

馬勃

桔梗

連翹

杏仁

通草

某二先起咳嗽。繼而耳聾脹痛。延綿百日不愈。此體質陰虧。觸入風溫。未經清理。外因傷及陰分。少陽相火陡起。故入暮厥痛愈劇。當先清降。再議育陰。

苦丁茶

鮮菊葉

金銀花

生萊豆皮

川貝母

鮮荷葉梗

益元散

臨證指南醫案

卷八

耳

五

某女風溫發熱。左耳後腫痛。

此或外治

乾荷葉

苦丁茶

馬勃

連翹

杏仁

黑梔皮

畢三壯年。脈來小促數。自春月風溫咳嗽。繼以兩耳失聰。據述苦降滋陰不效。是不明虛實經絡矣。內經以春病在頭。膏梁之質。厚味酒醴助上痰火。固非治腎治肝可效。每晚卧時服茶調散一錢。

又鮮荷葉汁

羚羊角

石膏末

連翹

玄參

鮮菊葉

牛蒡子

午服

又照前方去牛蒡菊葉加鮮生地鮮銀花

葉 火風侵竅耳聾

連翹 薄荷 甘菊 淡黃芩

苦丁茶 黑山梔

顧二暑邪竅閉耳失聰

鮮荷葉 鮮菊花葉 苦丁茶 夏枯草

蔓荊子 連翹 淡黃芩 黑山梔

某八左耳聾痛舌白脉數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱

宜用辛涼輕藥

鮮菊葉 苦丁茶 黑山梔 飛滑石

連翹 淡竹葉

臨證指南醫案 卷八耳

某二著熱上鬱耳聾作脹咳嗽當清氣熱

杏仁 連翹殼 淡竹葉 川貝

白沙參 六一散

某頭重耳聾脹目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解上

焦

連翹 羚羊角 薄荷梗 丹皮

牛蒡子 桑葉 以上俱皆外治

某風木之鬱耳脹欲閉

連翹 羚羊角 薄荷梗 苦丁茶

夏枯草花 黑山梔皮 小生香附

倪三因大聲喊叫致右耳失聰想外觸驚氣內應肝胆胆

脉絡耳震動其火風之威亦能鬱而阻竅治在小陽忌

食腥濁

青蒿葉 青菊葉 薄荷梗 連翹

鮮荷葉汁 苦丁茶

汪耳聾咳嗽形體日瘦男子真陰未充虛陽易升乘竅

書云胆絡脉附耳先議清少陽鬱熱以左耳為甚故也

桑葉 丹皮 連翹 黑山梔

青蒿汁 象貝母

丁腎開竅於耳心亦寄竅於耳心腎兩虧肝陽亢逆故

臨證指南醫案 卷八耳

陰精走泄陽不內依是以耳鳴時聞但病在心腎其原

實由於鬱鬱則肝陽獨亢令胆火上炎清晨服丸藥以

補心腎午服湯藥以清少陽以胆經亦絡於耳也

水煎熟地兩 麥冬一兩 龜版二兩 牡蠣一兩

白芍一兩 北味一兩 建蓮半兩 磁石一兩

茯神半兩 沉香五錢 辰砂五錢為末

夏枯草二錢 丹皮一錢 生地三錢 山梔一錢

女貞子三錢 赤苓一錢 生甘草四分

姚三氣閉耳鳴 耳外治通竅

鮮荷葉 杏仁 厚朴 廣皮

木通

連翹

苦丁茶

陽已

金三下虛耳鳴失聰 磁石六味去萸加川銅龜甲遠志

王 腎竅開耳胆絡脉亦附於耳凡木虛失聰治在腎邪

干竅閉治在胆乃定例也今年已六旬脉形細數是皆

腎陰久虧肝陽內風上旋蒙竅五行有聲多動直氣火

風然非苦寒直降可效填陰重鎮滋水制木以酥味

入陰酸以和陽藥理當如是議

熟地 龜版 鎖陽 牛膝 遠志

茯神 磁石 秋石 萸肉 五味

某 八十耳聾乃理之常蓋老人雖健下元已怯是下虛

臨證指南醫案 卷人耳 卒

上實清竅不主流暢惟固補下焦使陰火得以潛伏

磁石六味加龜甲五味遠志

腎開竅於耳心亦寄竅於耳胆絡脈附於耳體虛失

聰治在心腎邪干竅閉治在胆經蓋耳為清空之竅

清陽交會流行之所一受風熱火鬱之邪與水衰火

實腎虛氣厥者皆能失聰故先生治法不越乎通陽

鎮陰益腎補心清胆等法使清靜靈明之氣上走空

竅而聰斯聰矣如溫邪暑熱火風侵竅而為耳聾痛

脹者用連翹山梔薄荷竹葉滑石銀花輕可去實之

法輕清泄降為主如少陽相火上鬱耳聾者可用

鮮荷葉苦丁茶青菊葉夏枯草蔓荊子黑山梔羚羊

角丹皮辛涼味薄之藥清少陽鬱熱兼清氣熱為主

如心腎兩虧肝陽亢逆與內風上旋蒙竅而為耳鳴

暴聾者用熟地磁石龜甲沉香二冬牛膝項陽秋石

山萸白芍味厚質重之藥壯水制陽填陰鎮逆佐以

酸味入陰鹹以和陽為主因症施治從虛從實宜如

庖丁之導竅矣 鄒時來

卷八

空

風溫上鬱目赤脉左弦當用辛以散之		桑葉	夏枯草	連翹	草決明	赤芍
某二失血後復受燥熱左目赤痛當以辛涼清之		鮮荷葉	冬桑葉	生甘草	赤苓皮	
鮑氏秋風化燥上焦受邪目赤珠痛		萊豆皮	稻豆皮			
連翹		薄荷	黃芩	山梔		
夏枯草		青菊葉	苦丁茶	桑皮		
臨證指南醫案卷八						
席用淡滲漸安是暑入氣阻熱蒸濕鬱勿取大辛大苦						
之開泄做清邪中上治法		冬桑葉	穀精草	望月砂	苡仁	
川通草		萊豆皮	茯苓			
羚羊角		夏枯草	草決明	山梔皮		
連翹		生香附				
潘戒飢瀉減十四畧可加穀近日竟夕無寐目珠赤痛						
陽升不交於陰暫停妙香散此為宜		桑葉	丹皮	夏枯草	黑山梔	

川貝		苡仁				
陸壺勁氣火翳遮目睛高年苦辛難進		夏枯草	穀精草	草決明	望月砂	
生香附		連翹	山梔皮	丹皮		
某頭面風腫目起星是氣中熱		羚羊角	夏枯草	薄荷梗	穀精草	生香附
小生地		丹皮	望月砂	連翹	山梔	
汪脉左弦左目赤痛淚多		桑葉	丹皮	草決明	小胡麻	
夏枯草		穀精草	萊豆皮	黑稽豆皮		
臨證指南醫案卷八						
汪目痛偏左翳膜紅絲診脉左弦滿由肝胆氣熱所致		草決明	冬桑葉	夏枯草	小胡麻	
丹皮		穀精草	宜用此藥			
其肝火上鬱目赤紅腫		連翹	赤芍	菊花葉	黑梔皮	
苦丁茶		夏枯草				
江脉數右大鬱久熱生目障心痛		夏枯草花	小生香附	金石斛	半夏麴	
茯苓		橘紅				
某八目胞浮腫不飢不運						

血絡虛		桑皮 八分 茯苓皮 三錢 大腹皮 一錢 薑皮 五分 苡仁 一錢 通草 一錢	王 高年目暗已久。血絡空虛。氣熱乘其空。障致視不明。治盡而痛。當夜而甚。乃熱氣由陰而上。想外科用酒調末藥。必係溫散攻堅。因此而病虛症可知。	羚羊角 連翹心 夏枯草 青菊葉	全當歸 川桂枝 丹皮	葉 微寒。汗大出。下有痔漏。左眼腫疼。痛此陰傷火鬱。不可作時邪泛治。六味去更加芍藥。荆子丹皮重用。	某三 右目多淚。昔患心嘈。難陽明空虛。肝陽上擾。使然。當	臨證指南醫案 卷八 目	調補肝胃	嫩黃芪 三錢 當歸 一錢 白芍 一錢 茯神 三錢	煨薑 一錢 南棗 一錢	某四 當夏形懶。不耐大氣發泄。入冬兩目無光。精氣無收。藏凡五臟精華。皆聚於目。失藏失聚。內乏生真。不獨一臟之損。常用養營湯。	某六 肝清細。左目痛。淚熱。翳膜。此肝陰內虧。厥陽上越所致。	冬桑葉 一錢 炒枸杞 一錢 小胡麻 一錢 望月砂 三錢	製首烏 三錢 石決明 一錢 黃菊花 一錢 稽豆皮 一錢
-----	--	---------------------------------------	---	-----------------	------------	---	------------------------------	-------------	------	--------------------------	-------------	--	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

某三 目痛無光		製首烏 六兩 枸杞子 二兩 柏子仁 一兩 細生地 二兩	石決明 四兩 小胡麻 三兩 望月砂 三兩 刺蒺藜 二兩	冬桑葉 一兩 黃菊花 一兩 用稽豆皮八兩。穀精珠二兩。煎濃汁。泛丸。每服五錢。開水送。	某 昏脹目昏。心中嘈雜。當治肝腎。	熟地 六兩 枸杞子 三兩 桑椹子 二兩 沙苑 二兩	石決明 二兩 茯神 二兩 女貞子 一兩 青蘊 一兩	黃菊花 一兩 川斛 四兩 加蜜丸。早上開水送。四錢。	某六 脈滿。背脊痛。右目當風淚多。當治肝腎。	臨證指南醫案 卷八 目	製首烏 枸杞子 炒歸身 桑椹子	沙苑子 茯神 吐音 驅風	某二 遺止心嘈。目淚。仍是陽氣過動。當填陰和陽。	熟地 杞子 天冬 萸肉 五味	生地 茯苓 菊花 山藥 蜜丸	某 瞳神散大。左偏頭痛。先損左目。是焦煩鬱勃。陽升化風。助傷血液。使然。法當兼補肝腎。	熟地 枸杞子 山萸肉 五味 茯神	菊花 生神麴 穀精草 山藥	眼科一症。古有五輪八廓。七十二問之辨。傳氏又分
---------	--	-----------------------------	-----------------------------	---	-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	-------------	-----------------	--------------	--------------------------	----------------	----------------	---	------------------	---------------	-------------------------

房一百零八症因名目太多徒滋惑亂至於見
仁齋已備論具載甚詳但陰陽虛實寒熱標本施治
不可紊亂經云五臟六腑之精華皆上注於目又云
目者肝之竅也肝與胆為表裏肝液胆汁充足目乃
能遠視故無論外感與內症皆與肝胆有關係焉夫
六腑之邪惟風火燥居多兼寒兼濕者亦間有內起
之症肝膽心腎為多他臟亦間有之若夫論治則外
感之症必有頭痛寒熱鼻塞筋骨痠疼脈見緊數或
浮洪一切表症方可清散至於內因之症有虛實之
殊實者肝胆之風熱盛也凡暴赤腫痛脹悶難開翳
膜眵淚酸澀作痒斑翳入睛皆實症也當除風散熱
虛者腎經之水火衰也凡久痛昏暗青盲雀目內障
昏朦五色花翳迎風淚出皆虛候也治宜壯水益火
若陰血雖虧而風熱未盡則當審其緩急相兼而治
若久服寒涼虛陽轉盛則當補以甘溫從乎反佐至
於紅色淺淡而紫者為虛熱鮮澤而赤者為實熱腫
神內湧白睛帶赤者為熱症腫神青綠白睛枯槁者
為寒症腫脹紅赤眼珠刺痛夜則尤甚目不能開而
視物猶見者為邪火熾盛若白翳遮睛珠不甚痛或
全不痛目仍能開而視物不見者為真火不足當細

察其形症色脈因症而用藥此內治之大法也若
久失調致氣血凝滯火熱壅結而為赤腫腐爛翳膜
遮蔽致成外障譬之鏡受污垢必當濯磨須用點藥
若但服藥必不能愈至於內障之症但宜服藥倘用
點藥徒傷其氣血必無益而有損更當知目皆白珠
馬肉故畫點苦寒藥則可效瞳子黑睛屬陰故夜
間點苦寒藥則反劇是外治之法亦當以陰陽區別
也若夫偏正頭風屬氣虛痛者朝重暮輕血虛痛者
朝輕暮重亦有外感內因之別此症當以補養正氣
為主畧兼治表倘藥以風熱而論專於表散最易損
目更有肝陰虧耗木火上炎頭痛惡心眉稜骨痛不
欲飲食眼胞紅腫睛珠刺痛眵淚如膿白睛如翳目
珠上翳不下不得翳珠甚則顛頂腦後如破如裂此
皆發之風也夫肝屬木木主風熱盛化風其體必本
陰虧男子或有遺精白濁腸風痔漏下血等疾女子
或犯淋帶崩漏諸症此係陰傷陽升內風沸起太忌
發散宜用育陰熄風柔肝滋腎等法或可救十中之
四五凡羌活防風川芎細辛桑本升麻等藥皆不可
用倘或失治必致膏傷低陷青黃牒出致成痼疾而
不可救專是科者不可不留意焉葉先生雖非眼目

專科觀其案內諸法。補前賢之未備。較之慣用苦寒升散。及藥用點藥者。不啻如霄壤之殊矣。學者當細心而參玩之。丁理方

臨證指南醫案

卷八

鼻

兩三年鼻塞不通。清涕由口哈出。而氣室仍然大凡。頭面諸竅皆清。陽交會通行之所。就外邪來乘。亦必霧露無質。清邪邪鬱既久。氣血失其流暢。進藥攻治。必不效驗。欲治其病。須查手太陰自少商穴起。施針刺以泄邪流氣。乃一法也。無方

徐四頭面諸竅皆清。陽遊行之所。邪處於中。則為堵塞。陽氣不司流行。必畏寒形顏內痺。必鬱而成熱。有鼻柱脫。衄矣。論理當用通聖散。遠處江外。倉猝就診。不可輕投。

臨證指南醫案 卷八 鼻

用輕可去實

苦丁茶 乾荷葉邊 夏荆子 連翹心

飛滑石 白芷

毛十熱壅肺氣失降。鼻柱窒痛。恒外注

知母 水梨肉 川貝母 水熬膏

楊 鹹降滋填。鼻淵止得寐。用虎潛法。減當歸陳皮加天

冬淡菜膠脊筋丸

沈氏 素有痰火氣逆。春令地中陽升。木火化風。上引顛頂。腦熱由清竅以泄越。耳鳴鼻淵。甚於左者。春應肝胆氣火自左而升也。宜清熱散鬱。辛涼達於頭面主治。

羚羊角	黑山梔	苦丁茶	青菊葉
飛滑石	夏枯草花		
又照方去滑石加乾荷葉生石膏			
又性情躁急陽動太過氣火上升鬱於隱竅由春深病加失其條達之性經言春氣病在頭也考五行六氣迅速變化莫若火風腦熱暗泄而為鼻淵隧道失和結成瘰核夫東垣升陽散火丹溪總治諸鬱咸取苦辛為法然藥乃片時之效欲得久安以怡悅心志為要旨耳			
連翹心	土貝母	海蘆	昆布
黑山梔	川芎	小生香附	鬱金
臨證指南醫案 卷八 鼻			
羚羊角	夏枯草	乾荷葉邊	
生研木青菊葉汁法九苦丁茶煎湯送二錢五分			
汪形瘦米長身平木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下			
站不眠癢暖天稍止遇冷更甚其為虛證顯然明白醫者愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈			
勢法是要用天真丸			
人參	黃芪	白朮	山藥
茯苓	當歸	天冬	羊肉
經云肺和則鼻能知香臭矣又云胆移熱於腦令人			
辛頻鼻淵傳為蚬蟻頭目是知初感風寒之邪久則			

化熱熱鬱則氣源而塞矣治法利於開上宜薑如菊耳散防風通聖散川芎茶調散菊花茶調散等類先生則佐以荷葉邊苦丁茶蔓荊連翹之屬以治之外感宜辛散也內熱宜清涼者如腦熱鼻淵用羚羊山梔石膏滑石夏枯草青菊葉苦丁茶等類苦辛涼散鬱之法也久則當用鹹降滋填如虎潛補辛再加鎮攝之品其有精氣不足腦髓不固淋下無腥穢之氣者此勞怯根苗以天真丸主之此就案中大概而言言之也然症候錯雜再當考前賢之法而治之 華玉			
臨證指南醫案 卷八 鼻			
生			

牙

陰虧體質溫氣上蒸齒痛連及頭顱用玉女煎
火鬱頭頂屬厥陰上結杉齦腫

犀角 羚羊角 玄參 知母 生甘草

連翹 黑山梔 銀花 夏枯草

王四酒客牙宜鈔血痰血形寒內熱食少陰藥濁味姑緩

小黑豆皮 人中白 旱蓮草 川斛

左牡蠣 澤瀉

徐二脉細數上出體屬陰虛內熱牙痛後煩車穴閉口不

臨證指南醫案卷八牙

能張其病在絡藥餌難效擬進宣通絡痺方

羚羊角 薑蚕 川桂枝尖 煨明天麻

炒丹皮 黑山梔 鈎藤 高外法

汪風熱上蒸齦脹頭痛當用輕清土焦

活水蘆根 陶圖滑石 西瓜翠衣 生菜豆皮

連翹 銀花

牙症不外乎風火虫虛此但言其痛也其他如牙宣

牙搖牙疳牙疳牙疳牙疳牙疳牙疳牙疳牙疳牙疳

皆由於濕火熱毒結牙床酒分上下二齒辨明手

足陽明及少陰之異又當察其專科而任之華玉堂

咽喉

陸風火上鬱項腫咽痛

薄荷 連翹 射干 牛蒡子

馬勃 葵豆皮

邵風火上鬱咽痛頭脹宜用辛涼

西瓜翠衣 滑石 連翹 桑皮

射干 杏仁

汪三左脉弦數咽痛腕悶陰虧體質不耐辛溫當以輕

清上焦

臨證指南醫案卷八咽喉

桑葉 生熟豆皮 白沙參 川貝

玄參 川斛

王七勞傷恐有瘀腐進辛潤宜血初服身痛繼漸平復但

喉間緊痺而呼吸飲食仍不覺其苦眼白仍帶黃議清

肺中氣熱治

百部 大沙參 鮮枇杷葉 活水蘆根

川貝 地骨皮 南花粉 苡仁

徐五老勞咽疼

生雞子白 糯稻根 水炮 甜北沙參 牛

炒麥冬 錢三 川石斛 錢半 生甘草 三

<small>低溫上 受寒腫</small>	楊木病陰氣走瀉為虛癰。上受以實。咽喉腫。邪蒙。日暮昏。陰傷日熾。肌膚柔白。氣分不足。此。雖。解。清。上。但。不。可。犯。及。中。下。	<small>氣分熱</small>	連翹 鬱金 馬勃 牛蒡子 竹葉心 黑山梔 杏仁 楠紅	又 上焦之病。都是氣分。氣室則上下不通。而中宮遂脹。熱氣蒸。喉舌疳。清氣。中。必。傷。肺。皆。受。重。藥。之。累。	銀花二錢 川貝三錢 馬兜鈴五 連翹心一錢 川通草一錢 白金汁一 活水蘆根汁 牛杯	臨證指南醫案 卷八 咽喉 又 餘熱蒸痰壅氣。當腕膈因。咳而痛。議以潤降清肅。甜杏仁 花粉 川貝 甘草 桔梗	孫九腎液不收。肝陽上越。崩脹流涕。咽喉微痛。六味加牛膝車前五味	五 咽喉痛。發時如有物阻。膈甚至痛連心下。每晚知劇。是陰液日枯。肝臟厥陽化火。風上灼。法以柔劑。微甘以緩其急耳。 <small>此症中必有。不。但。氣。分。之。實。而。必。有。陰。虛。之。功。</small>	細生地 天冬 阿膠 生雞子黃	玄參心 糯稻根鬚	陳三陰陽交虛。醫衛欬斜為忽冷忽熱。周身骸骨皆痛。百
----------------------------	--	--------------------	-------------------------------	---	---	--	---------------------------------	---	----------------	----------	---------------------------

脈皆損。秋平天氣已降。身中氣反泄。越汗。出。喉。咽。入於陰。致自為動。搏耳。夫咽喉之患。久則喉痺。喉官妨阻。受納最不易治。從少陰咽痛例。用猪膚湯。旬日喉痛得緩。對症轉方。 <small>張中必。非。此。藥。所。能。治。</small>	張三陰損三年。不復入夏。咽痛拒納。寒涼清咽反加泄瀉。則知龍相上騰。若電光火灼。雖傾盆暴雨。不能撲滅。必身中陰陽協和方息。此草木無情。難效耳。從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之。	又 陰涸於下。陽熾於上。為少陰喉痛。乃損性之末傳矣。用猪膚甘涼益坎。有情之屬而效。今肉腠消燼殆盡。下臨證指南醫案 卷八 咽喉 <small>此症。不。通。順。者。</small>	隹易冷。髓空極矣。何暇以痰嗽為理。議滑澀之補。味鹹入腎可也。	牛骨髓兩 羊骨髓兩 猪骨髓兩 麋角膠兩 用建蓮肉五兩 山藥五兩 次實二兩 同搗丸	全二臟液不充。陽氣虛風鼓動。病起喉。辣心震。頻頻發。多因勞怒。用內經甘緩一法。	人參 薊肉炭 白芍 炙甘草	又 復脉湯去桂 <small>此。是。一。種。</small> 內經云。一陰一陽結。謂之喉痺。一陰者。手少陰君火。
--	--	--	--------------------------------	---	---	---------------	---

心之脉氣也。一陽者，手少陽相火三焦之氣也。二經之脉并絡於喉，故氣熱則內結，結甚則腫，腫甚則痺，痺甚則不通而死矣。卽今之所謂喉癰、喉風、喉蛾等類是也。夫推原十二經，惟足太陽別下項，其餘皆湊咽喉。然內經獨言一陰一陽結爲喉痺者，何也？蓋以君相二火獨勝則熱且痛也。愚歷攷咽喉湯方，皆用辛散鹹軟，去風痰，解熱毒爲主。如玄參、升麻、湯、聖濟透關散及玉鎖匙如聖散、普濟消毒飲子皆急於治標，而緩於治本。恐緩則傷人，故以治標爲急耳。又嘗考仲景傷寒論咽喉生瘡等症，每用甘草、桔梗、半夏散及湯爲主，一爲少陰水虧不能上濟，君火以致咽喉生瘡，不能出聲，故以半夏之辛滑佐雞子清利竅通聲，使以苦酒入陰，劫涎飲瘡，桂枝解肌，出經脉而出肌表，悉從太陽開發，而半夏治咽喉可無燥津涸液之患，一爲陰火上結而爲咽痛，故用生甘草甘涼泄熱，功在緩腎急而救陰液，佐以桔梗開提足少陰之熱邪，如腎液下泄不能上蒸於肺，致絡燥而爲咽痛者，仲景又有猪膚一法，潤燥解熱緩中，使其陰陽協和而後愈，是固本而兼治標者也。如風火上鬱，陰虧脉數而爲咽痛者，先生又有辛涼清上諸

法如咽喉緊閉氣熱而爲咽痛者，又有清肺中氣熱一法，如情志鬱勃相火上炎而爲咽痛者，則又有降氣開濁一法，如腎液不收肝陽上越而爲咽痛者，宗錢氏六味湯如陰陽交虛龍相上灼而爲咽痛者，宗仲景猪膚湯法。鄒澤九
凡病屬於任絡或腑者皆宜凡之而經治一房形休及九竅則爲有形之病宜有祛氣散結之藥藥入於胃不遇氣則到於安能至經結之邪故宜凡之功祇能去其半耳若欲速效必有外治之法可以應手而愈考博羣書廣求秘法自能得之
又外治諸法已長所詳開因其針灸之法術通神入妙何必外治此即外治最精者也後世針法不傳手是手以藥代針而多外治之法者針灸既廢而外治法又不講則天下之病多使用藥即者祇能愈其半耳必需外治者竟甘食理丹而醫道之一淵也後世之醫者須知之

瘡瘍

楊十瘡瘻四肢偏多。長夏入秋。懶倦欲眠。乾咳無痰。頭知

味。所納已少。此陽明胃陰因熱致耗。即熱傷元氣之徵。

當與甘寒。養胃陰。以供肺。如金匱麥門冬湯去半夏加

黃芪皮

吳八脉不浮大。非開外風。初起右掌二指已不屈伸。頭面

身半以上。常有瘡。此乃陽明脉絡內留濕熱。若

非癰氣吸入。定然食物中毒。姑與宣解緩攻。

連翹

犀角

赤芍

酒燉大黃

臨證指南醫案

卷八 瘡瘍

夫

荆芥

片薑黃

能食。二便通調。瘡無痛。初因膿瘡。瘡愈有泡。自面

及肢體。至於右指掌屈伸皆痛。為脉絡留邪。以致隧道

為壅。前方辛涼入血。先升發降。已得小效。今製清脉絡

壅熱。藉酒力以引導。通行營衛。亦一法也。

銀花

連翹

犀角

生大黃

荆芥

丹皮

黃芩

川芎

當歸

澤蘭

羚羊角

大豆黃卷

用無灰酒十餘度

金匱六血舍空。隙內風蟬動。外以熱湯泡洗。濕熱蒸襲肌表。

遂有裂膿流水。况思身前加麻痺陽脈亦衰。調治之法。

清營以熄內風。疎利濕熱以肅隧道。辛涼醒鮮勿進。可緩以計功。

製首烏

鮮生地

柏子仁

川斛

黑稻豆皮

虎骨

桑沙

黃柏

草薢

敷膏

吳瘡瘻之後。濕熱未去。癰阻隧道。水穀下咽。亦化為痰。

中焦受病。故不知飢餓。痰氣上干。漸至喘悶矣。但服藥

四十劑。純是破氣消冠。胃陽受傷。痰氣愈不得去矣。

半夏

茯苓

紫老薑

炒粳米

又瘡瘍大發。營衛行動於脉中。脉外可免腹滿之累矣。

第穀食尚未安。適猶是苦劣多進之故。胃陽未復。仍以

臨證指南醫案

卷八 瘡瘍

夫

通調利濕主之。

半夏

茯苓

金石斛

茯苓

澤瀉

秦七久熱瘡瘻五六年。環口燥裂。湯瀉並痛。

鮮生地

製首烏

丹皮

丹參

菟蔚子

銀花

地丁

紫草

共熬膏

王血熱風動。瘡癢。

荆芥

防風

地膚子

赤芍

銀花

小生地

木通

甘草

張三初因嘔吐。是肝胃不和。致病。故辛香剛燥愈劇。然久

病必入血絡。熱則久瘡不愈矣。夫木火皆令燥。易飢

楊五身瘦久瘧血分有熱精通之年最宜安養脉象非有力		生首烏 <small>三兩</small>	三角胡麻 <small>一兩五錢</small>	地骨皮 <small>二兩</small>	金銀花 <small>二兩</small>	丹皮 <small>二兩</small>	生白芍 <small>二兩</small>	生甘草 <small>一兩</small>	蜜丸早服	王九脉來濡浮久瘧變幻未罷是衛陽疏豁不耐寒暄初受客邪不解混處氣血浸淫僅在陽分肌腠之患議升	臨證指南醫案卷八瘧	舉一法氣壯斯風濕盡驅	人參 生黃芪 川芎 當歸 防風	蠶蛻 炙草 生薑 大棗	冬瓜皮 苡仁	鄒四痰因於濕久而變熱壅於經隧變現瘡疾疥癬已釀風濕之毒混在氣血之中邪正混處搜逐難驅四肢為甚姑從陽明升降法	連翹 赤芍 白殭蚕 白鮮皮	防風 升麻 滑石 酒浸大黃
-------------------------	--	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------	---	-----------	------------	-----------------	-------------	--------	---	---------------	---------------

汪氏風熱既久未解化成瘡癰當以和血驅風		當歸 赤芍 川芎 夏枯草	牛蒡子 製蠶蚕	金頭頭熱瘰未能泄邪此身熱皆成膿六氣辛涼兼理氣血可愈	連翹 犀角 銀花 丹皮	玄參 生甘草 青菊葉	某風熱毒閉項後腫	竹葉 滑石 蘆根 牛蒡 馬勃	薄荷葉 黑山梔 連翹 川貝 生甘草	臨證指南醫案卷八瘧	王疔毒略血失血都是暑入陰傷	竹葉心 玄參心 鮮生地 黑稽豆皮	冬冬 知母 常用解毒復元丹	屠三秋痢半年未愈瘰癧堅硬痛癢膿久成熱腑經病可冀其愈	夏枯草 香附 茯苓 苡仁	川貝 丹皮	虞氏頸項結核瘰癧足腫肝木犯中痰氣凝滯	夏枯草 <small>三兩</small> 牡蠣 <small>二兩</small> 澤瀉 <small>一兩</small> 茯苓 <small>二兩</small>	牛夏 <small>二兩</small> 厚朴 <small>一兩</small> 橘紅 <small>一兩</small> 神麴 <small>一兩</small>
--------------------	--	--------------	---------	---------------------------	-------------	------------	----------	----------------	-------------------	-----------	---------------	------------------	---------------	---------------------------	--------------	-------	--------------------	--	---

乳		瘰	
某氏	生香附一兩水煎汁泛丸	某氏	氣鬱痰核
夏枯草	生香附	丹皮	山梔
連翹	鬱金	赤芍	橘紅
王四	脈左關五長強項給癭時即	生地	丹皮
生鈞藤	山梔	土貝母	生薄荷
陳	躁急善怒氣火結癭癰癰為痛熱鬱化風氣阻滯	助腹鳴脫腹苟非開懷歡暢不能向安	土貝母
土貝母	山梔	瓜蒌皮	鬱金
臨證指南醫案	卷八 瘰癧	全	
白芥子	海藻	昆布	夏枯草
沈氏	肝氣鬱遏宿痞乳癭	川棟子	夏枯草
黑山梔	瓜蒌實	青橘葉	香附汁
劉氏	乳房為少陽脈絡經行之所此經氣血皆少由情懷失暢而氣血鬱滯有形而痛當治在絡恐年歲日加竟成沉痾非癰膿之症以脈不浮數無寒熱辨之	柴胡	夏枯草
川貝	茯苓	甘草	歸身
某氏	乳房結核是少陽之結此經絡氣血皆薄攻之非易		

湯		瘰	
孫	因頃急失血以來致頸項左右筋腫痛連背脊此乃驚傷氣血經脈流行失司已經百日不愈	孫	因頃急失血以來致頸項左右筋腫痛連背脊此乃驚傷氣血經脈流行失司已經百日不愈
臆延綿之憂治在小腸陽明	小生香附	夏枯草	鮮菊葉
黑山梔	鉤藤	丹皮	鬱金
陳	脈左數實血絡有熱暑風濕氣外加遂發疹塊連腹搔癢是屬暑濕	搔癢是屬暑濕	
臨證指南醫案	卷八 瘰癧	全	
杏仁	連翹	滑石	寒水石
銀花	晚蚕沙	黃柏	防已
瘰癧毒熱症與參芪不效即當清解為是消導亦是未	今者身熱正肺神識欲昏便溏溺赤煩渴是暑氣攻	入內侵脾胃有癰厥之變昨用宣肺解毒雖與暑邪無	益然亦無害若加黃芪又屬相反大凡熱氣蒙閉清竅
都令神昏當以牛黃清心丸清痰氣之阻俟其竅開此	暑門中大奇是法與解毒勿悖矣		
李	初病濕熱在經久則癰熱入絡膿瘍日多未已漸至	筋骨熱痛金匱云經熱則痺絡熱則癰數年宿病勿事	

速攻

犀角 連翹心 玄參 升參 野赤豆皮

細生地 葛黃 桑枝 牛服 夜服藥紫丸

某七瘡瘍服藥陽傷氣阻腕門不運腹脹最怕瘡毒內閉急宜通陽

厚朴 廣皮 薑皮 茯苓皮

連皮杏仁 桂枝木 浮島 大腹皮

某服藥科寒發之藥以致氣冲作脹喘急不眠無非濁陰上攻議來復丹

顧五脈微小者屬牛月餘腫未消脹水清稀浮腫汗出嘔

臨證指南醫案 卷八 瘡瘍

惡寒食此胃陽再敗瘡毒內攻欲脫夫陽失煦則陰液

不承元氣撒則毒愈瀰漫清解苦寒究竟新伐生陽議

甘溫胃受培植其本藥附者復振余非瘡醫按色脉以

推其理耳 加桂理中湯

姚瘡瘍久不勝氣血耗盡中宮營液枯涸氣不旋轉得

湯飲則痰涎上湧勢如噴肺況久恙若是藥餌難挽勉

擬方

人參 不或方 炮冬冬 代赭石 化橘紅

胡神食主胃通化主脾癰瘍瘡潰臥床不得舒展臃腫

氣機呆鈍何疑外科守定成方甚未歸地不能補托氣

血反凝滯於裏出納之機交失且是症乃水穀濕氣下垂而致結於足厥陰手陽明之界若濕熱不為盡驅藉補托以冀生機養賊貽害焉能濟事

金石斛五錢 糯米一錢 金銀花三錢 茯苓一錢

晚蘇沙二錢 寒水石二錢

徐營傷心琅納食無味此傷痛大虛常調其中

人參 歸身 炒白芍 木炭

熟地 廣皮 茯苓 炙草

某膿血去多痛猶未息胃傷不嗜穀口無味左關尺細

弱無力正虛之著據理進藥仍宜補托

臨證指南醫案 卷八 瘡瘍

人參 熟地 玉竹 柏子仁 歸身

丹參 茯苓 棗仁 遠志

某瘡瘍膿血去多元氣大耗脉無力不嗜食惡心中州

不振寐則驚悸神不守也以養營法

人參 熟地 廣皮 茯苓 炙草

歸身 白芍 五味 棗仁

某瘡瘍損能食身熱六味湯加青蒿節

曹三因瘍漏過進寒涼遂患腰痠引脊脊今晨起周身

不得自如乃經脉絡脉之中氣血流行失暢久病諸非

羚羊角

當歸

黃芪

白薇

桂枝

桑枝

顧 消渴不成成漏肌液滲去必腸絡空而內風暗動攻
胃則嘔逆吞酸腹痛泄瀉不食津液不升舌焦黑不渴
飲內外兼病難治之症

人參一錢

炒烏梅肉五分

炒黑川椒三分 茯苓三錢

生淡薑五分

炒廣皮一錢 白芍一錢

顧 久損瀉瘍胃減腹痛議用戊巳湯意

人參 茯神

白芍 炙草

炒菟絲子

肝經

王 四痛久臥伸不得卧如經脈絡脈呆鈍氣痺血瘀鬱蒸

臨證指南醫案 卷八 瘡瘍

全

上熱旬口頻頻大便必有血下復喘促煩燥不飢不食

竝無寒熱汗出全是銅結在裏欲作內癰之象部位臍

左之上內應乎肝癰者癰也血結必入於絡吐痰口氣

皆臭內應已見一斑矣 此是陽癰

炒桃仁

新絲

降香末

野鬱金汁

紫苑

冬瓜子

金銀花

某 臍旁紫黑先厥後熱少腹痛如刀割二便皆澀兩足

筋縮有腸癰之慮

老韭白

兩頭尖

小茴香

當歸鬚

炙山甲

某 舌焦黃小腹堅滿小便不利兩足皆痿濕熱結聚六

腑不通有腸癰之慮

川棟子

小茴

丹皮

山梔

通草

青葱

某 壯熱旬日周身筋脈牽掣少腹堅硬小便淋瀝忽冷
忽熱欲釀膿血乃腸癰為病倣孫真人牡丹皮太黃湯
主之

戴九痔瘡下血濕熱居多今色衰微顯是虛寒無運效法

則當補脾胃因痔瘡猶痛腫勢尙存佐以淡滲通腑

生於朮

生菟絲粉

生象牙末

生白蠟

外症本有專科先生並非瘍醫然觀其理理立方已

臨證指南醫案 卷八 瘡瘍

全

勝專科什伯矣惜其案無多法亦未備余不敘述大

凡瘍症雖發於表而病根則在於裏能明陰陽虛實

寒熱經絡俞穴大症化小小症化無善於消散者此

為上工其次能審明五善七惡循理用藥其刀鍼砭

割手法靈活敷貼薰洗悉遵古方雖潰易斂此為中

工更有不察症之陰陽虛實及因鬱則營衛不和致

氣血凝滯釀成癰症但知概用苦寒攻逐名為清火

消毒實則敗胃成生迨至胃氣一敗則變症蜂起矣

又有藉稱以毒攻毒秘方類聚毒藥合就丹丸隨症

亂投希冀取效于日前不顧貽禍於後日及問其經

古吳葉桂天士先生著 臨山華山山曲雲全較

姪旦王堂

調經

血滯

張二經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷家傳例以通劑

川芎 當歸 肉桂 生艾 小茴

臨證指南醫案卷九 調經

茯苓 生香附 南山楂 益母膏丸

姚二久嗽背寒晨汗不臥咳甚經事日遲脈如數而虛

減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草

南棗 飴糖 肺痿不固因桂枝連中溫為肺痿

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則

咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日

遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火

也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之饒已甚

可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣

肝犯胃

而桂枝白芍非飲陰和血之妙品乎

秦二氣衝心痛嘔逆氣墜少腹為瀉經來後期其色或淡

或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治

川連 小茴 川棟子 歸尾

炒牛夏 茯苓 桂枝 橘紅

血滯

三鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血况春深泄氣之候必

佐益氣之屬方為合法 歸脾湯

又 向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少

臨證指南醫案卷九 調經

腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆

肝木拂逆甚則為厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動

極之徵為肝用太過宜制其用前此芪朮守補不可用

矣 安胃理中丸去黃柏細辛

錢 脈滿脘悶減食經水來遲腹痛墜

柴胡 炒白芍 黃芩 鬱金

又 諸恙未減腹但痛不墜 逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

計八經閉寒熱便澹腹痛 加味逍遙散去山梔

胡氏
某

血虛內熱。經不至。加味逍遙散去木

某 經遲腹痛。風疹。絡血不寧。久鬱成熱。法當通利。

涼膈去芒硝加丹皮赤芍

孫二 奇脉下損。經遲腹痛。先用當歸建中湯。續商八脉治

法 歸建中湯

又 久嗽遇勞寒熱 歸建中去薑

謝三 能食不運。痰泄。經事愆期。少腹中乾澀而痛。下焦

痺。衝心嘔逆。腹鳴心辣。八脉奇經交病。

人參

茯苓

艾葉

製香附

淡從蓉

肉桂

當歸

臨證指南醫案

卷九 調經

三

鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

王三 脉右緩左瀼。經水色淡。後期嘔吐。痰水食物。畢咽三

載餘不孕。此久鬱凝痰滯氣。務宜宣通。從陽明厥陰立

方

半夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山查肉

薑汁法丸

又 三月中。用辛溫宣鬱方。痰涎自下。胸次寬。嘔逆緩。今

喜暖食惡寒。經遲至五十餘日。來必色淡且少。議用溫

養御任。栽培生氣方法。八珍去木草地。加小茴肉桂

斷艾香附紫石英河車膠丸

肝腎虛

朱二 經水一月兩至。或幾月不來。五年來並不孕育。下焦

肢體常冷。是衝任脉損。無有貯蓄。故益腎肝主之。

人參

河車膠

熟地

歸身

白芍

川芎

香附

茯神

肉桂

艾炭

小茴

紫石英

益母膏丸

肝腎虛

程三 三十三年不孕育。其中幻病非一。病人述經期遲至。來

期預先三日。周身筋骨。脉絡牽掣。痠楚不得舒展。凡女

人月水諸絡之血。必彙集血海而下。血海者。即衝脉也。

男子藏精。女子繫胞。不孕經不調。衝脉病也。腹為陰。陰

虛生熱。肢背為陽。陽虛生寒。究竟全是產後不復之虛。

臨證指南醫案

卷九 調經

四

損。惑見病治病之誤。有終身不育。淹淹之累。肝血陰虛。

木火內寄。古人溫養下焦。必佐涼肝堅陰。勿執經後期

為氣滯。亂投破氣。剛藥劫陰。

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

肝腎虛

朱 經云。陽維為病。苦寒熱。緣上年米雪甚少。冬失其藏。

春半潮濕。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。

八脉。肝腎一身綱維。八脉之束固之司。陰弱內熱。

陽微外寒矣。脊脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。

情景已露。局方逍遙散。固女科聖藥。大意重在肝脾二

經因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。今則入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脉不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

炙甘草 以甘定痛 阿膠 細生地 生白芍

麥冬 牡蠣 甘江不互

某陰虧內熱。經事愆期。

雄烏骨雞 小生地 阿膠 白芍 枸杞

天冬 茯苓 芡蔚子 女貞子 桂圓

臨證指南醫案 卷九 調經 五

右十味用青蒿汁童便醇酒熬膏加蜜丸

張四寒熱間日。經來腹痛。

小生地 丹皮 知母 花粉

生驚甲 澤蘭

某二先腹痛而後經至。氣滯為多。晨泄腹鳴。亦脾胃之病。

與下焦泄則異

川芎 當歸 香附 煨廣木香

查肉 茯苓

某二寒熱無汗。經先腹痛。喉中燥癢。咳逆。食物不思。此鬱

傷氣血。八脉主病。姑先與澤蘭湯。

歸身 澤蘭 丹參 白芍

柏子仁 茯神 此方名

周七室。文經水不調。先後非一。來期必先腹痛。較之平日為重。飲食大減。始於初夏。入秋下焦常冷。腹鳴忽瀉。忽結。究脉察色。是居室易於鬱怒。肝氣偏橫。胃先受戕。而

奇經衝任。踴維諸脉。皆肝胃屬。脉不循序流行。氣血

日加阻痺。失治必結癥聚。痞痞之累。

南山查 生香附 延胡 當歸 青皮

三稜 蓬朮 牛膝 川棟子 澤蘭

肉桂 炒小茴 葱白汁丸

臨證指南醫案 卷九 調經 六

顧經來筋掣腹痛。常有心痛乾嘔。此肝氣厥逆。衝任皆

病。務在宣通氣血。以調經。溫燥忌用。自可得效。

川棟一錢 丹皮三錢 炒查二錢 胡連八分

延胡一錢 澤蘭二錢 歸身二錢 生白芍一錢

又柏子仁丸

吳鬱傷絡脉痛經 肝胃氣

川芎 當歸 香附 小茴

烏藥 茯苓 紅棗

費經水紫黑。來時嘈雜。脉絡收引而痛。經過帶下不絕。

形瘦日減。脉來右大左弱。上部火升。下焦冷徹。骨中陰

陽乖違焉得孕育。問醫都以補血滿劑。宜乎鮮效。議通陽攝陰法。互用滋陰法。

鮑魚內信用此 生地 淡菴蓉 天冬

當歸 柏子仁 炒山查 牛膝

茯苓 紅棗蘄艾湯法丸

朱 脈數右肩痛。痰經不調。經來氣攻。皆性躁。氣分有熱。

細子苓 白芍 黑山梔 鈞藤 茯苓

當歸鬚 香附 芩蔚子 桑枝

李 酸滲入裏。氣血呆鈍。痛自心胸。脹及少腹。昔經行三

臨證指南醫案 卷九 調經 七

日。今四日猶未已。為凝滯所致。痛脹何疑。讀內經遺意。

以辛勝酸主治。但辛氣最易入表。當求其宣絡者宜之。

韭白汁 桃仁 延胡 小茴

當歸鬚 川棟子

經閉 木火鬱 王 苦辛泄降。胸腕脹悶已舒。此嗽血。皆肝胆氣火上逆。必經來可安。

南山查 桃仁 黑山梔 丹皮

橘葉 降香末 老韭白汁

胃陽虛 朱 當節令呵欠煩倦。秋深進食。微有惡心。病起至今。月事不來。夫衝任血海。皆屬陽明主司。見症胃弱。此陰柔

膩滯當停以理胃陽為務

人參 半夏麴 廣皮白 茯苓

生益智仁 煨薑 見寒症方可用

某 脈數形疲。咳。經閉半年。已經食減。便溏浮腫。無清嗽

通經之理。扶持中土。望其加穀。四君子湯 故者不更

某 三經閉兩月。脫痺嘔惡。此氣室不宣。胃陽碍鈍使然。當用和中為主。

半夏麴 老蘇梗 茯苓 廣皮

枳殼 川斛

某 夏令寒熱。經阻。少腹痛脹。血結洞瀉不爽。乃內傷氣

臨證指南醫案 卷九 調經 八

血不和。兼有時令濕邪。

茯苓皮 三錢 大腹皮 一錢 生益智 一錢 厚朴 一錢

蓬莪朮 五分 青皮子 五分 炒研

又 服五劑後氣已畧平。

葱白丸 用生蘄艾 三錢 紅棗 十五枚 煎清湯送

某 脈數經閉。腹脹足腫。 此為血為名為血

茯苓皮 大腹皮 青皮 小香附

延胡 炒山查 芩蔚子 炒砂仁

顯 經停四月。腹滿尻髀足肢盡腫。食納脹悶不化。大便澹瀉不實。女科認為胎氣。恐未必然。方書謂先經斷而

後腫脹者。治在血分。以和是為名

生白朮 厚朴 大腹皮 芫蔚子

椒目 小黑稽豆皮

傳 大凡痞滿在氣。燥實在血。腹脹。經水仍來。大便微溏。

固是氣分病也。下之暫愈。氣得泄也。繼而腹脹。經水不來。氣與血俱病也。病非輕渺。議中滿分消方法。

生於朮 猪苓 澤瀉 椒目

雞內金 青皮汁 厚朴

鄒十腰已下腫。經閉四月。腹痛瀉不爽。議開太陽。導其氣阻水濕。

臨證指南醫案 卷九 調經 九

牡蠣 澤瀉 猪苓 茯苓

生白朮 防己 厚朴 椒目

何 經阻腹滿。瀉後變痢。小溫中丸。

王三居經三月。痞悶膨脹。無姪脉發現。詢知勞碌致病。必屬脾胃陽傷。中氣愈餒。衝脉乏血。貯注。洵有諸矣。

大腹皮 牛夏 老蘇梗 橘紅

炒山查 芫蔚子

又 經停腹滿便秘。

郁李仁 冬葵子 柏子仁 當歸鬚 鮮杜牛膝

王十服阿魏丸。高突已平。痛未全止。經閉已有十餘月。腹

微膨。全屬氣血凝滯。若不經通。病何以去。

川芎 當歸 延胡 桃仁 查肉

香附 青皮 牛膝 益母膏丸

石二入肝必麻木。諸厥皆厥陰心痛。便燥。氣痺。血枯。乃勞怒情志不遂起見。

桃仁 當歸鬚 炒延胡 生香附

芫蔚子 南山查

又 辛潤氣藥病減。血虛氣滯。當以調經為要。見病理病為非。

桃仁 當歸 山查 芫蔚子

臨證指南醫案 卷九 調經 十

澤蘭 柏子仁

某二心下有形不飢。經水漸少。漸閉。由氣滯漸至血結。左右隧道不行。大便堅秘不爽。當與通絡。此係血枯

炒桃仁 炒五靈脂 延胡 蘇梗

生香附 木香汁 牛夏 薑汁

姚 經閉一年。腹漸大。恐延血壅沉痾。況聚瘕日久。形寒

跗腫。議用大針砂丸。每服一錢二分六服。

金 面無華色。脉右弦左瀼。經阻三月。衝氣攻左脇而痛。

腹時脹。兩足跗腫。是血壅症。勿得小視。

桂枝 茯苓 澤瀉 牡蠣

金鈴子 延胡

吳三經阻兩載少腹堅硬大便不爽不時咯出紫血塊此屬血蠱之象

鮮生地汁錢五 熟大黃錢一 潯桂心分五 老生薑錢

妙桃仁錢三 郁李仁錢一 四服

某經閉腹脹漸成蠱

香附 木香 青皮 烏藥 赤芍

五靈脂 延胡 當歸 鬱金

王二脉右虛左虛弦數腹痛胸膈痞阻冷汗周身刺痛寒慄此屬內損有經閉成勞之事

臨證指南醫案 卷九 調經 桂枝湯加茯苓

又照前方加當歸肉桂

又內損情懷少暢非偏寒偏熱可以攻病方中溫養氣血以使條達非因寒投熱之謂開懷安養為宜勿徒恃

藥繼此可進養營法 歸桂枝去薑加茯苓

潘二經水不來少腹刺痛鳴脹大便不爽心中熱痛食辛辣及酒其病更甚不敢通經姑與甘緩 甘麥大棗湯

某陽升風動眩暈心悸鼻衄經停兩月

生地 阿膠 麥冬 白芍

相子仁 棗仁 茯神 炙草

顧二病起經阻形容日瘦嘈雜刻飢心腹常熱此乃悲惋

離愁內損而成勞陰臟受傷陽脉不流難治之症必得怡悅情懷經來可挽但通經敗血斷不可用

生地 人參 茯苓 沉香汁 琥珀末

陳自經阻寒熱延及浮腫腹膨小溲日少入暮心腹中熱此臟陰已涸腑陽日痺內因怙鬱成勞情志為病當收肅司令而病日加增料難入冬無成法可遵勉擬回

生丹每次服半丸冀通其壅痺氣血漫言治病也

徐三經水久不來寒熱喉痛痺鬱勞藥難取效

清阿膠九雞子黃湯送

董脉數色奪久嗽經閉寒從背起熱過無汗此非瘧邪

臨證指南醫案 卷九 調經

由乎陰陽並損營衛循行失其常度經云陽維為病苦寒熱矣症屬血痺成勞為難治痺阻氣分務宜宣通

生鹿角 川桂枝木 當歸 茯苓

炙草 薑 另回生丹

仲三先因經阻繼以五心煩熱咳吐涎沫食減微嘔面腫色瘁乃肝陽化風旋動不息乾血勞病醫治無益

阿膠 生地 麥冬 牡蠣 小麥

王面色皸白脉來細促久嗽不已減食腹痛便澀經閉半載此三焦臟真皆損乾血勞怯之病極難調治俗醫

見嗽見熱多投清肺寒涼生氣斷盡何以挽回

歸建中湯去薑

尼七少年形色衰奪。側眠咳血。天柱骨垂。經水已閉。皆不治見症。歸建中湯去薑。

某。脈弱無力。發熱汗出。久咳形冷。減食過半。顯然內損。成勞大忌寒涼清熱治嗽。姑與建中法。冀得加穀經行。猶可調攝。

桂枝 五分 生白芍 一錢 炙草 五分 棗肉 三錢

飴糖 二錢 歸身 一錢

程九乾血勞病。百脈枯槁。漸至危篤。三月間診脈一次。當面告辭。余非憤憤醫流。不肯因循誤事。

臨證指南醫案

卷九 調經

三

益母丸早晚服二三錢

某。管虛寒熱。咳血。經閉。

當歸 炒白芍 丹參 棗仁 遠志

茯苓 炙草 廣皮 桂圓肉

顧三潮熱經阻。脈來弦數。管血被寒熱交蒸。斷其流行之機。即為乾血勞。非小恙也。

桂枝 三分 白芍 一錢 阿膠 一錢 生地 三錢

炙草 四分 麥冬 一錢 大棗 仁錢

朱女。冲年天癸未至。春陽升動。寒熱。血平。昔溺後腰痛。耳目甚聰明。先天質薄。陰本難充。易虧。最多倒經之慮。

雄烏骨雞 生地 生白芍 茯神 天冬

知母 牛膝 芩蔚子 女貞子 阿膠

諸藥除阿膠用水煎汁二次。其烏雞去毛及足。另以童便一碗。青蒿汁四碗。醇酒二碗。米醋一碗。同煮。再加入前藥汁。收膏入阿膠。收燉。服五錢。

張十七歲天癸不至。咳嗽失血。乃倒經重症。先以順氣導血。

降香末 鬱金 釣藤 丹皮

蘇子 炒山查 黑山梔

又震動氣衝。咳。噎。失血。

臨證指南醫案

卷九 調經

古

雞子黃 阿膠 鮮生地 天冬

生白芍 炒牛膝

又。脈細數。腹痛。管熱。經不通。

人參 天冬 鮮生地 白芍

丹參 調入琥珀末三分

易曰。乾道成男。坤道成女。女子屬陰。以血為主。故女科治法。首重調經。經常也。如潮汐之有信。如月之盈虧。不愆其期。故曰。經水。又曰。月事。又曰。月信。內經云。太衝脈盛。月事以時下。景岳云。衝為五臟六腑之海。臟腑之血。皆歸衝脈。可見衝脈為月經之本也。然血

氣之化由於水穀。水穀盛則血氣亦盛。水穀衰則血氣亦衰。是水穀之海。又在陽明。可見衝脈之血。又總由陽明水穀所化。而陽明胃氣。又為衝脈之本也。故月經之本。所重在衝脈。所重在胃氣。所重在心脾生化之源耳。心主血。脾統血。肝藏血。凡傷心傷脾傷肝者。均能為經脈之病。內經曰。二陽之病。發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。其傳為息音者。死不治。不得隱曲。言情欲不遂。而病發心脾也。風消者。發熱消瘦。胃主肌肉也。息音者。喘息上奔。胃氣上逆也。此雖言病發心脾。而實重在胃氣。因心為胃之母。胃

臨證指南醫案 卷九 調經

五

為脾之腑也。內經又曰。有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四支清。目眩。時時前後血。病名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來也。治之以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之。九以雀卵。大如小豆。以五丸為後飯。飲以鮑魚汁。利腸中。及傷肝也。此段經文。全重在氣竭肝傷四字。為通節之綱。言胸脇肝部也。支滿肝病也。妨於食。木邪凌土也。病則先聞腥臊臭。脾喜芳香。今脾土為木邪凌虐。病則先聞腥臊。乃肝之旺氣也。出清液。脾虛不能敷化水精也。先唾血。脾

傷不能統運營血也。四肢清。陽衰不能傍達四末也。目眩。陽不充而水上溢於經也。前後血。陰受傷而血內溢於絡也。血枯。內有乾血。血不歸經。而結胞門也。良由年少不禁。氣竭肝傷而致。月事衰少或不來也。治以烏鰂骨四分。取其味鹹走腎。性溫達肝。配以蘆茹一分。取其辛散內風。溫去惡血。二物并合。功專破宿生新。九以雀卵。取其溫補助陽。能調子臟精血。以五丸為後飯者。先藥後飯。使藥徐行下焦。力貴專功。五丸不為少也。飲以鮑魚汁。利腸垢。和肝傷。取其臭穢之味。佐烏鰂骨而辟宿積之血也。金匱要畧言調

臨證指南醫案 卷九 調經

五

經之法甚詳。後世如王節齋薛立齋諸賢。論症透微。用方精切。俱可為程式。茲不具贅。今觀葉先生案。奇經八脈。固屬扼要。其次最重調肝。因女子以肝為先天。陰性凝結。易於拂鬱。鬱則氣滯。血亦滯。木病必妨土。故次重脾胃。餘則血虛者養之。血熱者涼之。血瘀者通之。氣滯者疎之。氣弱者補之。其不治之症。直言以告之。誠一代之良工。女科之明鑑。學者當奉為典型。更能參考內經仲景及諸賢案論。自然學業日進。登峯造極矣。秦天一

淋帶

某 溫邪劫陰。帶下火升。胸痞脉小數。

生地 阿膠 牡蠣 川斛

小麥 茯神

某 陽明脉虛。手麻足冷。身動。帶下如注。用通攝方。

人參 桂枝木 桑螵蛸 生杜仲

歸身 茯苓

又 胸中似冷。熱飲乃爽。照前方去杜仲加白芍炮薑。

陳七色蒼脉數。是陰不足。心中泛泛。即頭暈腹痛。經水仍

臨證指南醫案 卷九 淋帶 七

來。兼有帶下。肝陽內擾。風木乘土。法當酸以和陽。鹹苦

堅陰。

生白芍 細生地 清阿膠 牡蠣

檮根皮 黃柏

又 烏骨雞 生地 阿膠 牡蠣 天冬

白芍 白薇 杜仲 川斷 湖蓮

蔞 帶下不止。少腹內躁。連痛。至不能伸縮。絡脉不宜。最

有結瘕綿纏。不可不慮。醫云肝氣。豈有是理。

桂枝 生沙苑 遠志 當歸

鹿角霜 杞子 茯苓 此方不切病

液稠 動 帶淋日久。脂液垂涸。奇脉俱傷。營衛亦偏。內風自動。

則中焦氣奪。浮腫腹膨。為寒為熱。皆以鹹緩和平。

阿膠 牡蠣 茯苓 柏子霜 郁李仁

袁 舌光赤。頭脹身熱。帶下如注。此五液走泄。陽浮熱蒸。

當用攝劑。若與鹿角霜沙苑。仍是升舉動陽。則無效矣。

熟地炭 阿膠 芡實 茯神

湖蓮肉 炒山藥

又 照前方去阿膠山藥加桑螵蛸莖肉炭。

吳 崩帶淋漓。陰從下走。暈厥汗出。陽從上冒。逢穀雨暴

凶。身中陰陽不相接續。相延虛脫。戊亥時為劇。肝腎病

臨證指南醫案 卷九 淋帶 六

治。

人參 阿膠 生龍骨 生牡蠣

五味 茯神

又 血液去則臟陰失守。神不內附。致目中妄見。非鬼祟

也。當先鎮陽神為主。若驟用陰藥。則有妨胃納矣。

人參 龍骨 五味 茯苓

芡實 建蓮肉 常用心經藥

又 淋帶黃白未淨。五更心悸汗出。

人參 炒枸杞 五味 茯苓

芡實 湖蓮肉

某五脉左細前用通補據述痛起得按痛緩八脉空虛然捨此補養恐反增劇矣

當歸 烏賊骨 紫石英 杜仲

杞子 柏子仁 沙苑 茯神

某女科病多倍於男子而胎產調經爲主要淋帶瘕泄奇脉虛空腰背脊脊牽掣似墜而熱氣反升於上從左而起女人以肝爲先天也醫人不曉八脉之理但指其虛剛如桂附柔如地味皆非奇經治法先以震靈丹固之每服一錢五分

又淋帶瘕泄諸液耗必陰傷此參附薑桂劫陰不效而

臨證指南醫案 卷九 淋帶 五

膠地陰柔亦不能效蓋脉隧氣散不攝陰藥沉降徒損其滑耳必引之收之固之震靈丹意通則達下清則固下惟其不受偏寒偏熱是法效靈矣後方常用

人參一錢 鹿角霜一錢 沙苑一錢 桑螵蛸三錢

炒杞子一錢 茯神三錢 炙草五分

方九 人參二兩隔 麋茸二兩切 出兔絲子二兩

淡補骨脂一兩 生紫石英一兩 生餘糧石二兩

茯苓一兩 炒黑小茴五錢 炒黑遠志五錢

晚服妙香三錢

姚三自乳血耗脉絡空豁脊脊椎體痠痺帶下不已問下

部已冷陰虛及陽速速斷乳不致延勞

人參 鹿角霜 枸杞 桑螵蛸殼

杜仲 茯苓 沙苑 白薇

徐四經漏成帶下焦畏冷眩暈肝臟陽升八脉空乏

當歸 炒白芍 炒黑枸杞 杜仲

海螵蛸 炒沙苑

楊七寡居獨陰自多愁煩思鬱加以針疔目注凝神陽上巔爲眩暈八脉無氣自帶下下冷內風日動癰疹麻木常爲隱現以緩下柔劑和其陰陽可得小效

製首烏 三角胡麻 枸杞 甘菊花炭

臨證指南醫案 卷九 淋帶 三

用紅棗搗丸早上服四錢

王七產後漏淋成帶入暮溺頻不爽驚恐神呆骨節盡痛是肝腎內損漸及奇經不司束固是產後虛在下甘辛潤補肝腎不與燥藥以腎惡燥肝忌剛也

枸杞子 炒黑 鹿角霜 歸身 兔絲子 炒香

生杜仲 沙苑子 茯苓 補骨脂 鹽水煎

某少腹拘急大便燥艱淋帶赤白此屬液涸

肉苁蓉 枸杞子 河車 當歸

柏子仁 郁李仁

又淋帶年久少腹拘急脹痛漫不爽大便艱澀得泄氣

則脹寬食物少納腕中不降必撫摩始下此病久藏陰腑陽皆傷熱藥難受以通陽固陰兼之

服早
人參 歸身 炒杞子 茯苓

鹿茸 河車 暮服震靈丹二十粒

帶下者由濕痰流注於帶脉而下濁液故曰帶下婦女多有之若者屬寒虛無火治之白者屬濕兼虛兼痰治之年久不止補脾腎兼升提大抵瘦人多火肥人多痰最要分辨白帶白濁白淫三種三者相似而迥然各別白帶者時常流出清冷稠粘此下元虛損也白濁者濁隨小便而來渾濁如甘此胃中濁氣

臨證指南醫案 卷九 淋帶 三

滲入膀胱也白淫者常在小便之後而來亦不多此男精不攝滑而自出也至於淋症由腎虛膀胱積熱所致腎虛則小便數膀胱熱則小便澀淋有氣血砂膏勞五者之殊皆屬濕熱氣淋為病小便澀滯常有餘瀝不盡血淋為病遇熱即發甚則溺血痛者為血淋不痛者為尿血砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止是也膏淋為病溺濁如膏敗精結者為砂精結散者為膏又煮海為鹽之義勞淋過勞即發痛引氣衝大約帶病惟女子有之淋濁男女俱有景岳云婦人淋帶其因有六一心旌搖心火不

臨證指南醫案 卷九 淋帶 三

靜而帶下者先當清火宜硃砂安神丸清心蓮子飲之類若無邪火但心虛帶下宜秘元煎人參九茯苓丸之類一慾事過度滑泄不固而帶下者宜秘元煎苓朮芩絲丸濟生固精丸之類一人事不暢精道逆而為濁為帶者初宜威喜丸久宜固陰煎之類一濕熱下流而為濁帶脉必滑數煩渴多熱宜保陰煎加味逍遙散若熱甚兼淋而赤者宜龍胆瀉肝湯一元氣虛而帶下者宜壽脾煎七福飲十全大補湯若陽氣虛寒脉微清腹痛多寒宜加姜附家韭子丸一脾腎氣虛下陷多帶者宜歸脾湯補中益氣湯之類已

上淋帶辨症論治彷彿已備語云鴛鴦綉出從君看莫把金針度與人若求金針暗度全憑葉案搜尋素天

崩漏

徐三肝脾鬱損血崩 人參逍遙散去柴胡炙甘草加

蚰杜仲 常用五葉

某經漏不止久風餐洩

人參 一味補虛大效

木瓜 炒烏梅

赤石脂 餘糧石

翼脈數寒熱汗出腹脇痛病起經漏崩淋之後是陰傷

陽乘消渴喜涼飲不可純以外邪論和營衛調中甘緩
主治

臨證指南醫案 卷九 崩漏

當歸 白芍 淮小麥 炙草

南棗 茯神

奇脈虛血帶 文五產育頻多衝任脈虛天癸當止之年有紫黑血如豚

肝暴下之後黃水綿綿不離三年來所服歸脾益氣但

調脾胃補虛未當齒及奇經為病論女科衝脈即是血

海今紫黑成塊幾月一下必積貯之血久而瘀濁有不

得不下之理此屬奇經絡病與臟腑無與考古云久崩

久帶宜清宜通做此為法

柏子仁 細生地 青蒿根 淡黃芩

澤蘭 槲根皮 接服斑龍丸

張五旬天癸當止而經淋周身牽掣右肢漸不能舉不
但衝任督帶損傷陽明胃脈衰微少氣乃最難向安之

病

人參 生黃芪 炙草 炒沙苑

炒杞子 炒歸身

朱崩漏兩年先有帶下始而半月發病今夏季每交申

酉其漏必至思下午為陽中之陰陰虛陽動衝脈任脈

皆動下無隄防約束夫奇經肝腎主司為多而衝脈隸

於陽明陽明久虛脈不固攝有開無闔矣醫但以瀉劑

圖旦夕苟安未及按經論病宜毫無一效

臨證指南醫案 卷九 崩漏

海螵蛸 鮑魚 茜草 生菟絲子

石殼廣蓮肉 接服烏賊魚骨丸

顧髓虛崩淋不止筋掣痛不能行

菴蓉 枸杞 柏子仁 茯神

川斛 紫石英 羊內腎 青鹽

成衝任二脈損傷經漏經年不痊形瘦膚乾畏冷由陰

氣走乎陽位益氣以培生陽溫攝以固下真

人參 鹿角霜 歸身 斷艾炭

茯神 炮薑 紫石英 桂心

張三經漏十二年五液皆涸衝任不用冬令稍安夏季病

加心搖動。腹中熱。腰膝附骨皆熱。此皆枯槁日著。方書謂暴崩宜溫。久崩宜清。以血去陰耗耳。

人參 生地 阿膠 天冬 人乳粉

柏子仁 茯神 棗仁 白芍 知母 九蜜

張 固本補衝任。涼肝寧血丸方

人參 二兩 生地 二兩 阿膠 二兩 白芍 二兩 茯苓 二兩

鮮河車膠 一兩 石穀建蓮肉 兩 二膠如少可加蒸

熟山藥搗漿為丸。早服四錢。參湯送。晚服二錢。

沈 天癸當止之年。經來淋漓不絕。乃陰衰陽動。入秋深。

夜寐甚少。汗泄四肢胸臆。夫衝脉隸於陽明。其氣行乎

臨證指南醫案 朱九 崩漏

身。陽明脉空。陽越衛疎。陰火升舉。當宗丹溪補陰丸。

或虎潛丸之屬。久病投湯太過。恐妨胃耳。

每早服丹溪補陰丸四錢 十服

黃 長齋有年。脾胃久虛。瘧由四末必犯中宮。血海隸於

陽明。苦味辛散皆傷胃系。雖天癸久絕。病邪藥味擾動

血絡。是為暴崩欲脫。醫者使阿膠味鹹潤滑。大便溏

瀉。豈宜潤下。即熟地五味補飲陰液。咽湯停脘。填欲吐

淨。滋賦酸濁之藥。下焦未得其益。脘中先已受戕。議以

仲景理中湯。血脫有益氣之法。坤土陽和旋轉。喜其中

流砥柱。倘得知味納穀。是為轉機。重症之尤。勿得忽視。

理中湯

某 停經三月。下漏成塊。少腹膨痛。議通和奇脉。

鹿角霜 生杜仲 桂枝木 生沙苑

當歸 茯苓 紅棗

肝腎虧 羅二 病屬下焦。肝腎內損。延及衝任奇脉。遂至經漏淋漓。

腰脊痠弱。脉絡交空。有終身不得孕育之事。

製熟地 砂仁 河車膠 當歸 白芍

人參 茯苓 於朮 炙草

斷艾炭 香附 小茴 紫石英

液陽經 陳五 五旬年歲。經漏如崩。繼以白帶綿綿。昔形充。今瘦損。

臨證指南醫案 朱九 崩漏

當年飲酒濕勝。大便久瀉。自病經年。便乾不爽。夜熱多

汗。四肢皆冷。氣短腹鳴。上噫氣。下泄氣。腰足跗酸。與無

力。食物日減。不知其味。此陽明脉衰。厥陰風木由乎血

去液傷。衝任交損。內風旋轉。而為風消之象。病在乎絡。

故令久延。金匱謂絡熱則痿矣。

人參 黃芪 苦參 茯神

牡蠣 小麥 濾清入參湯收

張 外冷內熱。食過如飢。唇燥裂。渴飲下漏。漏多則陰虛

陽亢。便溏不實。不可寒潤。

生地炭 阿膠 炒白芍 湖蓮

榜根皮

扶神

蘄艾炭

又消渴心悸

阿膠

生雞子黃

生地

天冬

生白芍

扶神

胡心痛如飢口吐涎涎沫值經來甚多因驚動肝陽

化內風欲厥之象治以鹹苦佐以微辛使入陰和陽

阿膠二錢

牡蠣三錢

川棟子一錢

小川連三分

川芎二分

當歸一錢

又和陽固陰諸病大減因經漏陰傷陽易浮越心怔悸

肢末痛內風未熄藥以甘柔使胃汁日充則砥柱中流

臨證指南醫案卷九崩漏

王

矣

人參

阿膠

麥冬

生白芍

炙草

扶神

邱四經漏成帶年餘醫療無功乃衝任督帶交病古稱久

帶久崩宜清視其體豐鬆與陽氣久虧與內經血脫方

法烏鯽魚丸鮑魚汁丸

又照前方加阿膠人中白

某經漏三年診色脈俱奪面浮跗腫肌乏華色納穀日

減便堅不爽自脊脊腰膝痠楚如墮入夏以來形神日

羸思經水必諸路之血貯於血海而下其不致崩決注

滴者任脈為之擔任帶脈為之約束剛維躡脈之擁護

督脈以總督其統攝今者但以衝脈之動而血下諸脈

皆失其司症固是虛日餌補陽不應未達奇經之理耳

考內經於胸脇支滿妨食時時前後血特製烏鯽丸鹹

味就下通以濟瀉更以穢濁氣味為之導引同氣相需

後賢謂暴崩暴漏宜溫宜補久漏久崩宜清宜通正與

聖經相符況乎莖木皆守不能入奇脈無病用之誠是

好藥藉以調病焉克有濟夏之月大氣正在泄越脾胃

主令歲氣天和保之最要議以早進通陰以理奇經午

餘天熱氣泄必加煩倦隨用清暑益氣之劑順天之氣

臨證指南醫案卷九崩漏

天

以扶生生安穩百日秋牛收肅令行可望其藏聚氣交

而奇絡漸固此久損難復非倖試速功矣早上湯藥

議以通陰潛陽方法早服

龜甲心 秋石 鹿角霜

真阿膠

柏子霜

生牡蠣

鎖陽

另煎清人參湯入清藥煎

取五十沸用藥匙百以匙又延偏桂之藥所招以

鹿性陽入督脈龜體陰走任脈阿膠得濟水沉伏味

鹹色黑熄肝風養腎水柏子芳香滑潤養血理燥牡

蠣去濕消腫鹹固下仲景云病人腰以下腫者牡蠣

澤瀉湯鎖陽固下焦之陽氣乃治八脈之大意

烏鰂丸方

烏鰂骨四分 米醋炙去甲 另研水飛 蔥茹一分

右爲細末用雀卵量搗爲丸每服三錢用藥煎先飲

淡鮑魚湯一小杯爲導引

又 進潛陽頗投但左耳鳴甚腸中亦鳴肝陽內風升動

未息減氣剛用柔 早服

龜甲心 照前製 眞阿膠 柏子霜 天冬

女貞實 早蓮草 另煎人參湯二錢加入濾

清藥內再煎五十餘沸

又 兩進柔潤清補頗投詢知病由乎悲哀煩勞調理向

臨證指南醫案 卷九 崩漏 无

愈繼因目病服苦辛寒散太過遂經漏淋帶年前七八

日始淨今則兩旬而止此奇脉內乏前議非誣據述周

身累現癰疹痞癰搔癢不寧想脂液久滲陰不內營陽

氣浮越衛怯少固客氣外乘凡六淫客邪無有不從熱

化內經以瘡疥諸病皆屬於火然內症爲急正不必以

肌腠見病爲治刻下兩三日間又值經至之期議進固

脉實下佐以東垣瀉陰火意經至之先用此方

龜甲心 眞阿膠 人參 桑螵蛸 生白龍骨

早蓮草 茯神 知母 早上服

又 當經行周身寒凜腰痠腹膨白疹大發議用固氣和

血方

人參 非珍藥 熟地 阿膠 川芎 當歸

白芍 南山查 斷艾 早上服

又 經來腹墜腰痠疹現肌癢鼻孔耳竅皆然想陰血下

注必陽氣鼓動內風沸起風非外來乃陽之化氣耳昨

因經至用膠艾四物湯和補固經今午診脉右大而瀉

左小數中有堅痰如刃之象洵平液枯風動初定烏鰂

魚丸當進其早上湯藥凡氣味之辛裁去雖爲補劑勿

取動陽耗液也 早上服

人參 生地 天冬 阿膠 生白芍

臨證指南醫案 卷九 崩漏 三

女貞子 早蓮膏 地榆 早上服

又 兩日早進清補柔劑夕用通固下焦衝任是月經來

甚少起居頗安與先哲云暴崩當溫瀉久漏宜宣通若

合符節矣連次候脉必小弱爲少安則知陽動不息因

風必流芪木呆守歸艾辛溫守則氣壅辛則陽動皆不

知變化之旨坐失機宜耳余未能久候焉有經年經月

之恙驟期速愈故丸藥創自內經七方之一世多渺忽

實出軒岐秘奧再議理陰虛風早用諒不致誤

擬長夏調理二法

晚服烏鰂丸三錢晨進養肝陰和陽熄風以安胃蓋

衝脉卽血海。隸於陽明胃脉。乃做經育立方

人參 阿膠 白芍 生地 旱蓮膏

女貞子 桑寄生 鹹秋石 細子芩 三角胡麻

藥末膠膏再加熟蜜三兩搗千餘杵九宜細光早上服四錢小暑至處暑生脉散送

又 此番經後帶下仍有久漏奇脉少固前案申說已著九劑尙司通攝衛任恪守定然必效。但外來寒暄易禦內因勞嘆難調余諄諄相告者爲此

人參 生地 阿膠 白芍 茯神

女貞子 旱蓮膏 小黑稽豆皮 早上服 初十日

臨證指南醫案

卷九 崩漏

三

又 昨晚煩冗陽動氣升頭額震痛經再下注更定鎮攝一法久後亦可備用

人參 生地 阿膠 龜甲心

生牡蠣 天冬 黑殼建蓮

又 十二日午診脉仍用初十日早服方法去稽豆皮加生牡蠣

交小暑後驟熱午後另煎生脉散微溫服一次

盧 停經牛載雨水節後忽然暴崩交春分節血止黃白淋漓自下寒則周身拘束熱時煩燥口乾晡至天明汗出乃止寐必身麻如虫行四肢骨節皆痛蓋血既大去

衝任之脉傷損而爲寒爲熱陰損及乎陽位矣書云崩

中日久爲白帶漏下多時骨髓枯由脂液蕩盡致形骸枯槁延爲瘵疾矣天熱氣燥所當謹慎

烏賊骨 阿膠 生地 生白芍

茜草 小麥

程 暴冷陽微後崩 附子理中湯

崩如山冢罕崩言其血之橫決莫制也漏如漏卮難塞言其血之漫無闕防也經云陰在內陽之守也氣得之以和神得之以安毛髮得之以潤經脉得之以行身形之中不可斯須離也去血過多則諸病叢生

臨證指南醫案

卷九 崩漏

三

矣原其致病之由有因衝任不能攝血者有因肝不藏血者有因脾不統血者有因熱在下焦迫血妄行者有因元氣大虛不能收斂其血者又有瘀血內阻新血不能歸經而下者醫者依此類推做葉氏用筆靈活於崩漏治法無餘蘊矣 秦天一

胎前

秦七經停三月無寒熱診脉大係惡阻減食

細子芩 知母 蘇梗 砂仁

橘紅 當歸 生白芍

方九 細子芩 蘇梗 砂仁 五錢 白芍 一兩

熟白朮 當歸 青葙湯法丸

某 懷妊將三月肝氣攻衝脇痞嘔吐紅痰

細條芩 生白芍 川棟子 瓜蒌皮

半夏 橘紅 竹茹 生薑

臨證指南醫案 卷九 胎前 三

程二 頑胎每三月是肝虛 亦是血旺

人參 阿膠 當歸 白芍

川芎 桑寄生

錢九 上年夏產過月經轉今經停四箇月左脉弦滑流動

乃為妊象此氣急腕痛咳嗽熱氣上乘迫肺之徵形肉

日瘦熱能燦陰耗氣議清金平氣勿碍於下

桑葉 川貝 桔梗 廣皮

黑山梔 地骨皮 茯苓 甘草

楊 血液僅僅養胎春陽升舉上焦易燥喉膈心嘈皆液

虧陽元

胃虛咳

鮮生地 茯神 白扁豆 立參心 川斛

謝 始而熱入陰傷少腹痛溺不爽秋暑再傷霍亂繼起

今不飢不食全是胃病况懷妊五月胎氣正吸脾胃真

氣津液重傷致令咳逆

人參 知母 炒麥冬 木瓜

蓮子肉 茯神 炒白朮 諸胃氣

金 懷妊五月得熱病久傷陰液身中陽氣有升無降耳

竅失聰便難艱澀議用仲景復脉法以生津液

炙甘草 人參 生地炭 阿膠

天冬 麥冬 生白芍 麻仁

臨證指南醫案 卷九 胎前 三

某 懷妊百日丙丁養胎胎熱從戌亥時升耳前赤癰刺

痛當養陰制火

細生地 茯神 生白芍 建蓮

桑葉 鉤藤

某 脉石虛左弦身麻肢冷胎冲脹悶五六月當脾胃司

胎厥陰內風暗動不飢吞酸全屬中虛

人參 枳殼 半夏 薑汁 桔梗

胡 懷妊六月陽明司胎閃動絡脉環跳痛連腰臂最防

胎氣

歸身 桂枝木 炒杞子 炙草

熱氣滯血		肝風		陰陽肺	
羊腰骨 白茯苓		某 氣逆壅熱於上 齟齬喉痹 胸悶腹脹 七月太陰司胎 法宜宣化清上		王 先寒後熱 咳嗽是春月風溫肺病 風為陽邪 溫漸變 熱客氣着人 卽日時氣 懷妊九月 足少陰腎脉養胎 上 受熱氣肺 喘急消渴 胸滿便溺不爽 皆肺與大腸為 表裏之現症 狀若繪矣 芎歸辛溫 參朮守補 肉桂沉香 辛熱皆胎前忌用 致大熱煩悶 勢屬危殆 議以清肺之	
川貝	牛蒡子 連翹 蘇梗	杏仁	花粉 菊花 橘紅	又 肝風眩暈 麻痺少寐 熱首烏 炒黑杞子 白芍 女貞子	扶神 黑稻豆皮
汪 娠八月 胎動不安 脫悶不飢 宜涼血調氣 可以安適	黃芩 知母 橘紅 生白芍	當歸 砂仁	程 娠八月 形寒氣逆 神煩倦無寐 乃肝陽乘中之徵 擬 進熄風和陽法	臨證指南醫案 卷九 胎前 重	黃芩 當歸 生白芍 生牡蠣
橘紅 茯神		又 肝風眩暈 麻痺少寐 熱首烏 炒黑杞子 白芍 女貞子		王 先寒後熱 咳嗽是春月風溫肺病 風為陽邪 溫漸變 熱客氣着人 卽日時氣 懷妊九月 足少陰腎脉養胎 上 受熱氣肺 喘急消渴 胸滿便溺不爽 皆肺與大腸為 表裏之現症 狀若繪矣 芎歸辛溫 參朮守補 肉桂沉香 辛熱皆胎前忌用 致大熱煩悶 勢屬危殆 議以清肺之	

熱邪		熱邪		熱邪	
急潤肺之燥 俾胎得涼則安 去病身安 自為不病之		古人先治其實 實者邪也		某 惡風木欲惡心厭食 今夾時邪 頭痛身熱 當先清熱	
泡淡黃芩 知母 鮮生地 花粉	阿膠 天冬	又 喘熱減半 四肢微冷 腹中不和 胎氣有上冲之慮 昨 遇清潤之方 藥藥有汗 可見辛燥耗血 便是助熱 今煩 渴不止 問初病由悲哀驚恐之傷 養肝陰 滋腎液 為治 穩保胎元 病體可調	復脉去桂 麻黃加天冬 知母子苓	朱 脈石濇小數 左弦促 納食既勝 常有甘酸渴味 微嘔	臨證指南醫案 卷九 胎前 美
金石斛 黑山梔 茯苓 半夏麴	橘紅 竹茹 枳實	又 吐清涎 旬朝始一更衣 仍不通爽 詢知病起情懷抑鬱 由氣鬱化熱 如內經五志過極 皆從火化 就懷妊惡阻 按徐之才 逐月安養 亦在足少陽經 正取清熱養胎 治 胎阻相火內寄 非涼劑無以和平 古人治病 以偏救偏 幸勿畏虛 以貽患	花柳 蘇梗	竹葉 連翹 生甘草 黃芩	花柳 蘇梗

<p>某 交節上吐下瀉。沉胎動不安。脉虛唇白。急用理中法。</p> <p>附子 人參 於朮 茯苓 白芍</p> <p>周 病中懷妊泄瀉。</p> <p>焦朮 炒白芍 炒黃芩 炒廣皮</p>	<p>金 懷妊若思時症。古人謂在保胎。今者喜懷惡寒。升則厥痛。陰微便痛。逆腹。暖胎須避絡傷。以及奇脉畏慮胎墜。難挽。辛香溫柔之補。冀其止厥。</p> <p>鹿角霜 淡從蓉 炒杞子 柏子仁</p> <p>當歸 炒沙苑 炒大茴 茯苓</p>	<p>某 固護胎元。諸症俱減。惟心嘈覺甚。陰火上升。營虛之微。</p> <p>臨證指南醫案 卷九 胎前 三</p> <p>人參 桑寄生 熟地 阿膠 絲綿灰</p> <p>條芩 白芍 當歸 茯苓 香附</p>	<p>某 懷妊痢滯。半月。胃陰既虧。陽氣上逆。咽中阻。飲水欲噦。舌尖紅赤。津液已耗。燥補燥劫。恐陰愈傷。而胎元不保。議益胃和陽。生津治之。</p> <p>熟地 烏梅 白芍 山藥</p> <p>建蓮 茯苓 用川石斛煎湯代水</p>	<p>潘 血液護胎。尚且不固。心中如飢空洞。食不能納。況又戰慄嘔逆。凡內外搖動。都是動胎。從來有胎而病外感。</p>
--	--	---	--	--

<p>麻桂硝黃等劑。必加四物。是治病保胎第一要法。</p> <p>小生地 白芍 阿膠 知母</p> <p>黃芩 青蒿梗</p>	<p>王 臨月下痢膿血。色紫形濃。熱伏陰分。議用白頭翁湯。苦味見效。知溫熱動血。以小其製為劑。可全功矣。</p> <p>黃芩 黃柏 炒銀花 炒山查</p> <p>茯苓 澤瀉</p>	<p>某 胎漏鼻衄。發疹而喘。</p> <p>淡黃芩 真阿膠 青芩</p> <p>某 觸胎下血。腹痛而墜。</p> <p>臨證指南醫案 卷九 胎前 三</p> <p>人參 炒白芍 炙草 廣皮 熟地炭</p> <p>炒砂仁末 加紋銀一二兩青芩二兩</p>	<p>又 照前方去熟地加炮薑熟木</p> <p>又 人參 熟地 炒歸身 炒白芍</p> <p>炙草 茯神 廣皮 炒砂仁</p> <p>陸 八形瘦。脉數尺動不食。惡心證象惡阻。腰痛見紅。為胎漏欲墜。</p> <p>青芩 二錢 建蓮 五錢 紋銀一兩 砂仁七分 白糯米一錢</p>	<p>某 三月胎漏。用固下益氣。</p> <p>人參 熟木 熟地 阿膠</p>
---	--	--	---	---

下殯胎不

白芍

炙草

砂仁

艾炭

華

血下殯胎未下濁氣擾動暈厥嘔逆腹脹少腹硬二

便窒塞不通此皆有形有質之阻若不急為攻治則瘀

川芎

當歸

芒硝

芫花子

大腹皮

青皮

黑豆皮

調回生丹

程

懷妊八月子腫腹漸墜正氣虛弱補劑必須理氣預

為臨產之算

人參

茯苓

廣皮

大腹皮

蘇梗

砂仁末

臨證指南醫案

卷九 胎前

氣

易曰大哉乾元萬物資始此言氣之始也又曰至哉

坤元萬物資生此言形之始也人得父母之氣以生

氣生形即稟此乾坤之氣也兩儀既兆五行斯彰故

天一生水水屬腎腎臟先生地二生火火屬心火又

次生天三生木木屬肝肝又次生地四生金金屬肺

肺又次生天五生土土屬脾脾又次生天既以五行

生五臟而仁義禮智信之五德亦即寓於其中朱夫

子所云天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦

賦焉此之謂也因此古人重胎教所以端其本也而

今不復講矣然六淫之感七情之傷妊婦稟氣有強

弱小兒胎元有醇躁故安胎之法不可不詳如惡阻

胎淋胎暈胎腫胎懸及漏胎等症古人言之甚晰茲

不具贅今閱葉先生案胎前大約以涼血順氣為主

而肝脾胃三經尤為所重因肝藏血血以護胎肝血

失榮胎無以蔭矣肝主升肝氣橫逆胎亦上衝矣胎

氣繫於脾如寄生之托於苞桑為與女蘿之施於松

栢脾氣過虛胎無所附墮滑難免矣至於胃為水穀

之海妊婦全賴水穀之精華以養身護胎故胃氣如

兵家之餉道不容一刻稍緩也其餘有邪則去邪有

火則治火陰虛則清滋陽虛則溫補隨機應變無所

執者學者更能引而伸之觸類而通之安胎之法可

一以貫之無餘蘊矣 秦天一

臨證指南醫案

卷九 胎前

罕

產後

欽 初產汗出眩暈胸痞腹痛宜通惡露

炒山查 延胡 鬱金 赤芍 炒牛膝

香附 童便 益母草湯代水

又 腹痛少緩但胸痞痰多治從上焦

炒山查 鬱金 丹參 橘紅

炒川貝 甜花粉

程 衝脈為病男子內結七疝女子帶下癥聚故奇脈之

結實者古人必用苦辛和芳香以通脈絡其虛者必辛

臨證指南醫案 卷九 產後 聖

甘溫補佐以流行脈絡務在氣血調和病必全愈今產

後體虛兼瘀而痛法當益體攻病日期已多緩治為宜

生地 生薑 丹皮 琥珀末 調入

此苦辛偶方加丹皮以通外琥珀以通內所以取效

又 回生丹 取乎醋煮大黃一味約入病所不礙無

病之所故亦效二法皆入絡藥

又 小生地 歸鬚 紅花 郁李仁 柏子仁

伏神 又照前方去紅花郁李仁加澤蘭

某二惡露淋漓痛由腰起攻及少腹此督帶空虛奇經氣

阻奚疑奇經為病通因一法為古聖賢之定例

當歸 查肉灰 炒丹皮 澤蘭

川斷 製首烏

唐 產後脫胎參附急救是挽陽固氣方法但現在陰分

其頭痛汗出煩渴乃陽氣上冒心開池貼傷陽幸熱則

傷陰俱非新產鬱閉之治道嘗讀仲景書明本草意為

是擬方於後亦非杜撰也

生左牡蠣 生細生地 上阿膠 炒黑查肉

芫蔚子 錢

吳 新產陰氣下泄陽氣上冒日晡至戌亥陽明胃衰厥

陰肝橫肝血無藏氣衝擾膈致心下格拒氣于膈中神

臨證指南醫案 卷九 產後 聖

亂昏譫若惡露衝心則死矣焉有天明再醒之理回生

丹酸苦直達下焦血分用過不應諒非瘀瘕想初由汗

淋發熱凡外感風邪邪滯汗解此熱昏亂即仲景之新

產鬱胃也倘失治必四肢牽掣如驚似風癇則危議從

亡陽汗出諸語例用救逆法

生龍骨 生牡蠣 桂枝 淮小麥

炙甘草 南棗 杏仁

又 氣從湧泉小腹中直冲胸臆而心下痛蠱蠱神迷此

肝腎內怯無以收納自固每假寐必魂魄飛越驚恐畏

懼非止一端救逆法鎮陽頗應但少補虛寧神益之固

之耳

人參 二錢 龍齒 三錢

棗仁 三錢 茯神 三錢

炒黑杞子 二錢 黑殼建蓮肉 五錢

用紫石英一兩搗碎

水三盞煎減半用以煎藥

又兩法皆效下元虛損無疑入脉無氣把握帶下淋漓

不止夢遺跌仆正經音下虛則夢墜也議鎮固奇脉方

人參 二錢 龍齒 三錢

棗仁 三錢 茯神 三錢

桑螵蛸 二錢 炒黑蓮志 五錢 用紫石英煎湯煎藥

又昨午憂悲嗔怒大便後陡然頭暈繼以嘔逆胸痞止

心洞嘈雜仍不能食子夜寒戰鼓慄寅刻津津微熱神

臨證指南醫案 卷九 產後

望

昏妄見顛痛乳脹腹鳴短氣呵欠似乎歎息之聲此乃

下元根蒂未堅偶觸心機諸陽神飛旋動舞仲景論先

厥後熱知飢不能食乾嘔列於厥陰篇中蓋危病初效

未沾水穀精華則胃土大虛中無砥柱俾厥陰風木之

威橫冲震蕩一如釋典混沌劫於地水大風卒來莫禦

矣當此醫藥全以護陽固陰但血舍耗涸剛猛及滋膩

總在難施之例無暇理病存體為要

人參 五錢

熟附子 一錢

川桂枝木 一錢 炮薑炭 一錢

炙黑甘草 五錢 茯苓 三錢

沈 此產後陰虛瘧疾鼻燥喉燥舌乾脰痞不飢大便窒

塞不通乃陽明津枯不上供肺下少滋腸風陽游行面

腫耳聾仲景謂陰氣先絕陽氣獨發後人以飲食消息

取義甘寒則知辛溫逐瘀之謬

人參 炒麥冬 棗仁 烏梅肉

蜜水炒黃知母

又酸味泄肝胃氣乃降大便通後汗大出心中刺痛皆

營液內耗陽氣衝突仲景三病之鬱胃見端矣雖痰吐

咯無苦燥耗氣之理

人參 阿膠 生地 麥冬

生白芍 炙草

臨證指南醫案 卷九 產後

望

張 產後鬱胃汗出潮熱腹痛

炒生地 炒山查 丹參 茯神

浮小麥 黑糯米皮

吳 產後十二朝先寒戰後發熱少腹疔痛腹膨滿下部

腰肢不能轉側伸縮小溲澀少而痛此敗血流入經絡

延及變為瘍症議用交加散

小生地 生薑 車前 牛膝

五靈脂 炒查肉 調入琥珀末一錢

又十六朝諸症稍減每黃昏戌亥時衝氣自下而上至

胸中即脹悶肢冷汗出右腹板實此厥陰肝臟因驚氣

逆今惡露未清。重鎮酸斂。均為暫忌。擬和血調血為穩。		歸紫	炒桃仁	延胡	炒查肉
又		官桂	香附	川棟	小茴
又		人參	當歸	白芍	炙草
又		茯神	香附	桂心	廣皮
程		脈濡惡露紫黑。惡露緊按。此屬絡虛。治在衝任。			
以辛甘理陽。		炒歸身	炒白芍	當歸	其有火者去
小茴		杜仲	肉桂	茯苓	
又		脈濡空大。營絡虛冷。			
臨證指南醫案		卷九	產後	聖	
人參		炒歸身	炒白芍	茯神	
炙草		桂心			
又		當歸羊肉湯加茯苓茴香			
許		產後陰虛。肝風動。喉乾。喘咳。晚則頭暈。			
阿膠		細生地	天冬	茯神	
小麥		川斛	宜和風藥		
程		坐蓐過勞。肝風陽氣動。而浮氣短。腹脹。惡露未清。不			
可膩滯須防痙厥。		小生地	丹參	澤蘭	茯神
黑檀豆皮		琥珀末			

又		血分既虧。風陽動泄。汗出心悸。此辛氣走泄。須忌所			
慮。痙厥如已見。端識靜藥和陽意。		阿膠	雞子黃	細生地	生牡蠣
丹參		茯神			
某		產後下焦陰虧。奇脈不固。陽浮乃升。風動則發。滑			
雜液損必消渴。骨熱治在肝腎。靜藥固攝。		熟地	潮蓮	炙草	五味
芡實		山藥	旱蓮	女貞	
某		新產後陰分大虛。汗出。胸痞。潮熱。陽浮。衛不固。雖			
多咳。頻忌用苦辛。表散。恐久延蓐勞耳。		臨證指南醫案	卷九	產後	聖
炒生地		炒麥冬	生扁豆	炙草	
金石斛		丹參	茯神	甘蔗漿	
某		產後身痛。少腹滿。			
查肉		川芎	醋炒	延胡	醋炒
艾葉		小茴	香附	醋炒	茯苓
又		當歸	桂心	茴香	香附
又		當歸	桂心	茴香	香附
孫		產難。傷力。驚恐。面微浮。腹脹。小便不爽。			
炒黑查肉		大黑豆皮	大腹皮	生香附	
茯苓		澤瀉	白花益母草	前湯代水	

金 服脹氣滯久瀉產後五日

於木 厚朴 茯苓 澤瀉

南山查 延胡

凌 一歲四氣之交夏季發泄為甚凡夏至一陰初復未

及充盈恰當產期為陰氣未充先泄暑熱乘隙內侵正

如內經最虛之處便是容邪之處矣產科未明此旨徒

曉產後逐瘀成藥苦辛破血津液愈劫所伏暑熱無由

可驅六氣客邪內迫臟腑漸漸蒙內閉攻熱害正養

正邪留藥難立方調治功讀仲景揣摩聖訓惟育陰可

以除熱況乎暑必傷氣人參非益氣之聖藥乎大隊陰

臨證指南醫案 卷九 產後 聖

藥佐以人參誠為陰分益氣之法服之熱癰壘壘而起

惡露緩緩而下扶正却邪並行不悖今穀食已安諒無

反覆難成易虧之陰須安養可望圖功倘加情志感觸

輕則奇損帶淋重則髓枯虧損莫道贈言之不詳也

雄烏骨雞一隻人參二兩秋 鮮生地三兩 柏子仁一兩

天冬一兩 麥冬二兩 阿膠二兩 建蓮肉三兩

秋神二兩 熬膏

項 初病舌赤神煩產後陰虧暑熱易深入此亟清營熱

所謂瘦人慮虛其陰

竹葉 細生地 銀花 麥冬

玄 通

張 產後十三朝舌黃赤口渴脫中緊口不食不乳不

大便此陰分已虛熱入營中狀如癰疽大忌清散清熱

議滋清營熱救其津液為要

細生地 天冬 生鱉甲 丹皮

丹參 茯神 豆豉 桑葉

又 產後血絡空虛暑邪客氣深入癰乃間日而發嘔惡

胸滿口渴皆暑熱燥胃津液也此虛人夾雜時氣只宜

和解不可發汗膩補

青蒿梗 淡黃芩 丹皮 鬱金

臨證指南醫案 卷九 產後 哭

花粉 川貝 杏仁 橘紅

又 脈緩熱止病減之象但舌色未淨大便未通產後大

虛不敢推蕩勿進葷膩恐滯蒸化熱疏粥養胃以滋清

潤燥便通再議補虛

生首烏 麻仁 麥冬 蜜水炒知母

蘇子 花粉 枳實 枳殼 枳實 枳殼

某 渴陰上逆惡心不食冷汗煩燥最防暴脫不可但執

惡露滯滿而專瀉氣攻血也

人參 乾薑 附子 澤瀉 冲入童便

某 脈無神神倦欲昏汗出乃陽氣走泄瀉利係陰氣不

產後 陰虛陽 浮發熱		守產後見症是屬重虛深恐節間暴脫而寒熱胸痞腹 痛豈遑論及標本		人參 對附子 人尿 猪胆汁		某二產後驟加驚恐陽上脅胃為厥左肢麻木耳竅失殯 皆陽挾內風混入清竅以上實下虛鎮陽煩陰味厚質 靜之藥		熟地 龜甲心 天冬 萸肉		五味 磁石 茯神 黑殼建蓮		某產後去血過多陰虛陽實頭中眩暈汗出肉瞤驚畏 身熱等症最易昏厥苦辛氣味宜忌		臨證指南醫案 卷九 產後 芎		生地 小麥 炙黑甘草 麥冬		阿膠 茯神 生左牡蠣		顧三產後真陰不復陽越風動四肢麻木先厥後熱		熟地 阿膠 炒杞子 生白芍		茯苓 菊花炭		徐 少腹衝及心下脘中痛而脹滿若云肝氣犯胃必有 嘔逆前法益陰和陽不應顯是產後下虛厥氣上攻議 用柔陽之藥		炒歸身 茯苓 炒枸杞 柏子仁		小茴 茯神	
------------------	--	----------------------------------	--	---------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--	---	--	----------------	--	---------------	--	------------	--	----------------------	--	---------------	--	--------	--	--	--	----------------	--	-------	--

產後 陰虛陽 浮發熱		又 衝逆震動而痛是產後衝任空乏按定痛減尤為虛 象緣胃弱減穀未便湯劑之多防胃餉耳		當歸 芩蓉 紫石英 茯苓		河車 鹿角霜		又 衝脈逆則諸脈皆動天朗晴和少安由陰分虛及陽 分可微前法包舉大氣溫養佐通是為絡方日來春升 畧有衄血然無清寒可投加鹹味佐其入陰從產後下 焦先傷耳原方減鹿霜歸身亦恐升陽也加枸杞桂圓 以痛在左故養肝是議		虞二背寒心熱天明汗出乃涼產後兩三月若此此屬下 陽動		臨證指南醫案 卷九 產後 芎		焦真陰已虧漸擾陽位二氣交乘並非客症頭暈耳鳴 心悸寒熱後必瀉內風震動當與靜藥十日		人參 炙草 白芍 麥冬		炒生地 炒烏梅		又 前法酸甘益陰和陽諸病皆減然此恙是產後下焦 百脉空乏謂之辱損填隙固髓為正治綠穀食未加沉 膩恐妨胃口加餐可用九藥初三月		人參 炙草 阿膠 生地 麥冬		又 照前方加桂枝木茯苓南棗 八月 初七		又 產後都屬下焦先損百脉空隙時序夏秋天暖發泄	
------------------	--	--	--	--------------	--	--------	--	--	--	------------------------------	--	----------------	--	--	--	-------------	--	---------	--	---	--	----------------	--	------------------------	--	------------------------	--

<p>加病此扶陽益陰得效今諸症向愈食已安行水未至其衝任奇脈不振須臾陰充旺脈中得以游移耳</p> <p>熟地 水製 人參 阿膠 莖肉 遠志炭</p>	<p>山藥 茯神 建蓮 烏骨雞膏丸 九月</p>	<p>吳 坐薦過勞驚恐交迫真陰既傷經年不復目暗昏花</p>	<p>陽扶肝風直上無制則當靜藥填陰佐酸以收攝</p>	<p>北沙參 秋神 黑檀豆皮 秋石 二分</p>	<p>臨證指南醫案 卷九 產後</p>	<p>郭二 產後下元陰分先傷而奇經八脈皆麗於下肝腎怯</p>	<p>不固八脈咸失職司經旨謂陽維脈病苦寒熱陰維脈</p>	<p>病苦心痛下損及胃食物日減然產傷先傷真陰忌用</p>	<p>桂附之剛溫煦陰中之陽能入奇經者宜之</p>	<p>人參 鹿茸 紫石英 當歸</p>	<p>補骨脂 茯苓 羊肉 小茴 桂枝木</p>
---	--------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------

<p>氣血虧 產後動怒氣血皆通痛嘔不眠不能仰面冷肢冷</p>	<p>口鼻氣寒痛必自下衝上此屬疝瘕厥痛</p>	<p>淡吳萸 韭白 兩頭尖 川楝子</p>	<p>桂枝木 茯苓</p>	<p>吳六 產後百日內右脇下少腹痛堅脹絡空無血氣乘於</p>	<p>中有結聚癥瘕之累延及變成脹滿經水不轉成大病</p>	<p>矣</p>	<p>當歸 桂心 生桃仁 牛膝</p>	<p>山查 炒黑小茴</p>	<p>陸 產後邪深入陰氣血膠結遂有癥瘕之形身體僵</p>	<p>臨證指南醫案 卷九 產後</p>	<p>乃奇脈綱維不用充形通絡可效倣仲景當歸羊肉湯</p>	<p>意</p>	<p>歸身 菴蓉 杞子 小茴</p>	<p>茯苓 紫石英 羊肉膠丸</p>	<p>某 產後胞掛溺淋筋脈牽掣治當攝下</p>	<p>桑螵蛸 生沙苑 莖肉炭 炒黃柏 茯神</p>	<p>馮四 產後兩月汗出身痛 歸芪建中湯</p>	<p>余 產後不復心悸欲嘔遇寒腹痛先議進和營衛繼當</p>	<p>補攝 歸桂枝湯加茯苓</p>	<p>吳八 胃痛三月不止茹素面黃產後吞酸小食中焦陽</p>
--------------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------	------------------------------	----------	---------------------	----------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

豈宜再加攻泄與辛補血絡方

桃仁 歸鬚 公丁香皮 川桂枝

半夏 茯苓

某產虛下焦起病久則延胃不飢不食乃陰損及陽陽

明脉空厥陰風動振旋而頭痛面浮肢冷指麻皆亡血

家見象

人參一錢 杞子三錢 歸身一錢 牛膝一錢 鹽水炒

巴戟天一錢 浙江黃甘菊花炭五分 茯苓一錢 牛

方九 人參二兩 茯苓二兩 苘肉二兩 五味一兩 牛

杞子二兩 桑螵蛸殼一兩 生白龍骨一兩

臨證指南醫案 卷九 產後 聖

浙江黃菊花一兩 蜜丸早服四錢開水送

楊三一自幼作勞即患頭眩加之刮症一月之內必發數次

前歲產後體甚不健右耳日夜响鳴鳴即頭眩神色衰

奪唇黃舌白帶下手冷脚腫脉右大是陽明空氣泄不

固煖下温中主之

人參二兩 桑螵蛸三兩 鹿角霜一兩 淡從蓉一兩

炒杞子二兩 柏子霜一兩 茯苓一兩 紫石英一兩 牛

白龍骨一兩 紅棗四兩 斬艾五錢 水煮搗丸服四錢

某胃痛欲嘔肢冷痛引腰背產後病發更甚

當歸 炒沙苑 炒黑杞子 炒黑小茴

鹿角霜 生精羊肉煎服

方九 人參 鹿茸 生杜仲 炒杞子

當歸 鹿角霜 茯苓 沙苑

小茴 羊腰子蒸熟搗丸

陰虛陽 鄒三 陽不入陰不寐汗出產傷陰先受損繼而損至奇經

前主温養柔補謂陰傷不受桂附剛猛開列病情全

是陰虛陽浮漏經幾一月尤為急治夜進局方震靈丹

五十粒前方複入涼肝益陰配陽是兩固法則

人參 麋茸 枸杞 天冬

茯神 沙苑

臨證指南醫案 卷九 產後 聖

某產後淋帶都是衝任奇脉內怯最有崩漏勞損淹纏

之慮但固補實下須通奇經者宜之

桑螵蛸 人參 茯苓 生杜仲

沙苑 芡實 湖蓮

陳產後小脉空際腰脊痛漏淋

桑螵蛸 鹿角霜 龍骨 淡從蓉

炒杞子 沙苑 茯苓

吳閨病原產後陰虛液虧加以平時嗔怒陽氣暴升絡

血不寧奇空衝任少貽帶淋暗泄等症

阿膠 天冬 當歸 白芍 淡黃芩

青蒿膏 女貞子 茯神 烏骨雞 蜜丸

起 蓐損八脉。經水不來。帶下頻頻。頗多。產後下焦先虛。繼及中宮。乃血液脂膏之涸。桂附熱燥。更助劫燥。此溫藥是溫養之義。非溫熱之謂。

人參 河車 麋茸 鹿角霜

歸身 茯苓 紫石英

楊 瘕泄起於產後。三年方愈。下損已極。經水幾月一至。來必衰頹如病。奇經衝任交空。下焦畏冷。食冷則瀉。心中疼熱。緩下溫經主之。

人參 鹿角霜 炒兔絲 生杜仲 炒杞子

臨證指南醫案 卷九 產後 薑

熟白朮 淡骨脂 茯苓 蒸餅丸

金三 經後即背寒不熱。逾月不愈。嗽痰有血。自秋令產。屢屢若傷風咳嗽。正月至穀減。思產後不復是下虛形。寒減食。先調脾胃。即和營衛法。人參建中湯。

某 易飢易怒。腹瀉氣墜。知飢不進食。自胎前至今。兩月不愈。並非客邪。用固攝升陽。

鹿茸 鹿角霜 熟地炭 當歸

桂枝 五味 茯苓

某 產後十年。有餘病。發必頭垂有痛。椎尻氣墜。心痛冷汗。此督任氣乖。躡維皆不用。是五液全涸。草木藥餌。總

屬無情。不能治精血之憊。故無效。當以血肉充養。取其通補奇經。

鹿茸 鹿角霜 鹿角膠 當歸 茯苓

杞子 柏子仁 沙苑 生杜仲 川斷

潘 胎前水溢。氣喘滿不得臥。余用開太陽膀胱。獲效。既產浮腫自然漸退。女科不明產後下虛。而以破氣寬脹。百日來腹大且滿。按之則痛。此皆氣散。瀰漫。九藥又補。滿守中。益助其鈍。氣血凝滯。經候不來。為難治之病。議腎氣湯。煨藥成炭。取其氣之通。勿令味濁。兼調琥珀末。以調其血。滿做古法中之所有。非杜撰也。

臨證指南醫案 卷九 產後 姜

桂七味加車前牛膝炒炭水洗煎。服調入琥珀末。

徐 六產後九年。心中脹甚。則瀉甚。肌浮足腫。食減過半。凡

脹必有喘。產後先傷在下。用薛氏濟生丸三錢十服。

某 產後血去過多。下焦衝任空虛。跗腫腹膨。形寒面黃。

脈濡。當用溫養。

鹿角霜三錢 補骨脂一錢 紫石英三錢 茯苓三錢

桂心四分 炒黑小茴七分

方 三脉沉濡。產虛寒入痛脹。腹鳴晨泄。病人述心痛。嘔逆。其實治下為是。

熟附子 胡盧巴 良薑 炒黑茴香

茯苓 廣木香

朱四脉微弱形無華色據說病起產後食減吐瀉是下焦不復中焦又傷漸加浮腫脹滿條甚忽平皆下焦厥逆上衝也下虛於產後剛劑難以肅任是病之不易取效者在此

淡從蓉 炒黑杞子 當歸 小茴

茯苓 沙苑

又濟生腎氣丸 一兩二錢

某四產後未滿百日胸脇骨節收引四肢肌肉麻木浮腫腹脹早輕夜重食減畏寒便澹脉得右遲左弦先與理

臨證指南醫案 卷九 產後 五

中健陽驅濁

人參 炮薑 淡附子 焦白朮

枳實 茯苓

范病脹起於產後下焦先傷濁陰犯中不可以脹滿為實症夫腑陽不通腎氣散漫吸氣不入息音如喘此身動便喘非外客之邪干肺春半溫氣外侵而腫頸項結核曾以夏枯菊葉辛解得效乃一時暴邪治法至於本病之腹滿洞泄附腫未經調理且脹勢侵晨至午頗減日暮黃昏脹形漸甚中焦陽微已見一斑愚見脹滿在中而病根在下仲景於產後失調都從下虛起見閱女

科湯藥一方殊屬不解思平居咽乾喉痺牙宣肝腎具陰下虧不敢剛藥宣通倣薛氏腎氣法減泄肝如牛膝肉桂之辛不致劫陰仍可通陽為法

六味去萸加芍藥附子牡蠣炒炭煎

又小滿節古云痛隨利減今便秘仍痛非是實症肝失調暢當理用以益水母不取芍藥之和陰加當歸小茴香拌炒焦黑以通肝臟脉絡之陽又辛散益腎也照前方去芍加茴香拌炒當歸

某產後腫脹不愈顯係下虛肝腎氣不收攝形寒痞悶食少痰多脉細肉消治從陰分非分和攻消者

臨證指南醫案 卷九 產後 五

濟生腎氣丸沉香汁沖開水送 接服金匱腎氣丸

王脹滿六年產後小愈今脹勢復甚兼脫肛淋症大腿

熱如滾水滾滌食入臍中作痛議治其腑

小溫中丸 三錢 六服

傅風勝為腫濕甚生熱乃經脉為病但產後百日精神

未復不可過劫

羚羊角 木防已 片薑黃 川桂枝

大杏仁 苡仁

方產後腹大半年不愈近日有形衝突腸如刀攪據述坐蓐艱產血去盈斗而腹形即已脹滿想八脉不用腎

氣散越不收非瘀血積氣為病議用大全方烏雞煎丸		烏骨雞	人參	蒼朮	附子	烏藥
肉桂		陳皮	草果	紅花	海桐皮	
黃芪		白朮	蓬朮	川烏	延胡	
白芍		木香	肉果	琥珀	丹皮	
卽以雞搗去毛頭嘴爪腸雜將藥放雞肚內貯砂鍋						
中以好酒一斗同煮令乾云雞骨以油單盛焙令乾						
為末蜜丸						
范 衝任傷腎帶損皆由產時失宜難復元固攝下真						
兼理奇脉治非背謬但腹滿膨脹為症固補不以通調						
臨證指南醫案卷九 產後 弄						
恐滋脹大意思宜通陰宜固包舉形骸和養脉絡乃						
正治方法病樣多端紛紜難治難以立方矣						
人參						
鮮河車膠 淡從蓉 砂仁製熟地						
鹿角霜 歸身 茯苓 紫石英						
小茴香 羊腰子						
某 產後下虛血病為多今腕中痞脹減食不適全是氣						
分之恙但調氣寬中勿動下焦為穩						
香附 神麴 蘇梗 白蔻仁						
茯苓 桔梗						
朱 產後冬月右腿浮腫按之自冷若論敗血半年已成						

瘧癘針刺泄氣其痛反加此乃衝任先虛羈維脉不爲用溫養下元須通絡脉然取效甚遲恪守可望却病	肝腎虛寒 兼痰飲 某	產後必病陰虛可知兩足跗中筋掣疼痛不耐走趨	當溫養肝腎以壯筋骨但食後腕中痞阻按之漉漉有聲手麻脇痛心煩耳目昏眩宛是陽氣不主流行痰飲內聚之象處方難以兼攝謹用分治法	中焦藥日中服 桂苓六君子竹瀝薑汁法丸	下焦藥侵晨服從四斤丸金剛丸參寫	臨證指南醫案 卷九 產後 李	茯苓 牛膝 虎骨 生杜仲粉	天麻 木瓜 草薺 蜜丸	程 脉沉喘咳浮腫鼻黑唇舌赤渴飲則脹急大便解而不爽此秋風燥化上傷肺氣氣藥不降水穀湯飲之	濕熱阻經最多坐不得卧之慮法宜即通太陽之裏用仲景越婢小青龍合方若畏產後久虛以補溫陽斯客氣散漫三焦皆累閉塞告危矣	桂枝木 杏仁 生白芍 石膏	茯苓 炙草 乾薑 五味	陳三 夏季坐蓐秋月熱病半年來不寐不便無皮毛焦落	痰飲阻 氣不寐
---	------------------	----------------------	---	-----------------------	-----------------	-------------------------	------------------------	----------------------	---	--	------------------------	----------------------	----------------------------	------------

不便

之象是痰飲爲氣所阻以致升降失常凡痺之基也蓋宣肺以通腸

紫苑 八錢 杏仁 三錢 枳殼 一錢 桔梗 一錢

瓜蒌皮 一錢 鬱金 一錢

下虛飲

陸 背寒夜臥氣衝欲坐乃下元虛乏厥瀉飲邪皆令上泛胎前僅僅支撐產後變症蜂起奈何庸庸者流泄肺翼其嗽緩宜乎藥增病勢矣

桂枝 茯苓 炙草 五味 淡乾薑

許 實喘屬肺虛喘屬腎產後下虛最多痰飲易於上泛喘嗽食減有浮腫脹滿不得臥之憂不可小視

臨證指南醫案 卷九 產後 三

茯苓 生白芍 乾薑 五味

風溫客

王 產後未復風溫入肺舌白面腫喘咳泄瀉小水漸少必加腫滿不易治之症

蘆根 方寸金 苡仁 通草 大豆黃卷

又 淡滲通泄氣分肺壅得開而臥再宗前議

通草 方寸金 蘆根 苡仁 大豆黃卷

木防已 茯苓

又 過投絕產凝寒重藥致濕聚阻痰兩投通泄氣分已效再用煖胃滌飲法

半夏 薑汁 黍米 茯苓

濕瀉

又 支飲未盡溇瀉不渴神氣已虛用澤水湯

生於朮 建澤瀉 茯苓 苡仁

某 脉小左弦咳逆脘悶小便不利大便溇瀉不思納穀

暖氣臭穢此皆胎前氣上逆冲濁得盤踞膈間肺失清肅降令上竅痺致下寒不利湯食聚濕氣不宣行怕延

出浮腫腹滿喘急不臥諸藥不獨以產後通瘀爲事

鬱金汁 杏仁 通草 桔梗

茯苓皮 苡仁

產後未復加以暑熱上干暑必傷氣上焦先受頭脹

暑熱上

沈 微微嘔惡脘悶不曉飢飽暑熱早涼汗泄不已經水連

臨證指南醫案 卷九 產後 三

至熱迫血絡妄動蓋陰虛是本病而暑熱係客氣清上

勿得礙下便是理邪勿混亂首鼠致延羣損不復矣

捲心竹葉 生地 炒川貝 連翹心

玄參 地骨皮

木火盛

袁 二神識不甚靈慧陡然狂亂入井夫暴病痰火風爲多

今診視色脉產後未滿百日多驚怕五味皆變厥陰肝

木順乘陽明古稱一陰一陽變亂爲癇先以清心胞解

營熱食進便通再酌調理

犀角 生地 菖蒲 玄參心 羚羊角 鬱金 竹葉心 連翹心

又復脈湯去參黃桂

某三產後不復元。仍自乳癰育。損不能復。卽是虛勞。速速斷乳。藥力可扶。凡產必下。焦先損。必以形質血氣之屬。莫以心熱。再用寒涼。伐其生氣。

人參 當歸 沙苑 杜仲

補骨脂 茯苓 羊內腎二枚

沈時熱。屬上焦病。逾時自解。緣體質素薄。長夏坐蓐。不但肝腎陰傷。諸氣皆爲發泄。陰不主總陽。衝脈上冲。而心熱骨痿。總是陰虛不肯復元。久久延成損症。此與清潤治肺之咳無預。法宜填補下焦。攝之固之。迎養秋收。

臨證指南醫案 卷九 產後 室

冬藏。胃納有加。庶乎漸安。

鮮紫河車 人參 眞秋石 茯神

水煮熟地 歸身 五味 芡實

山藥 生羯羊肉膠共河車膠二共和丸

姚十面。少華色。脈似數。按之乳瀼。產後二年。從未經來。腹中有形。升逆則痛。肩背眈眈。平痛難忍。咳吐都是涎沫。着枕氣衝欲生。食減便溏。身動語言喘急。此乃產後損極不復。諒非草木可以圖倖。由下焦元海少振。驚恐餒弱。衝脈動。斯諸脈交動。擬益元氣。充形骸。佐重鎮。以理怯。護持體質之義。非治病方藥矣。

人參 杞子 白龍骨 茯苓

紫石英 羊肉

鄒八產後成勞損。先傷下焦血分。寒熱數發。不止奇經八脈俱傷。欲嘔不飢。肝腎及胃。有形凝痰。議柔劑溫通補下。

人參 當歸 小茴香 茯苓 沙苑

淡苳蓉 杞子 鹿角霜 生紫石英

汪產後百日。寒熱消渴。心痛惡食。瀉瀉。此產後液涸。已屬沉痾難治。擬酸甘化陰扶胃。望其小安而已。

人參 烏梅 炙草 赤石脂

臨證指南醫案 卷九 產後 室

木瓜 茯神 炒粳米

張八產後下虛。厥氣上衝。犯胃。食入嘔脹。脈絡日空。營衛兩怯。寒熱汗泄。淹淹爲羸勞之病。最難調治。

淡吳更 桂枝 茯苓 炮薑

炒木瓜 南棗

黃產後陡然驚恐。陰虧厥陽上逆。血湧吐痰。胸背脇脘大痛。乃八脈空乏之徵。羸勞重症。延綿最難全好。議鎮固一法。

熟地炭 炒杞子 五味 紫石英

茯神 牛膝炭

<p>又 脉少欬痛止血緩仍用鎮納</p>	<p>熟地 炒杞子 五味 女貞子</p>	<p>又 芡實 茯神</p>	<p>又 眩暈腹脹痛 痛不宜破</p>	<p>熟地 炒杞子 五味 茯神</p>	<p>又 阿膠 芎肉 菊花炭 北沙參</p>	<p>又 烏骨雞 阿膠 熟地 杞子 五味</p>	<p>桂圓 茯神 建蓮 熬膏入參湯送</p>	<p>顧 小產三日脉數頭暈眩痛小腹墜痛欲厥此屬鬱冒</p>	<p>連翹 鬱金汁 丹皮 鈎藤</p>	<p>臨證指南醫案 卷九 產後</p>	<p>茯苓 炒山查 益母草湯煎</p>	<p>某二 小產後惡露淋漓管血內虧厥陽由是鼓動頭脹耳</p>	<p>鳴心中洞然病在下焦矣</p>	<p>枸杞子 柏子仁 全當歸 白芍</p>	<p>朱 脉小半產一日舌白頻嘔吐青絲水沫涎沫左肢</p>	<p>浮腫神迷如狀此胃陽大虛肝風內泛欲脫之象急急</p>	<p>護陽安胃黃得嘔緩再商治</p>	<p>人參 淡附子 炒焦糯米 煨老薑</p>	<p>又 雖得小效必三陰三陽一周扶過七日庶有愈理</p>
----------------------	----------------------	----------------	---------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------

<p>人參 淡附子 熟於朮 炮薑</p>	<p>茯苓 南棗</p>	<p>小產不及一月忽有厥逆痰潮此陰分既虛厥陽上</p>	<p>冒今二便已通神志似屬憤散病雖已成癰癰却非痰</p>	<p>火有餘肝腎位遠治宜鎮補擬陳無擇琥珀散</p>	<p>人參 白芍 鐵落 辰砂 磁石</p>	<p>遠志 菖蒲 牛黃 琥珀</p>	<p>孔 形畏寒惡寒忽然發熱腰膝墜脹帶下汗出由半產</p>	<p>下焦之損致入脉失其擁護少腹不和通攝脉絡治之</p>	<p>鹿角霜 炒當歸 杜仲 兔絲子</p>	<p>臨證指南醫案 卷九 產後</p>	<p>小茴香 桂枝</p>	<p>陳 懷妊三月小產半年不復寒從背起熱起心胸經水</p>	<p>後期不爽帶下脉脉不調脊脊腰膝痠疼膝骨跖</p>	<p>脛易冷無力由衝任督帶傷損致陰陽維躡不用調治</p>	<p>非法有終身不肯孕育之累</p>	<p>鹿角霜 炒枸杞 當歸 炒沙苑</p>	<p>桂枝 小茴</p>	<p>顧 上年小產下虛不復冬令藏聚未固春夏陽升風溫</p>	<p>乘虛上受清竅不利耳失聰鼻多塞咽燥痰稠悉見上</p>	<p>焦不清究竟下虛是本病議食後用清竅早上用鎮納</p>
----------------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

陽氣虛
久瀉

青菊葉三錢 羚羊角一錢 黑梔皮一錢 蓮翹心半錢
玄參心二錢 苦丁茶一錢 磁石六味加龜膠北味
久瀉延虛痛後而瀉氣弱不可運行病因小產而來
法當中下兩調

人參 炒菟絲子 木香 茯苓

炒白芍 炒蒲骨脂

汪 小產後氣衝結瘕是奇經八脈損傷醫謂病尙有形
愈從瘀血施治半年來肌肉大消內熱咯痰帶血食過
脫下輒云腹痛蓋產後下焦真陰大虧攻瘀清熱氣味
苦辛是重虛其虛藥先入胃既不中病先戕胃口致令

臨證指南醫案 卷九 產後 奎

飲食廢矣陰虛生熱經訓灼然祇以胃口傷殘難與滋
膩之藥此症延成羸勞必得飲食漸和方有調病之理
見病治病貽害豈可再循前轍議肝胃兩和方法

炒黑杞子三錢 雲茯神一錢 柏子仁三錢 生沙苑一錢

焦當歸一錢 小茴七分同當 紫石英五錢先煎 廿滾入藥

某 三次兩月胎漏而下是厥陰失養脈數右大腹痛惡

露未盡

柏子仁 炒香肉 丹皮 澤蘭葉

細生地 調入琥珀末

倪 小產半月頗安忽然腰腹大痛或攢膝跣足底或引

脇肋肩胛甚至湯飲藥餌嘔吐無存娠去液傷絡空風
動昔賢謂按之痛緩屬虛勿道諸痛爲實

炙甘草 淮小麥 南棗 阿膠

細生地 生白芍

又 往常經候不調乃癥瘕爲痛 葱白丸

金匱要畧云新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱
胃三者大便難新產血虛多汗出善中風故令病瘕
亡血復汗寒多故令鬱胃亡津液胃燥故大便難心
典云血虛汗出筋脈失養風入而益其勁此筋病也
亡陰血虛陽氣遂厥而寒復鬱之則頭眩而目瞶此

臨證指南醫案 卷九 產後 奎

神病也胃藏津液而滲灌諸陽亡津液胃燥則大腸
失其潤而大便難此液病也三者不同其爲亡血傷
津則一故皆爲產後所有之病卽此推之凡產後血
虛諸症可心領而神會矣張璐玉云產後元氣虧損
惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神昏口噤或
痰涎壅盛者急用熱童便主之或血下多而暈或神
昏煩亂者芎歸湯加人參澤蘭童便兼補而散之又
敗血上衝有三或歌舞談笑或怒罵坐臥甚則踰牆
上屋此敗血衝心多死用花蕊石散或琥珀黑龍丹
如難悶亂不致顛狂者失笑散加鬱金若飽悶嘔惡

腹滿脹痛者。此敗血衝胃。五積散。或平胃加姜桂。不應。送來復丹。嘔逆腹脹。血化為水者。金匱下瘀血湯。若面赤嘔逆欲死。或喘急者。此敗血衝肺。人參蘇木。甚則加芒硝蕩滌之。大抵衝心者十難救。一衝胃者。五死。五生衝肺者十全一二。又產後口鼻起黑色。而鼻衄者。是胃氣虛敗。而血滯也。急用人參蘇木。稍遲不救。丹溪云。產後當大補氣血。卽有雜症。以未治之。一切病。多是血虛。皆不可發表。景岳云。產後既有表邪。不得不解。既有火邪。不得不清。既有內傷停滯。不得不開通消導。不可偏執。如產後外感風寒。頭痛身

臨證指南醫案 卷九 產後

究

熱。便實中滿。脈緊數洪。有力。此表邪實症也。又火盛者。必熱渴躁煩。或便結腹脹。口鼻舌焦黑。酷喜冷飲。眼眇。尿痛溺赤。脈洪滑。此內熱實症也。又或因產過食。致停蓄不散。此內傷實症也。又或鬱怒動肝。胸脇脹痛。大便秘利。脈弦滑。此氣逆實症也。又或惡露未盡。瘀血上冲。心腹脹滿。疼痛拒按。大便秘。小便利。此血逆實症也。遇此等實症。若用大補。是養虎爲患。誤矣。以上四家之論。俱屬產後治病扼要處。學者當細心體察。再參觀葉先生醫案。更能博考羣書。以治產後諸病。易如反掌矣。否則如眇能視。不足以有明

也如跛能履。不能以與行也。烏得稱司命哉。秦天一婦人善病。而病由產後者爲更多。亦爲更劇。產後氣血大虧。內而七情。外而六氣。稍有感觸。卽足致病。使治之失宜。爲患莫測。朱丹溪曰。產後以大補氣血爲主。雖有他症。以未治之。此語固爲產後症之宗旨。而症實多端。論其常。未盡其變也。醫者惟辨乎脈候。以明內外之因。審乎陰陽。以別虛實之異。病根透徹。而施治自效。慎毋以逐瘀爲了事。亦毋以溫補爲守經。今觀先生案中。凡內因之實症。未嘗不用攻治之劑。然如熱熾昏亂。有似惡露冲心者。先生則曰。陰氣下

臨證指南醫案 卷九 產後

辛

泄。陽氣上冒。從亡陽汗出。譫語倒。爲救逆法。如少腹冲及心腕。痛而脹滿。有似肝氣犯胃者。先生則曰。產後下虛。厥氣上攻。惟用柔陽之藥。如頭痛汗出煩渴。有似感冒風寒者。先生則曰。開泄則傷陽。辛熱則傷陰。從仲景新產鬱胃之治。以立方。至於奇經八脈。爲產後第一要領。蓋八脈麗於下。產後陰分一傷。而八脈自失。所司溫補鎮攝。在所必先。無奈世人罕知。卽有一二講論者。終屬影響模糊。惟先生於奇經之法。條分縷析。盡得其精微。如衝脈爲病。用紫石英以爲鎮逆。任脈爲病。用龜板以爲靜攝。督脈爲病。用鹿角

以爲溫煦。帶脉爲病。用當歸以爲宣補。凡用奇經之藥。無不如芥投針。若夫外因爲病者。風濕入筋。用葦莖湯甘寒淡滲。以通肺氣。遇寒腹痛。用當歸枝湯。辛甘化陽。以和營衛。暑氣上干。則陰虛是本病。暑熱是客氣。清上勿致礙下。便是理邪。如濕傷脾陽而飲邪阻氣。用苦溫淡滲之品。澤太湯治之。熱蒸化燥而胃阻腸痺。用首烏麻仁麥冬之類。清滋潤燥之劑治之。熱乘陰虛而入營中。用清散清劑。惟有陰可以除熱。更如邪入營中。而虛症不得發汗。厥補當以輕清和解爲主要之先生。於內因之症。一一尋源探

臨證指南醫案 卷九 產後

主

本非同俗手漫謂補虛於外因之端。種種審變達權。不以產後自爲荆棘。惟讀書多而胸具靈機。故於丹溪本末二字。尤爲神化無迹。此所謂知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮也。案中諸症甚多。學者果能悟焉。則一以貫之矣。與商年

癰疽

營絡氣聚結

久痛在絡。營中之氣結聚成癰。始而夜發。繼而晝夜俱痛。陰陽兩傷。徧閱醫藥。未嘗說及絡病。便難液潤。香燥須忌。

青麝管

新絲

當歸鬚

桃仁

生鹿角

柏子仁

朱二

辛潤通絡。成形癰。濁吐。然癰必下行。爲膿上湧。雖安思其復聚。仍宜緩通。以去瘀生新爲治。無取沉降。急攻謂怒勞多令人傷耳。

臨證指南醫案

卷九 癰疽

主

當歸

桃仁

羌蔚子

製疾黎

生鹿角

茯苓

香附汁法丸

周十

癰聚結左肢節寒冷。病在奇脉。以辛香治絡。

鹿角霜

桂枝木

當歸

小茴

茯苓

香附

葱白

翼

脉症向安。辛甘化風方法非謬。據云痛時。少腹滿脹。

其有形癰痕。狀亦畧小。法宜益營之中。再佐通泄其氣。

古稱通則不痛耳。

人參

當歸

肉桂

吳萸

小茴

茯苓

青葱管

欽 瘕瘕少腹痛

當歸 生薑 羊肉 桂枝

小茴 茯苓

又 瘕痛已止當和營理虛

歸身 紫石英 白芍 酒炒 小茴

淡菴蓉 肉桂

丸方用養營去其木桂合杞圓膏

朱 疝瘕腹痛有形用玉溫辛補

當歸 生薑 羊肉

某 右脇攻痛作脹應時而發是濁陰氣聚成瘕絡脉病

臨證指南醫案 卷九 瘕瘕 圭

也議溫通營絡

當歸 三錢 小茴 炒焦 一錢 上肉桂 錢 青葱管 十

瘕聚有形高突痛在胃脘心下或垂芥腰小腹重按

既久痛勢稍定經水後期色多黃白此皆衝脉為病絡

虛則脹氣阻則痛非辛香何以入絡苦溫可以通降

延胡 川棟 香附 鱗金 茯苓

降香汁 芫蔚子 炒山查 烏藥

又 瘕聚瘕結痛脹妨食得食不下痛甚今月經阻不至

帶淋甚多病由衝任脉絡擾及肝胃之逆亂苦不宜湯

經通日久延為瘕疾矣

炒桃仁 當歸鬚 延胡 川棟子 青皮

小茴 吳萸 紫降香 青葱管

柳 四絡血不注衝脉則經阻氣攻入絡聚而為瘕乃痛衝

脉是陽明屬隸痛升於右腹及中脘作嘔清涎瀝沫操

家煩怒犯胃莫如肝泄肝正救胃

金鈴子 炒延胡 蓬莪朮 青橘葉

牛黃 厚朴 薑汁 茯苓

又 葱白丸二錢艾葉湯送

某 臍下瘕形漸大氣塞至心膈及咽喉飲不解渴逐氣

攻至背部經水百餘日不來小溲得利大便不爽氣滯

臨證指南醫案 卷九 瘕瘕 圭

血瘀皆因情志易鬱肝胆相火內灼衝脉之血欲涸丹

溪謂氣有餘便是火口甜食後痞用苦辛清降

胡黃連 八分 山梔仁 一錢 南山查 三錢 蘆薈 一錢

雞肫皮 不落水去垢 炙脆五錢 化服回生丹半丸

陸 六經阻半年腹形漸大痛不拒按漫短便通據形色脉

象不是用通經丸者下氣還攻於絡有形若瘕瘕炒枯

腎氣湯

脉弦左搏數年胃痛不痊發時手不可按脇中拘急

少腹左傍素有瘕聚之形氣卧下焦衝起為脹為嘔此

乃驚憂與怒致動肝木乘其中土胃傷失降脉絡逆併

瘰癧爲甚初起或理氣獲效久發中衰辛香氣燥脾胃不勝剋伐矣議疎肝木安土爲法冀其漸緩再酌後法

川楝子

川連

乾薑

桂枝

當歸

川椒

生白芍

烏梅

又少腹痼瘕多年衝起散漫胃脘兩脇痛甚欲嘔年前用安胃泄肝頗效但下焦至陰足跗發熱裂水久留濕熱瘀留經脈絡中交病若非宣通氣血難遏恐非至理

桃仁

相子仁

川芎

當歸

爲末用青葱管百莖加水一杯取汁法九

小茴

香附

茯苓

山梔

爲末

用青葱管百莖加水一杯取汁法九

臨證指南醫案

卷九 瘰癧

奎

其十數年左脇聚瘕發作必嘔吐涎沫酸苦渴水瘕不成寐便閉忽瀉始於悵鬱病由肝失暢達木必傳土胃氣受侮病久入絡氣血兼有緩圖爲宜急攻必變脹病

生牡蠣

川楝子肉

延胡

桃仁

半夏

茯苓

橘紅

白芥子

川連

吳萸

香附汁薑汁法九

肝經起

胃經起

虛滯

趙

脉小身不發熱非時氣也凡經水之至必由衝脉而始下此脉胃經所管醫藥消導寒涼不能中病反傷胃

口致衝脉上冲犯胃爲嘔攻胸痞塞升頓則昏厥經言

衝脉爲病男子內疝女子瘕聚今小腹有形兼有動氣

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

醫不知絡脉治法所謂愈究愈窮矣

鹿角霜

淡苣蓉

炒當歸

炒小茴

生杜仲

茯苓

用紫石英一兩煎湯煎藥

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義醫不知絡脉治法所謂愈究愈窮矣

鹿角霜

淡苣蓉

炒當歸

炒小茴

生杜仲

茯苓

用紫石英一兩煎湯煎藥

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

其病顯然夫日結日聚皆奇經中不司宣暢流通之義

<p>香椶皮<small>八分</small> 青皮<small>五分</small> 炒查肉<small>二錢</small> 砂仁殼<small>五分</small></p> <p>又少腹聚聚攻逆身熱或噎或渴氣下泄則諸恙悉舒</p> <p>惱怒病發厥陰肝木鬱遏不疎顯露一班</p>	<p>川棟子<small>一錢</small> 小茴<small>五分</small> 生牡蠣<small>三錢</small> 桂枝木<small>五分</small></p> <p>生白芍<small>一錢</small> 青皮<small>一錢</small></p> <p>程聚氣滯腹大便不爽必腹中疴痛當通腑經氣分</p>	<p>葱白九二錢五分紅棗湯送</p> <p>又做朱南陽意以濁攻濁</p> <p>韭白根<small>去鬚</small> 兩頭尖<small>一錢</small> 香櫛核<small>一錢</small></p>	<p>小茴香<small>七分</small> 金鈴子<small>肉牛</small> 老</p> <p>臨證指用醫案卷九 瘕瘕</p> <p>又瘕聚已解用八珍九加香附小茴白花益母膏丸</p>	<p>某瘕聚在左脇中肝病</p> <p>桃仁 川棟子 延胡 當歸</p> <p>橘紅 香附</p>	<p>王四瘕聚季脇漸加煩倦減食入夏土旺氣泄用泄少陽</p> <p>補太陰方</p> <p>人參 茯苓 炙草 當歸</p>	<p>丹皮 生地 鱉甲 澤蘭膏</p> <p>周痛久在絡凝聚成形仍屬經病謹用河間法</p> <p>川棟子 瓜蒌皮 香附汁 延胡 生牡蠣</p>	<p>痰氣結</p>
--	---	--	---	---	--	---	------------

<p>又理氣豁痰痛止思食仍以前法參用</p> <p>半夏 瓜蒌皮 香附汁 生牡蠣</p>	<p>橘紅 香豉</p> <p>葛一升升溪小溫中丸脹利自減知腸胃濕熱皆阻腸陽</p>	<p>之流暢水穀之氣不主游溢瘕屬氣聚瘕屬血結由無</p> <p>形釀為有形攻堅過急藥先入胃徒致後天氣乏恐脹</p>	<p>病必至矣俗有瘕散成蠱之說可為治此病之戒律</p> <p>老非根<small>生酒</small> 桃仁<small>一兩</small> 生香附<small>一兩</small> 炒查肉<small>一兩</small></p>	<p>當歸<small>一兩</small> 山甲片<small>一兩</small> 小茴香<small>三錢</small> 桂枝木<small>三錢</small></p> <p>胡二少腹聚聚能食便不爽腹微脹小溫中丸</p>	<p>王二初病寒熱半年經水不來少腹已有瘕形食又減半</p> <p>當此年犯乾血勞慮</p> <p>焦木 茯苓 廣皮 香附</p>	<p>當歸 南山查 白芍</p> <p>夫瘕者徵也血食凝阻有形可徵一定而不移瘕者</p>	<p>假也臟氣結聚無形成假推之而可動昔有七瘕八</p> <p>瘕之說終屬強分名目不若有形無形之辨為明的</p>	<p>也二症病在肝脾而胃與八脈亦與有責治之之法</p> <p>即從諸經再究其氣血之偏勝氣虛則補中以行氣</p>	<p>氣滯則開鬱以宣通血衰則養營以通絡血瘀則入</p>
--	--	---	---	---	--	--	---	---	-----------------------------

絡以攻痺此治癰瘰之大畧古方甚多而慈日丸烏雞煎丸尤為神效癰瘰之外更有癰癰腸覃石瘰內疳等症古人論之已詳茲不必贅今參先生方案如營傷氣阻者於益營之中佐通泄其氣如絡虛則脹氣阻則痛者以辛香苦溫入絡通降又如肝胃兩病者以泄肝救胃肝胃脾同病者則扶土制木肝臟之氣獨鬱不宜者辛香皆治於氣血痺絡逆失和者辛香端理其血病由衝任及肝胃之逆亂者仍從肝胃兩經主治以疎降溫通是凡此悉靈機法眼藥不妄投總之治癰瘰之要用攻法宜緩宜和用補法忌瀉

臨證指南醫案

卷九

癰瘰

七

忌呆上逆則想肝臟衝病之源頭下垂則究中氣陰邪之衰旺吞酸吐水必兼剛藥液枯腸結當補滋營再辨脈象之神力形色之枯澤致病之因由則治法自然無悞矣 戴商年

熱入血室

熱邪內陷
傷血

沈氏溫邪初發經水即至寒熱耳聾乾嘔渴飲見症已屬熱入血室則醫見咳嗽脈數舌白為溫邪在肺用辛涼輕劑而煩渴愈甚拙見熱深十三日不解不獨氣分受病況體質素虛面色黯慘恐其邪陷血厥三日已發癰五液暗耗內風掀旋豈得視為渺小之恙議用玉女煎兩清氣血邪熱仍有救陰之能

玉女煎加竹葉心武火煎五分

又脈數色黯舌上轉紅寒熱消渴俱緩前主兩清氣血

臨證指南醫案

卷九

熱入血室

七

伏邪已得效驗大凡體質素虛驅邪及牛必兼護養元氣仍佐清邪腹痛便溏和陰是急

白芍 炙草 人參 炒麥冬 炒生地

又脈右數左虛臨晚微寒熱復脈湯去薑桂

吳氏熱病十七日脈右長左沉舌痿飲冷心煩熱神氣忽清忽亂經來三日患病血舍內之熱氣乘空內陷當以厥熱在裏論病但病已至危從蓄血如狂例

細生地 丹皮 製大黃 炒桃仁

澤蘭 人中白

攻熱入血室金匱有五法第一條玉小柴胡因寒熱

而三難水逆等症。此下兩篇最第

二條。傷寒發熱。此下三現。此兩篇最第

恐入其誤。此下三現。此兩篇最第

第三條中風寒。此下三現。此兩篇最第

滿好。此下三現。此兩篇最第

自當急刺。此下三現。此兩篇最第

明。此下三現。此兩篇最第

汗出而愈。此下三現。此兩篇最第

條明其一。此下三現。此兩篇最第

當先化其痰。此下三現。此兩篇最第

臨證指南醫案 卷九 熱入血室 全

人一遇是症。不辨熱入之輕重。血室之盈虧。遽與小

柴胡湯。貽害必多。要之熱甚而血瘀者。與桃仁承氣

及山甲歸尾之屬。血含空而熱陷者。用犀角地黃湯

加丹參木通之屬。表邪未盡。而表症仍兼者。當合乎

和解。熱輕而清藥過投。氣機致鈍者。不妨借溫通為

使。血結胸有桂枝紅花湯。參入海蛤桃仁之治。昏狂

甚。進牛黃膏。調入清氣化結之前。再觀案中。有兩解

氣血。燔蒸之玉女法。其陰傷有育陰養氣之復脈

法。又有養陰清熱之緩攻法。先聖後賢。其治總條分

縷析。學者審症製方。慎毋拘乎柴胡一法也。邵新甫

臨證指南醫案目

卷十

幼科要畧

痧疹

痘

疳


吐瀉

痢疾

虫

集方

臨證指南醫案



許嗣本大瞻論

古吳葉桂天士先生著 錫山華南川山雲同校

邵錦新甫

幼科要畧

按襁褓小兒體屬純陽。所患熱病最多。世俗醫者固知謂六氣之邪。皆從火化。飲食停留。鬱蒸變熱。驚恐內迫。五志動極。皆陽奈。今時治法。初則發散解肌。以退表熱。仍混入消導。繼用清熱苦降。或兼下奪。再令病家禁絕乳食。每致胃氣索然。內風來乘。變見驚搐。告瘳甚多。附記世俗通套之方藥於左。不可不知。不足取法也。

臨證指南醫案 卷十 幼科

防風 荆芥 葛根 前胡 桔梗 木通

赤芍 荀子 厚朴 陳皮 山查 麥芽

枳殼 神麴 鈎藤 夏佐香 需冬 佐麻黃羌活

兩三日熱不解

柴胡 前胡 黃連 黃芩 山梔 連翹

薄荷 葛根 木通 鈎藤 厚朴 枳實

五寶膏 九刺必用大黃

四五日不解。但言食滯未盡。未與不和。總以柴苓小陷

胸若嘔逆煩渴。用竹茹黃連半夏。若痰多喘促。卽用葶藶杏仁。蘇子。荀子。胆星。貝母。其者加牛黃。此皆套法。所當戒也。

屢清消不愈。便無方法。苟不變驚。必曰胃蒸孩勞。所用藥餌。不分氣血陰陽。但知見症施治。如早涼暮熱。必用

地骨皮 丹皮 生地 玄參 甘草 北沙參

石斛 知母

有痰加

蘇子 杏仁 貝母 橘紅 胆星 桔梗

其鈎藤。石斛。茯苓。麥芽之屬。每劑必用。總之取無故疲

臨證指南醫案 卷十 幼科

藥待其自愈。倘有變症。希冀掩飾而已。

愚按嬰兒肌肉柔脆。不耐風寒。六腑五臟氣弱。乳汁難化。

內外二因之病自多。然有非風寒。竟致外感。不停滯已

屬內傷。其故何歟。嘗思人在氣交之中。春夏地氣之升。

秋冬天令之降。呼出吸入。與時消息。間有穢濁吸入。卽

是三焦受邪。過募原直行中道。必發熱煩躁。倘幼醫但

執前藥。表散消導。清火通便。病輕或有倖成。病重必然

顛覆。錢仲陽云。黃履不可近襁褓小兒。余言非無據矣。

四十年來治效頗多。畧述其畧云。

夫春溫夏熱。秋涼冬寒。四時之序也。春應溫而反大寒。夏

應熱而反大涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。皆不正之乖氣也。病自外感。治從陽分。若因口鼻受氣。未必恰在足太陽經矣。大凡吸入之邪。皆先犯肺。發熱咳嗽。口鼻均入之邪。先上繼中。咳嗽必兼嘔逆腹脹。雖因外邪。亦是表中之裏。設宗世醫發散易汗。雖汗不解。幼穉質滿神怯。日期多延。病變錯綜。茲以四氣常法列左。

伏氣

春溫一症。由冬令收藏未固。昔人以冬寒內伏。藏於少陰。入春發於少陽。以春木內應肝胆也。寒邪深伏。已經化熱。昔賢以黃芩湯為主方。苦寒直清裏熱。熱伏於陰。苦

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

味堅陰。乃正治也。知溫邪忌散。不與暴感門同法。若因外邪先受。引動在裏伏熱。必先辛涼以解新邪。繼進苦寒以清裏熱。況熱乃無形之氣。幼醫多用消滯。攻治有形。胃汁先涸。陰液劫盡者多矣。

備用方

黃芩湯 蔥豉湯 新邪引動伏邪
涼膈散 清心涼膈散

風溫

風溫者。春月受風。其氣已溫。經謂春氣病在頭。治在上焦。肺位最高。邪必先傷。此手太陰氣分先病。失治則入手厥陰心胞絡。血分亦傷。蓋足經漸傳。如太陽傳陽明。人

皆知之。肺病失治。逆傳心胞絡。幼科多不知者。俗醫見身熱咳嗽。不知肺病在上之旨。妄投荊防柴葛加入枳朴杏蘇。藟子查麥。廣皮之屬。輒云解肌消食。有見痰喘。便用大黃礞石滾痰丸。大便數行。上熱愈結。幼穉穀少。胃薄。表裏苦辛化燥。胃汁已傷。復用大黃大苦沉降丸。藥致脾胃陽和傷極。陡變驚癇。莫救者多矣。

按此症風溫肺病。治在上焦。夫風溫春溫忌汗。初病投劑。宜用辛涼。若雜入消導發散。不但與肺病無涉。劫盡胃汁。肺乏津液。上供頭目。清竅徒爲熱氣薰蒸。鼻乾如煤。目眵。或上竅無淚。或熱深肢厥。狂躁溺瀉。胸高氣促。

臨證指南醫案

卷十

幼科

四

皆是肺氣不宣化之徵。斯時若以肺藥。少加一味清降。使藥力不致直趨腸中。而止痺可開。諸竅自爽。無如城市庸醫。僉云結胸。皆用連薑柴枳。苦寒直降。致閉塞愈甚。告變甚多。

按此症。初因發熱喘嗽。首用辛涼。清肅上焦。如薄荷連翹。牛蒡。象貝。桑葉。沙參。梔皮。薑皮。花粉。若色蒼熱勝煩渴。用石膏竹葉辛寒清散。痧症亦當宗此。若日數漸多。邪不得解。芩連涼膈亦可選用。至熱邪逆傳入膈中。神昏目瞤。鼻竅無涕淚。諸竅欲閉。其勢危急。必用至寶丹。或牛黃清心丸。病減後餘熱。只甘寒清養胃陰足矣。

備用方薑薑湯

清心涼膈散

涼膈散

瀉白散

葶藶大棗湯

白虎湯

至寶丹

清心牛黃丸

竹葉石膏湯

喻氏清燥救肺湯

夏熱

夏為熱病然夏至已前時令未為大熱經以先夏至病溫後夏至病暑溫邪前已申明暑熱一症幼醫易眩夏暑發自陽明古人以白虎湯為主方後賢劉河間創議迥出諸家謂溫熱時邪當分三焦投藥以苦辛寒為主若拘六經分症仍是傷寒治法致悞多矣蓋傷寒外受之

臨證指南醫案

卷十

幼科

五

寒必先從汗解辛溫散邪是已口鼻吸入之寒即為中寒陰病治當溫裏分三陰見症施治若夫暑病而方甚少皆因前人畧於暑詳於寒耳考古如金匱暑暈之因而潔古以動靜分中暑中暑各具至理茲不臆述論幼科病暑熱夾雜別病有諸而時下不外發散消導加入香薷一味或六一散一服考本草香薷辛溫發汗能泄宿水夏熱氣閉無汗渴飲停水香薷必佐杏仁以杏仁苦降泄氣大順散取義若此長夏濕令暑必兼濕暑傷氣分濕亦傷氣汗則耗氣傷陽胃汁大受劫燥變病由此甚多發泄可令裏氣自虛張鳳達云暑病首用辛

涼藥用甘寒再用酸泄酸不必用下可謹要言不煩矣然幼科因暑熱蔓延變生他病茲摘其槩受熱厥逆

夏令受熱昏迷若驚此為暑厥即熱氣閉塞孔竅所致其邪入絡與中絡同法牛黃丸至寶丹芳香利竅可效神甦以後用清涼血分如蓮翹心竹葉心玄參細生地鮮生地二冬之屬此症初起大忌風藥初病暑熱傷氣竹葉石膏湯或清肺輕劑大凡熱深厥深四肢逆冷但看面垢齒燥二便不通或瀉不爽為是大忌誤認傷寒也

臨證指南醫案

卷十

幼科

六

幼兒斷乳納食值夏月脾胃主氣易於肚膨泄瀉頭熱手足心熱形體日瘦或煩渴善食漸成五疳積聚當審體之強弱病之新久有餘者當疏胃清熱食入糞色白或不化當健脾消導清熱若濕熱內鬱蟲積腹痛導滯驅蟲微下之緩調用肥兒丸之屬

口疳

夏季秋熱小兒泄瀉或初愈未愈滿口皆生疳腫實有阻滯咽喉致危者此皆在暑濕餘生熱氣蒸灼津液不升濕熱偏傷氣分治宜上焦宜淡滲世俗常刮西瓜翠衣治疳取其輕揚滲利也

服

夏令濕熱鬱蒸脾胃氣弱水穀之氣不運。暴着內蘊為熱。漸至浮腫腹脹。小水不利。治之非法。水濕久漬。逆行犯肺。必生咳嗽喘促。甚則坐不得臥。喘不能仰。危期速矣。大凡喘必生脹。脹必生喘。方書以先喘後脹者治在肺。先脹後喘者治在脾。亦定論也。金匱有風水皮水石水。正水黃汗。以分表裏之治。河間有三焦分消。子和有磨積逐水。皆有奧義。學者不可不潛心體認。難以槩述。閱近代世俗論水濕喘脹之症。以內經開鬼門取汗為表治。分利小便潔淨府為裏治。經旨病能篇謂諸濕腫滿。臨證指南醫案 卷十 幼科 七

皆屬於脾。以健脾燥濕為穩治。治之不效。技窮束手矣。不知凡病皆本乎陰陽。通表利小便。乃宣經氣利腑氣。是陽病治法。暖水蠶濕脾腎。補方以驅水。是陰病治法。治肺痺以輕開上。治脾必佐溫通。若陰陽表裏乖違。真日瀉。陰陽不運。亦必作脹。治以通陽。乃可奏績。如局方禹餘糧丸。甚至三焦交阻。必用分消。腸胃至寒。必用下奪。然不得與傷寒實熱同例。擅投硝黃枳朴。擾動陰血。若大陰脾臟飲濕阻氣。溫之補之不應。欲用下法。少許。遂為九可也。其治實經選用方法備採。簡用方導。蘇大黃湯。 湯白散。 大順散。

牡蠣澤瀉散

五苓散

越婢湯

甘遂半夏湯

控涎丹

五子五皮湯

子和桂苓湯

禹功丸

茯苓防已湯

中消分清湯

小青龍湯

木防已湯

附記一徐姓小兒。單脹數月。幼科百治無功。食用肥兒丸萬安散磨積丹綠礬丸雞腫藥俱不效。余謂氣分不效。宜治血絡。所謂絡瘀則脹也。用歸鬚桃仁延胡山甲。蟻螂蟾蜍靈脂山查之類為丸。十日全愈。

吐瀉霍亂

吐瀉一症。幼兒脾胃受傷。陡發驚搐最多。若是不正穢氣。臨證指南醫案 卷十 幼科 八

臨證指南醫案

卷十 幼科

八

觸入。或口食寒冷。套用正氣散六和湯五積散之類。正氣受傷。肢冷呃逆。嘔吐自利。即用錢氏益黃散。有痰用星附六君子湯。理中湯等。倘熱氣深伏。煩渴引飲。嘔逆者。連香飲黃連竹茹橘皮半夏湯。熱閉神昏。用至寶丹。寒閉用來復丹。

食瓜果泄瀉

穉年夏月。食瓜果水寒之濕。着於脾胃。令人泄瀉。其寒濕積聚。未能遽化熱氣。必用辛溫香竅之氣。古方中消瓜果之積。以丁香肉桂。或用麝香公丁香餅治瀉。亦祖此意。其平胃散胃苓湯亦可用。

瘧

瘧因暑發居多方書雖有痰食寒熱瘧癘之互異幼稚之瘧都因脾胃受病然氣性神弱初病驚癇厥逆為多在夏秋之時斷不可認為驚癇大方瘧症須分十二經與欬症相等若幼科庸俗但以小柴胡去參或香薷葛根之屬不知柴胡動肝陰葛根竭胃汁致變屢矣幼科純陽暑為熱氣症必熱多煩渴邪自肺受者桂枝白虎湯二進必愈其有冷食不化有足太陰脾病見症初用正氣或用辛溫如草果生薑半夏之屬方書謂草果治太陰獨勝之藥知母治陽明獨勝之熱瘧久色奪唇白汗臨證指南醫案

卷十

幼科

九

初病暑風濕熱瘧藥

脫痞悶

枳殼

桔梗

杏仁

厚朴二味喘最宜

瓜蒌皮

山梔

香豉

頭痛宜辛涼輕劑

連翹

薄荷

赤芍

羚羊角

蔓荊子

滑石

淡滲清上

重則用石膏

口渴用花粉

煩渴用竹葉石膏湯

熱甚則用黃芩黃連山梔

夏季身痛屬濕熱防辛溫宜用木防己湯

暑熱邪傷初在氣分日多不解漸入血分反渴不多飲

唇舌絳赤赤連膏知不應必用血藥諒佐清氣熱一味

足矣輕則用清熱丹皮汗多犀角竹葉心

玄參鮮生地細生地木通亦能發汗

淡竹葉若熱久痞結瀉心湯選用

又夏月熱久入血最多蓄血一症譫語昏狂看法以小

便清長者大便必黑為是桃仁承氣湯為要藥

幼穉瘧久面腫腹膨泄瀉不欲食或囊腫或跗腫必用

東垣益氣以升陽倘脾陽消憊前方不應用理中湯或

錢氏益黃散得效二三日須投五苓散一二日再與異

臨證指南醫案

卷十

十

功參苓白朮散之類必全好徐忠可註全置有云幼

兒未進穀食者患瘧久不止用水糖濃湯余試果驗

瘧多用烏梅以酸泄木安土之意用常山草果乃劫其

太陰之寒以常山極走使二邪不相併之謂用人參生

薑曰露薑飲一以固元一以散邪取通神明去穢惡之

氣總之久瘧氣餒凡壯胆氣皆可止瘧未必真有瘧鬼

又瘧邪既久深入血分或結瘕母驚甲煎丸該用煎方

活血通絡可矣

痢

痢疾一症古稱滯下蓋裏有積滯而後下也但濕熱氣滯

在血冷陽傷而滯非一人以滯爲食也以消食併
令禁忌飲食而已

夫瘧痢皆起夏秋都因濕熱鬱蒸以致脾胃水穀不運
濕熱灼氣血爲粘膩先痢後痢後不爽若偶食瓜果
水寒卽病未必卽變爲熱先宜辛溫疎利之劑若膿血
幾十行疔痛後重初用宣通驅熱如芩連大黃必加甘
草以緩之非如傷寒糞堅須用芒硝鹹以硬堅直走破
泄至陰此不過若能勝濕寒以逐熱足可却病古云行
血則便膿愈導氣則後重除行血涼血如丹皮桃仁延
胡黑查歸尾紅花之屬導氣如木香枳榔青皮枳朴廣

臨證指南醫案 卷十 幼科

十一

皮之屬世俗通套不過如此蓋瘧傷於經猶可延挨痢
關乎臟候治必危診之大法先明體質強弱肌色蒼嫩
更詢起居致病因由初病體堅症實前法可遵久病氣
餒神衰雖有腹痛後重亦宜詳審不可槩以攻積清毒
施治聊附記一治驗備考

施姓子年七歲七月二十三日天久雨陰晦遂發泄瀉
數次越日腹痛下痢紅白延幼科二人調治五六日至
初二日余診之嘔逆不食下痢無度都是血水其腹痛
晝夜無寧刻兩脈俱細石澀欲微坐次鼻聞藥氣乃大
黃氣令其勿進施云有二醫在村先生一商何如余唯

之入書室素方一醫曰下痢已來全無糟粕若非攻瀉
去積無別法可投余曰肢冷下血液七八日滴不飲水
望面色枯白中極氣黯脈形細爽按之不鼓明是冷濕
中於太陰仲景太陰九法示不用下乃急煎人參炙草
炮薑歸芍陳皮少佐肉桂二劑垢滯得下痢痢大減繼
以歸芍異功散參苓白朮散半月全安

噤口不納水穀下痢都因熱升濁攻必用大苦如芩連
石蓮清熱人參輔胃益氣熱氣一開卽能進食藥宜頻
頻進二三口

小兒休息久痢變爲糞後下血最難速愈有因氣弱下

臨證指南醫案 卷十 幼科

十二

陷者補中益氣虛寒飲食不化者錢氏益黃散濕熱未
淨氣分延虛者清暑益氣湯胃強善食者苦寒清熱更
節飲食須善調經月

久瀉久痢必傷及腎以腎司二便也必肛門後墜不已
與初病濕熱裏急下重不同治以攝陰液或佐疎補久
則純與攝納

小兒熱病最多者以體屬純陽六氣着人氣血皆化爲
熱也飲食不化蘊蒸於裏亦從熱化矣然有解表已復
熱攻裏熱已復熱利小便愈後復熱養陰滋清熱亦不
除者張季明謂元氣無所歸着陽浮則條熱矣六神湯

生之

秋燥

秋深初涼。穉年發熱咳嗽。證似春月風溫症。但溫乃漸熱之稱。涼即漸冷之意。春月為病。猶冬藏固密之餘。秋令感傷。恰值夏熱發泄之後。其體質之虛實不同。但溫自上受。燥自上傷。理亦相等。均是肺氣受病。世人誤認暴感風寒。混投三陽發散。津劫燥甚。喘急告危。若果暴涼外束。身熱痰嗽。只宜葱豉湯。或蘇梗煎。胡杏仁。枳桔之屬。僅一二劑亦可。更有粗工。亦知熱病。與瀉白散加茶連之屬。不知愈苦助燥。必增他變。當以辛涼甘潤之方。臨證指南醫案 卷十 幼科 三

氣燥自平而愈。慎勿用苦燥劫燥胃汁。

秋燥一症。氣分先受。治肺為急。若延綿數十日之久。病必入血分。又非輕浮肺藥可醫。須審體質症端。古謂治病如活潑之地。如盤走珠耳。

翁如子方數月。秋燥潮熱。咳嗽如瘧。幼科用發散藥二日不效。忙令禁乳。更醫用瀉白散。再加不連二日。晝夜煩熱喘而不咳。下痢粘膩。藥後竟瘳。藥水迥余診之。余曰。穉年以乳食為命。餓則胃虛氣餒。肺氣更不爽矣。與玉竹甘草炒廣皮竹葉心一劑。熱緩。繼與香粳米南棗廣皮甘草沙參二劑。與乳少進。令夜投勿藥。二日全愈。

冬寒

深秋入冬。暴冷折陽。外感發熱頭痛身痛。嘔惡。必從太陽。若渴能飲水者。裏熱見症。即非純以表散傷寒。每以風傷衛。用桂枝法。寒傷營。用麻黃法。小兒肌疎易汗。難任麻桂辛溫。表邪太陽治用。輕則紫蘇防風一二味。身痛用羌活。然不過一劑。傷風症亦肺病為多。前杏枳桔之屬。辛勝即是汗藥。其葱豉湯乃通用要方。若肢冷寒戰。嘔吐自痢。或身無熱。即從中寒裏症。三陰須分。但小兒科太陰中寒最多。厥陰間有。若冬令應寒。氣候溫煖。當藏反泄。即能致病。名曰冬溫。溫為欲熱之漸。非寒症得

臨證指南醫案 卷十 幼科 四

汗而解。若涉表邪一二裏熱必兼七八。是瘧疹丹痧。非徒風寒。或外受之邪。與裏邪相薄。亦令鬱於經絡。或飲醇厚味。裏熱熾烈。而衛氣不與營分相和。或不正直入內侵。即有腹痛下痢諸症。其治法按症。必以裏症為主。稍兼清散有諸。設用辛溫。禍不旋踵矣。至於痧痘時癘。須分四氣也。

看三關法

滑氏云小兒三歲已內看男左女右手虎口三節曰三關紋色紫熱紅傷寒青驚風白疳病黃色淡紅乃平常小恙其筋紋宜藏不宜暴露若見黑色則爲危險再脉紋見下截風關爲輕中截氣關爲重上截命關爲尤重耳直透三關爲大危

痧疹 痧子 吳音 瘡子 浙江 疹 北音 丹

痧屬陽腑經邪初起必從表治症見頭痛喘急咳嗽氣粗嘔惡一日二日即發者輕三五日者重陽病七日外隱伏不透邪反內攻喘不止必腹痛脹秘悶危矣治法宜

臨證指南醫案 卷十 幼科

苦辛清熱涼膈去硝黃

方書謂足陽明胃疹如雲佈密或大顆如痘但無根盤方書謂手太陰肺疹但有點粒無片片者用辛散解肌冬月無汗壯熱喘急用麻杏如華蓋散三拗湯夏月無汗用辛涼解肌葛根前胡薄荷防風香薷牛蒡枳桔木通之屬

古人以表邪口渴即加葛根以其升陽明胃津熱甚煩渴用石膏辛寒解肌無汗忌用

凡瘡疹辛涼爲宜 連翹辛涼翹出衆草能升能清最利幼科能解小兒六經諸熱

春令發痧從風溫 夏季從暑風暑必兼濕 秋令從熱燥燥氣 冬月從風寒

痧宜通泄泄瀉爲順下痢五色者亦無妨惟二便不利者最多凶症治法大忌止瀉

痧本六氣客邪風寒暑濕必從火化痧既外發世人皆云邪透孰謂出沒之際升必有降勝必有復常有痧外發身熱不除致咽啞齟齬喘急腹脹下痢不食煩躁昏沉竟以告斃者皆屬裏症不清致變須分三焦受邪孰多或兼別病累痺須細體認 上焦藥用辛涼 中焦藥用苦辛寒 下焦藥用鹹寒

臨證指南醫案 卷十 幼科

去

上焦藥氣味宜輕以肺主氣皮毛屬肺之合外邪宜辛勝裏甚宜苦勝若不煩渴病日多邪鬱不清可淡滲以洩氣分

中焦藥痧火在中爲陽明燥化多氣多血用藥氣味苦寒爲宜若日多胃津消燦苦則助燥劫津甘寒宜用

下焦藥鹹苦爲主若熱毒下注成痢不必鹹以堅堅但取苦味堅陰燥濕

古人以痧爲經腑之病忌溫燥滋補所謂痘喜溫暖疹喜清涼也然常有氣弱體虛表散寒涼非法淹淹釀成損性但陰傷爲多救陰必扶脾胃汁氣衰者亦有之急

當益氣解年陽體純剛之藥忌用幼科方書歌括曰赤疹遇清涼而消白疹得溫煖而解此溫字即後人酒醃檀木粗草紙木棉紗之屬雖不可不知然近年用者多無益

痧疔濕盛熱蒸口舌咽喉疔腫若不速治有穿腮破頰咽閉喘促告斃矣治之宜早外治另有端方若湯藥方必輕淡能解上病或清散亦可

痧痢乃熱毒內陷與傷寒協熱邪盡則痢止同法忌升提忌補瀉輕則分利宜通重則苦寒解毒

痘

臨證指南醫案 卷十 幼科

七

論痘首推錢仲陽陳文中二家錢用寒涼陳用溫熱確乎相左丹溪祖錢非陳分解毒和中安表爲要以犀角地黃湯爲主方舉世宗之莫敢異議後之萬氏以脾胃爲主魏氏以保元爲主皆從二家脫化費建中救偏悉以石膏大黃胡氏輒投汗下松江東地多宗秦鏡明京口江寧咸推管樞保赤吾蘇悉遵翁仲仁金鏡錄可謂家喻戶曉者其取長在者不在乎治看法精確有可以前知之巧妙後之翟氏輩氏深以氣血盈虧解毒化毒分斷闢揚錢陳底蘊超出諸家因分別太多請者目眩心憤不若翁仲仁薈薈杳杳也然眼目之功須宗翁氏而

黃治講究參之諸家可矣姑舉首法

大凡發熱三日而後見標是其常即以熱勢參詳見症定其吉凶翁仲仁金鏡錄甚明茲不復贅其未刻悉補入

傷寒邪由外入痘子熱從內起但時邪引動而出與傷寒兩途

週歲小兒初熱即現驚搐昏迷之狀最多世俗謂驚痘最好此言未必皆然方書云先驚後痘者生先痘後驚者死頻頻驚厥最多悶痘蓋痘由腎至肝至心脾及肺自裏至外自深及淺未發之前痘熱先已內動目現水

臨證指南醫案 卷十 幼科

七

晶光芒腎熱也水生木而入肝木生火而入心心火土而入脾土生金而入肺其先天痘毒從至陰以達陽全藉身中元氣領載充長以化毒爲漿漿必濃厚蒼老而始結痂毒已外洩元氣內返斯無變症週歲已內身小元弱常有熱一日即出亦有順痘但須看神氣靜躁熱勢輕重見點徐徐而出既出即長熱緩安乳便是好痘若神氣雖安熱亦不盛痘點雖不多色呆色鈍或作頭暈足落脈懈不束筋骨隱隱微息或短氣如喘或嘔或瀉最多悶症

若二三日間痘已出而外顯如豆液終日煩躁不止

最防隱處發片及發斑夾疹等症

一發熱煩躁標點雖見熱躁愈加細詢無忽再察兼症為六氣鬱遏者從時氣治為內傷停滯者從裏症治亦有表裏兩解治亦有下奪者但下法寒涼之中必須活血理氣防其凝滯冰伏

初起必三次而出熱止即齊其贈點亦有陸續發出者須看顏色靈活生氣頃刻轉機變化為要察形辨症治法用藥表藥活血疎肌次則涼血解毒實熱便閉者微下之虛弱氣怯者忌進疎解寒涼間有虛寒弱穉初發身不大熱四肢皆冷吐乳瀉乳痘點不長聞聲悠悠欲

臨證指南醫案

卷十

幼科

九

絕望色慘淡無形恰在一二朝間余見程氏女年甫半齡佈痘極多痘形與色淡白前症迭見近地幼科僉用荆防勞蟬紅花查肉木通胡荽等尖之屬方雖寫而示以凶危延余診視余曰毒重氣虛法在不治但身無熱見症虛寒不因腐氣表邪焉用表藥考萬氏始終以脾胃為主以埋中湯加丁桂與服一劑肢暖嘔止再服利緩痘起再用參歸鹿茸二服以錢氏異功散而愈凡看痘先論兒體強弱辨肌色如色白多氣虛色蒼多血熱形象廕廕有宿病或渴乳肌柔白嫩者痘必鮮明唇黑皮粗者色必暗晦廕瘦虛弱色燥形枯必須辨依

判長養內症安邪

病軀出痘即平常無奇亦難調理歌訣云形體廕瘦骨如柴肌肉枯焦神思衰遍體鋪排如此痘縱能漿足亦堪嗟

一初見腰痛足重不能起立者死此毒伏於腎

一初見腹脹胸高續增喘噦者死

一初見目睛呆瞪或暗無光或黑白高低皆屬緊閉症

一初見痘煩躁不止即防疔斑疔必現於隱處多死

一初見痘痘不續發痘色深紫漸變藍黑六日內死

一初見痘紫斑漸起痘反隱伏此名紫斑白悶

臨證指南醫案

卷十

幼科

十

一初見痘痘斑間雜若似酒珠點墨必死

已上皆論初見看法以定凶危發齊熱退後皆無諸惡症翁仲仁云三日四日痘出當齊點至足心勢方安靜

若論幼小之兒氣血易過常有未及三日而發齊者年

長之體四日已外猶有贈發者痘子稀少數不盈百不

必點至足心仲仁大意謂發齊安靜無慮變症然須辨

明痘形痘色是何等呈色身體強壯痘屬上中方可許

其無慮倘幼小弱質或病後或體弱病而後佈痘未可

見痘好浪許再以冬夏氣候論可以百千無悞

今世用方

初見宜解肌疎表通養法十六味

荊芥	四日	防風	三日	前胡	三日	牛蒡	四日
紫草	二三日	木通	紅花	甘草	甘草	甘草	甘草
赤芍	天蟲	查肉	川芎	川芎	川芎	川芎	川芎
連翹	桔梗	廣皮	蟬脫	三四月	蟬脫	三四月	蟬脫
方書中未見點用升麻葛根湯今人不用伍氏方法見點忌升麻後人謂葛根表疎亦忌此輕揚升表通套藥若裏症急須兩解							
伍氏方一二日用羌防透肌湯今人不用惡其辛溫氣雄也一二日壯熱氣促煩渴便秘痘粒不發翁仲仁云若非風寒壅遏定是氣虛不振愚謂述世佈痘每盛發							
臨證指南醫案 卷十 幼科 三							
於君相風木燥金司令蓋非火不發也火鬱發之升陽散火是已但前症若裏熱甚重煎灼脂液苟非苦寒下奪佐以升表不能用也費建中方頗為中的							
石膏	大黃	連翹	赤芍	青皮	青皮	青皮	青皮
查肉	花粉	紫草	木通	丹皮	丹皮	丹皮	丹皮
犀角	犀角	犀角	犀角	犀角	犀角	犀角	犀角
凡寒涼清火解毒必佐活血疎暢恐凝滯氣血也實熱便秘通用							
涼膈	通聖	前胡	前胡	前胡	前胡	前胡	前胡
痘四日發足伍氏遺古方用牛蒡熟末三分用葶藶汁							

酒釀燉熱調勻臨服刺入生雞冠血十餘滴與服毒輕者即起光潤之色世皆宗之							
發齊已四五日用涼血解毒湯藥伍氏名四聖飲非扁鵲原方							
生地	連翹	銀花	紅花	甘草	甘草	甘草	甘草
天蟲	桔梗	紫草	便滑用	紫草	便滑用	紫草	便滑用
血熱加丹皮犀角火盛加黃連石膏羚羊角有斑加金汁玄參頭面不起加川芎雞冠血咽喉痛加射干玄參山豆根狂亂躁擾加地龍汁毒重血凝加豬尾血水片量見大小用							
臨證指南醫案 卷十 幼科 三							
近世涼血解毒多用地丁銀花湯前藥							
凡看痘初起要根盤其痘易長綻倘尖瘦不肥多險成漿之後務要根盤即化一線圈紅緊附頂滿滾圓是為毒化若頂陷頂破根盤黯癰其毒與氣血交凝實且攻虛宜補							
實火宜清攻不宜早看來火色大赤痘形色濕潤方可攻托否則搔擦立至乾剝毒陷不治							
虛有血虛氣虛之分血虛為熱氣虛為寒但虛熱與實熱不同虛熱用滋清方藥							
痘頂腐氣根盤腐血氣蝕血載清毒化藥凡體強							

質實者多火。以清涼之劑。火解漿成。誤補則惡。惡者難也。其氣虛血弱。色必淡白。形不雄偉。或頂陷。或皮皺。內症則惡心。少食便瀉。年少未進穀食者。腸胃薄弱。最多虛症。七日以來。元氣用事。不能勝毒。使之外出。多有內陷致變者。余最究心是症。調之應手取效。魏氏保元湯。蕭氏參歸鹿茸湯。陳氏木香異功散。湯滑不禁。用七味豆蔻丸。白朮散。理中湯。多獲奇效。甚者必用三服。大凡兒肌白嫩者。多虛症。蒼黑者。多實火。雖為大槩。亦屬至要。白嫩發痘。色必鮮艷。勿謂便是善症。蒼黑發痘。色必晦昧。勿便許為凶。總以神氣安靜。顏色日換。形象

臨證指南醫案

卷十 幼科

三

漸長便吉。

六七日伍氏內托散

生黃芪 甘草 陳皮 川芎 當歸

白糯米 防風 天蟲 角刺 銀花

血熱者不用芪防芎歸 表疎者去天蟲角刺

血熱仍用丹皮地黃紫草連翹羚羊

猪尾雞冠雞鳴散達表之藥 猪尾膏通裏之藥

保元湯 人參 黃芪 炙草 加川芎當歸名芎歸

保元 虛寒加肉桂 升頂加鹿茸

氣滯正氣加廣皮厚朴 瀉加木香肉果

質弱加坎基河車 驅逆加丁香厚朴

參歸鹿茸湯 人參 當歸 鹿茸 黃芪

龍眼肉 炙草

木香散 人參 木香 丁香 大腹皮

桂心 青皮 訶子 半夏 甘草

前胡 赤苓

異功散 人參 木香 官桂 廣皮

當歸 茯苓 丁香 白朮 附子

肉果 厚朴 半夏

荳蔻丸 肉果 木香 砂仁 枯礬

臨證指南醫案

卷十 幼科

三

訶子 龍骨 赤石脂

白朮散 四君加藿香木香

七八九日頻用清涼。痘火色既退。漿不能透。或有半漿。

頂有箸笠之形。不克充灌。今人多用桑蟲漿生用。雞冠

血生用。同酒漿和服。倘攻起。少頃後呆滯者。須用補托。

伍氏攻發藥用老人牙煨研極細加麝香少許舂服

二三分名黑靈丹

右天蟲乃疎表風藥 山甲乃攻經透風藥一味為

末酒漿服曰獨勝散

凡蟲蟻皆攻無血者走氣有血者走血。錢者升。地行者

凡癰足聲音啞者不助緊喘痰升者大忌翁仲仁云
挫喉聲啞藥行飽滿亦無妨蓋痘漿因熱氣以煉成必
升騰以達頭面肺位最高熱上蒸迫肺先受損是以聲
出不揚倘喘急扶肚臍胸乃火毒歸肺必不治矣
火毒歸肺幼科每用珠子牛黃膏連之屬多不效余遵
孫真人葦蕈湯或仲景葶藶大棗湯間有效者肺氣壅
遏苦寒直下已過病所故無效
方書以六七日已前寒戰屬肺熱六七日已後寒戰屬
氣虛六七日以前咬牙屬胃熱六七日已後咬牙屬血
虛亦屬定論

臨證指南醫案

卷十 幼科

三

八九日癰塌咬牙痘不起漿或灰白或涸或癰危險極
矣速速溫補亦可望生翁仲仁云塌陷咬牙便實聲清
猶可治聲清則上無熱毒痰聚便實則腑陽未至盡洩
所以溫補得效耳 木香散 異功散

八九日順痘漿色蒼黃毒氣悉化亦云垂成須謹防護
持搔損流膿裂血倘正氣大泄毒從虛陷常有不治之
患斯時預囑件毋勿懈使癰腐乾結肌肉完固便是全
功若痘已破碎聲不啞者毒不洩也無妨

伍氏方用芍藥湯

炒白芍

黃仁

茯苓

地骨皮 銀花

百合

山藥

建蓮

十一二日漸次成痂之際極好之症必有咳嗽或夜夢
身熱世俗幼科僉云毒氣未盡藥投苦寒多有胃減廢
食釀成痘勞童怯者吾嘗論痘自腎臟骨髓之中由肝
主筋心主血脉脾主肌肉肺主皮毛從內之外毒乃洩
釋收疤之時真氣歸裏肺合皮毛是為末傳處位高體
清肅從前灌脹成痂蒸迫之氣受虧已極氣泄為咳矣
況投利濕下注藥而結痂其上焦已經禪燥若毒仍留
伏焉能收屬此斷斷然也再論幼穉陽常有餘陰未充
長佈痘至於結痂一身脂液大損其陰氣告置可知故
暮夜屬陰時為煩為熱者正內經云陰虛生內熱也昔

臨證指南醫案

卷十 幼科

三

西郊吳氏女年甫四歲痘係順症幼科調治至漿滿成
痂之日忽發煩躁夜熱不寐晨起安然醫用保元及錢
氏五味異功加芍藥與服熱躁益加又更一醫曰毒氣
未盡乃悞補之故用桑蟲漿暨涼解藥服後躁熱甚而
添泄瀉邀余視之靚漿痂形色詢平素起居時日當午
即用六味地黃湯一服而安此二條人多忽而不究故
辨及之 旬朝後嗽大法以甘寒生津胃藥

蔗漿

麥冬

沙參

桑豆皮

地骨皮

甘草

玉竹

甜杏仁

解餘毒藥全以不傷胃氣為主若用寒連必須酒製翟

聶二氏辨之詳矣。平和無奇。斷不敗事。如三豆飲之。過若金銀花一味。本草稱解毒不寒。余見脾胃虛弱者多服即瀉。伍氏用連翹飲子。亦取平和。

痘毒起。熱症十有七八。虛寒十有三。甚至骨出腐敗。亦有愈者。但外科大忌用火煉升藥。其診看之法。亦如瘍毒。須分陰陽耳。

痘疔濕盛生熱。強者用苦寒清降。以苦能去濕也。若阻咽廢食。以及穿腮破頰者難治。

年長出痘。男女慾火已動。其初即現膝痛腰痠。咽喉窒痛欲閉。苦辛寒藥。必不效驗。宜甘鹹寒。滋水制火。佐以

臨證指南醫案 卷十 幼科

壬

解毒。六七日來痛勢日緩。聶氏有參麥清補方。余每用錢氏六味。加龜膠玄參秋石。獲效者甚多。若漿不肯起。頻吐粘涎者凶。

凡惡痘。凶危時刻。如諸悶症。不過三五日。已發而縮。其危最速。總在七日內。再若蒙頭。鎖喉。懸鏡。纏腰。蜘蛛。垂種等。為十惡症。其袁氏十八惡症。今人未嘗備及。如此等痘。治之無益。徒招怨尤。更有糖沙夾斑。十朝危期。又根枝雖好。佈於歲內。幼小之兒。必八九歲。或不治。牛漿毒陷之變。必斃於十一二四之期。若能食者。十救一二。痘至八九旬。日外無漿。則裏毒不化。必留膿。瘡潰。痰潮。

不食。眼開。條欵難以盡言。危期速矣。常有忽然連串片片之痘。裂水形如松脂。桃膠外露。轉眼堆聚。內症漸安。變凶轉吉。更有旬朝內外。乾板。澗如焦鍋。已狀毫無生氣。忽從地角承漿諸處。裂縫流臭水。漸升頭額。堆腫高厚。若糊臉。名曰發臭。毒泄即當補托。遲則氣脫。

驚

小兒倉猝驟然驚搐。古曰陽癇。從熱症治。古人用涼膈散為主方。

按急驚屬陽。熱病用涼膈。以清膈間無形之熱。膈上邪熱逼近膈中。絡閉則危殆矣。此宜通乃一定之法。然必

臨證指南醫案 卷十 幼科

壬

詢病因。察時候治之。

幼科以痰熱風驚四治。猶可說也。吾鄉有端科。立方鉤藤連翹木通薄荷前胡枳殼桔梗。加入表散消食。多不效驗。

驚為七情。內應乎肝。肝病發驚。駭木強火熾。其病動不能靜。且火內寄肝胆。火病來必迅速。後世龍膏本連。必加水磨硝黃。取其苦寒直降。鹹苦走下。辛香通裏。發之閉也。如牛黃丸。至寶丹。紫雪。皆可選用。凡熱邪聚。數神迷昏憤者。做此。

鉤藤丹皮之屬。僅泄少陽胆熱。與急驚。發熱內閉之症。

無益若火熱劫燥血液苦寒藥不中與也宜用犀角地黃湯之屬

方書有鎮墜金石之藥有攻風劫痰之藥雖非常用不可不考

驚與厥皆逆亂之象仲景云蛔厥都從驚恐得之凡吐蛔腹痛嘔惡明是肝水犯胃幼醫調治束手告斃余宗仲景法每效

慢驚古稱陰癇其治法急培脾胃理中湯為主方有痰嘔吐用南星白附子六君子湯聲音不出開竅如竹瀝薑汁菖蒲根荷金之屬

臨證指南醫案 卷十 幼科

三

是病皆他病致變其因非一有過飢禁食氣傷有峻藥強灌傷胃有暴吐暴瀉脾胃兩敗其症面青皖白身無熱雖熱不甚短氣骨蒸皆倦如底皆溫補治之惟嘔逆不受乳食溫補反佐薑連連理湯錢氏益黃散

錢氏異功散

疳

穉年五疳猶大方之五勞雖方書有五疳之分是疳夏令為多因從脾胃諸小兒乳食難進消化不及初斷乳後果腥雜進氣傷滯聚致熱蒸於肌肉消瘦腹大肢細名曰丁癸或善食或不嗜食或渴飲無度或便瀉白色

久延不已多致凶危宜忌食生冷腥肥凝滯治法初用清熱和中分利次則疎補佐運常有繼病治之無效待妊婦產過自愈者

夏季霍亂吐瀉通用藿香正氣散

水瀉宜分利四苓散寒加薑桂熱用苓連

腹痛宜疎氣調氣用木香青皮有滯加炒枳肉厚朴重則加萊菔子檳榔

腹痛有熱用芩芍枳實有寒則用草果砂仁吳萸

吐瀉後能食便反秘結者愈不能食神怯色痿者防慢驚治法調中溫中若有餘熱煩渴甘寒或甘醪救津故

臨證指南醫案 卷十 幼科

三

木瓜之酸制暑通用要藥

春溫風溫

春月暴暖忽冷先受溫邪繼為冷束咳嗽痰喘最多辛解

忌溫只用一劑大忌絕穀若甚者宜晝夜豎抱勿倒三四日大輕為咳重為喘喘急則鼻掀胸挺

春溫皆冬季伏邪詳於大方諸書幼科亦有伏邪治從

大方然暴感為多如頭痛惡寒發熱喘促身重脈浮無汗原可表散若令溫者辛溫少用陽經表藥最

忌混亂至若身熱咳嗽之症只宜肺藥辛解瀉白散加前胡牛蒡薄荷之屬清其熱只宜一二味若一二更

俱通者。消食少用。須辨表裏上中下何者為急。施治。
春季溫暖。風溫極多。溫變熱最速。若發散風寒。消食劫
傷津液。變症尤速。

初起咳嗽喘促通行用

薄荷汗多不用連翹

象貝

牛蒡

花粉

桔梗

沙參

木通

枳殼

橘紅

桑皮

甘草

山梔

泄瀉不用

蘇子降氣

表解熱不清用

黃芩

連翹

桑皮

花粉

地骨皮

川貝

知母

山梔

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

裏熱不清。早上涼。晚暮熱。即當清解血分。久則滋清養

陰。若熱陷神昏。痰升喘促。急用牛黃九至寶丹之屬。

按風溫乃肺先受邪。遂逆傳心胞。治在上焦。不與清胃

攻下同法。吾鄉幼科當此。初投發散消食。不應改用柴

芩瓜蒌枳實川連。再下奪不應多致危殆。皆因不明手

經之病耳。

若寒痰阻閉。亦有喘急胸高。不可與前法用。三白吐之。

或妙香丸。

暑熱

暑邪必挾濕。狀如外感風寒。忌用柴葛羌防。如肌表熱無

汗。辛涼輕劑無悞。香薷辛溫氣升。熱伏易吐。佐苦降。
如杏仁川連黃芩則不吐。宜通上焦。如杏仁連翹薄

荷竹葉。暑熱深入。伏熱煩渴。白虎湯。六一散。

暑邪首用辛涼。繼用甘寒。後用酸泄。飲津。不必用下。

暑病頭脹如蒙。皆濕盛生熱。白虎竹葉。酒濕食滯。加

辛溫通裏。

小兒發熱最多。變蒸之熱。頭緒煩。不能載。詳於巢氏病

源矣。然春溫夏熱秋涼冬寒。四季中傷為病。當按時論

治。其內傷飲食治法。不宜混入表藥。消滯宜用丸藥。潔

臨證指南醫案

卷十

幼科

三

痧疹

袁 溫邪痰嗽氣喘肚膨四日不解防發痧

連翹 山梔 牛蒡 杏仁 石膏

汪 痧將退熱未去肺氣不清咳逆無痰

前胡 桑皮 杏仁 橘紅 桔梗

木通 蘇子 象貝

王 痧隱太早咳喘發熱宜開肺氣

薄荷 杏仁 象貝 連翹 桑皮

木通 紫苑 鬱金

臨證指南醫案 卷十 痧疹 三

某 溫邪發痧不透熱毒內陷深藏上薰肺為喘下攻腸

則利皆冬溫火化之症經云火淫於內治以苦寒

不究病本不明藥中氣味愈治愈劇至此凶危

川連 黃芩 飛滑石 炒銀花

連翹 甘草 丹皮 地骨皮

蔣 喘為肺病脹乃肝病因時痧寒熱未解熱邪內陷所

致王先生用苦辛酸法極通然浮腫未減得非經

腑之濕熱留着歟

木防已 石膏 杏仁 大豆黃卷

通草 茵仁 連翹

又 痧退後呻吟不肯出聲涕淚皆無唇紫腫乃毒火

未經清解上痰漸閉氣促痰鳴猶是溫邪客氣致此自

當清解務盡其神識自和奈何以畏虛滋肺邪火愈熾

矣

川連 玄參 杏仁 甘草

黃芩 連翹 桔梗 銀花

王 痧後及暮加喉痛咳

玄參 犀角 鮮生地 連翹

花粉 丹皮

那 咽痛鼻燥唇腫自利風溫熱化發疹上焦熱熾宜辛

臨證指南醫案 卷十 痧疹 三

涼微苦以泄降

連翹 黃芩 犀角 桔梗

牛蒡 杏仁 玄參 通草

譚 六歲溫邪時癘胸白口臭穢逆遊行三焦而為麻疹目赤

鼻屎吐烟瀉痢津津汗出而喘渴欲飲當與辛苦寒劉

河間法世俗不知愈日發痧但以荆防湯散升提火得

風颺煩烈莫遏津劫至變矣涼膈去積黃加石膏牛

蒡赤芍

張三 手足煩熱時發赤塊

桑豆殼 捲心菜

無論

痘

程見點若隱若現。神倦不寧。勢如悶伏。表裏俱不宜暢。雙解固宜。再佐以芳香搜逐。使蘊伏之毒透發為主。

紫雪丹

周熱閉心胞絡中。目綻口開。舌縮。兩手撮空。痰涎壅通。便瀉。血分大傷。九日險期。按法圖梓。勉與紫雪丹二錢。開水調緩緩下。用茶匙。備得神甦。速舒方有生機。

又神醒。舌終紫音縮。渴飲不已。心胞熱閉雖開。而在裏脂液已涸。古人以心熱消渴。多係臟陰現症。不可攻奪。

臨證指南醫案 卷十 痘

明矣

鮮生地 竹葉心 玄參 知母 銀花露

金汁 先用紫雪一錢

初起腰足俱與。肝腎蘊毒不得外越。目泛匝舌。癰增喘促。是緊關不治之症。諸醫僉用石膏大黃。然此藥僅通陽明胃腑之蘊。未能搜逐肝腎至陰之臟。讀宋醫錢仲陽直訣。毒伏於陰。亦有下奪之法。其製方曰。聚變丁。祥九。乃百中望一二生全者。紅芽大戟 五錢 紅紫 五枚 水煮至熟。去核及大戟湯。但用棗肉研化開水送。

毒伏不肯宣透。氣滯血凝。焉能起。或成漿七八險關。

診視肉腫。瘡枯。神躁不安。議疎利內壅。佐活血透肌法。

犀角 紫草 炒查 鮮生地 酒浸大黃

紅花 青皮 丹皮 連翹 牛蒡

茅根 笋尖 湯代水

俞發熱五六日來。神煩不寧。腹膨咳逆。詢知二三日。前眉間見點數粒。狀如麤痞。隨即隱伏不見。乃毒重壅遏。

悶伏景象。設或發出。亦屬重險。且甫生六月。胃之穀氣難進。湯藥凝滯。進紫雪須少。搜其蘊蓄之邪。使其神安再商。紫雪丹一分。

商 紫雪丹一分

臨證指南醫案 卷十 痘

要

高點雖繁密。根脚綻立。寒涼藥不宜太重。可以維持收功。

犀角 連翹 牛蒡 炒查 紫草

丹皮 天豆 桔梗

龐二神倦腹痛。點粒繁瑣。地界不清。是時邪毒火兼重。急進雙解法。使大便稍通。六腑氣宣。則痘毒透轉。商犀角 連翹 牛蒡 酒大黃 紫草 青皮

桃仁 炒查 木通 生石膏 荊芥 笋尖

程成片不立。頂焦黑。澤潤。重不能起。服滋得化毒。今喘咳交加。九朝難進。

羚羊角 玄參 連翹 天麻 土貝

紫草 炒查 丹皮 銀花地丁湯代水

錢三雖未發齊其點形繁密色澤不潤重險何疑今未全退倘宜清解

犀角 生石膏 炒查 紫草 連翹

牛蒡 赤芍 桔梗 木通

程三身小氣弱佈痘繁稠用藥不宜寒涼五日後受得補托可冀有成

連翹 牛蒡 炒查 紅花 天麻

川芎 歸身 桔梗 炒乾荷葉

臨證指南醫案 卷十 痘 三

毛身小氣弱漿發漸爲腐虛

人參 炒歸身 炙草 瀉皮 炒白芍

炒黃米

童四痘形粘着肌肉不肯起綻高立兼之繁紅殼薄乃時火毒火交熾而元氣素虧體質目今六日前時癰未徹宜先清解活血提頂希冀腐盡分地界再究

犀角 羚羊 玄參 丹皮 炒查

秦皮 紫草茸 銀花

鄭痘發猶然身熱咳嗽乃入肺故留診其點粒粘着不爽溫邪鬱滯氣血更難清矣虛微開肺氣以宣之

活血以疎動之冀其形色充長若一進沉降恐無好音

連翹 桔梗 紅花 牛蒡 甘草

炒查 鬱金 丹皮 雞冠血

又昨進輕揚提頂活血痘形頗長所嫌色不光潤蓬鬆盤頂有乾塌無漿之慮今明時氣將解氣血用事況正欲納穀苦寒不但冰伏毒氣更防大傷胃口古人於重症更加詳慎者爲此

川芎 當歸 天麻 桔梗 甘草

角刺 紫草茸 丹皮 炒查

又六進和氣血法形色畧潤究不肥綻焉得起脹成漿臨證指南醫案 卷十 痘 三

進十宣散法

人參 川芎 歸身 瀉皮 紫草茸

天麻 紅花 白芷 甘草 桔梗

張四船小重載難許全功勉議進雞鳴散二分

陸五點雖不密色滯形癢痰多嗆逆如嘶是痘雖發出毒猶在肉上冲心肺故有喘咳不寧之象進涼血透毒法

羚羊 桔梗 甘草 紫草 丹皮 川芎

連翹 玄參 射干 天麻 西牛黃 分

朱四炒黃米 炒山慈 紅花 銀花 又五身小痘多元氣虛弱服本藥較味陽氣太過虛

嘔泄宜少少與藥扶過八九風波方得平安

又六朝薄嫩無漿仍宜內托
川芎 炒當歸 桔梗 甘草 黃米 雞冠血

黃芪 防風 歸身 川芎 紫草茸

丹皮 天重 桔梗 甘草 雞冠血

宋朝顏頰形似紅沙餘痘乾枯不潤昨進清毒活血續發

點子盈千仲仁謂毒重壅閉氣血必乾焦退縮今五朝

形象僅似初齊痘以十二日為常數已經壅遏未發三

日矣當此質薄神弱恐難延多日即或望其堆沙發臭

然必在旬日以外目下總以解毒清涼八九波濤洶湧

臨證指南醫案 卷十 痘 毒

恐難人力穩全

犀角 羚羊角 川連 炒查 土貝母 紫草茸

玄參 鮮生地 連翹 丹皮 牛蒡子 猪尾血

吳五朝痘子分顆原屬純正所嫌色滯乾枯防八九癢塌

涼藥兼以活血是為平準方法看守勿懈為上

羚羊角 丹皮 連翹 炒查 紫草茸

黃連 玄參 天重 生地 雞冠血

孫肌柔白嫩體質是虛但痘必由毒熾腐地中六

氣咸從火化癰固宜清氣血若非清解何以透達

今觀色油紅形勢一變由腐而清先服此方

具起脹之象體症未為合局慮進銳退速清涼解毒佐
以提頂在五六日之法然險症變遷不定論

羚羊角 連翹 丹皮 天重 生甘草

紫草茸 川連 炒查 桔梗

銀花湯煎和入雞冠血數滴

汪五痘形繁瑣成片色紫滯乃火毒重險症藉身大氣旺

扶持十四險關冀其發臭堆沙庶幾可以圖倖

犀角 羚羊角 桔梗 炒查 連翹

天重 紫草茸 丹皮 石膏 銀花

臨證指南醫案 卷十 痘 罕

地丁 牛蒡 猪尾血 冰片

又六雖血熱毒重猶幸入於體堅急清解活血莫令痰阻

廢食扶持堆沙可望向安

照前方去石膏地丁天重牛蒡加川連玄參土貝

查痘子成漿濕氣蘊於皮毛與熱氣相蒸內應乎肺發

出點痘疹宜忌葷腥輕清理肺淡滲清其濕熱驗其體

質最薄慎勿過劑

苡仁 茯苓 連翹 地骨皮 通草

桑葉 白沙參 甘草

顧痘發由絡其毒不化而轉陷亦歸於絡當世暑曉攻

補而已讀古人書。辛香溫煦。乃治毒陷大法。

人參 肉桂 炙草 丁香 厚朴

訶子皮 廣皮 木香 前胡 茯苓

徐未納穀食。但以湯藥。所以滑泄不止。頭仰胸突。擁痰身熱。肺熱未清。不可驟補。翁仲仁有泄瀉安寧。大虛少毒之議。姑以和中清咽再商。

桔梗 甘草 炒歸 川芎 廣皮

炒查 炒黃米湯煎 沖雞冠血

又朝身小痘密。氣弱難任。雖清漿三四。防護宜慎。八九日不致損破。可以有成。

臨證指南醫案 卷十 痘 望

人參 黃芪 炙草 紫茸 天靈

廣皮 川芎 歸身 厚朴 炒查

加炒冬米

孫朝七。嬌皮薄。漿汁未灌。緣身小痘多。氣血交虧。不能運毒化漿。八九日期。最有癢塌之慮。扶過十二朝無變。庶幾可望有成。進參歸鹿茸湯法。

人參 歸身 鹿茸 生黃芪 炙草

廣皮 厚朴 煨木香

又八朝前方加肉菓炒冬米

又漿清四五。不能充灌。因元氣餒弱不振。不能煨煉毒

氣成漿。恐有內陷之慮。再進補托。冀其堆沙。或可回春。

人參 黃芪 廣皮 炙草 木香

鹿茸 歸身 肉果 坎炆 官桂

又十三。廔痲甚。薄中凝血跡。兼之噎逆帶嘔。食入便有不化之形。此虛中有毒。非純補純清之症。

炒川貝 炒銀花 茯苓 苡仁 甘草

地骨皮 方太輕

楊八。潤塌癰陷。漿色白。滯不榮。謂之氣衰毒陷。所冀堆沙加食。一線機耳。

人參 黃芪 川芎 歸身 木香

臨證指南醫案 卷一 痘 望

炙草 廣皮 桂心

又十一。漿滿堆沙。四肢圓綻。但氣弱恐其不肯收痂。必實脾利水為法。

人參 冬米 炙草 茯苓 新會皮

白芍

又十三。已經堆沙。加六。都是向安之象。便溏滑膩。皆寒涼傷裏。腸中脂垢自下。當脾胃藥中。少佐固腸。以久延不已。倘貽變症。

人參 熟米 訶子 廣皮 肉果

白芍 木香 炙草 茯苓

又^{十六} 納食不化腹膨便黃白色要諸胃滯消肺弱宜補古稱痞滿屬氣氣行滯通但瘰後虛體純消猶恐變症

人參 焦木 炒查 木香 焦麥芽
廣皮 茯苓 澤瀉

鮑^九 漿不外達毒欲內陷已經咬牙滑瀉嘔惡內症諸款皆屬深畏十二四總屬陰關痘子毒氣必氣元旺冀其托出謹以陳氏木香散救裏托毒

人參 木香 丁香 官桂 炒歸身
厚朴 廣皮 肉果 訶子皮

臨證指南醫案

卷十

痘

星

孫 面腫目泛頭搖微嘔肝風離體乘上逆攻此乃變驚欲厥之象夫相火寄於肝胆氣欽痘痂宜進涼解毒倘得微熱緩仍進穀方有佳音

羚羊角 川連 鈎藤 石菖蒲 黑山梔

胆星 天麻 連翹

又 肝風勢定疳蝕亦緩仍宜清熱解毒但不可犯胃

羚羊角 連翹 胆星 丹皮 炒銀花

金石斛 茯苓

諸^{十三} 痘已收靨然痂落太早恐有餘毒今寫止瀉短宜進清涼佐以分利

生苡仁 百合 茯苓 川斛 白沙參
炒麥冬 妙理

某 已經回痂不宜再進補劑恐氣血壅滯致有餘毒變幻宗翁仲仁清涼以助結痂之法

黃芩 銀花 川貝 甘草 地骨皮
桔梗 連翹 苡仁

胡^{十五} 雖然堆沙屬痂咬牙發瘡毒氣未盡上冲心肺補清皆在難進扶過十八日後癰毒尚可療治若發疳蝕恐難全愈

炒麥冬 白沙參 苡仁 川貝 炒銀花

臨證指南醫案

卷十

痘

器

地骨皮
沈^{十三} 漿未充滿忽然乾涸卽是倒靨咬牙寒戰元氣大虧非峻補難挽

人參 鹿茸 炒當歸 桂心 桂圓

煨木香

程 回痂太早餘毒流走四肢臂腿腫痛議活血解毒

連翹 小生地 當歸 赤芍 刺蒺藜

丹皮 夏枯草 銀花 酒半小杯

吳^{十四} 喘咳嘔逆腹脹都是餘毒內閉小便少大便溏不得爽倘再加喘急便是棘手必得瀉毒外發可望挽回

徐朝十六	瘡毒已發。咳。噎未止。痲落如。肌色既白。雖屬氣	炒銀花	炒川貝	茯苓	苡仁	車前	炒澤瀉	沈	薄藥回痲。毒氣未盡。只宜清肺解毒。	杏仁	甘草	川連	黃芩	山梔	連翹	銀花	又	痲火未清。	大貝	丹皮	地骨皮	川連	犀角	連翹	銀花	玄參	某	痘未退痲。痲火內逼爲喘。	臨證指南醫案	卷十	痘	吳	苡仁	銀花	地骨皮	連翹	茯苓	川貝	桑皮	地骨皮	連翹	茯苓	川貝	利分消。做古痘毒。當利小便意。	吳朝十四	薄藥回痲。毒氣未化。已有疳蝕之患。理進清解餘毒。但勉進稀粥。溏瀉未罷。胃未旺相。脾氣積弱。議以滲	木通	銀花	牛蒡	夏枯草	連翹	杏仁	桑皮	地骨皮	黃芩	查	痲後發痲。係肺熱未清。宜辛涼佐以解餘毒。	生甘草稍	桑白皮	大腹皮	菉豆皮	茯苓皮	飛滑石
------	-------------------------	-----	-----	----	----	----	-----	---	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	---	-------	----	----	-----	----	----	----	----	----	---	--------------	--------	----	---	---	----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	-----------------	------	--	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	---	----------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

人參	熟地	茯苓	建蓮	又	三十陽極則煩。陰瀉爲躁。夜甚劇。自從陰分設法益虛和陽爲治。	炒杞子	生白芍	人參	茯神	棗仁	歸身	炙草	馮二十	痲膠粘連。神氣昏昧。元爲漿泄而乏。變幻慢驚。欲脫。此皆穉年陽亢陰虧。毒明目窺。肝陰之絕。恐難再振。	人參	茯苓	炒芍	生穀芽	藿香	土制木以緩肝風。冀免驚疳之患。	人參	茯苓	炒芍	生穀芽	藿香	廣皮	半夏	李朝二十	納食嘔吐。脾胃不和。肝風內動。肢浮肉腫。治宜培	臨證指南醫案	卷十	痘	吳	地骨皮	甘草	生地炭	菉豆皮	炒丹皮	炒川貝	川斛	沈一	朝痰。噎失音。不嗜食物。晝則稍安。暮夜煩躁。此肺熱未肅。磨耐多日。體氣陽亢陰虧。肝風內熾。突起驚厥可慮。	炒澤瀉	苡仁	川斛	茯苓	百合	廣皮	瘡毒宜速調治。恐日久愈虛。致有慢驚之慮。	血交虛。但痘後餘毒未可驟補。議進和脾胃利濕方法。
----	----	----	----	---	-------------------------------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	---	----	----	----	-----	----	-----------------	----	----	----	-----	----	----	----	------	-------------------------	--------	----	---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	--	-----	----	----	----	----	----	----------------------	--------------------------

遠志 炒山藥 五味

楊點來不爽。頂有水痕微焦。此時氣傳染。胎毒未發。乃水赤之類痘耳。

連翹 牛蒡 丹皮 赤芍 飛滑石

木通 山梔 甘草

邵痘中復感溫邪。口鼻觸入。由中道以佈及絡脉。目泛失明。左肢不舉。少腹突起。腫滿兩足皆瘳。詢知痘見六日。陡然頭搖煩躁而得。小便淋漓。大便漸壅。乃厥陰肝熱。疔痕失其疎泄。內風旋轉。腑陽不通。經言暴腫暴脹。皆風火變動。至於迅速病來。其能食消運。熱化自可殺。

臨證指南醫案 卷十 痘

痘

穀考古辛散酸泄甘緩三法。難圖腑絡壅結。仲景於厥陰條例。有下之利不止者死之大戒。議進鹹苦以通在下結熱。愚見若此。再與高明商酌良治。

川棟子 小茴 蘆薈 山梔 橘紅

龍胆草 方諸水七匙

自古治痘名家。不啻甘數。各有精確卓識。以補前人之未備。雖各有所偏。實所以相濟也。醫者貴統彙羣書。隨宜施治。安可執偏門管見。以應無窮之變哉。先生治痘。夙稱神奇。觀其案中寒熱攻補。不膠於一見。如毒火深伏。氣血壅遏者。藉方香以披逐。用紫雪丹。

臨證指南醫案 卷十 痘

痘

氣滯血凝。毒重火熾。以清大黃石膏青皮桃仁劑。芥犀角猪尾血之類。三治肝肺毒火不宜。氣血有焦燔之勢者。用犀角羚羊辛寒重藥。安石膏鮮生地之類。元氣不支。陽虛毒陷。而見灰白濕爛泄瀉嘔惡等症者。用辛香溫煦。如陳文仲之法為要。氣血極虛。而漿清塌痺。全無實症相兼者。當峻補氣血。用參歸鹿茸湯。及坎炁湯之類。氣虛莫外乎保元及四君子。血虛不離於四物及補血湯。又有氣虛血熱者。補氣之中兼涼血。血虛氣滯者。補血之中佐辛香。用攻法瀉分部位經絡。用補法當辨寒熱燥濕過清則有冰伏之慮。偏熱則有液涸之虞。此皆先生採擇先賢之法。因人見症而施治。可謂善法古者矣。夫痘雖以形色辨其吉凶。然內症尤為緊要。如痘點既起。或不慎風寒。而營衛凝滯。或縱恣飲食。而氣機呆鈍。以致身熱不食。腹膨嘔惡泄瀉。漿水不行。不究治其病因。但執清寒膩補。常有凶危之變。亦有痘形雖重。若神寧安靜。飲食二便如常。聲音清響。調理得宜。亦可轉危為安。大凡形老而色鮮明者。雖甚密。變幻恒少。形嫩而色晦滯者。雖稀疏。變幻恒多。表裏相參。審症的確。然後設法處治。方無貽誤。至於逆症條款已現。雖自昔名。

醫亦莫能挽救。小兒天枉者不可勝數。深可憐憫。邇年以來。幸有種痘一法。盛行於世。實可挽回造化。凡有小兒者。俟週歲後。即可選用種痘之苗。引而發之。百不失一。此誠補痘科之未備。而為最上一乘之法也。正痘有先賢諸成法。避險有種痘之良方。痘症於是乎大全矣。陸履安

痘之發也。一由乎胎毒內伏。一由於外感時邪之氣引導而出。其症之順逆。若內毒輕而外感之氣亦輕者。痘必稀疎。此為順症。若內毒輕而外感之氣重者。慮其過悶不齊。不易灌漿。若能至灌漿則時邪漸退。

痘症指南醫案 卷十 痘

完

後易收功。此為先重後輕症。若內毒重而外感之氣輕者。慮其灌漿已後。毒難盡洩。不易收靨結痂。恐發痘毒疳蝕之患。此為先輕後重症。若內毒重而外感之氣亦重者。痘必稠密。色不鮮澤。發熱見點之後。一路踴躍。難以收功。此為逆症。然胎毒之輕重。人皆易明。若外感之氣。人莫能曉。夫天地間。祇有六氣。氣平則為和氣。不平則有勝復。勝復至極。則為厲氣。為瘟疫氣。瘴氣。更有道塗中穢濁氣。人若感之。不拘老幼俱病。今出痘所感之氣。則異乎是。此氣獨與未洩胎毒之小兒。兩相感觸。未聞痘症盛行之時。已出過痘。

之兒。亦染病患也。考是氣自古迄今。從未有人申說明白。確定為何氣。故前賢於痘症一科。未嘗不殫心瘁慮。立論著方。因不明其氣之源。不無偏執之弊。有喜於寒瀉者。有喜於溫托者。有先用寒瀉而後用溫補者。有先用溫托而後用清火解毒者。更有不審兒體之虛實寒熱。俱宗費建中救偏損言。每於發熱見點時。驟用大黃石膏黃連犀角羚羊茅根蘆根等。不知費氏之書。名為救偏。乃救慣用熱藥之偏耳。若本不偏。而宗其法。助不偏者。反至偏矣。嬰兒之命。其何以堪。幸古有種痘良法。相傳至今。其法簡易靈驗。至

痘症指南醫案 卷十

辛

穩至當。蓋正痘因外感時邪而發。種痘則種於無病之時。故所出稀疎。輕者不過幾十粒。此豈非避危就安之妙法乎。倘愚人不信。何不將自出與種出。彼此相較。其理自明。假使一村之中。有百兒出天花。未嘗不延醫服藥。若能八九廿收功。人咸稱為太平痘矣。甚有竭力調治。而損傷幾及一半者。不問其歸咎於醫生。惟有委命於天而已。今若種百兒之痘。設或損傷四五個。則必責罰種師。并不容其托足於此。一村之人。何篤信醫生。而不相信種師耶。與其委命於天。孰若以人功挽之。以此相較。則當種與不當種。自決。

矣。至於種法全在乎好苗。夫苗者即取他兒之痘痂也。必用種出之痘。落下之痂。謂之種苗。此苗之中毫無天行時毒之氣在內。故放心可用。若自出天花之痂。謂之時苗。此苗之中有時行之氣。若不辨而用之。名雖為種。實與傳染他兒。天行時毒之氣無異。此時苗之不可用也。然種苗之內尚要揀擇。必取痘粒稀少。其色紅潤。濃漿濃厚。所結之痂厚實。光澤。尖圓。者。此氣血充足。陰陽合德。上好之苗也。俟痂落下。用紙包好。記明何日收得。收貯新磁瓶內。緊護其口。置清涼之處。勿觸穢熱之氣。其苗在北方。天氣涼。春月之苗。一月之內尚可種。冬月之苗。四五十日尚可種。南方氣溫。夏月之苗。四五日。春月之苗。二十日。冬月之苗。三十日。若延日久。則氣薄無力。恐種不出矣。欲覓此等種苗。先訪有人家正在種痘之際。向彼明言其故。懇求四五粒。即可源源而種。或平日於同道種師內。相與一二位志誠老實者。議明彼此互借。則苗亦可不新。亦有膽大種師。於五六月中。覓貧家壯實之兒種之。不惟不索酬謝。反肯津貼銀錢。次遞傳種三四箇兒。延至七月。則苗亦可以不新矣。近有種師因種苗已斷。權取時苗種之。往往有種出稠密棘手。

重症者。皆時苗之過也。不知時苗之性。即選上好者。亦必要傳種過四五兒。俱各順當者。其苗性始和平。方能與種苗相等。至於下手種法。尤須詳慎。凡種一兒。用痘痂三四粒。兩兒則用六七粒。放於乾淨茶杯中。傾入清水四五茶匙。用小指尖在內三四攪。則痂已濕。急將水傾去。用柳木杵研。其杵約長四寸。粗如筆管。兩頭要光圓。研十數轉足矣。如太乾。加入清水一二滴。切不可太潮。只要研如乾漿糊狀。用彈熟新棉花。捏一小團。如棗核大。兩頭圓。其長短粗細。量兒鼻孔之大小為之。其棉團不可太鬆。鬆則苗氣易往外洩。且見涕則縮小。易於脫出。將棉團只用一頭蘸漿末糊於上。塞兒鼻中。男左女右。塞不可太進。太進則兒不適意。亦不可太出。太出則易於脫落。總要寬鬆。淺深適中。為妙。塞後勿放小兒用手拈出。若被噴嚏打出。急將苗仍塞入鼻下。苗後以六個時辰為度。天氣熱。早取出數刻。天氣寒。多留數刻。痘苗取出之後。其苗氣漸次傳遍五臟。至七日。或八九日。始發熱。發熱三日而見點矣。此誠至穩至當之種法也。種痘之苗。不過痘痂一味。今各處種師。詭稱痘痂之外。尚要加他藥。為力導。此係惑人謠語。切勿信。

之既種後將發熱時小兒頸項內男左女右必有一
 小塊狀如痰核此乃毒氣結聚於此故痘發必稀疎
 此塊不必醫治待落痂後則塊亦漸消矣若用脂苗
 種者項中無塊當以此辨之又間有驚痘於發熱時
 小兒忽然驚搖手足跳不語目上視有片時即平復
 者有發一二個時辰者有發一次者有發兩次者總
 屬不妨斯時切不可擾動叫喚之待其自平即已不
 必服藥須預對痘家說明免其憂慮以上諸論皆時
 下種師之秘訣也若夫辨兒之可種與不可種須察
 兒體之虛實及有無宿病若調治之法當節飲食適
 臨證指南醫案 卷十 痘 聖

寒溫防驚嚇此皆種師俱各明悉茲不重贅 鄭望頤

疳

脾胃虛弱
 和

沈 穉年歇乳進穀脾胃氣餒少運腹膨目翳是為五疳

夏日中土司令久病投以補氣恰合調其脾胃近日嘔
 吐泄瀉身熱乃寒暄失和致食不易化小溲既少腑氣
 不和余幼科久疎憶錢氏每以調中為主而驅邪都主
 輕法深慮脾土傷則延驚癇耳

益智仁 焦朮 茯苓 廣皮

藿香梗 厚朴 查肉 澤瀉

張四 五疳腹脹數月法當疎補

臨證指南醫案 卷十 疳 聖

人參 茯苓 麥芽 炒查肉

廣皮 半夏 湖蓮

又 照前方去半夏湖蓮加澤瀉

陳五 官人自汗短氣咳嗽風溫見症肌腠有瘰癧之形與

疹瘡腑病不同但幼穉生陽充沛春深入夏形質日減

色脈是虛而補脾辛甘不應腹滿按之自硬二便原得

通利腹痛時發時止痛已即能飲食考幼科五疳與大

方五勞相類疳必因鬱熱為積為重此飲食不充肌膚

也病來非暴攻之由漸再論疳熱重積古人治肝治胃

恒多而潔古東垣於內傷夾滯所製九劑以緩治取義

乎渣質有形與湯飲異。或刻下溫邪擾攘之餘。即以甘涼之屬。清養胃陰。以化肺熱。其辛氣泄表不宜進。

甜杏仁 麥冬 地骨皮 生甘草

冬桑葉 玉竹 和入青甘蔗汁一酒杯

做治疳熱羸瘦。從陽明厥陰疏通消補兼施。

方九 人參 黃連 蘆薈 川棟子 使君子

茯苓 白芍 廣皮 胡黃連 南山楂

某七 歲食物不節。脾胃受戕。腹膨大便不調。此屬脾疳。

焦木 茯苓 廣皮 益智仁

大腹皮 木瓜 炮薑 炒神麴

臨證指南醫案 卷十 疳 聖

吳九 歲能食。色枯形瘦。熱泄瀉。此皆口腹不慎。值長夏濕熱。脾胃受傷。將成五疳。

青蒿梗 枳實炭 胡黃連 炒穀芽 炒白芍

炒山查 廣皮 茯苓 澤瀉

王 五疳已久。脾胃受傷。食物不運。腹膨滯瀉。此積聚未清。中焦先餒。元穀不化。腫脹皆至難治之症。

七香餅 疳者乾也。小兒腸胃柔嫩。若乳食失調。甘肥不節。運

化不及。停積發熱。熱久津乾。此因積成疳者也。或五

臟偏熱。或因病後。或醫藥誤下。致亡失津液。脾不輸

化。積滯不行。此因乾致積者也。故五疳不離乎脾胃。

其治法。胃滯當消。脾弱宜補。熱者用苦寒清火。冷者宜辛溫健運。有蟲者兼用殺蟲之品。其虛者各隨本臟補其母。總宜丸劑緩調。不能旦夕速功。或用雞肝納入治疳藥。燉食。最為有效。陸履安

臨證指南醫案 卷十 疳 聖

吐瀉

吳 身熱吐乳自利溫邪內擾脾胃。年防驚。

藿香葉 飛滑石

王 未到周歲熱犯脾胃。嘔逆下利。壯熱不已。最多慢驚之變。

人參 川連 黃芩 藿香梗

廣皮 生白芍 烏梅

某 暑邪犯肺。交土王用事。脾胃素弱不運。暑濕腹鳴泄瀉。惡心露睛。怕成慢驚。

臨證指南醫案 卷十 吐瀉 五

人參 藿香 炒厚朴 木瓜

川連 茯苓 炒扁豆 澤瀉

章 傷食一症。考古用五積散之義。取煖胃使其腐熟也。

既上湧頻吐。大便溏瀉。胃氣益傷。陽氣坐困。日甚。清不升。濁不降。痰潮乾嘔。腹鳴。便遺。睡則露睛。黑唇紫小。

漫竟無陽不流行。津液自耗。有慢驚昏厥之危。議通胃陽。讀錢氏薛氏之書。能知此意。

人參 鮮金 炒半夏 炒白附子

茯苓 菖蒲 炒廣皮 炒粳米

又 陽明胃陽受傷。脈病以通為補。若與守中必致難逆。

昨日用方。通勝於補。獲安。幼穉非真虛寒之病。

人參 茯苓 益智 廣皮

炒荷葉 炒粳米

又 鼻明汗出。齟血。陽明虛。胃氣未和。不宜涼降。六神湯加炒廣皮。

虞 面色痿黃。脈形弦遲。湯水食入。嘔吐。出神氣。懨懨。

欲如昏寐。此胃陽大乏。風木來乘。漸延厥逆。俗稱慢脾。險症。幼稚弱質。病延半月有餘。豈可再以疲藥玩忽。宗仲景食穀欲嘔者。吳茱萸湯主之。

人參 吳茱萸 茯苓 半夏 薑汁

臨證指南醫案 卷十 吐瀉 五

又 昨用泄木救胃土法。安受不見嘔吐。然中焦陽氣大虛。濁氣上僭。則為昏厥。津液不升。唇舌乾燥。豈可苦寒。

再伐生氣。今如寐神倦。陽陷於陰。何疑。仲景通陽理虛。後賢錢氏薛氏。皆宗其義。

人參 炒半夏 茯苓 廣皮

煨薑 南棗 太極孔溫補

蘇 周歲幼小。強食腥麵。身不大熱。神氣呆鈍。上吐下瀉。最防變出慢驚。此乃食傷脾胃。為有餘。因吐瀉多。擾動正氣。致傷耳。

廣皮 厚朴 茯苓 廣藿香

內傷

生益智 木下

陳 涼風外受。內鬱熱。身發熱。便解血脈。煩渴。得汗

僅解外風。右裏熱。未。六便。有積滯。清

裏極。是。但半歲未。咳。食。胃。少。與藥

藿香梗 川連 黃芩 生白芍

淡竹葉 廣皮 滑石 炒查肉

余 形神衰弱。腹泄。純。白。而。瀉。瘕。痞。未。罷。氣。喘。痰。升。總

是損極。今胃虛納減。倘內風振動。驚厥立至。孰不知因

虛變病也。

人參 炒粳米 茯苓 炒廣皮 炒荷葉蒂

臨證指南醫案 卷一 吐瀉 羌

胃不和 呂 二痰。中。帶。血。食。已。嘔。吐。因。驚。仆。氣。逆。令。胃。不。和。與。黃。連

溫胆湯。因。年。弱。質。性。以。金。石。斛。代。之。溫胆湯去甘草

加金石斛薑汁

胃虛氣 某 九 久 嘔 少 食

人參 半夏 茯苓 廣皮 薑汁

某 一 蛇 厥 少 腹 痛 欲 嘔 安胃丸

王 九 久 瀉 兼 發 瘡 痂 是 濕 勝 熱 鬱 苦 寒 必 佐 風 藥 合 平 東

垣脾宜升胃宜降之旨

人參 川連 黃柏 炙草 廣皮

白朮 神麴 麥芽 柴胡 升麻

羌活 防風

何 一 夏 病 入 冬 仍 腹 痛 下 積 稔 年 不 慎 食 物 腸 胃 屢 瀉 利

久 陰 傷 身 熱 痰 喘 先 與 理 陰 疎 肺 滯 濁

熟地炭 當歸炭 山查 炮薑

炙草 茯苓 麥芽

世 俗 所 稱 慢 驚 風 者 不 知 起 於 何 代 創 是 名 者 其 遺

禍 於 嬰 孩 已 不 啻 萬 億 矣 蓋 就 其 所 指 之 病 而 論 如

吐 瀉 兼 作 氣 怯 神 倦 虛 煩 搐 搦 痰 喘 不 食 肝 虛 無 神

睡 則 露 睛 等 症 乃 與 病 名 毫 不 相 關 其 所 指 之 症 是

或 由 外 感 未 清 或 諸 病 誤 治 或 飲 食 失 調 或 由 病 後

臨證指南醫案 卷一 吐瀉 卒

而 成 以 致 吐 則 傷 胃 瀉 則 傷 脾 土 衰 則 不 生 金 中 虛

木 必 乘 剋 是 皆 肝 脾 肺 胃 之 病 治 宜 急 顧 本 原 扶 土

生 金 安 胃 和 肝 溫 養 腎 陽 猶 慮 弗 及 若 就 其 名 而 治

之 醫 家 胸 中 先 執 慢 驚 風 三 字 之 名 概 用 重 墜 之 藥

鎮 驚 定 怯 或 散 風 清 火 豁 痰 破 氣 其 遺 禍 可 勝 言 哉

蓋 是 症 因 中 土 已 虛 風 木 已 動 延 久 必 現 出 似 驚 之

狀 耳 實 則 並 非 因 驚 而 起 也 奈 何 竟 以 慢 驚 風 名 之

豈 非 指 鹿 為 馬 乎 要 之 慢 字 若 以 急 慢 而 論 則 凡 病

之 緩 者 皆 可 稱 為 慢 惟 驚 乃 屬 急 症 不 可 以 慢 字 加

之 若 以 似 慢 肆 慢 而 講 於 病 名 上 又 甚 荒 唐 惟 願 觀

幼科書者當知其背謬不通勿爲其所惑則幸甚今
觀先生案中並未嘗用及驚藥風藥是明徵也此症
更當兼參東垣立齋景岳諸法而治之則無遺蘊矣
華岫雲

臨證指南醫案

卷十

吐瀉

空

癰瘰癧

熱邪閉

周 痺年癰癧病發迅速醒來二便自通此係陽氣拂逆
阻其靈竅姑與清絡宣通方法

犀角

遠志

胆星

黑山梔

玄參

菖蒲

連翹

竹葉心

風入

唐十四面青脉濡神呆舌絀不伸語寂寂然癰症四肢皆震
口吐涎沫此陰風已入脾絡矣

人參

生朮

蜈蚣

全蝎

薑汁炒南星 薑汁炒白附

臨證指南醫案

卷十

癰瘰癧

空

邪遏心

某 伏邪經旬發熱不解唇焦舌渴暮夜神識不清慮其
邪陷心胞有瘰癧之變

犀角

捲心竹葉

鮮石菖蒲

連翹

玄參心

浙生地

又 化熱液枯

生地

竹葉心

丹皮

玄參

麥冬

生白芍

熱邪傷
陰用風
動

吳 冬月伏邪入春病自裏發裏邪原無發散之理更悞
於禁絕水穀徒以苓連枳朴希圖清火消食以退其熱
殊不知胃汁再劫肝風掀動變幻瘰癧危病診視舌絀

鼻竅黑煤肌膚甲錯欲飲水心中疼熱何一非
肝腎陰液之盡引水自救風陽上燥亂如狂皆緣腎
者未曾曉得溫邪從陰裏發達者必以存陰為務
耳今延及一月五液告涸病情未為穩當所恃重真食
穀多歲錢氏謂幼科易虛易實望其倘有生機而已

阿膠 生地 天冬 川石斛

雞子黃 玄參心

又 鹹潤頗安其執邪深入至陰之地古云熱深厥深內
涸若此陰液何以上承慮其將餓咽故以解毒佐之

玄參心 真阿膠 真金汁 細生地

臨證指南醫案 卷十 癩瘧厥 奎

天冬 銀花露

又 胃未得穀風陽再熾入暑煩躁防其復厥

生地 白芍 麥冬 金汁

阿膠 牡蠣 金銀花露

又 神識畧蘇常欲煩躁皆是陰液受傷肝風不息議毓
陰和陽

生地 牡蠣 阿膠 麥冬

木瓜 生白芍

又 腫中熱熾神躁舌乾痰多咳嗽皆火刑肺金宜用紫
雪丹一錢

小兒癩瘧厥本屬險症十中每死二三奈今之患者

十中常死六七其故何也蓋緣醫者不察病情概以
芩連鉤藤茵蒲梔紅等夾金石之藥投之以冀清火

降痰而已此醫之不善治也而最可惡者尤在病家
之父母失於調治有名為愛之實以殺之之故何也

小兒諸症如發熱無汗煩躁神昏譫語之頃或戰汗
大汗將止之時或嘔吐泄瀉之後或癰厥漸甦或便

久閉而適然大便或灌藥之後斯時正元氣與病邪
交戰之際若能養得元氣一分即退一分病邪此際

小兒必有昏昏欲睡懶於言語氣怯神弱身不轉動
臨證指南醫案 卷十 癩瘧厥 奎

之狀此正當養其元神冀其邪退正復乃病家父母
偏於此際張惶驚恐因其不語而呼之喚之因其不

睡而頻叫醒之因其不動而搖之拍之或因微有昏
譫而必詳詰之或急欲以湯飲進之或屢問其痛痒

之處曉曉不已使其無片刻安寧如此必輕變為重
重變為死矣更有豪富之家延醫數人問候者多人

房中聚集者多人或互談病情病狀夜則多燃燈燭
以照之或對之哭泣不已或信巫不信醫祈禱疊興

舉家紛擾此非愛之實以殺之也試以大人之病情
體貼之抑好安然寂靜乎抑好喧譁動擾乎此理概

可知也。予曾見一孩。患暑濕初瘧。半月有餘。病勢甚重。醫者投以蒼朮白虎湯。夜半發汗。至寅時身體漸涼。冷汗不止。默默倦睡。口不肯言。氣息甚微。醫云。六脈安靜。並不煩躁。此病退之象也。因戒其父母。切勿擾動。直至申時。汗止聲出。而病已霍然矣。可見無論大人與小兒諸病。總宜安然寂靜為主。其調養之法。有非筆墨所能罄者。惟在病家能細心體會。醫者能諄諄告戒。勿以余言為迂。則幸甚。更有幼孩發熱昏迷。手足厥冷。竅絡阻塞。哭不出聲。藥難下咽。斯時惟有諄善於推拿者。可使立時甦醒。然後再議用藥。至於治法。癰瘰厥本屬三症。與大方相類。茲不重贅。華

臨證指南醫案

卷十

癰瘰厥

奎

虫

濕熱

陳^七濕傷脾胃失調。下注小腸。虫從溺竅而出。糞溏完穀。

不可溫補

黃柏

茯苓

猪苓

槐米

澤瀉

葶藶

又。虫自小便而出。經月瀉皆粘膩。及不化食物。此非虛寒。皆濕蘊內蘊。運化失司。當苦藥勝濕。兼理幼穉疳積。

黃連

黃柏

茅朮

厚朴

澤瀉

槐角子

木通

使君子

淡竹葉

臨證指南醫案

卷十

奎

三服後續進肥兒丸

龔^七濕熱生虫。腹痛便溏。惡食。

川連

胡連

生白芍

烏梅

枳實

川椒

炒查

青皮

水法丸

許腸有濕熱生虫。用苦寒引導小腸。

苦楝皮

北秦皮

槐角子

胡粉

黃柏

牡蠣

生研末猪肚腸一條漂潔煮丸

張^十丹溪云。小兒盜汗。不可用湯藥。純陽汗。乃陽泄故也。至於瘡多。濕熱浮腫。脹滿得攻下而消。此六腑以通為補也。其少腹痛。屢發。亦由濕熱生虫。生積。當以發苦

泄熱

川連 胡連 生白芍 雞肫皮 炒香肉

蘆薈 枳實 苦楝皮 烏梅肉 搗丸

汪六肛漏時腫瀉過白虫手足陽明熱甚

槐角子 黃柏 樞子肉 生茅朮 樗根白皮

小川連 茯苓 炒地榆 蒸餅爲丸

虫類雖多其源皆由飲食停滯濕熱鬱蒸變化而成

者也凡面色痿黃飲食不爲肌膚起伏作痛聚散不

定痛止即能飲食者皆有虫積或從嘔或從小便或

從大便而出治法當觀其微甚若虫勢驟急者當用

臨證指南醫案卷十 虫

攻逐之劑如黑丑檳榔大黃胡粉山稜莪朮之類虫

去則調其脾胃緩者用酸苦泄熱燥濕兼以相制相

畏之品如川連胡連蘆薈苦楝烏梅川椒雷丸蕪荑

史君樞肉之類脾弱者兼運其脾胃滯者兼消其滯

虫症治法大畧如此 陸履安

案中所用諸方開載於後以便初學之士查閱

桂枝湯 桂枝 白芍 炙草 生薑 大棗

桂枝加附子湯 即桂枝湯加附子

苓桂朮甘湯 茯苓 白朮 桂枝 炙草

小建中湯 白芍 桂枝 炙草 生薑 大棗 飴糖

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 桂枝 炙草 生薑

大棗 蜀漆 龍骨 牡蠣

生薑瀉心湯 生薑 乾薑 半夏 黃芩 黃連 甘草

人參 大棗

甘草瀉心湯 甘草 乾薑 半夏 黃芩 黃連 大棗

臨證指南醫案卷十 集方 矣

半夏瀉心湯 半夏 黃芩 黃連 人參 炙草 乾薑

大棗

附子瀉心湯 附子 黃芩 黃連 大黃

黃芩湯 黃芩 白芍 甘草 大棗

黃連阿膠湯 黃芩 黃連 白芍 阿膠 雞子黃

旋覆花代赭石湯 旋覆花 代赭石 人參 半夏 甘草

生薑 大棗

炙甘草湯 又名復脈湯 炙草 桂枝 人參 麻仁 生地

阿膠 麥冬 生薑 大棗

烏梅丸 烏梅 人參 當歸 黃連 黃柏 桂枝 乾薑

蜀椒 附子 細辛

白虎湯 石膏 知母 甘草 粳米

白虎加入參湯 即白虎加入參

竹葉石膏湯 竹葉 石膏 人參 麥冬 半夏 甘草

粳米

白頭翁湯 白頭翁 秦皮 黃連 黃柏

大黃黃連瀉心湯 大黃 黃連

猪膚湯 猪膚 白蜜 白粉

四逆湯 甘草 乾薑 附子

人參四逆湯 即四逆湯加入參

臨證指南醫案 卷十 集方

宛

通脉四逆湯 即四逆湯加葱白 更有隨症加法

通脉四逆加猪胆汁湯 即四逆湯加猪胆汁

白通湯 葱白 乾薑 附子

白通加猪胆汁湯 即白通湯加猪胆汁人尿

木附湯 白朮 附子 甘草 生薑 大棗

桂枝附子湯 桂枝 附子 甘草 生薑 大棗

理中湯 九同 人參 甘草 白朮 乾薑

吳茱萸湯 吳茱萸 人參 生薑 大棗

真武湯 茯苓 白芍 白朮 附子 生薑

桃花湯 赤石脂 乾薑 粳米

麻黃杏仁甘草石膏湯 麻黃 杏仁 甘草 石膏

小青龍湯 麻黃 桂枝 白芍 乾薑 細辛 五味子

甘草 半夏

梔子豉湯 梔子 香豉

桃仁承氣湯 桃仁 桂枝 大黃 芒硝 甘草

四逆散 柴胡 枳實 白芍 甘草

白散 桔梗 貝母 巴豆

五苓散 猪苓 茯苓 澤瀉 白朮 桂

猪苓湯 猪苓 茯苓 澤瀉 阿膠 滑石

牡蠣澤瀉散 牡蠣 澤瀉 海藻 蜀漆 葶藶 商陸根

臨證指南醫案 卷十 集方

辛

瓜蒌根

右仲景傷寒中方

蠶甲煎丸 蠶甲 烏扇 黃芩 柴胡 鼠婦 乾薑

大黃 芍藥 桂枝 葶藶 石葦 厚朴 丹皮

瞿麥 紫威 半夏 人參 蟾蜍 阿膠 蜂窠

赤硝 蜣螂 桃仁 煨龍下灰 清酒

千金方有海藻大戟無鼠婦赤硝

白虎加桂枝湯 即白虎湯加桂枝

崔氏八味丸 乾地黃 山茱萸 山藥 丹皮 茯苓

澤瀉 附子 桂枝

桂枝加龍骨牡蠣湯	即桂枝湯加龍骨牡蠣
酸棗仁湯	棗仁 甘草 知母 茯苓 川芎
黃芪建中湯	即小建中湯加黃芪
皂莢丸	皂莢 蜜丸棗膏湯送
麥門冬湯	麥冬 半夏 人參 甘草 大棗 粳米
葶藶大棗瀉肺湯	葶藶 大棗
千金葦莖湯	葦莖 苡仁 桃仁 瓜瓣
瓜蒌薤白白酒湯	瓜蒌實 薤白 白酒
赤石脂丸	蜀椒 烏頭 附子 炮薑 赤石脂
附子粳米湯	附子 半夏 甘草 粳米 大棗
臨證指南醫案 卷十 集方 三	
當歸生薑羊肉湯	當歸 生薑 羊肉
甘遂半夏湯	甘遂 半夏 芍藥 甘草 一木無
木防已湯	木防已 石膏 桂枝 人參
小半夏湯	半夏 生薑
外臺茯苓飲	茯苓 人參 白朮 枳實 橘皮 生薑
桂苓五味甘草湯	桂枝 茯苓 五味 甘草
越婢湯	麻黃 石膏 甘草 生薑 大棗
防己茯苓湯	防己 黃芪 桂枝 茯苓 甘草
大半夏湯	半夏 人參 白蜜
大黃牡丹湯	大黃 丹皮 桃仁 瓜子 芒硝

當歸建中湯	即小建中湯加當歸
甘草小麥大棗湯	甘草 小麥 大棗
旋覆花湯	旋覆花 葱 新絳
腎氣丸	與崔氏八味丸同
右金匱要畧中方	
六味地黃丸	即八味去桂附 煎服名六味地黃湯
都氣丸	即六味丸加北味 再加附子名附都氣丸
還少丹	熟地 山藥 牛膝 枸杞 山萸 茯苓 杜仲
遠志	五味子 楮實 小茴 巴戟 從蓉 石菖蒲
丹溪滋陰大補丸	即還少丹去楮實
臨證指南醫案 卷十 集方 圭	
黑地黃丸	蒼朮 熟地 五味 乾薑
虎潛丸	熟地 虎胥骨 龜板 黃柏 知母 瑣陽
當歸	牛膝 白芍 陳皮 羯羊肉
天真丸	精羊肉 肉苁蓉 山藥 當歸 天冬 黃芪
人參	白朮
三才湯	天冬 熟地 人參
大造丸	紫河車 龜板 人參 熟地 天冬 麥冬
黃柏	牛膝 杜仲
人參固本丸	人參 天冬 麥冬 生地 熟地
天王補心丸	生地 人參 玄參 丹參 棗仁 遠志

扶神 柏子仁 天冬 麥冬 當歸 五味 桔梗	石菖蒲 辰砂	孔聖桃中丹 龍骨 龜板 遠志 菖蒲	大補陰丸 黃柏 知母 熟地 龜板 猪脊髓	滋腎丸 黃柏 知母 肉桂	斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 菟絲子 柏子仁	玉貞丸 硫黃 硝石 石膏 半夏 薑汁糊丸	來復丹 玄精石 硫黃 硝石 五靈脂 青皮 陳皮	牛疏丸 半夏 流黃	黑錫丹 黑鉛 硫黃
<p>二至丸 冬青子 旱蓮草</p> <p>參苓白朮散 人參 茯苓 白朮 甘草 山藥 扁豆</p> <p>苡仁 建蓮 砂仁 桔梗 陳皮</p> <p>玉屏風散 黃芪 防風 白朮</p> <p>四君子湯 人參 茯苓 白朮 甘草</p> <p>六君子湯 即四君子湯加陳皮半夏</p> <p>異功散 即四君子湯加陳皮</p> <p>四獸飲 即六君子湯加烏梅草果生薑大棗</p> <p>六神散 即四君子湯加山藥扁豆薑棗煎</p> <p>補中益氣湯 人參 黃芪 白朮 甘草 陳皮 當歸</p>									

升麻 柴胡 生薑 大棗	三拗湯 麻黃 杏仁 甘草	葱豉湯 葱白 淡豆豉	川芎茶調散 川芎 薄荷 荆芥 羌活 白芷 甘草	防風 細辛 爲末茶調服	霞天膏 牛肉熬膏加麵	防風通聖散 防風 荆芥 麻黃 連翹 薄荷 川芎	當歸 白芍 白朮 山梔 大黃 芒硝 黃芩	石膏 桔梗 甘草 滑石 薑蔥	溫胆湯 陳皮 半夏 茯苓 甘草 枳實 竹茹
<p>十味溫胆湯 即溫胆湯加人參遠志棗仁熟地</p> <p>逍遙散 柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓 甘草 煨薑</p> <p>薄荷 本方加丹皮山梔名加味逍遙散</p> <p>六和湯 砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜</p> <p>人參 赤茯苓 白朮 甘草 薑棗</p> <p>藿香正氣散 藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 白朮</p> <p>陳皮 半夏 厚朴 桔梗 甘草 薑棗</p> <p>駐車丸 黃連 阿膠 乾薑 當歸</p> <p>越鞠丸 香附 蒼朮 川芎 神麴 山梔</p> <p>四物湯 生地 當歸 白芍 川芎</p>									

張子和王燭散	歸尾	生地	川芎	赤芍	大黃	芒硝
甘草						
歸脾湯	人參	白朮	茯苓	棗仁	龍眼肉	黃芪
當歸	遠志	木香	炙草	生薑	大棗	
人參養榮湯	人參	茯苓	白朮	甘草	當歸	白芍
熟地	黃芪	肉桂	五味	遠志	陳皮	加薑棗
犀角地黄湯	犀角	生地	白芍	丹皮		
地黃飲子	熟地	巴戟	山黃	菴蓉	附子	官桂
石斛	茯苓	菖蒲	遠志	麥冬	五味	
活絡丹	川烏	草烏	胆星	地龍	乳香	沒藥
臨證指南醫案 卷十 集方 圭						
附子理中湯	即理中湯加附子					
理中安蛇丸	即理中湯去甘草加茯苓川椒烏梅					
連理湯	即理中湯加黃連茯苓					
治中湯	即理中湯加青皮陳皮					
四神丸	破故紙	五味	肉蓯	吳萸		
清暑益氣湯	人參	黃芪	白朮	蒼朮	青皮	陳皮
神麴	甘草	麥冬	五味	當歸	黃柏	澤瀉
升麻	葛根	加薑棗				
生脉散	人參	麥冬	五味			
益元散	滑石	甘草	辰砂			

大順散	乾薑	肉桂	杏仁	甘草
四苓散	猪苓	茯苓	澤瀉	白朮
桂苓丸	肉桂	茯苓	蜜丸	
胃苓散	即平胃散合五苓散			
加味腎氣丸	即六味丸加附子肉桂車前牛膝			
消川散	黑牽牛	大黃	甘遂	芒硝
解毒分清飲	川草薢	石菖蒲	烏藥	益智仁
食鹽	茯苓			
禹功散	黑牽牛	茴香	薑汁調	或加木香
瓊玉膏	地黃	茯苓	人參	白蜜
臨證指南醫案 卷十 集方 圭				
通幽湯	當歸	升麻	桃仁	紅花
			甘草	生地
				熟地
白虎加蒼朮湯	即白虎湯加蒼朮			
涼膈散	連翹	大黃	芒硝	甘草
				山梔
				黃芩
				薄荷
當歸龍薈丸	當歸	龍胆草	山梔	黃連
				黃柏
				黃芩
大黃	青黛	蘆薈	木香	麝香
				蜜丸薑湯下
左金丸	黃連	吳萸	水泛丸	
戊巳湯	黃連	吳萸	白芍	
甘露飲	生地	熟地	天冬	麥冬
				石斛
				茵陳
				黃芩
枳殼	枇杷葉	甘草	一方加桂苓名桂苓甘露飲	
河間桂苓甘露飲消石石膏寒水石甘草白朮茯苓澤瀉				

猪苓肉桂每服五錢 張子和去猪苓減三石一半加人

參乾葛藿香木香亦名桂苓甘露飲

瀉白散 桑皮 地骨皮 甘草 粳米

導赤散 生地 木通 甘草梢 淡竹葉

紫雪 黃金 寒水石 石膏 滑石 磁石 升麻 玄參

甘草 犀角 羚羊角 沉香 木香 丁香 朴硝

硝石 辰砂 麝香

清骨散 銀柴胡 胡黃連 秦艽 鱉甲 地骨皮 青蒿

知母 甘草

二陳湯 半夏 陳皮 茯苓 甘草 生薑

臨證指南醫案 卷十 集方 主

二賢散 陳皮 甘草

控涎丹 甘遂 大戟 白芥子

滾痰丸 青礞石 沉香 大黃 黃芩 煅硝

白金丸 白礞 鬱金

平胃散 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

橘牛枳朮丸 白朮 枳實 橘皮 半夏

保和丸 山楂 神麴 茯苓 半夏 陳皮 藟子 連翹

水陸二仙丹 金櫻膏 芡實

桑螵蛸散 人參 茯神 遠志 石菖蒲 桑螵蛸 龍骨

龜板 當歸

蠟礞丸 黃蠟 白礞

膠艾四物湯 卽四物湯加阿膠艾葉

柏子仁丸 柏仁 牛膝 卷柏 澤蘭 續斷 熟地

右江訥菴醫方集解中方

補陰益氣煎 人參 當歸 山藥 熟地 陳皮 炙草

升麻 柴胡 生薑

兩儀膏 人參 熟地 熬膏白蜜收

貞元飲 熟地 炙草 當歸

玉女煎 生石膏 熟地 麥冬 知母 牛膝

理陰煎 熟地 當歸 炙甘草 乾薑 或加肉桂

臨證指南醫案 卷十 集方 主

何人飲 何首烏 人參 當歸 陳皮 煨薑

參附湯 人參 製附子

芪附湯 黃芪 製附子 加生薑

青囊斑龍丸 鹿角膠 鹿角霜 柏子仁 菟絲子 熟地

茯苓 補骨脂

斑龍二至百補丸 鹿角 黃精 杞子 熟地 菟絲子

金櫻子 天冬 麥冬 牛膝 楮實子 龍眼肉

已上藥同鹿角熬成膏加入煉蜜調入後藥末杵合爲丸

鹿角霜 人參 黃芪 芡實 茯苓 山藥 知母

熟地 萸肉 五味子 十味爲細末和前膏爲丸

秫米半夏湯 秫米 半夏

錢氏益黃散 陳皮 青皮 訶子肉 炙草 丁香

和中丸 白木 厚朴 陳皮 半夏 枳榔 枳實

炙草 木香

東垣和中丸 人參 白朮 炮薑 炙草 陳皮 木瓜

神保丸 木香 胡椒 乾蝎 巴豆

子和導水丸 大黃 黃芩 滑石 黑丑

脾約丸 大黃 杏仁 厚朴 麻仁 枳實

華蓋散 麻黃 蘇子 桑皮 杏仁 赤苓 橘紅 甘草

石刻安腎丸 附子 肉桂 川烏 川椒 巴戟 菟絲子

臨證指南醫案 卷十 集方

破故 赤石脂 遠志 茯苓 茯苓 蒼朮 山茱萸

杜仲 胡蘆巴 石斛 韭子 小茴 菴蓉 柏子仁

川棟子 鹿茸 青鹽 山藥

王荊公妙香散 人參 龍骨 益智仁 茯苓 茯苓

遠志 甘草 硃砂

豬肚丸 白朮 苦參 牡蠣 豬肚一具 劉松石方

威喜丸 茯苓 豬苓 黃蠟

交加散 生地 生薑

烏鰂魚骨丸 烏鰂魚骨 蘆茹 即茜草根 雀卵 鮑魚湯下

三豆飲 大黑豆 赤小豆 綠豆 甘草水煮

錢氏牛黃清心丸 黃連 黃芩 山梔 鬱金 辰砂

西牛黃

右景岳全書中方 所載方及自定之方

已上四部書。諒業醫者必備。故但開藥品。其分量炮製加減服法。以及治症。俱未載明。并內有峻利之方。所服不過幾厘幾粒者。須按方查閱。切勿草率臆度。且不遵古法。不惟無效。反有遺悞。慎之。

清燥救肺湯 經霜桑葉 三錢 杏仁 七分 去皮 麥冬 一錢 二分 石膏 二錢 人參 七分 阿膠 八分 胡麻仁 一錢 甘草 一錢

枇杷葉 一片 上水 一碗 煎六分 食遠服

臨證指南醫案 卷十 集方

進退黃連湯 川黃連 一錢 薑汁炒 乾薑 一錢 人參 一錢 牛乳拌蒸

桂枝 一錢 牛乳 一錢 薑汁 一錢 大棗

右進法用本方三味不製水三茶鍾煎減半溫服退法桂枝不用黃連減半或加肉桂五分如上製煎服

當歸桂枝湯 即桂枝湯加當歸

茯苓桂枝湯 即桂枝湯加茯苓

參歸桂枝湯 即桂枝湯加入參當歸

人參建中湯 即建中湯加入人參

參芪建中湯 即建中湯加入參黃芪

歸芪建中湯 即建中湯加當歸黃芪

歸芪建中湯 即建中湯加當歸黃芪

歸芪建中湯 即建中湯加當歸黃芪

吳理中湯 卽理中湯加吳茱

人參溫胆湯 卽溫胆湯加人參

黃連溫胆湯 卽溫胆湯加黃連

星附六君子湯 卽六君子湯加製南星白附子

生脉四君子湯 卽生脉散合四君子湯

生脉六味湯 卽生脉散合六味湯

養營湯 卽人參養營湯

六神湯 卽陳無擇六神散卽四君子加山藥扁豆

戊巳湯 卽四君子湯加陳皮白芍 与戊巳湯各別

苓薑朮桂湯 以此四味

臨證指南醫案 卷十 集方

五子五皮湯 卽五皮飲加杏仁蘇子葶藶白芥子荀子

加桂理中湯 卽理中湯加桂

子和桂苓湯 卽子和桂苓飲

資生丸 人參 白朮 上炒 苡仁 各三 山查肉 神麴

橘紅 各二 扁豆 蓮肉 厚朴 各一 山藥 茯苓

麥芽 芡實 各一 桔梗 甘草 藿香 各五 澤瀉

川黃連 白豆蔻 各三 右製爲末煉蜜丸每丸重二錢

每服一丸醉飽後二九細嚼淡鹽湯下

聚精丸 黃魚鱔膠 一觔切碎 蛤粉炒 沙苑蒺藜 八兩馬乳浸隔

右爲末煉蜜丸每服八十九白湯下

禹餘糧丸 蛇含石 本草名蛇黃大 禹餘糧石 三兩層數多

鋼鉞砂 五兩醋 三物各研極細配入下項藥

羌活 川芎 三稜 蓬朮 白蔻 白蒺 陳皮

青皮 木香 大茴 牛膝 當歸 炮薑 附子 炮

肉桂 各五 右製爲末入前藥拌勻神麴糊爲丸如桐子

大食前或溫酒或白湯送下三十九至五十九最要忌鹽

一毫不可入口否則病發愈甚日三服兼用溫和調補藥

助之 此方又右大鉞砂丸 此方去附子蓬朮青皮加

茯苓葉氏名鉞砂丸

小溫中丸 白朮 茯苓 一兩 陳皮 一兩 熟牛夏 一兩

臨證指南醫案 卷十 集方

甘草 三錢 神麴 炒一 生香附 一兩 苦參 炒五 黃連 炒五

鉞砂 飛麴 一兩半 爲末醋水各半打神麴糊爲丸桐子大

每服七八十九白朮六錢陳皮一錢生薑一片煎湯下虛

甚者加人參一錢木方去黃連加厚朴半兩忌口病輕服

至六七兩小便長甚者服一觔小便始長

繆仲淳脾腎雙補丸 人參 蓮肉 炒 山萸 炒 山藥 炒 各

五味子 各一 橘紅 砂仁 炒 車前子 米泔

巴戟肉 各十二兩 肉豆蔻 十兩 補骨脂 日乾一動

右爲末煉蜜丸如虛而有火者或大盛肺熱者去人參肉

豆蔻巴戟補骨脂 忌羊肉羊血

阿魏丸	阿魏 七錢 鱉甲 二兩 黃芪 廣皮 枳實 柴胡
白木	各一 青皮 草果 黃芩 當歸 茯苓 各八錢
白蔻仁	七錢 山查 一兩 神麴 一兩 延胡 水法丸
又方	阿魏連翹胡黃連山查青皮山稜蓬朮陳皮半夏麥芽
厚朴萊菔子甘草	
更衣丸	硃砂 五錢 蘆薈 七錢 好酒和丸每服一錢二分
濟生腎氣丸	即八味丸加車前牛膝葉氏用茯苓八兩為君
熟地	只用四兩 又薛氏濟生九分量不同
海粉丸	蛤粉 瓜瓞實 杏仁 各一兩 廣皮 紫蘇 各二兩
白朮	土貝母 各四兩 紫苑 三兩 木香 五錢 煉蜜丸
臨證指南醫案 卷十 集方	
蔥白丸	熟地 四兩 白芍 當歸 川棟子 茯苓 各二兩
川芎	枳殼 厚朴 青皮 神麴 麥芽 各一兩 三稜
蓬朮	各一兩 乾薑 大茴 木香 各七錢 肉桂 五錢 用蔥白汁丸
又方	人參 阿膠 川芎 當歸 厚朴 用蔥白汁丸
安胃丸	烏梅 川椒 附子 桂枝 乾薑 各一兩 黃柏 二兩
黃連	五錢 川棟子肉 廣皮 青皮 各二兩 白芍 三兩
人參	量加如有邪 再用川椒烏梅湯法丸 一方無廣皮
有當歸細辛	
妙香丸	巴豆 三百十五粒 去皮 牛黃 研 龍腦 研 麝香 研
輕粉	各三兩 硃砂 九兩 真金箔 九十 右各研勻煉黃蠟六兩

入白蜜三分同煉勻為丸每兩作三十九	
海蛤丸	天冬 瓜蒌霜 海浮石 蛤粉 風化硝
桔梗	橘紅 香附 竹瀝 薑汁 蜜丸
木薤丸	白朮 菟絲 又是括新方苓朮菟絲丸
局方龍骨丸	即當歸龍薈丸
白痰黎丸	即一味用山梔湯製為丸用大豆黃卷湯送下
禹糧石脂丸	即二味為丸
橘朮丸	即二味為丸
真武丸	即真武湯作丸
歸脾丸	即歸脾湯料作丸
臨證指南醫案 卷十 集方	
桑麻丸	桑葉 罌粟之麻 蜜丸
濟川丸	即濟川散
禹功丸	即禹功散
生脉六味丸	即六味丸合生脉散
肥兒丸	景岳全書中有四方
益母丸	此方不一總用益母草膏為君有加四物香附山查
者有去山查加阿膠者有加八珍香附砂仁查肉者	
東垣清心涼膈散	連翹 薄荷 黃芩 山梔 桔梗
甘草 竹葉	水煎服
金鈴子散	金鈴子 即川棟子 延胡索 一兩 為末每服三

錢酒調服 水煎服亦可

虎杖散 吐牛膝根汁二兩古方本用虎杖草汁今人

當門子歸香一分 右將麝香入汁中和勻隔湯燉溫服

葛可久花蕊石散 花蕊石 煨存性研如粉以童便一盞男

人入酒少許女人入醋少許煎溫食後調服三錢甚者五

錢能使瘀血化為黃水後用獨參湯補之

歸芍異功散 卽異功散加當歸白芍

雞鳴散 牛蒡子炒香研細 加入雞羅冠血五匙狀元

通聖散 卽防風通聖散

歸其異功散 卽異功散加當歸黃芪

臨證指南醫案 卷十 集方

香砂異功散 卽異功散加木香砂仁

正氣散 卽藿香正氣散

玉壺丹 卽扁鵲玉壺丸 治命門火衰陽氣暴絕寒水厥服

却有神效古吳王晉三先生得異授製法當宗之

好硫黃八兩配真麻油八兩以硫打碎入冷油內燉爐上

炭火宜微勿烈以桑條徐調候硫溶盡卽傾入大水內急

攪去上面油水其色如金取缸底淨硫稱見若干兩仍配

香蘇油若干兩照前火候再溶再傾連前共三轉第四轉

用真棉花核油配硫若干兩照前火候再溶再傾入大水

內攪去上面油水其色如金第五轉用肥皂四兩水中同

煮六時第六轉用皂莢四兩水中同煮六時拔淨製硫之

油攪去其水其色如硫火之紫第七轉用爐中炭灰淋蠟

水製六時第八轉用水煮腐製六時拔淨皂蠟之性第九

轉用田字草出水荒稻田中其葉 搗汁和水煮六時臨用

研如飛麝凡淨硫一兩配炒糯米粉二兩或水法或濕搗

爲丸每服以硫三分爲準漸加至一錢止開水溫下

回生丹 大黑豆三升用水浸取殼用絹袋盛盛同豆

紅花三兩炒黃色入好酒四碗 蘇木三兩河水五碗

大黃爲末 陳米醋九觔 右將大黃末一觔入淨鍋下醋三

觔文火熬用長木筯不住手攪之將成膏再加醋三觔熬

臨證指南醫案 卷十 集方

之又加醋三觔次第加畢然後下黑豆汁三碗次下蘇木

汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆盛之大黃鍋焦亦

鏟下入後藥同磨

人參二兩 川芎 當歸 熟地 茯苓 香附 延胡

蒼朮米泔炒 桃仁 蒲黃各一兩 烏藥二兩 牛膝 地榆

橘紅 白芍 羌活 炙草 五靈脂 山萸 三稜各錢

良薑 木香各四錢 木瓜 青皮 白朮各三錢 益母草二兩

乳香 沒藥各二錢 馬鞭草 五錢 秋葵子 三錢

右三十味并前黑豆殼共晒乾爲細末入石臼內下大黃

膏再下煉熟蜜一觔共搗千槌爲丸每丸重二錢七分靜

室陰車二十份日不可煎曬乾後止重二錢外以蠟作殼
護之用時去蠟調服 一方無益母草馬鞭草秋葵子三
味并不用蜜醋止用八碗

至寶丹 犀角 鎔砂 雄黃 琥珀 玳瑁 各一兩

水安息香 一兩無灰酒熬成膏如 西牛黃 五錢 麝香 一錢

龍腦 二錢 金銀箔 各五片為極細末將安息香膏重湯煮入
諸藥搜和分作百丸蠟護隨服剖用參湯化下

紫金丹 牛黃 冰片 狗寶 鴉片 各六分 廣木香 二兩

右為末人乳九重五厘金箔為衣

震靈丹 禹糧石 赤石脂 紫石英 代赭石 各四兩

臨證指南醫案 卷十 集方

上四味作小塊入淨鍋中鹽泥封固候乾用炭十觔煨炭
盡為度入地出火氣必得二晝夜研細末

乳香 二兩 沒藥 二兩 硃砂 水飛 五靈脂 二兩

為末同前四味和勻糯米飯丸宜堅細

四順清涼飲 大黃 當歸 芍藥 甘草 各等分水煎服

露蓀飲 人參 生薑 水煎露一宿空心隔湯燉溫服

子和桂苓飲 即桂苓甘露飲

七香餅 香附 一兩 丁香 二錢 甘松 八錢 益智仁 六錢

砂仁 二錢 蓬朮 二錢 廣皮

阿膠雞子黃湯 阿膠 雞子黃 湯 河間中滿分消湯 清阿膠九

鑄煮丹 香連飲 已上五方候考

按先生雖善用古方然但取其法而並不膠柱觀其加減
之妙如復脈建中瀉心等類至用杜蠟澤瀉散只取此二
味故案中有但書用某方而不開明藥味者決非盡用板
方必有加減之處觀者以意會之可也

論中所述諸方開列於後以便查閱

麻黃人參芍藥湯 桂枝 麻黃 黃芪 炙草 白芍

人參 麥冬 五味 當歸

甘草湯 生甘草

生薑甘草湯 生薑 人參 甘草 大棗

臨證指南醫案 卷十 集方

調中益氣湯 即補中益氣湯去當歸白朮加木香蒼朮

升陽益胃湯 羌活 防風 獨活 白芍 各五錢 廣皮 四錢

黃芪 二兩 人參 半兩 炙甘草 各一兩 柴胡 黃連 各二錢

白朮 茯苓 澤瀉 各三錢 每服三錢加薑棗煎

桂枝黃連湯 即仲景黃連湯 黃連 桂枝 乾薑 人參

半夏 炙草

溫脾湯 乾薑 肉桂心 熟附子 炙草 枳實

厚朴 各二兩 大黃 四錢 用一兩水煎服

橘皮湯 橘皮 生薑

橘皮竹茹湯 橘皮 竹茹 生薑 甘草 人參

生薑半夏湯	半夏	生薑汁
蒼朮石膏湯	蒼朮	石膏 知母 甘草
滋陰養營湯	當歸	生地 熟地 白芍 甘草 黃芩
秦艽 防風		
蘭草湯	蘭草	水煎服
潔古芍藥湯	芍藥	歸尾 黃芩 黃連 大黃 木香
栝榔 甘草 肉桂		
葛根苓連湯	葛根	甘草 黃芩 黃連
茅朮理中湯	即理中湯白朮換茅朮	
厚朴三拗湯	厚朴	大黃 枳實
厚朴溫中湯	厚朴	陳皮 甘草 木香 草薢 乾薑
茯苓		
下瘀血湯	大黃 杏仁 蟅蟲	
舒筋湯	赤芍 海桐皮 當歸 白朮	各錢半 片薑黃二錢
羌活 炙草	各錢一	水薑煎去渣磨入沉香汁少許食前服
通氣防風湯	柴胡 升麻 黃芪	各錢一 防風 陳皮 羌活
人參 甘草	各錢五分	桑木 青皮 各錢三分 薤仁二分 黃柏一分
玄參 升麻湯	玄參 升麻 犀角	牛蒡 連翹 防風
與芩 黃連 桔梗 甘草		
芎歸湯	川芎	當歸

澤木湯	澤瀉	白朮
茵陳四逆湯	附子	乾薑 炙草 茵陳
坎炁湯	即坎炁丹	坎炁 人乳粉 熟地 人參 枸杞子
酒釀白蜜同煨搗丸米飲送		
補血湯	黃芪	當歸
黃連竹茹橘皮半夏湯	黃連 竹茹 橘皮 半夏	
左歸丸	熟地 山藥 枸杞 山萸 牛膝 菟絲子	
鹿角膠 龜膠		
右歸丸	熟地 山藥 枸杞 山萸 菟絲子 鹿角膠	
杜仲 當歸 肉桂		附子
臨證指南醫案	卷十	集方
金剛丸	草薢 杜仲 肉蓯蓉 菟絲子	
四斤丸	木瓜 天麻 薤蓉 牛膝	附子 虎骨
或加乳香沒藥		
柏子仁丸	柏子仁 人參 白朮 半夏 北味 牡蠣	
麻黃根 麥麩 棗肉丸		
五仁丸	火麻仁 郁李仁 柏子仁 松子仁 杏仁	
指迷丸	茯苓丸	即指迷茯苓丸
清六丸	滑石 甘草 紅麴	
蘇合香丸	蘇合香 安息香 犀角 冰片 射香 香附	
木香 藿香 沉香 丁香 白朮 煉蜜丸硃砂為		

表外作蠟丸

五瀉丸 硃砂 真珠 雄黃 水銀 黑鉛 煉蜜丸如藤

子大每服三四丸

硃砂安神丸 硃砂 黃連 生地 當歸 甘草

人參丸 人參 茯苓 茯神 棗仁 遠志 益智仁

杜蠟 硃砂 棗肉丸

扶菴丸 茯苓 菟絲子 建蓮 酒糊丸或加五味子

苓下菴丸 茯苓 白朮 菟絲子 蓮肉 山藥 炙草

五味子 杜仲

濟生固精丸 牡蠣 菟絲子 韭子 龍骨 北五味

臨證指南醫案 卷十 集方

桑螵蛸 白石脂 茯苓

家韭子丸 家韭子 鹿茸 肉苁蓉 牛膝 菟絲子

熟地 當歸 巴戟 杜仲 石斛 肉桂 炮薑

烏雞煎丸 烏骨雄雞一隻 烏藥 蛇床子 丹皮 白朮

人參 黃芪各一兩 茅朮一兩 海桐皮 紅花 白芍

肉桂 附子 炮去川烏 炮義朮 陳皮各二兩 熟地 洗焙

延胡 木香 肉荳蔻 草薢 琥珀各五錢 右細判以烏雞

湯燉去毛及腸雞將上藥納雞肚內用新磁瓶以好酒一

斗同煮令乾去雞骨以油單盛焙乾爲末煉蜜和丸如桐

子大每服三十丸隨症用湯引下

安蛇丸 卽理中安蛇丸

侯氏黑散 菊花 白朮 防風 桔梗 黃芩 細辛

茯苓 牡蠣 人參 礬石 當歸 乾薑 川芎

桂枝 爲散酒服

雞金散 雞內金 沉香 砂仁 陳香櫟皮

天水散 卽六一散

本事方神效散 白海浮石 蛤粉 蟬蛻 爲細末用大鯽

魚膽七箇調服三錢

人參敗毒散 人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎

桔梗 茯苓 甘草 枳殼 薄荷 生薑

臨證指南醫案 卷十 集方

瓜蒌散 瓜蒂 赤小豆 香豉

蒼耳散 白芷 薄荷 辛夷 蒼耳 爲末葱茶湯調服

聖濟透關散 雄黃 豬牙皂莢 藜蘆 等分研末先含水

一口用藥吹鼻卽吐去水 備急如聖散有白礬等分

花蕊石散 花蕊石 四兩 硫黃一兩 研細泥封煨赤服一錢重便

下

失笑散 蒲黃 五靈脂

五積散 白芷 陳皮 厚朴 當歸 川芎 芍藥 茯苓

桔梗 蒼朮 枳殼 半夏 麻黃 乾薑 肉桂

甘草 薑蔥

牛黃膏 牛黃_{二錢} 硃砂 鬱金 丹皮_{各三錢} 水片_{一錢} 甘草_{一錢}

煉蜜丸如劑子大每服一丸新水化下

三才封髓丹 天冬 熟地 人參 黃柏 砂仁 甘草

一炷丹 河車_{具一} 人乳粉_{四兩} 秋石_{四兩} 紅鉛_{五錢} 蜜丸每丸重七釐

琥珀黑龍丹_{即黑龍丹} 常歸 五靈脂 川芎 真薑 熟地_{各二兩}

碎八砂鍋內紙筋一百草霜一兩黃乳香_{各二錢} 琥珀

花蘆石_{錢各一} 右爲細末醋糊丸如彈子大每用一二丸炭

火煨紅段八生薑自然汁浸碎以童便合酒調灌下

左歸飲 熟地 山藥 枸杞 炙草 茯苓 山萸

右歸飲 即左歸飲去茯苓加杜仲肉桂附子

臨證指南醫案卷十 集方 全

溫胃飲 人參 白朮 炮薑 扁豆 當歸 陳皮 炙草

歸氣飲 熟地 茯苓 扁豆 炮薑 丁香 藿香 炙草

陳皮

大和中飲 陳皮 枳實 砂仁 麥芽 厚朴 山楂

澤瀉

四柱飲 人參 附子 茯苓 木香

六柱飲 即四柱飲加肉豆蔻訶子

五磨飲子 烏藥 沉香 檳榔 枳實 木香 白酒磨服

生鐵落飲 生鐵落 清水浸研澄飲水

普濟消毒飲 黃芩 黃連 陳皮 甘草 玄參 連翹

板藍根 牛蒡 薄荷 僵蚕 升麻 柴胡 桔梗

馬勃 或加人參 便閉加大黃

清心蓮子飲 石蓮肉 人參 黃芪 茯苓 柴胡 黃芩

地骨皮 麥冬 車前 甘草

七福飲 人參 熟地 當歸 白朮 棗仁 遠志 炙草

胃關煎 熟地 白朮 山藥 扁豆 炮薑 吳萸 炙草

二陰煎 生地 麥冬 棗仁 甘草 玄參 茯苓 黃芩

木通

秘元煎 人參 茯苓 白朮 炙草 棗仁 山藥 芡實

五味 遠志 金櫻子

臨證指南醫案卷十 集方 全

固陰煎 人參 熟地 山藥 山萸 遠志 炙草 五味

菟絲子

保陰煎 生地 熟地 白芍 山藥 川斷 黃芩 黃柏

甘草

壽脾煎 人參 白朮 炙草 當歸 山藥 棗仁 炮薑

建蓮肉 遠志

玉鑰匙 馬牙硝_{半兩} 礞砂_{五錢} 白僵蚕_{二錢} 水片_{一字}

爲末以紙管吹五分入喉中

蒲黃酒 蒲黃_{一兩} 炒褐色 清酒十爵沃之溫服

臨證指南醫案卷十終

臨證指南醫案十卷

浙江巡撫
採進本

國朝葉桂撰桂字天士吳縣人以醫術名於近時然
生平無所著述是編乃門人取其方藥治驗分門
別類集爲一書附以論斷未必盡桂本意也